

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
Департамента лекарственных
средств и медицинских изделий при
Министерстве здравоохранения
Кыргызской Республики

Кысанов Т.А.
« 04 » декабря 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

АЛЛЕРВЕГ

Торговое название

Аллервег

Международное непатентованное название

Лоратадин

Лекарственная форма

Таблетки

Состав

Каждая таблетка содержит:

Активное вещество:

Лоратадин 10 мг

Вспомогательные вещества: лактоза моногидрат, коповидон, микрокристаллическая целлюлоза, кроскармеллоза натрия, стеарат магния.

Описание

Белые таблетки однородные, круглые, с плоской поверхностью, фаской и риской на одной стороне.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты для лечения заболеваний респираторной системы. Антигистаминные препараты системного действия. Антигистаминные препараты системного действия другие. Лоратадин.

Код АТХ: R06AX13.

Фармакологические свойства**Фармакодинамика**

Аллервег - антигистаминное средство, селективно блокирует периферические H1-гистаминовые рецепторы. Подавляет каскад цитотоксических реакций: выделение провоспалительных цитокинов, в т.ч. интерлейкина-4 (ИЛ-4), интерлейкина-6 (ИЛ-6), интерлейкина-8 (ИЛ-8), интерлейкина-13 (ИЛ-13), хемокинов типа RANTES, продукцию супероксидного аниона активированными полиморфноядерными нейтрофилами, адгезию и хемотаксис эозинофилов, экспрессию молекул адгезии, в т.ч. Р-селектина, IgE- зависимое выделение гистамина, ПГЭ2 и LTC4. Применение в дозе 5 мг не сопровождается нарушениями психомоторных функций, а в дозе 10 мг увеличением частоты возникновения сонливости по сравнению с группой плацебо. При приеме доз 5-20 мг/сут в течение 2 недели кумуляции не наблюдается. Лоратадин уменьшает проницаемость капилляров, предупреждает развитие отека тканей, снимает спазмы гладкой мускулатуры. Первичный активный метаболит

лоратадина является дезлоратадин. Исходя из антигистаминной активности, Аллервег оказывает противоаллергическое и противозудное действие. Аллервег не усиливает такие эффекты алкоголя, как нарушение психомоторной функции и сонливость.

Фармакокинетика

После приема внутрь лоратадин хорошо абсорбируется из ЖКТ. Лоратадин начинает определяться в плазме в течение 30 мин после приема. Максимальная концентрация лоратадина в плазме достигается в период от 2 до 6 часов (в среднем через 3 часа) после однократного приема препарата в дозе 5 мг или 10 мг. Лоратадин экстенсивно метаболизируется в организме; лишь небольшая часть принятой внутрь дозы выводится с мочой (<2%) и калом (<7%). Основной путь метаболизма лоратадина является гидроксилирование. Лоратадин выводится из организма в виде глюкуронидного соединения и в небольшом количестве в неизмененном виде. Период полувыведения составляет от 20 до 30 часов (в среднем 27 ч). Не является ингибитором CYP3A4 и CYP2D6 и не является субстратом или ингибитором Р- гликопротеина. Степень кумуляции лоратадина соответствовала его периоду полувыведения (примерно 27 ч) и кратности применения (один раз в сутки). Биодоступность лоратадина была пропорциональна дозе в диапазоне от 5 мг до 20 мг. Лоратадин умеренно (83-87%) связывается с белками плазмы. Не проникает через ГЭБ, проникает через плацентарный барьер и в грудное молоко. В исследовании с однократным приемом лоратадина в дозе 10 мг пища не оказывала влияния на распределение лоратадина.

Показания к применению

Симптоматическое лечение аллергического ринита и хронической идиопатической крапивницы у взрослых и детей в возрасте старше 6 лет.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата;
- дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция;
- беременность, период лактации (грудное вскармливание);
- возраст до 6 лет и масса тела менее 30 кг;

С осторожностью назначают препарат при печеночной недостаточности.

Беременность и лактация

Применение Аллервег при беременности возможно только, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Аллервег выделяется с грудным молоком, поэтому при необходимости назначения препарата в период лактации следует прекратить грудного вскармливания.

Способы применения и дозы

Взрослые и дети, старше 12 лет принимают внутрь по 1 таблетке (10 мг) Аллервег 1 раз в день. Детям в возрасте от 6 до 12 лет назначают: при массе тела до 30 кг - по 1/2 таблетки, при массе тела более 30 кг - по 1 таблетке 1 раз в день.

Курс лечения - от 10 до 15 дней. В отдельных случаях курс лечения врач устанавливает индивидуально (от 1 до 28 дней).

Побочные эффекты

Со стороны нервной системы и органов чувств: головная боль (12%), сонливость (8%), утомляемость (4%), в 2% и менее — нарушение концентрации внимания, головокружение, нервозность, беспокойство, возбуждение (у детей), бессонница, обморок, амнезия, депрессия, гиперкинезия, тремор, парестезия, гипестезия, дисфония, нарушение зрения, изменение слезоотделения, конъюнктивит, блефароспазм, боль в глазах и ушах, шум в ушах; очень редко — судороги.

Со стороны органов ЖКТ: сухость во рту (3%), в 2% и менее — повышение аппетита, увеличение массы тела, анорексия, тошнота, изменение саливации, нарушение вкуса, зубная боль, стоматит, рвота, гастрит, метеоризм, диспепсия, запор или диарея; очень редко — желтуха, гепатит, некроз печени.

Со стороны респираторной системы: в 2% и менее — заложенность носа, чиханье, сухость в носу, носовое кровотечение, синусит, фарингит, ларингит, кашель, кровохарканье, бронхит, бронхоспазм, боль в грудной клетке, инфекции верхних дыхательных путей, диспноэ.

Со стороны мочеполовой системы: изменение цвета мочи, болезненные позывы на мочеиспускание, дисменорея, меноррагия, вагинит, ослабление либидо, импотенция, очень редко — отеки.

Со стороны опорно-двигательного аппарата: боль в спине, артралгия, миалгия, судороги икроножных мышц.

Со стороны ССС: гипертензия или гипотензия, сердцебиение, тахикардия; очень редко — суправентрикулярная тахикардия.

Аллергические реакции: гиперемия, кожная сыпь, крапивница, дерматит, зуд, ангионевротический отек; очень редко — анафилаксия.

Прочие: сухость волос и кожи, жажда, астения, недомогание, лихорадка, озноб, фотосенсибилизация, повышенная потливость, боль в молочных железах, увеличение массы тела; очень редко — алоpecia, увеличение размеров грудной клетки, многоформная эритема.

Передозировка

Симптомы: головная боль, сонливость, сердцебиение, которые могут продолжаться длительное время.

Лечение: при приеме избыточного количества Аллервег следует как можно быстрее удалить препарат из ЖКТ и по возможности уменьшить его абсорбцию (промывание желудка, прием активированного угля). Специфического антидота нет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При одновременном применении с эритромицином, кетоконазолом (ингибиторы CYP3A4) и циметидином (ингибитор CYP3A4 и CYP2D6) концентрация лоратадина в крови повышается. Понижает уровень эритромицина в плазме на (15%). Одновременный прием индукторов микросомального окисления (фенитоин, этанол, барбитураты, рифампицин, трициклические антидепрессанты) снижает эффективность лоратадина.

Особые указания

Прием препарата следует прекратить не менее чем за 2 суток перед проведением кожных аллергических проб, так как препарат Аллервег может оказать влияние на их результаты.

Использование в педиатрии: препарат не назначают детям младше 6 лет.

Применение у пациентов с печеночной недостаточностью: необходимо назначать уменьшенную суточную дозу препарата, по 5 мг 1 раз в день ежедневно или по 10 мг 1 раз в день через день.

Применение у пациентов с почечной недостаточностью: начальная доза должна составлять 10 мг (1 таблетка) через день.

Применение у пациентов пожилого возраста: коррекция дозы не требуется.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами: Данных об отрицательном влиянии Аллервег в рекомендуемых дозах на способности к управлению автомобилем или работе с механизмами нет. Однако при применении препарата Аллервег в дозах, превышающих рекомендуемые, или при появлении нестандартных эффектов после приема препарата, следует соблюдать осторожность при занятиях потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты реакций. Пациенты должны быть уведомлены о потенциальном риске в связи с развитием

симптомов головокружения, которые могут влиять на способность управлять транспортными средствами или сложными механизмами.

Форма выпуска

10 таблеток в каждом блистере.

Один блистер вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонной упаковке.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска

По рецепту.

Владелец торговой марки и регистрационного удостоверения**Vegapharm LLP**

Unit 18, 53 Norman Road, Greenwich Centre Business Park, London, England, SE10 9QF,
Великобритания

Производитель

Replek Farm Ltd., Skopje
Kozle Str. 188, 1000 Skopje,
Республика Македония

Адрес организации, принимающей на территории Кыргызской Республики претензии от потребителей по качеству продукта:

ОсОО «Аман Фарм»
г. Бишкек, Республика Кыргызстан, ул. Тыныстанова дом 4а, кв. 11
E-mail: aman.pharm 12@gmail.com