

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
Департамента лекарственных
средств и медицинских изделий при
Министерстве здравоохранения
Кыргызской Республики
Кысанов Т.А.
«19» _____ 2025 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ДИОСПЕРИДИН

Торговое название

Диосперидин.

Международное непатентованное название

Нет.

Лекарственная форма

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Состав: каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит:

Диосмин 450 мг

Гесперидин 50 мг

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, натрия крахмалгликолят, желатин, тальк, магния стеарат.

Покрывание содержит: глицерол, гипромеллоза 2190, макрогол 6000, натрия лаурилсульфат, железа (III) оксид желтый (E172), железа (III) оксид красный (E 172), титана диоксид (E 171), магния стеарат.

Описание

Розовато-бежевые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, овальные, двояковыпуклые с насечкой.

Фармакотерапевтическая группа

Ангиопротекторы. Диосмин в комбинации с другими препаратами.

Код АТХ: C05CA53

Фармакологические свойства

Фармакодинамика:

Диосперидин обладает венотонизирующим и ангиопротективным свойствами. На венозном уровне - уменьшает растяжимость вен и венозный застой. На уровне микроциркуляции - снижает проницаемость, ломкость капилляров и повышает их резистентность. У пациентов с признаками повышенной капиллярной ломкости после терапии препаратом повышалась капиллярная резистентность, измеренная ангиостереометрически. Повышает венозный тонус: с помощью венозной окклюзионной плетизмографии было показано уменьшение времени венозного опорожнения. Доказана терапевтическая эффективность при лечении функциональной и органической хронической венозной недостаточности нижних конечностей, а также в проктологии при лечении геморроя.

Диосмин — биофлавоноид. В комбинации с гесперидином оказывает венотонизирующее и ангиопротективное действие. Повышает тонус и уменьшает растяжимость вен, что способствует снижению венозного застоя; понижает проницаемость капилляров и увеличивает их резистентность; улучшает микроциркуляцию и лимфоотток. Применяется в смеси с гесперидином для лечения хронической венозной недостаточности нижних конечностей, лечения хронического геморроя и острых геморроидальных приступов.

Фармакокинетика:

Быстро абсорбируется в желудочно-кишечном тракте. Основное выделение препарата происходит с калом. С мочой в среднем выводится около 14% от принятого количества препарата.

Период полувыведения составляет 11 часов. Препарат имеет высокий уровень метаболизма, что демонстрируется присутствием феноловых кислот в моче.

Показания к применению

- хроническая венолимфатическая недостаточность нижних конечностей органической и функциональной природы (отеки, боль, тяжесть в ногах);
- острый и хронический геморрой.

Противопоказания

- известная повышенная чувствительность к препарату.
- детский возраст.

Способ применения и дозы

Для перорального применения.

Лечение хронической венолимфатической недостаточности (отеки, боль, тяжесть в ногах, ночные судороги, трофические язвы, лимфедема и др.): 2 таблетки в сутки (в два приема) во время еды. После недели применения можно принимать 2 таблетки в сутки одновременно во время еды.

Хронический геморрой: 2 таблетки в сутки (в два приема) во время еды. После недели применения можно принимать 2 таблетки в сутки одновременно во время еды.

Острый геморрой: 6 таблеток в сутки на протяжении первых 4 дней и по 4 таблетки в сутки на протяжении следующих 3 дней. Применять во время еды. Суточное количество таблеток разделить на 2–3 приема.

Курс лечения и дозирование зависят от показания для применения, течения заболевания и определяются врачом. Средняя продолжительность лечения составляет 2–3 мес.

Побочное действие

Со стороны пищеварительной системы: часто - диарея, тошнота, рвота, диспепсия; нечасто – колиты.

Со стороны ЦНС: редко – головокружение, головная боль, общее недомогание.

Со стороны кожных покровов: редко – сыпь, зуд, крапивница; неутонченной частоты – изолированный отек лица, губ, век; в исключительных случаях – ангионевротический отек.

Передозировка

Случаев передозировки не отмечено.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не отмечалось.

Особые указания

При обострении геморроя, назначение данного препарата не заменяет специфического лечения других нарушений. Продолжительность лечения не должна превышать сроки,

указанные в разделе «Способ применения и дозы». В том случае, если симптомы не исчезают после короткой терапии, следует провести проктологическое обследование и пересмотреть применяемую терапию.

При наличии нарушений венозного кровообращения, максимальный эффект лечения обеспечивается сочетанием со здоровым хорошо сбалансированным стилем жизни, при котором желательно избегать долгого пребывания на солнце, снизить массу тела, совершать пешие прогулки и, в некоторых случаях, носить специальные носки, улучшающие циркуляцию крови.

Беременность и лактация:

Следует воздерживаться от применения препарата в первые три месяца беременности.

Из-за отсутствия данных относительно экскреции препарата в молоко, кормящим матерям не рекомендуется прием препарата.

Влияние на вождение автомобиля и выполнение работы, требующей высокой скорости психических и физических реакций:

Не влияет.

Форма выпуска

По 15 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в ПВХ блистере.

По 2 ПВХ блистера вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонной упаковке.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

3 года. Не применять препарат по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Произведено для

SPEY MEDICAL LTD.

Lynton House, 7-12 Tavistock Square, London, WC1H 9LT, Великобритания

Производитель

HELP S.A.,

Pedini Ioanninon, Янина, 45500, Греция

Адрес организации, принимающей на территории Кыргызской Республики претензии от потребителей по качеству продукта

ОсОО «Аман Фарм» г. Бишкек, Республика Кыргызстан, ул. Тыныстанова дом 4а, кв. 11,

E-mail: aman.pharm12@gmail.com