

БЕКИТЕМ

Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо министрлигинин
алдындагы Дары каражаттары жана
медициналык буюмдар
департаментинин директорунун
орун басары

Абдиев М.К.

« 16 » *Сейсенби* 2020-ж.

**ДАРЫ КАРАЖАТЫН МЕДИЦИНАДА КОЛДОНУУ БОЮНЧА
НУСКАМАСЫ**

СТОФЕКСИМ

Соодадагы аталышы

Стофексим

Эл аралык патенттелбеген аталышы

Цефиксим

Дарынын түрү

Ичип кабыл алуу үчүн суспензияны даярдоого арналган порошок

Курамы

Стофексим 50 мг:

Ар бир даяр 5 мл суспензия төмөнкүлөрдү камтыйт:

Активдүү зат:

Цефиксим USP (тригидрат түрүндө) 50 мг суусуз цефиксимге туура келет.

Көмөкчү заттар: сахароза, ксантан чайыры, натрий бензоаты, ананас Трусил жыпар жыт бергичи, коллоиддүү кремний диоксиди, хинолин сары WS.

Стофексим 100 мг:

Ар бир даяр 5 мл суспензия төмөнкүлөрдү камтыйт:

Активдүү зат:

Цефиксим USP (тригидрат түрүндө) 100 мг суусуз цефиксимге туура келет.

Көмөкчү заттар: сахароза, ксантан чайыры, натрий бензоат, ананас Трусил жыпар жыт бергичи, коллоиддүү кремний диоксиди, хинолин сары WS.

Сүрөттөмөсү

Стофексим 50 мг/5 мл

Жыпар жыттуу, дээрлик актан боз-сары түскө чейинки гранулдаштырылган порошок.

Стофексим 100 мг/5 мл

Жыпар жыттуу, актан дээрлик ак түскө чейинки гранулдаштырылган порошок.

Фармадарылык тобу

Системалуу колдонуу үчүн микробко каршы препараттар. Системалуу колдонуу үчүн бактерияга каршы препараттар. Бета-лактамык бактерияга каршы башка препараттар. Үчүнчү муундагы цефалоспориндер. Цефиксим.

АТХ коду: J01DD08.

Фармакологиялык касиеттери

Фармакодинамикасы

Ичип кабыл алуу үчүн III муундагы, кеңири чөйрөдө таасир берүүчү жарым синтетикалык цефалоспориндүү антибиотик. Бактерицидик таасир көрсөтөт. Таасир берүү механизми козгогучтун клеткалык мембранасынын синтезин бөгөттөө менен шартталган. Цефиксим төмөнкү көптөгөн грамон жана грамтерс бактерияларды продуцирлөөчү β -лактамазалардын таасирине туруктуу.

Цефиксим *In vitro* жана клиникалык тажрыйба шартында *грамон бактерияларга*: *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus pyogenes*; *грамтерс бактерияларга карата активдүү*: *Haemophilus influenzae*, *Moraxella (Branhamella) catarrhalis*, *Escherichia coli*, *Proteus mirabilis*, *Neisseria gonorrhoeae*.

Цефиксим *In vitro* *грамон бактерияларга*: *Streptococcus agalactiae*; *грамтерс бактерияларга карата активдүү*: *Haemophilus parainfluenzae*, *Proteus vulgaris*, *Klebsiella pneumoniae*, *Klebsiella oxytoca*, *Pasteurella multocida*, *Providencia spp.*, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*, *Citrobacter amalonaticus*, *Citrobacter diversus*, *Serratia marcescens*.

Цефиксимдин таасирине *Pseudomonas spp.*, *Enterococcus (Streptococcus) serotoppor D*, *Listeria monocytogenes*, *Staphylococcus spp.* (анын ичинде метицилин-резистенттүү штамдар), *Enterobacter spp.*, *Bacteroides fragilis*, *Clostridium spp.* *туруктуу*.

Фармакокинетикасы

Ичип кабыл алууда цефиксимдин биожеткиликтүүлүгү тамак-ашты кабыл алууга көз карандысыз 40-50% түзөт, бирок цефиксимдин сары суудагы C_{max} препаратты тамак-аш менен бирге кабыл алууда 0,8 саатка тезирээк жетишилет.

Препаратты суспензия түрүндө 200 мг дозасында кабыл алууда кан сары суусунда C_{max} 4 сааттан кийин жетишилет жана 2,8 мкг/мл түзөт, 400 мг дозасында кабыл алууда – 4,4 мкг/мл.

Плазма белоктору менен байланышуусу, негизинен альбуминдер менен, 65% ды түзөт.

Дозанын 50% га жакыны 24 саат аралыгында өзгөрүлбөгөн түрдө заара менен бөлүнүп чыгарылат, дозанын 10% жакыны өт аркылуу бөлүнүп чыгарылат.

$T_{1/2}$ дозадан көз каранды жана 3-4 саатты түзөт.

Бөйрөк функциясы бузулган, КК 20 дан 40 мл/минутагы чейин болгон бейтаптарда $T_{1/2}$ 6,4 саатка чейин жогорулайт, КК 5-10 мл/мин болгон учурда – 11,5 саат.

Колдонууга көрсөтмөлөр

Стофексим грамон жана грамтерс микроорганизмдердин көптөгөн штамдарына карата активдүүлүккө ээ. Стофексим төмөнкү ооруларды дарылоо үчүн көрсөтүлгөн:

- кулкун сезгенүүсү, алкым бездин сезгенүүсү жана кобул сезгенүүсү;
- курч бронхит жана өнөкөт бронхиттин курчуусу;
- орто отит;
- заара жолдорунун оорлошпогон инфекциясы;
- уретралдык жана цервикалдык оорлошпогон гонорея;
- бактериялык гастроэнтерит.

Каршы көрсөтмөлөр

- цефалоспорин тобундагы антибиотиктерди жеке көтөрө албастык;

- 6 айга чейинки бала курагы.

Препаратты улгайган курактагы бейтаптарга, өнөкөт бөйрөк алсыздыгында, псевдомембраноздук колитте (оору таржымалында) **этияттуулук менен** дайындоо керек.

Кош бойлуулук жана бала эмизүү

Стофексим препаратын кош бойлуулук мезгилинде колдонуу, эне үчүн божомолдонгон пайда күмөн үчүн потенциалдуу кооптуулуктан жогору болгон учурда гана мүмкүн.

Бала эмизүү мезгилинде препаратты колдонуу зарыл болгон учурда эмчек эмизүүнү токтотуу керек.

Колдонуу жолу жана дозалар

Чондорго: Стофексим препаратынын сунушталган дозасы суткасына 400 мг түзөт. Бул дозаны ар бир 12 саат сайын 200 мг дан суспензия түрүндө кабыл алууга болот.

Оорлошпогон уретралдык же цервикалдык гонококк инфекциясын дарылоо үчүн 400 мг Стофексим препаратын бир жолу ичип кабыл алуу сунушталат.

Балдарга: суспензиянын сунушталган дозасы суткасына 8 мг/кг түзөт. Ал суткалык дозада бир жолу же 2 кабыл алууга бөлүнүп кабыл алынса болот, тактап айтканда 4 мг/кг дан ар бир 12 саат сайын. 50 кг дан жогору дене салмагы менен же 12 жаштан улуу балдар чондорго сунушталган дозаны алышы керек.

Бөйрөк функциясы бузулган учурда Стофексим препараты төмөнкү негизде дайындалышы мүмкүн: креатинин клиренси доза 60 мл/мин стандарттуу доза (400 мг суткасына). 21–60 мл/мин стандарттык дозанын 75% (300 мг суткасына). 20 мл/мин стандарттык дозанын жарымы (200 мг суткасына).

Суспензияны даярдоо жолу: флаконду көмкөрүү жана порошокту чайкоо керек. Флакондогу белгиге чейин бөлмө табына чейин муздатылган кайнак сууну 2 этапта кошуу керек жана ар бир кошуудан кийин гомогендик суспензия пайда болгуча аралаштыруу керек. Андан кийин порошоктун толук эрүүсүн камсыздоо үчүн суспензияды 5 мин аралыгында коюп коюу керек. Даяр суспензияны колдоноор алдында чайкап алуу зарыл.

Кыйыр таасири

Аллергиялык реакциялар: бөрү жатыш, тери гиперемиясы, тери кычышуусу, эозинофилия, калтыроо, көп формлуу экссудативдүү эритема (ошондой эле Стивенс-Джонсон синдрому), токсиндүү эпидермалдык некролиз (Лайелл синдрому), анафилактикалык шок, сары суулук ооруну элестетүүчү реакциялар.

Нерв системасы тарабынан: баш ооруу, баш айлануу, кулактарда чуулдоо, карышуулар.

Тамак-ашты сиңирүү системасы тарабынан: ооз кургоо, анорексия, көңүл айнуу, кусуу, ич өтүү, ич катуу, метеоризм, ич ооруу, дисбактериоз, боор функциясынын бузулуусу, холестаз, холестатикалык сарык, кандидоз, стоматит, глоссит, псевдомембраноздук энтероколит.

Кан жаратуу системасы тарабынан: панцитопения, лейкопения, нейтропения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, гемолитикалык аз кандуулук, апластикалык аз кандуулук, кан агуу.

Заара бөлүп чыгаруу системасы тарабынан: интерстициалдык нефрит, бөйрөк функциясынын бузулуусу, курч бөйрөк алсыздыгы.

Жыныс системасы тарабынан: вагинит, жыныс органдарынын кычышуусу.

Лабораториялык көрсөткүчтөр тарабынан: боор трансаминазаларынын активдүүлүгүнүн жана ЩФ жогорулоосу, гипербилирубинемия, мочевино азотунун жогорулоосу, гиперкреатининемия, протромбин убактысынын жогорулоосу.

Башкалар: кандидомикоз, демигүү.

Ашыкча доза

Симптомдору: кыйыр натыйжалардын күчөөсү.

Дарылоо: ашказанды жуу; зарылдыгына жараша гистаминге каршы препараттарды, ГКС, эпинефринди, норэпинефрин, допамин, оксигендик дарылоону, инфузиялык эритмелерди куюну, ӨЖЖ колдонууну камтыган колдоо көрсөтүүчү жана симптомдоруна жараша дарылоону өткөрүшөт. Цефиксим гемо- же перитонеалдык диализ жолу аркылуу айланып жүрүүчү кандан көп өлчөмдө бөлүнүп чыкпайт.

Башка дары каражаттары менен өз ара таасири

Пробенецид менен айкалыштырып колдонуу цефиксимдин кан сары суусундагы концентрациясын жогорулатат. Салицил кислотасы кандагы эркин цефиксимдин камтылуусун 50% га анын плазма протеиндери менен байланышуусунан бошонуусунун эсебинен жогорулатат. Бул натыйжа дозага көз каранды болуп саналат. Цефиксим карбамазепиндин кандагы концентрациясын жогорулатат. Нифедипин цефиксимдин биожеткиликтүүлүгүн жогорулатат. Аминогликозиддер жана фуросемид цефиксимдин нефротоксиндүүлүгүн жогорулатат. Цефалоспоринди катарындагы башка антибиотиктер менен айкалыштырып кабыл алуу Кумбс түз сынамын өткөрүүдө жалган оң жыйынтык бериши мүмкүн. Ошондой эле мындай айкалыштырууда протромбин убактысы жогорулайт. Антикоагулянттар жана варфарин менен бирге кабыл алуу протромбин убактысын жогорулатышы ыктымал, бул нерсе кан агуу менен байкалышы мүмкүн. Цефиксим айкалыштырылган пероралдык контрацептивдердин натыйжалуу таасирин төмөндөтүүсү жана эстрогендердин реабсорбциясын азайтуусу мүмкүн.

Өзгөчө көрсөтмөлөр

Дарылоону баштоонун алдында, бейтапта мурда цефалоспориндерге, пенициллиндерге же башка препараттарга жогорку сезимталдуулук реакциялары бар болуусу тууралуу суроону кылдаттык менен изилдеп алуу керек. Антибиотиктерди узак убакыт аралыгында колдонуу кабылдоочу эмес микроорганизмдердин ашыкча өсүүсүн козгоосу ыктымал.

Авто унааны жана потенциалдуу кооптуу механизмдерди башкаруу жөндөмдүүлүгүнө таасир берүү өзгөчөлүктөрү

Унаа каражаттарын башкарууда жана кыйыр натыйжалардын профилин эске алуу менен көңүл бөлүүнүн жогорку концентрациясын жана психомотордук реакциянын тездигин талап кылган ишмердүүлүктүн башка потенциалдуу кооптуу түрлөрү менен алектенүүдө этияттуулукту сактоо керек.

Чыгаруу формасы

Стофексим 50 мг/5 мл:

30 мл флакондо ичип кабыл алуу үчүн суспензияны даярдоого арналган порошок.

Медицинада колдонуу боюнча нускамасы жана 10 мл ченем стаканы менен бирге бир флаконду картон кутуга салышат.

Стофексим 100 мг/5 мл:

50 мл флакондо ичип кабыл алуу үчүн суспензияны даярдоого арналган порошок.

Медицинада колдонуу боюнча нускамасы жана 10 мл ченем стаканы менен бирге бир флаконду картон кутуга салышат.

Сактоо шарты

Кургак, жарыктан корголгон жерде 25°C дан жогору эмес аба табында сактоо керек. Балдар жетпеген жерде сактоо зарыл!

Жарактуулук мөөнөтү

3 жыл.

Жарактуулук мөөнөтү аяктагандан кийин колдонууга болбойт!

Даярдалган суспензияны бөлмө табында сактоо керек жана 7 сутка аралыгында колдонуу зарыл!

Берүү шарты

Рецепт боюнча.

Соода маркасынын жана каттоо күбөлүгүнүн кармоочусу:

Belinda Laboratories LLP

Astra House, Arklow Road,

London, England SE14 6EB, UK (Улуу Британия)

Өндүрүүчү:

Nectar Lifesciences Ltd. (Unit-VI)

Village Bhatoli Kalan (Adjoining Jharmajri E.P.I.P.),

P.O. Barotiwala, Tehsil. Baddi, Disst. Solan,

H.P.-174103, India (Индия)

Кыргыз Республикасынын аймагында керектөөчүлөрдөн продукциянын (товардын) сапаты боюнча арыз-доолорду кабыл алуучу уюмдун дареги:

«Aman Pharm» (Аман Фарм) ЖЧК, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары,

Шоорукова көч. 36.

Тел: (0312) 560466, E-mail: aman.pharm12@gmail.com