

БЕКТЕМ

Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо министрлигинин
алдындагы Дары каражаттары жана
медициналык буюмдар
департаментинин директорунун
орун басары
Кагаздиев Н. М.



2021-ж.

ДАРЫ КАРАЖАТЫН МЕДИЦИНАДА КОЛДОНУУ БОЮНЧА НУСКАМА

ЛАМБРОТИН

Соодадагы аталышы
Ламбротин

Эл аралык патенттелбеген же топтук аталышы
Амброксол + Цетиризин

Дарынын түрү
Ичип кабыл алуу үчүн сироп.

Курамы: ар бир 5 мл төмөнкүлөрдү камтыйт:

Активдүү заттар:

Амброксол гидрохлорид ВР 30 мг

Цетиризин гидрохлорид ВР 5 мг

Көмөкчү заттар: сорбитол эритмеси 70%, метилгидроксibenзоат, пропилгидроксibenзоат, тиомочевина, пропиленгликоль, суюк глюкоза, глицерин, калий ацесульфам, лимон кислотасы, натрий сахарин, натрий цитрат, кармазин боегучу (супра), эсс. малина, эсс. жалбыз, тазартылган суу.

Сүрөттөмөсү

Картон таңгакчада ак пластмасса капкакчасы менен янтар түсүндөгү пластик флакондо толтурулган кызгылт коюу суюктук.

Фармадарылык тобу: Респиратордук системасынын ооруларынын дарылоо үчүн препараттар. Жөтөлгө каршы препараттар жана суук тийүү ооруларын дарылоо үчүн каражаттар. Жөтөлгө

каршы каражаттар менен айкалыштан тышкары какырыкты бөлүп чыгаруучу препараттар. Какырыкты бөлүп чыгаруучу препараттар.

АТХ коду: R05CA.

Фармакологиялык таасири

Фармакодинамикасы:

Амброксол муколитикалык каражат болуп саналат. Секретомотордук, секретолитикалык жана какырыкты бөлүп чыгаруучу таасирге ээ; бронхтордун былжырлуу чел кабыктарынын бездин сероздук клеткаларын жөнгө салат, альвеолаларда жана бронхтордо былжыр секретинин курамы жана үстүнкү-активдүү заттын бөлүнүп чыгуусун жогорулатат (сурфактанттын); какырыктын сероздук жана былжырлуу курамдык бөлүктөрүнүн бузулган ара катышын калыбына келтирет. Гидролизирлөөчү ферменттерди активдештирүү менен жана бөлүнүп чыгуучу клеткалардан лизосомалардын бошонуусун күчөтүү менен какырыктын илеешкектигин төмөндөтөт. Жылмындаган эпителийдин кыймылдуу активдүүлүгүн жогорулатат, мукоцилиардык ташылуусун жогорулатат. Ичип кабыл алуудан кийин таасир берүүсү 30 минутадан кийин өнүгөт жана 6-12 саат аралыгында уланат.

Цетиризин аллергияга каршы каражат болуп саналат. Цетиризин - гистаминге каршы препарат, H₁ – рецепторлорунун селективдүү антагонистти, ал олуттуу антихолинергиялык жана антисеротониндик таасирге ээ. Цетиризин гематоэнцефалиялык тосмо аркылуу өтпөйт. Цетиризин аллергиялык реакциянын баштапкы фазасын токтотот, ошондой эле сезгенген клеткалардын көчүүсүн төмөндөтөт; кийинки аллергиялык реакцияга катышуучу медиаторлодун бөлүнүп чыгуусун басынтат. Цетиризин бронхиалдык бактын жогорку активдүүлүгүн олуттуу төмөндөтөт, алар бронхиалдык астмасы менен жабыркаган оорулууларда гистаминдин бошонуусуна жооп катары пайда болушат. Препараттын бул натыйжалары борбордук таасир менен коштолбойт, бул нерсе психометриялык тесттер менен жана ЭКГ маалыматтары менен тастыкталат.

Фармакокинетикасы:

Ичип кабыл алуудан кийин амброксол абдан жакшы сиңирилет, кан плазмасындагы C_{max} 0,5-3 сааттан кийин жетишилет. Плазма белоктору менен байлашуусу - 80%. ГЭТ, бала тон тосмосу аркылуу өтөт, эмчек сүтү менен бөлүнүп чыгат. Дибромантранилленген кислотаны жана глюкурондук конъюгаттарды пайда кылуу менен боордо зат алмашат. T_{1/2} 1,3 саатты түзөт. Бөйрөктөр аркылуу бөлүнүп чыгат: 90% - сууда эрип кетүүчү метаболиттер түрүндө, 5% - өзгөрүлбөгөн түрдө.

Цетиризин ичип кабыл алынган учурда тез сиңирилет, чондордо жарым жартылай бөлүнүп чыгуу мезгили $7,9 \pm 1,9$ саатты түзөт. Цетиризин жана анын метаболиттери негизинен организмден заара менен бөлүнүп чыгат.

Өзгөчө клиникалык учурлардагы фармакокинетика: T_{1/2} оор өнөкөт бөйрөк алсыздыгында жогорулайт, боор функциясынын бузулуусунда өзгөрбөйт.

Колдонууга көрсөтмөлөр

Илээшкек какырыктын бөлүнүп чыгуусу менен дем алуу жолдорунун оорусу:

- курч жана өнөкөт бронхит;
- өпкө сезгенүүсү;
- өпкөнүн өнөкөт кептелме оорусу;
- какырыктын бошонуусунун кыйыndoосу менен бронхиалдык астма;
- бронхоэктатикалык ооруу.

Каршы көрсөтмөлөр

- препараттын курамдык бөлүктөрүнө жогорку сезгичтик;
- бөйрөктүн оор оорулары;
- кош бойлуулук жана бала эмизүү мезгили (эмчек эмизүү).

Төмөнкү учурларда препарат *этияттуулук менен* дайындалат:

- оордуктун орточо жана оор даражасындагы өнөкөт пиелонефритте;
- бөйрөк алсыздыгында (дозалоо режимин оңдоп түзөтүү талап кылынат);
- улгайган курактагы адамдарга (бул категориядагы бейтаптарда түйдөкчөлүү чыпкалоонун мүмкүн болгон төмөндөөсүнөн улам).

Колдонуу жолу жана дозасы

Ламбротин препаратын, тамкатанып жаткан убакытта, суюктуктун анча көп эмес көлөмү менен ичип кабыл алуу керек.

Балдарга Ламбротин сиробун (15 мг амброксол 5 мл де) төмөнкү дозаларда берүү сунушталат:

2 жашка чейин - 2,5 мл ден күнүнө 2 жолу;

2 ден 5 жашка чейин - 2,5 мл ден күнүнө 3 жолу;

5 жаштан улууларга - 5 мл ден күнүнө 2-3 жолу.

Чоңдорго 10 мл Ламбротин сиробу (30 мг амброксол 5 мл де) күнүнө 2-3 жолу сунушталат.

7—күндөн ашык созулган ддарылоодо, дозаны 2 эсе төмөндөтүшөт.

Дарыгердин дайындоосу жок 4-5 күндөн ашык кабыл алуу сунушталган эмес.

Дарылоо мезгилинде көп суюктук ичүү зарыл (соктор, чай, суу), анткени ал препараттын муколитикалык натыйжалуу таасирин күчөтөт.

Кыйыр таасирлер

Препарат адатта жакшы көтөрүмдүү. Сейрек учурларда гана жогорку сезгичтик реакциясы, алсыздык, баш оору, гастралгия, ашказанда толуу сезими, кусуу, көңүл айнуу, тамак ашты сиңирүүнүн бузулуусу белгиленет. Бул көрүнүштөр убактылуу жүрүүчү мүнөзгө ээ жана препаратты токтотууну талап кылат.

Ашыкча доза

Симптомдору: көңүл айнуу, кусуу, ич өтүү, диспепсия, уйку келүү, буйдалуу, алсыздык, баш ооруу, тахикардия, жогорку кыжырдануу, заара бөлүп чыгаруунун кармалуусу, чарчоочулук (адатта цетиризинди 50 мг суткалык дозада кабыл алууда болот).

Дарылоо: жасалма кустуруу, препаратты кабыл алуудан кийин алгачкы 1-2 сааттан кийин, майларды камтыган тамак-ашты кабыл алуу жана активдештирилген көмүрдү дайындашат.

Башка дары каражаттар менен өз ара таасири

Ламбротин препаратын башка препараттар менен айкалыштырууга болот. Дарылык өз ара таасирдин жагымсыз көрүнүштөр тууралуу маалыматтар жок.

Жетөлгө каршы препараттар менен айкалыштырып колдонуу жетөлдүн төмөндөөсүнүн фонунда какырыктын бошонуусунун кыйындоосуна алып келет. Амоксициллиндин, цефуроксим, эритромицин жана доксициклиндин бронхиалдык секретке өтүүсүн жогорулатат.

Өзгөчө көрсөтмөлөр

Препарат ашказандын жана он эки эли ичегинин клиникалык картинасына таасир берүүсү мүмкүн.

Чыгаруу формасы

Янтар түсүндөгү пластик флакондо 100 мл ичип кабыл алуу үчүн сироп.

Бир флакон ченем стаканы менен жана колдонуу боюнча нускамасы менен бирге картон таңгакчада.

Сактоо шарты

Кургак, жарыктан корголгон жерде 25°C дан жогору эмес аба табында сактоо керек.

Балдар жетпеген жерде сактоо зарыл.

Жарактуулук мөөнөтү

3 жыл. Жарактуулук мөөнөтү аяктагандан кийин колдонууга болбойт.

Берүү шарты

Рецепти жок.

Соода маркасынын жана каттоо күбөлүгүнүн ээси

Belinda Laboratories LLP

Astra House, Arklow Road,

London, England SE14 6EB, UK (Улуу Британия)

Өндүрүүчү

Lark Laboratories (India) Ltd.

SP-1192E, Phase-IV, RIICO Industrial Area,

Bhiwadi, Distt. Alwar (Rajasthan), India (Индия)

Кыргыз Республикасынын аймагында продукциянын (товардын) сапаты боюнча арыз-доолорду кабыл алуучу уюмдун дареги

«Aman Pharm» ЖЧК (Аман Фарм), Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары,

Шооруков көч. 36.

Тел: (0312) 560466, E-mail: aman.pharm12@gmail.com