

TEOREMA 4: RAPPRESENTAZIONE in BASE

Hp: $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, base $B \geq 2$

Th: $\exists! p \in \mathbb{Z}_+, \{d_i\}_{i \geq 1}$ interi non negativi.

- $d_1 \neq 0$,
 - $(\forall i. d_i \in [0; \beta^{-1}])$,
 - $(\forall k > 0. (\exists j \geq k | d_j \neq \beta^{-1}))$

.

 - $x = \text{segno}(x) \cdot \beta^P \left(\sum_{i=1}^{\infty} d_i \beta^{-i} \right)$

INSIEME dei NUMERI di MACCHINA

$$J(\beta, t, m, M) := \{0\} \cup \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$$

$$x = \text{segno}(x) \cdot \beta^P \left(\sum_{i=1}^{+} d_i \beta^{-i} \right)$$

con $d_1 \neq 0$, $(\forall i \in [0; +\infty] \cdot d_i \in [0; \beta])$,
 $p \in [-m; M]$

$\Omega :=$ massimo numero di macchine

$$\Omega = \beta^m (1 - \beta^{-n})$$

$$\# f = 1 + 2(m+M+1) (\beta^t - \beta^{t-1})$$

esponenti *mantisse*

$\omega :=$ minimo numero > 0 rappresentabile
 $\omega = \beta^{-m-1}$

TRONCAMENTO e ARROTONDAMENTO

Hp: $x = \text{segno}(x) \beta^p \left(\sum_{i=1}^{\infty} d_i \beta^{-i} \right)$

1) troncamento:

$$\tilde{x} = \text{trunc}(x) = \text{segno}(x) \beta^p \left(\sum_{i=1}^{t-1} d_i \beta^{-i} \right)$$

2) arrotondamento:

$$\begin{aligned} \tilde{x} &= \text{arr}(x) \\ &= \text{trunc}(x) \quad \text{se } d_{t+1} < 1/2 \beta \\ &= \text{trunc}(x) + \beta^{p-t} \quad \text{altrimenti} \end{aligned}$$

ERRORE ASSOLUTO

$$\epsilon = \tilde{x} - x$$

ERRORE RELATIVO

$$\epsilon_x = (\tilde{x} - x) / x$$

PRECISIONE di MACCHINA

$$u = \beta^{1-t} \quad \text{se } \tilde{x} = \text{trunc}(x)$$

$$|\epsilon_x| = \frac{|\tilde{x} - x|}{|x|} < u$$

$$u = 1/2 \beta^{1-t} \quad \text{se } \tilde{x} = \text{arr}(x)$$

OPERAZIONI di MACCHINA

$$x \oplus y = (x + y)(1 + \epsilon)$$

con $\epsilon :=$ errore locale

dell'operazione

ERRORE INERENTE

$$\epsilon_{in} = \frac{f(\tilde{x}) - f(x)}{f(x)} \quad \text{con } f(x) \neq 0$$

Dico che un problema è'

MALCONDITIONATO per un intorno di x

se e solo se $\exists \sup(f(x))$.

Hp: $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, Ω aperto $\subset \mathbb{R}^n$, f differentiabile

due volte, $\tilde{x} = (\tilde{x}_0, \dots, \tilde{x}_n)$

$$\epsilon_{in} = \sum_{i=1}^n c_{x_i} \epsilon_{x_i}, \quad \text{con } c_{x_i} = \frac{x_i}{f(x)} \cdot \frac{\partial}{\partial x_i} f(x)$$

coefficiente di

amplificazione

Somma: $c_x = \frac{x}{x+y}$, $c_y = \frac{y}{x+y}$

sottrazione: $c_x = \frac{x}{x-y}$, $c_y = \frac{y}{x-y}$

moltiplicazione: $c_x = 1$, $c_y = 1$

divisione : $c_x = 1$, $c_y = -1$

ERRORE ALGORITMICO

Hp: $g(x) :=$ sequenza dei passaggi algoritmici utilizzati nel calcolo di $f(x)$

e.g. $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$, $g(x) = ((x \otimes x) \oplus 1) \odot x$

$$\epsilon_{alg} = \frac{g(\tilde{x}) - f(\tilde{x})}{f(x)}$$

ERRORE TOTALE

$$\epsilon_{tot} = \frac{g(\tilde{x}) - f(x)}{f(x)} = \epsilon_{in} + \epsilon_{alg}$$

ERRORE ANALITICO

$f(x)$ non razionale $\rightarrow h(x)$ razionale

$$\epsilon_{an} = \frac{h(x) - f(x)}{f(x)}$$

$$\Rightarrow \epsilon_{tot} = \epsilon_{in} + \epsilon_{alg} + \epsilon_{an}.$$

NORMA VETTORIALE

È una funzione $f: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{R}^+$ t.c.

- 1) $(\forall v \in \mathbb{F}^n : f(v) > 0 \wedge f(v) = 0 \Leftrightarrow v = \vec{0})$
- 2) $(\forall v \in \mathbb{F}^n : (\forall \alpha \in \mathbb{F}, f(\alpha v) = |\alpha| f(v)))$
- 3) $(\forall v, w \in \mathbb{F}^n : f(v+w) \leq f(v) + f(w))$

NORMA MATRICIALE

funzione $f : \mathbb{F}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$ t.c.

- 1) $(\forall A \in \mathbb{F}^{n \times n} : f(A) > 0 \wedge f(A) = 0 \Leftrightarrow A = \vec{0})$
- 2) $(\forall A \in \mathbb{F}^{n \times n} : (\forall \alpha \in \mathbb{F}, f(\alpha A) = |\alpha| \cdot f(A)))$
- 3) $(\forall A, B \in \mathbb{F}^{n \times n} : f(A+B) \leq f(A) + f(B))$
- 4) $(\forall A, B \in \mathbb{F}^{n \times n} : f(A \cdot B) \leq f(A) \cdot f(B))$

Oss. Per ogni norma matriciale $\|Id\| \geq 1$.

NORMA INDOTTA

funzione $f : \mathbb{F}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$ t.c.

$(\forall A \in \mathbb{F}^{n \times n}, f(A) = \|A\| = \max_{\|x\|=1} |Ax|$ con $\|\cdot\|$ norma vettoriale su \mathbb{F}^n).

Vale inoltre:

$(\forall A \in \mathbb{F}^{n \times n}, (\forall x \in \mathbb{F}^n, |Ax| \leq \|A\| \cdot |x|))$.

NORMA EUCLIDEA

VETTORI

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

MATRICI

$$\|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^H A)}.$$

Trasposta
Coniugata

NORMA 1

VETTORI

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|.$$

MATRICI

$$\|A\|_1 = \max_{j=1 \dots n} \sum_{i=1}^n |\alpha_{ij}|.$$

NORMA INFINTO

VETTORI

$$\|x\|_\infty = \max_{i=1 \dots n} |x_i|$$

MATRICI

$$\|A\|_\infty = \max_{i=1 \dots n} \sum_{j=1}^n |\alpha_{ij}|.$$

CONDIZIONAMENTO di un PROBLEMA

$$Ax = b, A \in \mathbb{F}^{n \times n}, b \in \mathbb{F}^n$$

$\frac{\|\tilde{x} - x\|}{\|x\|}$ misura il condizionamento del problema.
Risulta:

$$\frac{\|\tilde{x} - x\|}{\|x\|} \leq [\|A\| \cdot \|A^{-1}\|] \cdot \frac{\|\tilde{b} - b\|}{\|b\|}$$



$\Rightarrow \kappa(A) :=$ numero di condizionamento.

