

作业 2 参考答案

1. 先证明 $P(A+B)$, 再将 $A+B+C$ 表示为 $(A+B)+C$.
2. 利用概率的公理化定义, 逐个验证集合函数 $\bar{P}(A) = P(A|B)$ 满足非负性, 正则性及可列可加性.
3. (1) 不正确. 取任一事件 A_0 满足 $0 < P(A_0) < 1$, 令 $A = B = A_0$.
(2) 不正确. 取 $A = B = \emptyset$.
(3) 不正确. 注意多个事件独立的定义.
4. $P(A_2) = 1/2, P(A_3) = 1/3, P(A_5) = 7/36, P(A_2A_3) = 1/6, P(A_2A_5) = 1/12$, 由独立定义知 A_2 与 A_3 独立, A_2 与 A_5 不独立.
5. 参考概率导论 (Bertsekas, 第 2 版) 中例 1.20 与例 1.21.
6. 记事件 B 为“ A 在迟早要发生”, 事件 B_n 为“ A 在前 n 次试验中发生”, 则
$$1 \geq P(B) \geq P(B_n) = 1 - P(B_n^c) = 1 - (1 - \epsilon)^n \rightarrow 1.$$
7. 记事件 A 为“随机取一张朝上后为红色”, 易得 $P(BB) = P(RR) = P(BR) = 1/3, P(A|BB) = 0, P(A|RR) = 1, P(A|BR) = 1$, 由贝叶斯公式得 $P(BR|A) = 1/3$.
8. (1) 显然每个人中奖的概率均为 $1/n$; (2) 记事件 A_k 表示“第 k 个人抓到“中”后游戏结束”, 则 $P(A_1) = 1/n, P(A_k|A_{k-1}^c \cdots A_1^c) = 1/(n-k+1), k \geq 2$. 利用乘法公式可得 $P(A_k) = 1/n$. 即抽奖顺序不影响中奖概率.
9. 记事件 A 为“小明患此病”, 事件 B 为“小明阳性”, 由贝叶斯公式知 $P(A|B) = 5/6 > 80\%$, 从而建议手术.
10. 对 $0 < k < n$, 记 s_k 为本金 k 元时输光离场的概率, 由递推式 $s_k = (1-p)s_{k-1} + ps_{k+1}$ 以及边界条件 $s_0 = 1, s_n = 0$ 得

$$s_k = \begin{cases} \frac{r^n - r^k}{r^n - 1}, & \text{当 } r \neq 1, \\ 1 - \frac{k}{n}, & \text{当 } r = 1, \end{cases}$$

其中 $r = (1 - p)/p$. 对 $p \leq 0.5$ 总有 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_k = 1$.

11. 记 A 表示该物种最终灭绝, 由全概率公式可得

$$P(A) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3}P(A) + \frac{1}{3}P(A)^2.$$

解得 $P(A) = 1$.

12. 由全概率公式得 $P(\text{甲药治愈}) = 0.655$, $P(\text{乙药治愈}) = 0.66$, 从而综合来看建议乙. 但由于患病 A 的概率很大, 且甲药对 A 的治愈率更高, 因此选甲也有一定合理性.

13. (1) $P(B_1) = 3/5$.

(2) 若放回 $P(B_2) = P(B_1) = 3/5$; 若不放回, 利用全概率公式与条件概率下的全概率公式可得 $P(B_2) = P(B_1) = 3/5$. 不论放不放过, 若不观测第一个球颜色, 则对取的袋子编号没有先验. (直观上还可以同第 8 题理解).

(3) $P(B_2 B_1) = 2/5$, $P(B_2|B_1) = 2/3$. $P(B_2|B_1) > P(B_2)$. 直观上观测到第一次取出黑球后, 取的袋子是 1 号袋子的可能性更大.

(4) Bayes 公式

$$P(B_{n+1}|B_1 \cdots B_n) = \frac{P(B_1 \cdots B_{n+1}|F)P(F) + P(B_1 \cdots B_{n+1}|F^c)P(F^c)}{P(B_1 \cdots B_n|F)P(F) + P(B_1 \cdots B_n|F^c)P(F^c)}.$$

极限为 $4/5$, 即充分确认选中 1 号袋.

(5) Bayes 公式. 极限为 1.

14. (1) 用 a 元与甲打赌, b 元与乙打赌, 应满足 $a + b \leq 100$, $-a + 1.5b > 0$, $4a - b > 0$.

(2) $5P_{\text{甲}}(A) - 20P_{\text{甲}}(B) \geq 0$, $10P_{\text{乙}}(B) - 15P_{\text{乙}}(A) \geq 0$. $P_{\text{甲}}(B) \leq 0.2$, $P_{\text{乙}}(B) \leq 0.4$.