

关于第 05 期题目的讨论

数学学习小组

2020.06.24

目录

1	题目 05-1	3
1.1	第一种解法	4
1.2	第二种解法	5
1.3	第三种解法	6
1.4	第四种解法	7
1.5	第五种解法	8
1.6	第六种解法	9

1 题目 05-1

本题来源于第 05 期 (2020.06.24) 小组讨论题中, 原题号为第 2 大题第 4 小问。

对于椭圆 Γ :

$$\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{64} = 1$$

设点 A 为椭圆短轴上的顶点。

设点 P 点 Q 为椭圆上异于 A 的任意一点, 且两点关于原点 O 对称。

直线 AP 交 x 轴于点 M 。

直线 AQ 交 x 轴于点 N 。




图 1: 题目 05-01 的示意图

请判断以线段 MN 为直径的圆是否过定点?

若是求出定点坐标, 若否则说明理由。

1.1 第一种解法

提出者：李宇轩

核心思路：利用 $k_1 \cdot k_2 = e^2 - 1$ ，设定点 $S(x, y)$ 。

已知椭圆方程： $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{64} = 1$

解得 $A(0, 8)$ $a = 10$ $c = 6$ $e = \frac{c}{a} = \frac{3}{5}$

设 $l_{AP}: y = k_1x + 8$ 令 $y = 0$ 则 $x_M = -\frac{8}{k_1}$

设 $l_{AQ}: y = k_2x + 8$ 令 $y = 0$ 则 $x_N = -\frac{8}{k_2}$

直线 PQ 过圆心，故 AP 与 AQ 的斜率积为定值。

$$k_1 \cdot k_2 = e^2 - 1$$

$$k_1 \cdot k_2 = -\frac{16}{25}$$

设以直线 MN 为直径的圆所过定点为 $S(x, y)$

因此则有 $\overrightarrow{MS} \cdot \overrightarrow{NS} = 0$

$$M\left(-\frac{8}{k_1}, 0\right) \quad \overrightarrow{MS} = \left(x + \frac{8}{k_1}, y\right)$$

$$N\left(-\frac{8}{k_2}, 0\right) \quad \overrightarrow{NS} = \left(x + \frac{8}{k_2}, y\right)$$

代入可得：

$$x^2 + x \cdot \left(\frac{8}{k_1} + \frac{8}{k_2}\right) + \frac{64}{k_1 \cdot k_2} + y^2 = 0$$

$$x^2 + x \cdot \left(\frac{8 \cdot (k_1 + k_2)}{k_1 \cdot k_2}\right) + \frac{64}{k_1 \cdot k_2} + y^2 = 0$$

$$x^2 - x \cdot \left(\frac{25 \cdot (k_1 + k_2)}{2}\right) - 100 + y^2 = 0$$

$$x^2 - \frac{25}{2} \cdot (k_1 + k_2) \cdot x - 100 + y^2 = 0$$

由于 $S(x, y)$ 为圆所过的定点。

所以 S 的坐标取值应当使得上方推出等式恒成立。

$$\begin{cases} x = 0 \\ x^2 + y^2 = 100 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = \pm 10 \end{cases}$$

故定点为 $S(0, 10)$ 或 $S(0, -10)$

1.2 第二种解法

提出者：师梦萍

核心思路：求解 x_M, x_N ，设定点 $S(x, y)$ 。已知椭圆方程： $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{64} = 1$ 解得 $A(0, 8)$ 设 $P(x_1, y_1)$ 则 $Q(-x_1, -y_1)$

$$\overrightarrow{AP} = (x_1, y_1 - 8)$$

$$\overrightarrow{QA} = (x_1, y_1 + 8)$$

$$l_{AP} : \frac{x}{x_1} = \frac{y-8}{y_1-8} \quad \text{令 } y=0 \quad \text{则 } x_M = \frac{-8x_1}{y_1-8}$$

$$l_{AQ} : \frac{x}{x_1} = \frac{y-8}{y_1+8} \quad \text{令 } y=0 \quad \text{则 } x_N = \frac{-8x_1}{y_1+8}$$

上一步也可以用同理替代。

设以直线 MN 为直径的圆所过定点为 $S(x, y)$ 因此则有 $\overrightarrow{SM} \cdot \overrightarrow{SN} = 0$

$$M\left(\frac{-8x_1}{y_1-8}, 0\right) \quad \overrightarrow{SM} = \left(\frac{-8x_1}{y_1-8} - x, -y\right)$$

$$N\left(\frac{-8x_1}{y_1+8}, 0\right) \quad \overrightarrow{SN} = \left(\frac{-8x_1}{y_1+8} - x, -y\right)$$

代入可得：

$$\left(\frac{-8x_1}{y_1-8} - x\right) \cdot \left(\frac{-8x_1}{y_1+8} - x\right) + y^2 = 0$$

$$x^2 + y^2 + \left(\frac{8x_1}{y_1+8} + \frac{8x_1}{y_1-8}\right) \cdot x + \frac{64x_1^2}{y_1^2 - 64} = 0$$

$$x^2 + y^2 + \frac{8x_1 \cdot (y_1 + 8 + y_1 - 8)}{y_1^2 - 64} \cdot x + \frac{64x_1^2}{y_1^2 - 64} = 0$$

$$x^2 + y^2 + \frac{16x_1y_1}{y_1^2 - 64} \cdot x + \frac{64x_1^2}{y_1^2 - 64} = 0$$

由椭圆方程得：

$$\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{64} = 1$$

$$y_1^2 = 64 \cdot \left(1 - \frac{x^2}{100}\right)$$

$$y_1^2 = 64 - \frac{16}{25}x_1^2$$

将其代入可得：

$$x^2 + y^2 + \frac{16x_1y_1}{y_1^2 - 64} \cdot x + \frac{64x_1^2}{y_1^2 - 64} = 0$$

$$x^2 + y^2 + \frac{16x_1y_1}{64 - \frac{16}{25}x_1^2 - 64} \cdot x + \frac{64x_1^2}{64 - \frac{16}{25}x_1^2 - 64} = 0$$

$$x^2 + y^2 - \frac{16x_1y_1}{\frac{16}{25}x_1^2} \cdot x - \frac{64x_1^2}{\frac{16}{25}x_1^2} = 0$$

$$x^2 + y^2 - \frac{25y_1}{x_1} \cdot x - 100 = 0$$

由于 $S(x, y)$ 为圆所过的定点。所以 S 的坐标取值应当使得上方推出等式恒成立。

$$\begin{cases} x = 0 \\ x^2 + y^2 = 100 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = \pm 10 \end{cases}$$

故定点为 $S(0, 10)$ 或 $S(0, -10)$

1.3 第三种解法

提出者：乔君毅

核心思路：求解 x_M, x_N ，设圆的方程。

$$\text{已知椭圆方程: } \frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{64} = 1$$

解得 $A(0, 8)$ 设 $P(x_1, y_1)$ 则 $Q(-x_1, -y_1)$

$$\overrightarrow{AP} = (x_1, y_1 - 8)$$

$$\overrightarrow{QA} = (x_1, y_1 + 8)$$

$$l_{AP}: \frac{x}{x_1} = \frac{y-8}{y_1-8} \quad \text{令 } y=0 \quad \text{则 } x_M = \frac{-8x_1}{y_1-8}$$

$$l_{AQ}: \frac{x}{x_1} = \frac{y+8}{y_1+8} \quad \text{令 } y=0 \quad \text{则 } x_N = \frac{-8x_1}{y_1+8}$$

上一步也可以用同理替代。

设点 M 和点 N 的中点 $C(x_C, 0)$ 。

求解圆的圆心可得：

$$x_C = \frac{1}{2} \cdot (x_M + x_N)$$

$$x_C = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{-8x_1}{y_1-8} + \frac{-8x_1}{y_1+8} \right)$$

$$x_C = \frac{-4x_1}{y_1-8} + \frac{-4x_1}{y_1+8}$$

$$x_C = -\frac{8x_1y_1}{y_1^2-64}$$

求解圆的半径可得：

$$r = \frac{1}{2} \cdot |x_M - x_N|$$

$$r = \frac{1}{2} \cdot \left| \frac{-8x_1}{y_1-8} + \frac{-8x_1}{y_1+8} \right|$$

$$r = \frac{1}{2} \cdot \left| \frac{8x_1}{y_1+8} - \frac{8x_1}{y_1-8} \right|$$

$$r = \left| \frac{64x_1}{y_1^2-64} \right|$$

因此可设圆的方程：

$$\left(x + \frac{8x_1y_1}{y_1^2-64} \right)^2 + y^2 = \frac{(64x_1)^2}{(y_1^2-64)^2}$$

$$x^2 + x \cdot \left(\frac{16x_1y_1}{y_1^2-64} \right) + y^2 = \frac{(64x_1)^2 - (8x_1y_1)^2}{(y_1^2-64)^2}$$

$$\text{根据椭圆方程可得: } y_1^2 = 64 - \frac{16}{25}x_1^2$$

将其代入可以得到：

$$x^2 + x \cdot \left(\frac{16x_1y_1}{y_1^2-64} \right) + y^2 = \frac{(64x_1)^2 - (8x_1y_1)^2}{(y_1^2-64)^2}$$

$$x^2 + x \cdot \left(\frac{16x_1y_1}{y_1^2-64} \right) + y^2 = \frac{\left(\frac{1024}{25} \right) \cdot x_1^4}{\left(\frac{256}{25} \right) \cdot x_1^4}$$

$$x^2 + x \cdot \left(\frac{16x_1y_1}{y_1^2-64} \right) + y^2 = 100$$

若圆上有一点 (x, y) 为定点。

那么该定点的取值应当使得上方推出等式恒成立。

$$\begin{cases} x = 0 \\ x^2 + y^2 = 100 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = \pm 10 \end{cases}$$

故定点为 $(0, 10)$ 或 $(0, -10)$

1.4 第四种解法

提出者：李周

核心思路：参数方程，求解 x_M, x_N ，设定点 $S(x, y)$ 。已知椭圆的标准方程： $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{64} = 1$ 可得椭圆的参数方程：
$$\begin{cases} x = 10 \cdot \cos \theta \\ y = 8 \cdot \sin \theta \end{cases}$$
设 $P(10 \cdot \cos \theta, 8 \cdot \sin \theta)$ 故 $Q(-10 \cdot \cos \theta, -8 \cdot \sin \theta)$ 且根据方程可知 $A(0, 8)$

$$l_{AP}: y = \frac{4 \sin \theta - 4}{5 \cos \theta} x + 8$$

$$l_{AQ}: y = \frac{4 \sin \theta + 4}{5 \cos \theta} x + 8$$

$$\text{令 } y = 0 \text{ 解得 } x_M = \frac{10 \cdot \cos \theta}{1 - \sin \theta}$$

$$\text{令 } y = 0 \text{ 解得 } x_N = \frac{-10 \cdot \cos \theta}{1 + \sin \theta}$$

设以直线 MN 为直径的圆所过定点为 $S(x, y)$ 因此则有 $\overrightarrow{MS} \cdot \overrightarrow{NS} = 0$

$$M\left(\frac{10 \cdot \cos \theta}{1 - \sin \theta}, 0\right) \quad \overrightarrow{MS} = \left(x - \frac{10 \cdot \cos \theta}{1 - \sin \theta}, y\right)$$

$$N\left(\frac{-10 \cdot \cos \theta}{1 + \sin \theta}, 0\right) \quad \overrightarrow{NS} = \left(x + \frac{10 \cdot \cos \theta}{1 + \sin \theta}, y\right)$$

代入可得：

$$x^2 + \left(\frac{10 \cdot \cos \theta}{1 + \sin \theta} - \frac{10 \cdot \cos \theta}{1 - \sin \theta}\right) \cdot x - \frac{100 \cdot \cos^2 \theta}{1 - \sin^2 \theta} + y^2 = 0$$

$$x^2 + \left(\frac{10 \cdot \cos \theta}{1 + \sin \theta} - \frac{10 \cdot \cos \theta}{1 - \sin \theta}\right) \cdot x - 100 + y^2 = 0$$

由于 $S(x, y)$ 为圆所过的定点。所以 S 的坐标取值应当使得上方推出等式恒成立。

$$\begin{cases} x = 0 \\ x^2 + y^2 = 100 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = \pm 10 \end{cases}$$

故定点为 $S(0, 10)$ 或 $S(0, -10)$

1.5 第五种解法

提出者：白昱轩

已知椭圆方程: $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{64} = 1$

经过变换可得: $16x^2 + 25y^2 - 1600 = 0$

设直线 PQ : $y = kx$

联立方程:
$$\begin{cases} 16x^2 + 25y^2 - 1600 = 0 \\ y = kx \end{cases}$$

$16x^2 + 25k^2x^2 - 1600 = 0$

$x_1 = \frac{40}{\sqrt{25k^2 + 16}} \quad P\left(\frac{40}{\sqrt{25k^2 + 16}}, \frac{40k}{\sqrt{25k^2 + 16}}\right)$

$x_2 = \frac{-40}{\sqrt{25k^2 + 16}} \quad Q\left(\frac{40}{\sqrt{25k^2 + 16}}, \frac{-40k}{\sqrt{25k^2 + 16}}\right)$

据椭圆方程可知 $A(0, 8)$

$l_{AP}: \frac{x}{x_P} = \frac{y-8}{y_P-8}$

$l_{AQ}: \frac{x}{x_Q} = \frac{y-8}{y_Q-8}$

令 $y = 0$ 则 $x_M = \frac{-8x_P}{y_P-8} = \frac{-40}{5k - \sqrt{25k^2 + 16}}$

令 $y = 0$ 则 $x_N = \frac{-8x_Q}{y_Q-8} = \frac{-40}{5k + \sqrt{25k^2 + 16}}$

设以 MN 为直径的圆所过定点为 $S(x, y)$

因此则有 $\overrightarrow{MS} \cdot \overrightarrow{NS} = 0$

将其代入可得:

$(x - x_M)(x - x_N) + y^2 = 0$

$\left(x + \frac{40}{5k - \sqrt{25k^2 + 16}}\right)\left(x + \frac{40}{5k + \sqrt{25k^2 + 16}}\right) + y^2 = 0$

将其展开可得:

$x^2 + \left(\frac{40}{5k - \sqrt{25k^2 + 16}} + \frac{40}{5k + \sqrt{25k^2 + 16}}\right) \cdot x - 100 + y^2 = 0$

若圆上有一点 (x, y) 为定点。

那么该定点的取值应当使得上方推出等式恒成立。

$$\begin{cases} x = 0 \\ x^2 + y^2 = 100 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = \pm 10 \end{cases}$$

故定点为 $(0, 10)$ 或 $(0, -10)$

1.6 第六种解法

提出者：杨骥荣

核心思路：取特殊值，利用两圆的交点。

已知椭圆的标准方程： $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{64} = 1$ 可得椭圆的参数方程：
$$\begin{cases} x = 10 \cdot \cos \theta \\ y = 8 \cdot \sin \theta \end{cases}$$
1. 令 $\cos \theta = 1$ 有 $\sin \theta = 0$ 解得 $P(10, 0)$ $Q(-10, 0)$ 显然 $M(10, 0)$ $N(-10, 0)$ 可设圆 MN 的方程 $x^2 + y^2 = 100$ 2. 令 $\cos \theta = \frac{4}{5}$ 有 $\sin \theta = \frac{3}{5}$ 解得 $P(8, \frac{24}{5})$ $Q(-8, -\frac{24}{5})$ $A(0, 8)$

$$l_{AP}: \frac{x-8}{8} = -\frac{y-\frac{24}{5}}{8-\frac{24}{5}} \quad \text{令 } y=0 \quad x_M=20$$

$$l_{AQ}: \frac{x-8}{8} = -\frac{y+\frac{24}{5}}{8+\frac{24}{5}} \quad \text{令 } y=0 \quad x_N=-5$$
因此 $M(20, 0)$ $N(-5, 0)$ 可设圆 MN 的方程 $\left(x - \frac{15}{2}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{25}{2}\right)^2$

联立两个圆的方程后化简可得：

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 100 \\ x^2 + y^2 - 15x = 100 \end{cases}$$

解得 $(0, \pm 10)$ ，故猜测定点为 $(0, \pm 10)$ 。

核心思路：取特殊值，利用椭圆的对称性。

设 P 关于 y 轴的对称点为 P' 。设 Q 关于 y 轴的对称点为 Q' 。直线 AP' 交 x 轴于点 M' 。直线 AQ' 交 x 轴于点 N' 。显然 MN 与 $M'N'$ 对称。

故以其为直径的圆也对称。

因此两圆的交点必然在 y 轴上。取 $P(10, 0)$ $Q(-10, 0)$ 圆 $MN: x^2 + y^2 = 100$ 与 y 轴交点 $(0, \pm 10)$ ，故猜测定点为 $(0, \pm 10)$ 。

以上为第一部分猜测定点的两种方法。

以下为第二部分证明定点的一种方法。

设 $P(x_1, y_1)$ 则 $Q(-x_1, -y_1)$ 同时 $A(0, 8)$

$$\overrightarrow{AP} = (x_1, y_1 - 8)$$

$$\overrightarrow{AQ} = (x_1, y_1 + 8)$$

$$l_{AP}: \frac{x}{x_1} = \frac{y-8}{y_1-8} \quad \text{令 } y=0 \quad \text{则 } x_M = \frac{-8x_1}{y_1-8}$$

$$l_{AQ}: \frac{x}{x_1} = \frac{y+8}{y_1+8} \quad \text{令 } y=0 \quad \text{则 } x_N = \frac{-8x_1}{y_1+8}$$

上一步也可以用同理替代。

对于定点 $S(0, \pm 10)$ 有 $\overrightarrow{SM} \cdot \overrightarrow{SN} = 0$

$$M\left(\frac{-8x_1}{y_1-8}, 0\right) \quad \overrightarrow{SM} = \left(\frac{-8x_1}{y_1-8}, \pm 10\right)$$

$$N\left(\frac{-8x_1}{y_1+8}, 0\right) \quad \overrightarrow{SN} = \left(\frac{-8x_1}{y_1+8}, \pm 10\right)$$

代入可以得到:

$$\frac{-8x_1}{y_1-8} \cdot \frac{-8x_1}{y_1+8} + 100 = 0$$

$$\frac{64x_1^2}{y_1^2 - 64} + 100 = 0$$

由椭圆方程得:

$$\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{64} = 1$$

$$y_1^2 = 64 \cdot \left(1 - \frac{x^2}{100}\right)$$

$$y_1^2 = 64 - \frac{16}{25}x_1^2$$

将其代入观察到等式成立。

因此证明了 $\overrightarrow{SM} \cdot \overrightarrow{SN} = 0$, 故定点 $S(0, \pm 10)$