

§1 R^n 中的 Jordan 测度

首先由直观定义 R^n 中标准长方体

$$H = \{x = (x_1, \dots, x_n) \in R^n; a_i \leq x_i \leq b_i, i = 1, \dots, n\}$$

的体积 (或测度) 为 $V(H) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i)$. 设 $Q \subseteq R^n$, 如果 Q 是 R^n 中的有限个标准长方体的体积的并集, 则称 Q 为 R^n 中的简单集. 易知, 若 Q 是 R^n 中的简单集, 则存在 R^n 中有限个标准长方体 H_1, \dots, H_m , 使得

$$H_i^0 \cap H_j^0 = \phi, i \neq j, \quad Q = \bigcup_{i=1}^m H_i,$$

其中 H_i^0 表示集合 H_i 的内部. 可以证明 $\sum_{i=1}^m V(H_i)$ 与 Q 的上述表示方法无关. 从而可定义 $\sum_{i=1}^m V(H_i)$ 为 Q 的体积 (或测度). 约定空集为简单集, 其测度为 0.

设 Ω 是 R^n 中的有界集, 定义

$$V^-(\Omega) = \sup\{V(Q); Q \text{ 为简单集且 } Q \subseteq \Omega\},$$

$$V^+(\Omega) = \inf\{V(Q); Q \text{ 为简单集且 } Q \supseteq \Omega\}.$$

分别称 $V^-(\Omega)$ 和 $V^+(\Omega)$ 为 Ω 的 Jordan 内测度和外测度, 显然 $V^-(\Omega) \leq V^+(\Omega)$. 若 $V^-(\Omega) = V^+(\Omega)$, 则称 Ω 在 R^n 中 Jordan 可测, 且称 $V^-(\Omega) = V^+(\Omega)$ 为 Ω 在 R^n 中的 Jordan 测度, 记为 $V(\Omega)$. 显然简单集 Jordan 可测且它的 Jordan 测度就是由直观定义的体积. 以下简称 Jordan 可测为 J 可测, Jordan 测度为 J 测度. J 可测有以下性质.

(i) 若 Ω J 可测, 则 $\Omega^0, \bar{\Omega}$ 都 J 可测, 且

$$V(\Omega^0) = V(\Omega) = V(\bar{\Omega}).$$

证 记 $V = V(\Omega)$. 由于 $\Omega^0 \subseteq \Omega$, 所以由定义易知

$$\begin{aligned} V^-(\Omega^0) &\leq V^-(\Omega) = V(\Omega) = V, \\ V^+(\Omega^0) &\leq V^+(\Omega) = V(\Omega) = V. \end{aligned}$$

任给 $\varepsilon > 0$, 存在简单集 Q_1 使得 $Q_1 \subseteq \Omega$, 且

$$V(Q_1) > V^-(\Omega) - \frac{\varepsilon}{2} = V - \frac{\varepsilon}{2}.$$

由简单集的定义易知对于 Q_1 存在简单集 Q_2 使得 $Q_2 \subseteq Q_1^0$, 且

$$V(Q_2) > V(Q_1) - \frac{\varepsilon}{2}.$$

由于 $Q_2 \subseteq Q_1^0 \subseteq \Omega^0$, 从而

$$V^-(\Omega^0) \geq V(Q_2) > V(Q_1) - \frac{\varepsilon}{2} > V - \varepsilon.$$

于是有

$$V - \varepsilon < V^-(\Omega^0) \leq V.$$

由 ε 之任意性得 $V^-(\Omega^0) = V$. 再由

$$V = V^-(\Omega^0) \leq V^+(\Omega^0) \leq V$$

可得

$$V^-(\Omega^0) = V^+(\Omega^0) = V,$$

即 Ω_f^0 可测且其 J 测度为 V . 同理可证

$$V^-(\bar{\Omega}) = V^+(\bar{\Omega}) = V.$$

注 此性质的逆不真, 即 Ω^0 J 可测, $\bar{\Omega}$ J 可测, Ω 未必 J 可测. 例如在 R^1 中记 $[0, 1]$ 中的所有有理数组成的集合为 M , 则易知 $V^-(M) = 0, V^+(M) = 1$, 从而 M 在 R^1 中不是 J 可测. 但 $M^0 = \phi, \bar{M} = [0, 1]$, 显然均在 R^1 中 J 可测.

(ii) 若 Ω_1 和 Ω_2 都 J 可测, 则 $\Omega_1 \cup \Omega_2$, $\Omega_1 \cap \Omega_2$ 和 $\Omega_1 \setminus \Omega_2$ 也都 J 可测, 且

$$V(\Omega_1 \cup \Omega_2) \leq V(\Omega_1) + V(\Omega_2),$$

其中等号成立的充要条件是 $V(\Omega_1 \cap \Omega_2) = 0$.

证 首先容易证明当 Ω_1 和 Ω_2 都是简单集时, 此性质成立, 且

$$V(\Omega_1 \cup \Omega_2) = V(\Omega_1) + V(\Omega_2) - V(\Omega_1 \cap \Omega_2). \quad (1)$$

设 Ω_1 和 Ω_2 都是 J 可测集. 任给 $\varepsilon > 0$, 存在简单集 Q_1 和 Q_2 , 使得 $Q_1 \supseteq \Omega_1$, $Q_2 \supseteq \Omega_2$, 且

$$V(Q_1) < V(\Omega_1) + \frac{\varepsilon}{2}, \quad V(Q_2) < V(\Omega_2) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

由于 $\Omega_1 \cup \Omega_2 \subseteq Q_1 \cup Q_2$, 从而由 (1) 得

$$\begin{aligned} V^+(\Omega_1 \cup \Omega_2) &\leq V(Q_1 \cup Q_2) = V(Q_1) + V(Q_2) - V(Q_1 \cap Q_2) \\ &< V(\Omega_1) + V(\Omega_2) + \varepsilon - V(Q_1 \cap Q_2). \end{aligned}$$

再由 $Q_1 \cap Q_2 \supseteq \Omega_1 \cap \Omega_2$, 可知 $V(Q_1 \cap Q_2) \geq V^+(\Omega_1 \cap \Omega_2)$, 于是有

$$V^+(\Omega_1 \cup \Omega_2) < V(\Omega_1) + V(\Omega_2) - V^+(\Omega_1 \cap \Omega_2) + \varepsilon.$$

由 ε 的任意性可得

$$V^+(\Omega_1 \cup \Omega_2) \leq V(\Omega_1) + V(\Omega_2) - V^+(\Omega_1 \cap \Omega_2). \quad (2)$$

另一方面, 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 存在简单集 Q_3 和 Q_4 , 使得 $Q_3 \subseteq \Omega_1$, $Q_4 \subseteq \Omega_2$ 且

$$V(Q_3) > V(\Omega_1) - \frac{\varepsilon}{2}, \quad V(Q_4) > V(\Omega_2) - \frac{\varepsilon}{2}.$$

由于 $Q_3 \cup Q_4 \subseteq \Omega_1 \cup \Omega_2$, 从而由 (1) 得

$$\begin{aligned} V^-(\Omega_1 \cup \Omega_2) &\geq V(Q_3 \cup Q_4) = V(Q_3) + V(Q_4) - V(Q_3 \cap Q_4) \\ &> V(\Omega_1) + V(\Omega_2) - \varepsilon - V(Q_3 \cap Q_4). \end{aligned}$$

显然 $Q_3 \cap Q_4 \subseteq \Omega_1 \cap \Omega_2$, 所以

$$V(Q_3 \cap Q_4) \leq V^-(\Omega_1 \cap \Omega_2).$$

于是可得

$$V^-(\Omega_1 \cup \Omega_2) > V(\Omega_1) + V(\Omega_2) - V^-(\Omega_1 \cap \Omega_2) - \varepsilon.$$

由 ε 的任意性, 则

$$V^-(\Omega_1 \cup \Omega_2) \geq V(\Omega_1) + V(\Omega_2) - V^-(\Omega_1 \cap \Omega_2). \quad (3)$$

比较 (2) 和 (3), 再由 $V^-(\Omega_1 \cup \Omega_2) \leq V^+(\Omega_1 \cup \Omega_2)$, $V^-(\Omega_1 \cap \Omega_2) \leq V^+(\Omega_1 \cap \Omega_2)$, 立即可得

$$V^-(\Omega_1 \cup \Omega_2) = V^+(\Omega_1 \cup \Omega_2),$$

$$V^-(\Omega_1 \cap \Omega_2) = V^+(\Omega_1 \cap \Omega_2).$$

由此可知 $\Omega_1 \cup \Omega_2$ 和 $\Omega_1 \cap \Omega_2$ 都 J 可测, 且 (1) 对任何 J 可测集 Ω_1 和 Ω_2 都成立.

余下来仅证明 $\Omega_1 \setminus \Omega_2$ 的 J 可测性. 事实上, 由 Ω_1 和 Ω_2 的 J 可测性可推出 $\Omega_1 \cap \Omega_2$ J 可测. 任给 $\varepsilon > 0$, 存在简单集 Q_1 和 Q_2 , 使得 $Q_1 \supseteq \Omega_1$, $Q_2 \subseteq \Omega_1 \cap \Omega_2$, 且

$$V(Q_1) < V(\Omega_1) + \frac{\varepsilon}{2}, \quad V(Q_2) > V(\Omega_1 \cap \Omega_2) - \frac{\varepsilon}{2}.$$

显然 $Q_1 \setminus Q_2 \supseteq \Omega_1 \setminus \Omega_2$. 易知性质 (ii) 对于简单集成立, 所以 $Q_1 \setminus Q_2$ J 可测. 再由

$$Q_1 = (Q_1 \setminus Q_2) \cup (Q_1 \cap Q_2),$$

且 $(Q_1 \setminus Q_2) \cap (Q_1 \cap Q_2) = \phi$, 从而由 (1) 得

$$V(Q_1) = V(Q_1 \setminus Q_2) + V(Q_1 \cap Q_2).$$

于是

$$V^+(\Omega_1 \setminus \Omega_2) \leq V(Q_1 \setminus Q_2) = V(Q_1) - V(Q_1 \cap Q_2).$$

由于 $Q_1 \cap Q_2 = Q_2$, 则

$$V^+(\Omega_1 \setminus \Omega_2) \leq V(Q_1) - V(Q_2) < V(\Omega_1) - V(\Omega_1 \cap \Omega_2) + \varepsilon.$$

由 ε 之任意性可得

$$V^+(\Omega_1 \setminus \Omega_2) \leq V(\Omega_1) - V(\Omega_1 \cap \Omega_2). \quad (4)$$

另一方面, 对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在简单集 Q_3 和 Q_4 使得 $Q_3 \subseteq \Omega_1$, $Q_4 \supseteq \Omega_1 \cap \Omega_2$, 且

$$V(Q_3) > V(\Omega_1) - \frac{\varepsilon}{2}, \quad V(Q_4) < V(\Omega_1 \cap \Omega_2) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

显然 $Q_3 \setminus Q_4 \subseteq \Omega_1 \setminus \Omega_2$, 则

$$\begin{aligned} V^-(\Omega_1 \setminus \Omega_2) &\geq V(Q_3 \setminus Q_4) = V(Q_3) - V(Q_3 \cap Q_4) \\ &\geq V(Q_3) - V(Q_4) > V(\Omega_1) - V(\Omega_1 \cap \Omega_2) + \varepsilon. \end{aligned}$$

由 ε 之任意性可得

$$V^-(\Omega_1 \setminus \Omega_2) \geq V(\Omega_1) - V(\Omega_1 \cap \Omega_2), \quad (5)$$

比较 (4) 和 (5) 可知 $\Omega_1 \setminus \Omega_2$ J 可测, 且

$$V(\Omega_1 \setminus \Omega_2) = V(\Omega_1) - V(\Omega_1 \cap \Omega_2).$$

由性质 (ii) 可知任意有限多个 J 可测集 $\Omega_1, \dots, \Omega_m$ 其并集和交集都 J 可测, 且

$$V\left(\bigcup_{i=1}^m \Omega_i\right) \leq \sum_{i=1}^m V(\Omega_i),$$

其中等号成立的充要条件是

$$V(\Omega_i \cap \Omega_j) = 0, \quad i, j = 1, \dots, m, i \neq j.$$

上述性质一般称为 Jordan 测度的有限可加性. Jordan 测度没有所谓完全可加性, 即可数无穷多个 J 可测集其并集和交集都未必 J

可测. 例如在 R^n 中 $[0, 1]$ 上的所有有理数有无穷多个, 即它们可排为 $r_1, r_2, \dots, r_n, \dots$. 显然 R^n 中任意单点集都 J 可测且其 J 测度为 0, 但 $M = \bigcup_{i=1}^{\infty} r_i$ 不 J 可测.

R^n 中的一个 J 可测集, 如果它的 J 测度为 0, 则称其为 R^n 中的 Jordan 零测集, 简称为 R^n 中的 J 零集. 显然 R^n 中的有界集 A 是 J 零集 $\iff V^+(A) = 0$, 即任给 $\varepsilon > 0$, 存在 R^n 中的有限个标准长方体 H_1, \dots, H_m , 使得 $A \subseteq \bigcup_{i=1}^m H_i$, 且

$$\sum_{i=1}^m V(H_i) < \varepsilon.$$

例 1 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上有界, 令

$$A = \{(x, y) \in R^2; a \leq x \leq b, y = f(x)\},$$

则 A 是 R^2 中的 J 零集的充要条件是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

证 必要性. 设 A 是 R^2 中的 J 零集, 则任给 $\varepsilon > 0$, 存在 R^2 中有限个标准长方形

$$H_i = \{(x, y) \in R^2; x_{i-1} \leq x \leq x_i, y_{i-1} \leq y \leq y_i\},$$

其中 $i = 1, \dots, m$, 使得 $A \subseteq \bigcup_{i=1}^m H_i$, 且

$$\sum_{i=1}^m V(H_i) = \sum_{i=1}^m \Delta x_i \Delta y_i < \varepsilon, \quad (6)$$

这里 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, $\Delta y_i = y_i - y_{i-1}$. 不妨设

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_m = b,$$

且对于 $i = 1, \dots, m$ 有

$$y_{i-1} \leq f(x) \leq y_i, \quad \forall x \in [x_{i-1}, x_i]. \quad (7)$$

x_0, x_1, \dots, x_m 对应 $[a, b]$ 的一个分割 T , 设 $f(x)$ 关于 T 的积分大和与小和分别为 $S(T)$ 和 $s(T)$. 由 (6) 与 (7) 可得

$$0 \leq S(T) - s(T) \leq \sum_{i=1}^m \Delta x_i \Delta y_i < \varepsilon.$$

从而 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

充分性. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积. 任给 $\varepsilon > 0$, 则存在 $[a, b]$ 的分割

$$T: a = x_0 < x_1 < \dots < x_m = b$$

使得 $f(x)$ 相应的 T 的大和 $S(T)$ 与小和 $s(T)$ 满足

$$0 \leq S(T) - s(T) < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (8)$$

令

$$M_i = \sup_{x_{i-1} \leq x \leq x_i} f(x), \quad m_i = \inf_{x_{i-1} \leq x \leq x_i} f(x),$$

则

$$S(T) - s(T) = \sum_{i=1}^m (M_i - m_i) \Delta x_i,$$

其中 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$. 设

$$H_i = \{(x, y) \in R^2; x_{i-1} \leq x \leq x_i, m_i + \delta \leq y \leq M_i\},$$

其中 $0 < \delta < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$, 则 H_i 为 R^2 中的标准长方形. 显然 $A \subseteq \bigcup_{i=1}^m H_i$ 且由 (8) 可知

$$\sum_{i=1}^m V(H_i) = \sum_{i=1}^m (M_i - m_i + \delta) \Delta x_i < \varepsilon.$$

从而 A 是 R^2 中的 J 零集.

例 2 设 D 是 R^n 中的有界闭集, $f(x_1, \cdots, x_n)$ 在 D 上连续, 则

$$A = \left\{ (x_1, \cdots, x_n, x_{n+1}) \in R^{n+1}; \right. \\ \left. (x_1, \cdots, x_n) \in D, x_{n+1} = f(x_1, \cdots, x_n) \right\}$$

是 R^{n+1} 中的 J 零集.

证明留作练习.

为了后面的需要, 我们顺便介绍 Lebesgue 零测集 (简称 L 零集) 的概念. 设 A 是 R^n 中的有界集, A 称为 R^n 中的 Lebesgue 零测集, 如果任给 $\varepsilon > 0$, 存在至多可数多个 R^n 中的标准长方体 H_1, H_2, \cdots , 使得 $A \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} H_i$, 且

$$\sum_{i=1}^m V(H_i) < \varepsilon$$

显然若 A 是 R^n 中的 J 零集, 则 A 必是 R^n 中的 L 零集. 反之, 若 A 是 R^n 中的 L 零集, 则 A 未必是 R^n 中的 J 零集, 请读者给出例子说明.

对于判断 R^n 中的有界集是否 J 可测的问题, 我们有以下结果:

定理 设 Ω 是 R^n 中的有界集, 则 Ω J 可测的充要条件是 Ω 的边界点集 $\partial\Omega$ 是 J 零集.

证 必要性. 设 Ω J 可测, 记 $V(\Omega) = V^+(\Omega) = V^-(\Omega)$. 任给 $\varepsilon > 0$, 则存在简单集 Q'_1 和 Q_2 使得 $Q'_1 \subseteq \Omega$, $Q_2 \supseteq \Omega$, 且

$$V(Q_2 \setminus Q'_1) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

适当缩小组成 Q'_1 的每个标准长方体得简单集 Q_1 使得 $Q_1 \subseteq (Q'_1)^0 \subseteq \Omega^0$, 且

$$V(Q_2 \setminus Q_1) < \varepsilon. \quad (9)$$

由于简单集均为闭集, 所以 $Q_2 \supseteq \bar{\Omega}$. 于是有

$$\partial\Omega \subseteq \bar{\Omega} \setminus \Omega^0 \subseteq Q_2 \setminus Q_1.$$

由 (9) 可得

$$V^+(\partial\Omega) \leq V^+(Q_2 \setminus Q_1) = V(Q_2 \setminus Q_1) < \varepsilon.$$

由 ε 的任意性得 $V^+(\partial\Omega) = 0$, 即 $\partial\Omega$ 是 J 零集.

充分性. 设 $\partial\Omega$ 是 J 零集. 任给 $\varepsilon > 0$, 存在简单集 Q'_2 使得 $\partial\Omega \subseteq Q'$, 且 $V(Q'_2) < \frac{\varepsilon}{2}$. 适当扩大组成 Q'_2 的每一个标准长方体可得简单集 Q 满足 $\partial\Omega \subseteq Q^0$, 且 $V(Q) < \varepsilon$. 由于 $\partial\Omega$ 是有界闭集, 从而存在 $\delta > 0$ 使得

$$\text{dis}(\partial\Omega, \partial Q) = \inf_{x \in \partial\Omega, y \in \partial Q} |x - y| = 2\delta. \quad (10)$$

记

$$\Omega_\delta = \{x \in \Omega; \text{dis}(x, \partial\Omega) \geq \delta\},$$

其中 $\text{dis}(x, \partial\Omega) = \inf_{y \in \partial\Omega} |x - y|$. 若 $\Omega_\delta = \phi$, 则 $\Omega \subseteq Q$, 从而可得

$$V^+(\Omega) - V^-(\Omega) \leq V(Q) < \varepsilon. \quad (11)$$

若 $\Omega_\delta \neq \phi$, 则 $\Omega_\delta \subseteq \Omega^0$ 且 Ω_δ 是有界闭集. 任取 $x \in \Omega_\delta$, 以 x 为中心做标准长方体 $H(x)$ 使得

$$d_x = \sup_{y, z \in H(x)} |y - z| = \delta.$$

显然

$$|y - x| \leq \frac{\delta}{2}, \quad \forall y \in H(x).$$

由于 $x \in \Omega$, $\text{dis}(x, \partial\Omega) \geq \delta$, 从而 $H(x) \subseteq \Omega^0$. 因为

$$\Omega_\delta \subseteq \bigcup_{x \in \Omega_\delta} (H(x))^0,$$

由 Borel 定理可知存在有限个点 $P_1, \dots, P_m \in \Omega_\delta$ 使得

$$\Omega_\delta \subseteq \bigcup_{i=1}^m (H(P_i))^\circ \subseteq \bigcup_{i=1}^m H(P_i) \subseteq \Omega^\circ.$$

记 $Q' = \bigcup_{i=1}^m H(P_i)$, 则 $V(Q') \leq V^-(\Omega)$. 如果 $x \in \Omega \setminus \Omega_\delta$, 则 $x \in \Omega$, $\text{dis}(x, \partial\Omega) < \delta$ 由 (10) 得 $x \in Q$, 于是 $\Omega \subseteq Q \cup Q'$. 由此可得

$$V^+(\Omega) \leq V(Q \cup Q') \leq V(Q) + V(Q') < V^-(\Omega) - \varepsilon,$$

即 (11) 也成立. 由 ε 之任意性得 $V^+(\Omega) = V^-(\Omega)$, 即 Ω J 可测.

从这一定理与前面的例 1 和例 2 可知通常遇到的有界区域一般是 J 可测的. 以后本课程所提到的有界区域均假设为 J 可测.

§2 重积分的概念与性质

一、重积分的定义

设 D 是 R^n 中的有界闭区域, $f(x)$ 为定义在 D 上的函数, 有限集 $T = \{\Delta\sigma_1, \dots, \Delta\sigma_l\}$ 称为 D 的一个分割, 如果

- (i) 每一个 $\Delta\sigma_i$ ($i = 1, \dots, l$) 均是 D 的闭 J 可测子集.
- (ii) $\Delta\sigma_1, \dots, \Delta\sigma_l$ 两两无相交内部, 即

$$(\Delta\sigma_i)^\circ \cap (\Delta\sigma_j)^\circ = \phi, \quad i \neq j.$$

$$(iii) \quad D = \bigcup_{i=1}^l \Delta\sigma_i.$$

有时称 T 为布在 D 上的一个网, 每一个 $\Delta\sigma_i$ 为一个网眼. 以后我们用 $\Delta\sigma_i$ 既表示这个点集又表示它的 J 测度. 称 $d(T) = \max_{1 \leq i \leq l} d(\Delta\sigma_i)$ 为分割 T 的直径, 其中 $d(\Delta\sigma_i) = \sup_{x, y \in \Delta\sigma_i} |x - y|$ 为 $\Delta\sigma_i$ 的直径. 任取 $\xi^i \in \Delta\sigma_i$, 则 $\sum_{\Delta\sigma_i \in T} f(\xi^i) \Delta\sigma_i$ 称为 $f(x)$ 在 D 上关于 T 的一个积分和.