

施笃兹定理

施笃兹定理是奥地利数学家Otto Stolz (1842-1905) 和意大利数学家Ernesto Cesàro (1859 - 1906) 最早提出并证明的([1]和[2]), 因此也被称为Stolz-Cesàro定理或Stolz-Cesàro引理. 对于数列极限, 当 $x_n \rightarrow \infty$ 且 $y_n \rightarrow \infty$ 或者 $x_n \rightarrow 0$ 且 $y_n \rightarrow 0$ 时, 比值 $\frac{x_n}{y_n}$ 的极限状态极为复杂, 这两种情形下的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$ 分别被称为 $\frac{\infty}{\infty}$ 型不定式和 $\frac{0}{0}$ 型不定式, 施笃兹定理是计算这两种不定式的一个有力工具.

定理1 (施笃兹定理, $\frac{\infty}{\infty}$ 型) 设 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 是两个数列, 满足下列条件:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = A$ (其中 $A \in \mathbb{R}$ 或 $A = +\infty$ 或 $A = -\infty$),

(2) 数列 $\{y_n\}$ 严格递增且趋向 $+\infty$,

则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = A$.

证 (i) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = 0$. 于是对于任给的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N_1 , 使当 $n \geq N_1$ 时, 就有 $\left| \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} \right| < \frac{\varepsilon}{2}$. 从而

$$-\frac{\varepsilon}{2}(y_{n+1} - y_n) < x_{n+1} - x_n < \frac{\varepsilon}{2}(y_{n+1} - y_n).$$

因此当 $n > N_1$ 时, 有

$$x_n - x_{N_1} = \sum_{k=N_1}^{n-1} (x_{k+1} - x_k) < \sum_{k=N_1}^{n-1} \frac{\varepsilon}{2} (y_{k+1} - y_k) = \frac{\varepsilon}{2} (y_n - y_{N_1})$$

和

$$x_n - x_{N_1} = \sum_{k=N_1}^{n-1} (x_{k+1} - x_k) > - \sum_{k=N_1}^{n-1} \frac{\varepsilon}{2} (y_{k+1} - y_k) = -\frac{\varepsilon}{2} (y_n - y_{N_1}).$$

故 $\left| \frac{x_n - x_{N_1}}{y_n - y_{N_1}} \right| < \frac{\varepsilon}{2}$. 另一方面, 又有

$$\left| \frac{x_n - x_{N_1}}{y_n - y_{N_1}} \right| = \frac{\left| \frac{x_n}{y_n} - \frac{x_{N_1}}{y_{N_1}} \right|}{1 - \frac{y_{N_1}}{y_n}} \geq \left| \frac{x_n}{y_n} - \frac{x_{N_1}}{y_{N_1}} \right| \geq \left| \frac{x_n}{y_n} \right| - \left| \frac{x_{N_1}}{y_{N_1}} \right|.$$

于是 $n > N_1$ 时, 有

$$\left| \frac{x_n}{y_n} \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \left| \frac{x_{N_1}}{y_{N_1}} \right|.$$

由已知, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty$, 故有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{N_1}}{y_n} = 0$, 从而对前述的 $\varepsilon > 0$, 又存在正整数 N_2 , 使当 $n > N_2$ 时, 就有 $\left| \frac{x_{N_1}}{y_n} \right| < \frac{\varepsilon}{2}$. 令 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 于是当 $n > N$ 时, 就有 $\left| \frac{x_n}{y_n} \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$. 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = 0$, 即此时结论成立.

(ii) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = a \neq 0$. 令 $z_n = x_n - ay_n$, 于是有

$$\frac{z_{n+1} - z_n}{y_{n+1} - y_n} = \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} - a \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

由上段证明知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z_n}{y_n} = 0$. 从而有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = a$.

(iii) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = +\infty$. 因为 $\{y_n\}$ 严格递增且 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty$, 故存在正整数 N , 使当 $n > N$ 时, 就有

$$x_{n+1} - x_n > y_{n+1} - y_n > 0.$$

故不妨设 $\{x_n\}$ 严格递增且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$. 又因这时有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_{n+1} - y_n}{x_{n+1} - x_n} = 0$, 由(i)有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} = 0$.

从而得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = +\infty$.

(iv) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = -\infty$. 这时, 只要令 $z_n = -x_n$ 即可由(iii) 的结论得到证明. \square

注 1. 注意定理1的前提条件中没有“数列 $\{x_n\}$ 趋向 ∞ ”的要求.

2. 当 $A = \infty$ 时, 定理1的结论未必成立. 例如, $x_n = (-1)^n n$, $y_n = n$, $n = 1, 2, \dots$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = \infty$, 而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$ 不存在.

3. 定理1的逆命题不成立. 例如, $x_n = 3n + (-1)^n$, $y_n = 3n + (-1)^{n+1}$, $n = 1, 2, \dots$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = 1$, 而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n}$ 不存在. 因此, 要从 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = A$ 得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = A$, 或者已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n}$ 存在, 或者需要另外附加条件, 下面的命题就是一例.

命题1 设 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 是两个数列, 满足下列条件:

(1) 对任何正整数 n , 有 $y_n \neq 0$,

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = A \in \mathbb{R}$,

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{y_{n+1}} = B \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$,

则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = A$.

证 因为

$$\frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = \frac{\frac{x_{n+1}}{y_{n+1}} - \frac{x_n}{y_{n+1}}}{1 - \frac{y_n}{y_{n+1}}} = \frac{\frac{x_{n+1}}{y_{n+1}} - \frac{x_n}{y_n} \cdot \frac{y_n}{y_{n+1}}}{1 - \frac{y_n}{y_{n+1}}},$$

所以由条件得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = \frac{A - A \cdot B}{1 - B} = A.$$

□

4. 施笃兹定理有一些常用的推论. 例如,

- (1) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ (其中 $a \in \mathbb{R}$ 或 $a = +\infty$ 或 $a = -\infty$), 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} = a$;
- (2) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = a$ (其中 $a \in \mathbb{R}$ 或 $a = +\infty$ 或 $a = -\infty$), 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n} = a$;
- (3) 设 $x_n > 0, n = 1, 2, \cdots$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ (其中 $a \in \mathbb{R}$ 或 $a = +\infty$), 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} = a$;
- (4) 设 $x_n > 0, n = 1, 2, \cdots$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = a$ (其中 $a \in \mathbb{R}$ 或 $a = +\infty$), 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = a$.

5. 由定理1可以证明下面形式上更一般的结果: 设 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 是两个数列, p 是一个给定的正整数, 满足下列条件:

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+p} - x_n}{y_{n+p} - y_n} = A$ (其中 $A \in \mathbb{R}$ 或 $A = +\infty$ 或 $A = -\infty$),
- (2) 数列 $\{y_n\}$ 严格递增且趋向 $+\infty$.

则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = A$.

类似于定理1, 不难证明 $\frac{0}{0}$ 型不定式的施笃兹定理.

定理2 (施笃兹定理, $\frac{0}{0}$ 型) 设 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 是两个数列, 满足下列条件:

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$,
- (2) 数列 $\{y_n\}$ 严格递减,
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = A$ (其中 $A \in \mathbb{R}$ 或 $A = +\infty$ 或 $A = -\infty$),

则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = A$.

将来在第6章, 学习了上下极限之后, 施笃兹定理可以推广为上下极限形式的命题.

定理3 设 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 是两个数列, 满足数列 $\{y_n\}$ 严格递增且趋向 $+\infty$, 则有

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n}.$$

定理4 设 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 是两个数列, 满足下列条件:

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$,
- (2) 数列 $\{y_n\}$ 严格递减,

则有

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n}.$$

同样地, 对于函数极限, 当 $f(x) \rightarrow 0$ 且 $g(x) \rightarrow 0$ 或者 $f(x) \rightarrow \infty$ 且 $g(x) \rightarrow \infty$ 时, 比值 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 的极限状态极为复杂, 这两种情形下的极限 $\lim \frac{f(x)}{g(x)}$ 分别被称为 $\frac{0}{0}$ 型不定式和 $\frac{\infty}{\infty}$ 型不定式. 将来在一元微分学中, 我们将给出计算这两种不定式的有力工具——洛必达法则. 由施笃兹定理的思想, 可以给出和证明下面的两个定理(它们可以看成是施笃兹定理的推广). 请自行给出定理的证明([3]中有定理5和定理6的证明).

定理5 设常数 $T > 0$, 若 $f(x), g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上满足

- (1) 对任意 $x \in [a, +\infty)$, 有 $g(x+T) > g(x)$,
- (2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$,
- (3) $f(x), g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 的每个有界子区间上有界,
- (4) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+T) - f(x)}{g(x+T) - g(x)} = A$ (其中 $A \in \mathbb{R}$ 或 $A = +\infty$ 或 $A = -\infty$),

则有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = A$.

定理6 设常数 $T > 0$, 若 $f(x), g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上满足

- (1) 对任意 $x \in [a, +\infty)$, 有 $0 < g(x+T) < g(x)$,
- (2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$,
- (3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+T) - f(x)}{g(x+T) - g(x)} = A$ (其中 $A \in \mathbb{R}$ 或 $A = +\infty$ 或 $A = -\infty$),

则有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = A$.

下面是应用施笃兹定理解决问题的一些例子, 其中有的例子需要较高的技巧. [3]中有更多应用施笃兹定理的例子.

例1 设 $p \in \mathbb{N}^*$, 证明:

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^{p+1}} = \frac{1}{p+1}$;
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^p} - \frac{n}{p+1} \right) = \frac{1}{2}$.

证 (1) 由施笃兹定理, 有

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^{p+1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^p}{(n+1)^{p+1} - n^{p+1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^p + pn^{p-1} + \cdots + 1}{(p+1)n^p + \cdots + 1} \\ &= \frac{1}{p+1}. \end{aligned}$$

(2) 由施笃兹定理, 有

$$\begin{aligned}
 & \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^p} - \frac{n}{p+1} \right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p - \frac{n^{p+1}}{p+1}}{n^p} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^p - \frac{(n+1)^{p+1} - n^{p+1}}{p+1}}{(n+1)^p - n^p} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^p + pn^{p-1} + \cdots + 1) - \left(n^p + \frac{p}{2}n^{p-1} + \cdots + \frac{1}{p+1} \right)}{pn^{p-1} + \cdots + 1} \\
 &= \frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

□

例2 设 $a_1 > 0$, $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}$, $n = 1, 2, \cdots$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{2n}} = 1$.

证 已知 $0 < a_1 < 1$, 故 $a_2 = a_1 + \frac{1}{a_1} > a_1 > 0$. 设 $a_n > a_{n-1} > 0$, 则 $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n} > a_n > 0$, 因此由数学归纳法知对一切正整数 n , 有 $a_{n+1} > a_n > 0$, 于是 $\{a_n\}$ 严格递增. 若 $\{a_n\}$ 有上界, 由单调收敛定理知数列 $\{a_n\}$ 收敛. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0$, 在 $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}$ 两边令 $n \rightarrow \infty$ 取极限得 $a = a + \frac{1}{a}$, 矛盾. 因此 $\{a_n\}$ 无上界, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$. 由施笃兹定理, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}^2 - a_n^2}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{1}{a_n^2}}{2} = 1.$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{2n}} = 1$.

□

例3 (William Lowell Putnam Mathematical Competition, 2006年B6)

设 k 是一个大于1的整数, $a_1 > 0$, $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{\sqrt[k]{a_n}}$, $n = 1, 2, \cdots$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^{k+1}}{n^k}$.

解 不难看出 $\{a_n\}$ 是一个严格递增的正数数列. 若 $\{a_n\}$ 有上界, 则由单调收敛定理知 $\{a_n\}$ 收敛于一个正数 A , 在 $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{\sqrt[k]{a_n}}$ 两边令 $n \rightarrow \infty$ 取极限, 得 $A = A + \frac{1}{\sqrt[k]{A}}$, 即 $0 = \frac{1}{\sqrt[k]{A}}$, 矛盾! 因此 $\{a_n\}$ 无上界, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$.

对任意 $x > 0$, 将 $\left(1 + \frac{k+1}{k}x\right)^k$ 看成 k 个 $1 + \frac{k+1}{k}x$ 和 1 个 1 相乘, 由均值不等式得

$$\left(1 + \frac{k+1}{k}x\right)^{\frac{k}{k+1}} < \frac{k\left(1 + \frac{k+1}{k}x\right) + 1}{k+1} = 1+x,$$

故 $(1+x)^{\frac{k+1}{k}} > 1 + \frac{k+1}{k}x$; 另一方面, 由 $(1+x)^{\frac{1}{k}} < 1 + \frac{x}{k}$ 得

$$(1+x)^{\frac{k+1}{k}} - 1 - \frac{k+1}{k}x < (1+x)\left(1 + \frac{x}{k}\right) - 1 - \frac{k+1}{k}x = \frac{x^2}{k}.$$

合起来, 就得到

$$0 < (1+x)^{\frac{k+1}{k}} - 1 - \frac{k+1}{k}x < \frac{x^2}{k}.$$

将 $x = \frac{a_{n+1}}{a_n} - 1 = a_n^{-\frac{k+1}{k}}$ 代入到上面的不等式, 整理得到

$$0 < a_{n+1}^{\frac{k+1}{k}} - a_n^{\frac{k+1}{k}} - \frac{k+1}{k} < \frac{a_n^{-\frac{k+1}{k}}}{k}.$$

由两边夹定理知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(a_{n+1}^{\frac{k+1}{k}} - a_n^{\frac{k+1}{k}} - \frac{k+1}{k} \right) = 0, \text{ 即 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(a_{n+1}^{\frac{k+1}{k}} - a_n^{\frac{k+1}{k}} \right) = \frac{k+1}{k}.$$

于是由施笃兹定理得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^{\frac{k+1}{k}}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(a_{n+1}^{\frac{k+1}{k}} - a_n^{\frac{k+1}{k}} \right) = \frac{k+1}{k},$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^{k+1}}{n^k} = \left(\frac{k+1}{k} \right)^k. \quad \square$$

例4 设 $x_n = \frac{\sum_{k=0}^n \ln C_n^k}{n^2}$, $n \in \mathbb{N}^*$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解 由施笃兹定理, 有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=0}^{n+1} \ln C_{n+1}^k - \sum_{k=0}^n \ln C_n^k}{(n+1)^2 - n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=0}^n \ln \frac{C_{n+1}^k}{C_n^k}}{2n+1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=0}^n \ln \frac{n+1}{n-k+1}}{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) \ln(n+1) - \ln(n+1)!}{2n+1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[(n+1) \ln(n+1) - \ln(n+1)!] - (n \ln n - \ln n!)}{(2n+1) - (2n-1)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot \frac{1}{n}}{2} = \frac{1}{2}. \quad \square \end{aligned}$$

例5 设 $\{a_n\}$ 是一个数列, $a, \lambda \in \mathbb{R}$, $|\lambda| > 1$, 证明: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + \lambda a_{n+1}) = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{a}{1+\lambda}$.

证 令 $b_n = a_n - \frac{a}{1+\lambda}$, $n = 1, 2, \dots$, 则由 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + \lambda a_{n+1}) = a$ 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n + \lambda b_{n+1}) = 0$.

由施笃兹定理, 有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (-\operatorname{sgn} \lambda)^n b_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-\lambda)^n b_n}{|\lambda|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-\lambda)^{n+1} b_{n+1} - (-\lambda)^n b_n}{|\lambda|^{n+1} - |\lambda|^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^{n+1} (\operatorname{sgn} \lambda)^n}{|\lambda| - 1} (b_n + \lambda b_{n+1}) = 0. \end{aligned}$$

于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(-\operatorname{sgn} \lambda)^n} \cdot (-\operatorname{sgn} \lambda)^n b_n = 0$, 进而得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{a}{1 + \lambda}$. □

例6 设 $a_1 > 0$,

$$a_{n+1} = a_n + \frac{1}{\sum_{k=1}^n a_k}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{2 \ln n}} = 1.$$

证 记 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, $n = 1, 2, \dots$. 当 $n = 1$ 时, 由题设知 $a_1 > 0$. 设 a_1, a_2, \dots, a_n 都大于 0, 则 $S_n > 0$, 从而 $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{S_n} > 0$. 由数学归纳法知对任意正整数 n , 都有 $a_n > 0$. 于是 $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{S_n} > a_n$, 即数列 $\{a_n\}$ 严格递增. 进而知 $na_1 \leq S_n \leq na_n$, $n = 1, 2, \dots$. 由

$$a_{n+1}^2 = \left(a_n + \frac{1}{S_n}\right)^2 \geq \left(a_n + \frac{1}{na_n}\right)^2 > a_n^2 + \frac{2}{n}$$

可见

$$a_{n+1}^2 > a_1^2 + \frac{2}{1} + \dots + \frac{2}{n} \rightarrow +\infty \quad (n \rightarrow \infty),$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$. 注意到 $0 < \frac{n}{S_n^2} \leq \frac{1}{na_1^2}$, 根据两边夹定理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{S_n^2} = 0$. 因为

$$1 < \frac{(n+1)a_{n+1} - na_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{n}{a_{n+1}S_n} \leq 1 + \frac{1}{a_1 a_{n+1}},$$

所以由两边夹定理得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)a_{n+1} - na_n}{a_{n+1}} = 1$, 再由施笃兹定理知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{S_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)a_{n+1} - na_n}{a_{n+1}} = 1.$$

因此使用施笃兹定理就得到

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{2 \ln n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}^2 - a_n^2}{2 \ln(n+1) - 2 \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(a_{n+1}^2 - a_n^2)}{2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{na_n}{S_n} + \frac{n}{2S_n^2} \right) = 1 + 0 = 1, \end{aligned}$$

进而得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{2 \ln n}} = 1. \quad \square$$

参考文献

- [1] Stolz, Otto, Über die grenzwerte der quotienten, Mathematische Annalen 15, 556 - 559 (1879).
- [2] Cesàro, Ernesto, Sur la convergence des séries, Nouvelles annales de mathématiques, Series 3, 7: 49 - 59 (1888).
- [3] 孙本旺, 汪浩, 数学分析中的典型例题和解题方法, 湖南科学技术出版社, 1981.