

영어음성학 정리 - 9월 3주차

영어의 자모는 크게 voiced 와 voiceless로 구분된다. 이 둘은 성대의 떨림을 기준으로 한다.

성대가 떨리면 voiced, 그렇지 않으면 voiceless이다.

자음은 b, d, g, j, l, m, n, ng, r, th, v, w, y, z가 voiced consonants이고,

Ch, f, k, p, s, sh, t, th는 voiceless consonants이다.

모음은 모두 voiceless이다.

모음은 크게 두종류로 나뉜다. 단모음(monophthongs)와 복모음(diphthongs)가 있다.

Phonetics는 '말(speech)'를 연구하는 학문이다.

Phonetics는 다시 세 종류로 나뉘는데, Articulatory phonetics, Acoustic phonetics, Auditory phonetics가 그 예시이다.

Articulatory phonetics는 우리의 구강구조에서 어떻게 말을 생산하는가에 대해 연구한다.

Acoustic phonetics는 어떻게 말이 전달되는지 파동의 개념으로 본다.

Auditory phonetics는 어떻게 말이 우리의 귀로 전달되어 인식하는가를 배운다.

조음(Articulation)

말소리가 이동하는 통로: 이 - 귀(ear), 비 - 코(nose), 인 - 인두(pharynx), 후 - 후두(larynx)

Vocal tract(upper):

입술(lip): v,p와 같은 소리의 조음 장소이다.

치아(teeth): th와 같은 치음 소리의 조음 장소이다.

Alveolar ridge: 치아 바로 뒤 잇몸부분이다. d와 같은 치경음의 조음장소이다.

경구개(hard palate): 입천장 중에 앞부분으로, 상대적으로 딱딱한 부분이다.

연구개(soft palate): 입천장 중 뒷부분으로, 상대적으로 부드러운 부분이다. Velum이라 부르기도 한다.

목젖(uvula): 목젖이다.

인두벽(pharynx wall): 인두 부분을 말한다.

Vocal tract(lower):

아랫부분은 크게 3군데로 나뉜다. 입술, 혀, 후두개(epiglottis)

그중에 혀는 혀끝(tip), 혀날(blade), 앞, 중간, 뒤, 혀뿌리(root)가 있다.

epiglottis는 후두에 있는 후두개를 말한다.

Phonation process in larynx

폐에서 나오는 공기는 larynx에서 phonation process 거친다. 이때 성대가 매우 빠른 속도로 진동하여 소리를 만든다. 보통 소리의 높낮이와 진동수는 비례한다. 후두에서 진동이 있느냐 없느냐에 따라 유성음 무성음으로 나뉜다. 영어의 모든 모음은 유성음이다.

Oro-nasal process in velum

m, n, ng와 같이 흔히 비음이라 말해지는 것들은 코로 공기가 감을 통해서 이루어진다.

이때, velum이 주역할을 한다. Velum이 열리면 비음이 되고, 다른 음성일때는 닫혀 있다.

Control of constrictors

constriction이 어디에 이루어지느냐에 따라 영어 자모음이 달라진다.

입술로 이루어지는 소리들, p와 같은 소리들이 대표적이다.

Tongue body가 palatal과 velar 어디에 있느냐에 따라 소리가 달라진다.

velar는 k, palatal의 경우 g가 대표적이다.

Tongue tip의 경우 dental부터 치아 뒷부분인 alveolar, 더 뒷부분인 palato-alveolar부분(sh), 그리고 그 부분을 지나가면서 발성하는 retroflex음이 있다.

한편 세기에 따라 달라지기도 한다.

완전히 막고 세게하면 stop, 조금 틈을 열면 fricative, 모음보다 조금 더 열면 approximants, 그 다음은 모음이다.

이러한 소리들은 조음 기관의 조합으로 이루어진다. 이러한 소리들로 단어가 구성된다. 이때 구성되는 하나하나의 소리를 phoneme이라 한다.

Praat에서는 intensity를 알 수 있고, pitch를 통해 음의 높낮이를, 모음구분할 수 있는 formant 또한 확인할 수 있다.