

# 量子计算

## —数学基础

# Quantum Computer

网址: [www.qubits.top](http://www.qubits.top)

Calvin Tang

179209347@qq.com

# 介绍

## 教程简介：

- 面向对象：量子计算初学者
- 依赖课程：线性代数，解析几何，量子力学（非必需）

## 知乎专栏：

[https://www.zhihu.com/column/c\\_1501138176371011584](https://www.zhihu.com/column/c_1501138176371011584)

## Github & Gitee 地址：

<https://github.com/mymagicpower/qubits>

<https://gitee.com/mymagicpower/qubits>

## \* 版权声明：

- 仅限用于个人学习，或者大学授课使用  
（大学授课如需ppt原件，请用学校邮箱联系我获取）
- 禁止用于任何商业用途

# 从线性运算说起

线性运算是**加法**和**数量乘法**，在实数域像只包含加法和数量乘法二元一次方程就属于线性运算，如：

$$y = ax + b$$


矩阵的线性运算：矩阵的加法和数乘运算

向量的线性运算：向量的加法和数乘运算

它们满足交换律、结合律、分配律等。

对于一个实数轴而言，任意多个实数的线性组合仍然是实数，即其仍在实数轴上，如：

$$y = a_0x_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n$$




$$y = 1 * 2 + 0.5 * 3 + 0.1 * 6 = 2 + 1.5 + 0.6 = 4.1$$

# 复平面

对于虚数  $i$ ，我们无法在实数轴上线性运算获得，也就是说**与实数线性无关**。而线性无关意味着虚数  $i$  在与实数轴垂直的一个数轴上：

对于复数  $a + b i$ ，其在复平面里的坐标表示如下：






# 复数向量表示

如果我们用向量来理解的话，复数  $a + b i$  可以表示为，向量  $a \vec{j}$  和  $b \vec{i}$  的线性组合：

$$a \vec{j} + b \vec{i} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$



$\vec{j}$  定义为实数轴单位向量，单位长度为 1  
 $\vec{i}$  定义为虚数轴单位向量，单位长度为  $i$


# 复数向量三角函数表示

如右图所示，如果将向量长度定义为  $r$ ，且  $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ ，则根据三角函数有：

- $a = r \cos(\theta)$
- $b = r \sin(\theta)$

那么复数  $c = a + b i$  可以表示为：  
 $r(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$

向量  $a \vec{j} + b \vec{i}$  可以表示为：  
 $r \cos(\theta) \vec{j} + r \sin(\theta) \vec{i}$



## 欧拉公式 ( 1/2 )

泰勒公式：

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

公式1

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

公式2

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

公式3

由公式3，用ix代入x

$$e^{ix} = 1 + \frac{ix}{1!} + \frac{(ix)^2}{2!} + \frac{(ix)^3}{3!} + \cdots + \frac{(ix)^n}{n!}$$

## 欧拉公式 ( 2/2 )

代入虚数  $i$ :  $i^0 = 1, i^1 = i, i^2 = -1, i^3 = -i \dots i^{2n} = (-1)^n, i^{2n+1} = (-1)^n i$

$$\begin{aligned} e^{ix} &= 1 + \frac{ix}{1!} - \frac{x^2}{2!} - \frac{ix^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{ix^5}{5!} - \frac{x^6}{6!} - \frac{ix^7}{7!} + \dots + \frac{i^{2n}x^{2n}}{(2n)!} + \frac{i^{2n+1}x^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + i(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}) \\ &= \cos(x) + i \sin(x) \end{aligned}$$

由此可得欧拉公式：

$$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$$

$\theta$ 取  $\pi$  时，可得欧拉恒等式：

$$e^{i\pi} = -1$$



# 虚数 $i$ 与实数关系 – 复数加法的几何意义

复数：

$$c_1 = a + b i = a \vec{j} + b \vec{i}$$

$$c_2 = c + d i = c \vec{j} + d \vec{i}$$

令：

$$c_1 = 1 + 3 i = 1 \vec{j} + 3 \vec{i}$$


$$c_2 = 3 + i = 3 \vec{j} + 1 \vec{i}$$

$$\begin{aligned} \text{则 } c_3 &= c_1 + c_2 \\ &= (a+c) \vec{j} + (b+d) \vec{i} \\ &= 4 \vec{j} + 4 \vec{i} \end{aligned}$$

复数加法的几何意义可以概括为：

**平行四边形法则**

结果为两个复数向量形成的平行四边形的对角线。



## 虚数 $i$ 与实数关系 – 向量旋转

根据欧拉公式：

$$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$$


复数  $c = a + b i$  即  $r(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$  可以表示为：

$$c = r e^{i\theta}$$

$\theta = 0$  时,  $c = r e^{i\theta} = r e^0 = r$

根据图形可知：

复数  $c = a + b i$  即  $r(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$  可以理解为实数轴上长度为  $r$  的向量逆时针旋转  $\theta$  角得到。



# 虚数 $i$ 与实数关系 – 复数乘法的几何意义

复数  $c_1 = a + bi$  :

➤  $c_1 = r_1(\cos(\theta_1) + i \sin(\theta_1))$

➤  $c_1 = r_1 e^{i\theta_1}$

复数  $c_2 = c + di$  :

➤  $c_2 = r_2(\cos(\theta_2) + i \sin(\theta_2))$

➤  $c_2 = r_2 e^{i\theta_2}$


$$\begin{aligned} \text{复数 } c_1 * c_2 &= r_1 e^{i\theta_1} * r_2 e^{i\theta_2} \\ &= r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)} \\ &= r_3 e^{i\theta_3} \end{aligned}$$

根据上面的计算过程可知复数乘法几何意义 :

**旋转缩放**

$$c_3 = c_1 * c_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

可以理解为  $c_1$  作用于  $c_2$  , 将复数  $c_2$  向量逆时针旋转  $\theta_1$  角 , 并且长度进行缩放 , 缩放系数为  $r_1$  。



$i$  乘以向量 , 几何意义是逆时针旋转90度 !

# 复数空间与实数空间转换 - 向量

复向量：

$$\begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a + b i \\ c + d i \end{bmatrix}$$

(  $\alpha$ 、 $\beta$  都是复数 )

实向量表示：

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix}$$

所有的门，都是希尔伯特空间中的算子，即算子矩阵中所有的元素都是复数（其中的实数应理解为虚部为 0）。

那么  $Y = \sigma_y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$  **实向量空间**中的矩阵表示（看做 2 \* 2 分块矩阵）：

$$\begin{array}{c|cc} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \\ \hline \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$a + b i$  算子其矩阵表示：

$$\begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$$

## 复数空间与实数空间转换 – 矩阵

$a + b i$  作为算子其矩阵表示：

$$\begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$$

那么  $Y = \sigma_y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$  **实向量空间**中的矩阵表示（看做  $2 * 2$  分块矩阵）：

$$\begin{array}{c|cc} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \\ \hline \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

## 欧拉公式 – 矩阵证明法 ( 1/4 )

① 泰勒公式：
$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

②  $i$  矩阵表示：
$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\frac{\pi}{2}) & -\sin(\frac{\pi}{2}) \\ \sin(\frac{\pi}{2}) & \cos(\frac{\pi}{2}) \end{bmatrix}$$

因为  $a + bi$  矩阵表示： $\begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$

③ 用  $x \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$  代入  $e^x$  中的  $x$ ：

④ 
$$\begin{aligned} e^x &= 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} \\ &= x^0 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} \quad \text{1 要转换成 } x^0, \text{ 如此才能保证维度一致} \\ &= (x \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix})^0 + \frac{1}{1!} (x \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix})^1 + \frac{1}{2!} (x \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix})^2 + \frac{1}{3!} (x \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix})^3 + \dots + \frac{1}{n!} (x \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix})^n \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^0 + \frac{1}{1!} x \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^1 + \frac{x^2}{2!} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^2 + \frac{x^3}{3!} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^3 + \dots + \frac{x^n}{n!} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^n \end{aligned}$$



## 欧拉公式 – 矩阵证明法 ( 2/4 )

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\frac{\pi}{2}) & -\sin(\frac{\pi}{2}) \\ \sin(\frac{\pi}{2}) & \cos(\frac{\pi}{2}) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^3 = \begin{bmatrix} \cos(\frac{3\pi}{2}) & -\sin(\frac{3\pi}{2}) \\ \sin(\frac{3\pi}{2}) & \cos(\frac{3\pi}{2}) \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

...

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{2n+1} &= \begin{bmatrix} \cos(\frac{(2n+1)\pi}{2}) & -\sin(\frac{(2n+1)\pi}{2}) \\ \sin(\frac{(2n+1)\pi}{2}) & \cos(\frac{(2n+1)\pi}{2}) \end{bmatrix} \\ &= (-1)^n \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^0 = \begin{bmatrix} \cos(\frac{0\pi}{2}) & -\sin(\frac{0\pi}{2}) \\ \sin(\frac{0\pi}{2}) & \cos(\frac{0\pi}{2}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} \cos(\frac{2\pi}{2}) & -\sin(\frac{2\pi}{2}) \\ \sin(\frac{2\pi}{2}) & \cos(\frac{2\pi}{2}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

...

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{2n} &= \begin{bmatrix} \cos(\frac{(2n)\pi}{2}) & -\sin(\frac{(2n)\pi}{2}) \\ \sin(\frac{(2n)\pi}{2}) & \cos(\frac{(2n)\pi}{2}) \end{bmatrix} \\ &= (-1)^n \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

## 欧拉公式 – 矩阵证明法 ( 3/4 )

$$\begin{aligned}
 e^{x \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}} &= \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^0 + \frac{1}{1!} x \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^1 + \frac{x^2}{2!} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^2 + \frac{x^3}{3!} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^3 + \dots + \frac{x^n}{n!} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^n \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \frac{x^2}{2!} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \frac{x^4}{4!} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \frac{x^6}{6!} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &\quad + x \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - \frac{x^3}{3!} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + \frac{x^5}{5!} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - \frac{x^7}{7!} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} & 0 \\ 0 & 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} \end{bmatrix} \\
 &\quad + \begin{bmatrix} 0 & -(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}) \\ x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} & 0 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

## 欧拉公式 – 矩阵证明法 ( 4/4 )

根据泰勒公式：

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

可得：

$$\text{欧拉公式：} e^{x \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} \cos x & 0 \\ 0 & \cos x \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\sin x \\ \sin x & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos x & -\sin x \\ \sin x & \cos x \end{bmatrix}$$

$$\text{欧拉恒等式：} e^{\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \pi} = \begin{bmatrix} \cos \pi & -\sin \pi \\ \sin \pi & \cos \pi \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

也可以表示为：

$$e^{x(0,1)} = (\cos x, \sin x)$$


$$e^{(0,\pi)} = (-1, 0)$$

矩阵表示或者二元组表示，更能体现复数的本质：  
**虚数不虚，复数是矩阵在2维上的特例！**

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

$$e^{i\pi} = -1$$

# 矩阵类型



Pauli 矩阵

$$X = \sigma_x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Y = \sigma_y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

$$Z = \sigma_z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

# 实对称矩阵 $A^T$ vs 厄米矩阵 $A^\dagger$ — 等价

实对称矩阵： $A^T = A$      $A^T$  的意思是转置  
 厄米矩阵： $A^\dagger = A$      $A^\dagger$  的意思是转置共轭

实对称矩阵是所有元素均为实数的对称矩阵。具有以下性质：

- 1、所有特征值均为实数
- 2、所有特征向量均为实向量
- 3、不同特征值对应的特征向量之间是正交的
- 4、具有n个线性无关的特征向量

为什么要加上共轭呢？

转换成实数矩阵后，就很清晰，**没有共轭，矩阵并不对称。**

$A^\dagger = A = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$  **实向量空间**中的矩阵表示：

$$\begin{array}{c} \left[ \begin{array}{cc|cc} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ \hline 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \end{array}$$

$A^T = A = \begin{bmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{bmatrix}$  **实向量空间**中的矩阵表示：

$$\begin{array}{c} \left[ \begin{array}{cc|cc} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \end{array}$$

# 正交矩阵 vs 么正矩阵 — 等价

正交矩阵：  $A^T A = I$ ，即  $A^T = A^{-1}$

性质：正交矩阵的行（列）向量组是欧几里得空间的标准正交向量组。

么正矩阵：  $U U^\dagger = I$ ，即  $U^\dagger = U^{-1}$

性质：么正矩阵的行（列）向量组是酉空间的标准正交向量组。

那么  $Y = \sigma_y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$  实向量空间中的矩阵表示（看做  $2 * 2$  分块矩阵）：

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$A^T A = I$  其中的  $I$  意味着  $A$  行列式的值为 1，也就意味着  $A$  对任何向量变换，只旋转，不缩放。





Thank

You