

量子计算

—基础篇

Quantum Computing

网址: www.qubits.top

Calvin Tang

179209347@qq.com

介绍

教程简介：

- 面向对象：量子计算初学者
- 依赖课程：线性代数，量子力学（非必需）

知乎专栏：

https://www.zhihu.com/column/c_1501138176371011584

Github & Gitee 地址：

<https://github.com/mymagicpower/qubits>

<https://gitee.com/mymagicpower/qubits>

* 版权声明：

- 仅限用于个人学习
- 禁止用于任何商业用途

从线性运算说起

线性运算是**加法**和**数量乘法**，在实数域，像只包含加法和数量乘法二元一次方程就属于线性运算，如：


$$y = ax + b$$

矩阵的线性运算：矩阵的加法和数乘运算

向量的线性运算：向量的加法和数乘运算

对于一个实数轴而言，任意多个实数的线性组合仍然是实数，即其仍在实数轴上，如：

$$y = a_0x_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n$$




$$y = 1 * 2 + 0.5 * 3 + 0.1 * 6 = 2 + 1.5 + 0.6 = 4.1$$

复平面

对于虚数 i ，我们无法在实数轴上线性运算获得，也就是说**与实数线性无关**。而线性无关意味着虚数 i 在与实数轴垂直的一个数轴上：


对于复数 $a + b i$ ，其在复平面里的坐标表示如下：



复数向量表示

如果我们用向量来理解的话，复数 $a + b i$ 可以表示为，单位向量 \vec{j} 和 \vec{i} 的线性组合：

$$a \vec{j} + b \vec{i} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$




\vec{j} 定义为实数轴单位向量，单位长度为 1
 \vec{i} 定义为虚数轴单位向量，单位长度为 i

复数三角函数表示

如右图所示，如果将向量长度定义为 r ，且 $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ ，则根据三角函数有：

- $a = r \cos(\theta)$
- $b = r \sin(\theta)$

那么复数 $c = a + b i$ 可以表示为：
 $r(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$



欧拉公式 (1/2)

泰勒公式：

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

公式1

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

公式2

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

公式3

由公式3，用 ix 代入 x

$$e^{ix} = 1 + \frac{ix}{1!} + \frac{(ix)^2}{2!} + \frac{(ix)^3}{3!} + \cdots + \frac{(ix)^n}{n!}$$

欧拉公式 (2/2)

代入虚数 i : $i^0 = 1, i^1 = i, i^2 = -1, i^3 = -i \dots i^{2n} = (-1)^n, i^{2n+1} = (-1)^n i$

$$\begin{aligned} e^{ix} &= 1 + \frac{ix}{1!} - \frac{x^2}{2!} - \frac{ix^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{ix^5}{5!} - \frac{x^6}{6!} - \frac{ix^7}{7!} + \dots + \frac{i^{2n}x^{2n}}{(2n)!} + \frac{i^{2n+1}x^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + i \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \right) \\ &= \cos(x) + i \sin(x) \end{aligned}$$

由此可得欧拉公式：

$$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$$

θ 取 π 时，可得欧拉恒等式：

$$e^{i\pi} = -1$$

复数加法的几何意义

复数：

$$c_1 = a + b i = a \vec{j} + b \vec{i}$$

$$c_2 = c + d i = c \vec{j} + d \vec{i}$$

令：

$$c_1 = 1 + 3 i = 1 \vec{j} + 3 \vec{i}$$


$$c_2 = 3 + i = 3 \vec{j} + 1 \vec{i}$$

$$\begin{aligned} \text{则 } c_3 &= c_1 + c_2 \\ &= (a+c) \vec{j} + (b+d) \vec{i} \\ &= 4 \vec{j} + 4 \vec{i} \end{aligned}$$

复数加法的几何意义可以概括为：

平行四边形法则

结果为两个复数向量形成的平行四边形的对角线。




复数极坐标表示

根据欧拉公式：

$$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$$

复数 $c = a + bi$ 即 $r(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$ 可以表示为：

$$c = r e^{i\theta}$$



复数乘法的几何意义

复数 $c_1 = a + b i$:

- $c_1 = r_1(\cos(\theta_1) + i \sin(\theta_1))$
- $c_1 = r_1 e^{i\theta_1}$

复数 $c_2 = c + d i$:


- $c_2 = r_2(\cos(\theta_2) + i \sin(\theta_2))$
- $c_2 = r_2 e^{i\theta_2}$

$$\begin{aligned} \text{复数 } c_1 * c_2 &= r_1 e^{i\theta_1} * r_2 e^{i\theta_2} \\ &= r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)} \end{aligned}$$

根据上面的计算过程可知复数乘法几何意义 :

旋转缩放

可以理解为 c_1 作用于 c_2 , 将复数 c_2 向量逆时针旋转 θ_1 角 , 并且长度进行缩放 , 缩放系数为 r_1 。



i 乘以向量 , 几何意义是逆时针旋转90度 !

复数加法与向量加法

结合线性代数的知识，复数的几何性质与二维向量。

$a + bi$ 等价的向量表示：

$$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

于是复数 c_1 ， c_2 的向量形式为：

$$c_1 = a + bi = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \quad c_2 = c + di = \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}$$

复数加法向量形式：

$$c_1 + c_2 = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a + c \\ b + d \end{bmatrix}$$

复数乘法与矩阵乘法

复数的乘法：

$$(a + b i)(c + d i) = ac - bd + (ad + bc) i$$

则有 $ac - bd + (ad + bc) i$ 的向量形式：

$$\begin{bmatrix} ac - bd \\ ad + bc \end{bmatrix}$$

$c + d i$ 的向量表示：

$$\begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}$$

$a + b i$ 作为旋转缩放操作算子时，等价的矩阵为：

$$\begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$$

复数的乘法 $(a + b i)(c + d i)$ 等价于：

$$\begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ac - bd \\ ad + bc \end{bmatrix}$$

复数乘法与矩阵乘法

因为：

$$(a + b i)(c + d i) = ac - bd + (bc + ad) i$$

$ac - bd + (bc + ad) i$ 等价矩阵形式为：

$$\begin{bmatrix} ac - bd & -bc - ad \\ -bc - ad & ac - bd \end{bmatrix}$$

并且：

$a + b i$ 作为算子其等价矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$$

$c + d i$ 作为算子其等价矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} c & -d \\ d & c \end{bmatrix}$$

$$\text{复数的乘法等价于：} \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c & -d \\ d & c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ac - bd & -bc - ad \\ -bc - ad & ac - bd \end{bmatrix}$$

与复数 $ac - bd + (bc + ad) i$ 等价矩阵形式一致。

结论

矩阵表示或者二元组表示，更能体现复数的本质：

虚数不虚，复数是矩阵在2维上的特例！

$a + bi$ 等价的向量表示：

$$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

$a + bi$ 等价的矩阵表示：

$$\begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$$

i 向量表示：

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

i 矩阵表示：

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\frac{\pi}{2}) & -\sin(\frac{\pi}{2}) \\ \sin(\frac{\pi}{2}) & \cos(\frac{\pi}{2}) \end{bmatrix}$$

欧拉公式 – 矩阵证明法 (1/4)

① 泰勒公式： $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$

② i 矩阵表示： $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\frac{\pi}{2}) & -\sin(\frac{\pi}{2}) \\ \sin(\frac{\pi}{2}) & \cos(\frac{\pi}{2}) \end{bmatrix}$

③ 用 $x \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 代入 e^x 中的 x ：

④
$$\begin{aligned} e^x &= 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} \\ &= x^0 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} \\ &= (x \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix})^0 + \frac{1}{1!} (x \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix})^1 + \frac{1}{2!} (x \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix})^2 + \frac{1}{3!} (x \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix})^3 + \dots + \frac{1}{n!} (x \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix})^n \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^0 + \frac{1}{1!} x \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^1 + \frac{x^2}{2!} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^2 + \frac{x^3}{3!} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^3 + \dots + \frac{x^n}{n!} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^n \end{aligned}$$

欧拉公式 – 矩阵证明法 (2/4)

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\frac{\pi}{2}) & -\sin(\frac{\pi}{2}) \\ \sin(\frac{\pi}{2}) & \cos(\frac{\pi}{2}) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^3 = \begin{bmatrix} \cos(\frac{3\pi}{2}) & -\sin(\frac{3\pi}{2}) \\ \sin(\frac{3\pi}{2}) & \cos(\frac{3\pi}{2}) \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

...

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{2n+1} &= \begin{bmatrix} \cos(\frac{(2n+1)\pi}{2}) & -\sin(\frac{(2n+1)\pi}{2}) \\ \sin(\frac{(2n+1)\pi}{2}) & \cos(\frac{(2n+1)\pi}{2}) \end{bmatrix} \\ &= (-1)^n \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^0 = \begin{bmatrix} \cos(\frac{0\pi}{2}) & -\sin(\frac{0\pi}{2}) \\ \sin(\frac{0\pi}{2}) & \cos(\frac{0\pi}{2}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} \cos(\frac{2\pi}{2}) & -\sin(\frac{2\pi}{2}) \\ \sin(\frac{2\pi}{2}) & \cos(\frac{2\pi}{2}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

...

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{2n} &= \begin{bmatrix} \cos(\frac{(2n)\pi}{2}) & -\sin(\frac{(2n)\pi}{2}) \\ \sin(\frac{(2n)\pi}{2}) & \cos(\frac{(2n)\pi}{2}) \end{bmatrix} \\ &= (-1)^n \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

欧拉公式 – 矩阵证明法 (3/4)

$$\begin{aligned}
 e^{x \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}} &= \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^0 + \frac{1}{1!} x \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^1 + \frac{x^2}{2!} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^2 + \frac{x^3}{3!} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^3 + \dots + \frac{x^n}{n!} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^n \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \frac{x^2}{2!} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \frac{x^4}{4!} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \frac{x^6}{6!} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &\quad + x \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - \frac{x^3}{3!} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + \frac{x^5}{5!} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - \frac{x^7}{7!} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} & 0 \\ 0 & 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} \end{bmatrix} \\
 &\quad + \begin{bmatrix} 0 & -(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}) \\ x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} & 0 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

泰勒公式：

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

欧拉公式 – 矩阵证明法 (4/4)

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

$$e^{i\pi} = -1$$

欧拉公式：

$$e^{x \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} \cos x & 0 \\ 0 & \cos x \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\sin x \\ \sin x & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos x & -\sin x \\ \sin x & \cos x \end{bmatrix}$$

欧拉恒等式：

$$e^{\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \pi} = \begin{bmatrix} \cos \pi & -\sin \pi \\ \sin \pi & \cos \pi \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Thank

You