

Comenzado el	sábado, 2 de mayo de 2026, 21:47
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 2 de mayo de 2026, 21:58
Tiempo empleado	10 minutos 25 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Softmax es ampliamente usado en:

- ☐ a. Cálculo de determinantes
- ☐ b. Segmentación de intervalos numéricos
- ☒ c. Redes neuronales como capa de salida ✓ Correcta

La respuesta correcta es: Redes neuronales como capa de salida

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la regresión logística, los coeficientes w se interpretan como:

- ☐ a. Desviaciones estándar
- ☒ b. Contribuciones en términos de log-odds ✓ Correcta
- ☐ c. Promedios muestrales

La respuesta correcta es: Contribuciones en términos de log-odds

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La función de pérdida usada en regresión logística es:

- ☐ a. Error cuadrático medio
- ☐ b. Logaritmo natural de los predictores
- ☒ c. Entropía cruzada ✓ Correcta

La respuesta correcta es: Entropía cruzada

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el propósito principal de la regresión lineal?

- ☐ a. Clasificar variables en categorías
- ☒ b. Estimar una variable de salida en función de predictores ✓ Correcta
- ☐ c. Calcular probabilidades acumuladas

La respuesta correcta es: Estimar una variable de salida en función de predictores

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La regresión polinómica permite:

- ☐ a. Eliminar multicolinealidad automáticamente
- ☒ b. Capturar relaciones curvas y complejas ✓ Correcta
- ☐ c. Reducir el número de variables

La respuesta correcta es: Capturar relaciones curvas y complejas

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un modelo de regresión lineal, ¿qué significa el término constante o intercepto?

- ☐ a. El error cuadrático medio del ajuste.
- ☒ b. El valor estimado de la variable de salida cuando todos los predictores valen cero. ✓ Correcta
- ☐ c. La pendiente de la variable independiente.

La respuesta correcta es: El valor estimado de la variable de salida cuando todos los predictores valen cero.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué función se utiliza en la regresión logística binaria?

- ☐ a. Función identidad
- ☒ b. Sigmoide (logística) ✓ Correcta
- ☐ c. Tangente hiperbólica

La respuesta correcta es: Sigmoide (logística)

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El problema del sobreajuste en polinomios se controla mejor con:

- ☐ a. Aumentando siempre el grado
- ☐ b. Reduciendo el tamaño de los datos
- ☒ c. Regularización y validación cruzada ✓ Correcta

La respuesta correcta es: Regularización y validación cruzada

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué papel cumple el parámetro b en la regresión logística?

- ☐ a. El grado polinómico
- ☐ b. La tasa de aprendizaje
- ☒ c. El sesgo (bias o intercepto) ✓ Correcta

La respuesta correcta es: El sesgo (bias o intercepto)

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En resumen, ¿qué equilibrio buscan los modelos de regresión?

- ☒ a. Balancear complejidad e interpretabilidad ✓ Correcta
- ☐ b. Minimizar la dimensionalidad
- ☐ c. Garantizar normalidad absoluta

La respuesta correcta es: Balancear complejidad e interpretabilidad

Ir a...

< [Actividad anterior](#)

[Actividad siguiente](#) >