


健康体检报告

MEDICAL EXAMINATION REPORT



周富豪(男)

项目号 T012470037

单位 中信百信银行股份有限公司

联系电话 199****2030

项目简称 百信银行入职

员工号

类别 入职

卡号 0010900225777200

部门

递送地址

递送方式 电子报告

体检号 8520250701513



北京爱康国宾亚运门诊部 (爱康国宾北京亚运村慧忠北里分院)

检查日期 2025.07.01

23/4269

爱康国宾®

3 6 0 * 健 康 全 管 理

爱康集团是中国中高端连锁体检与健康管理集团,通过旗下多个品牌,为团体客户和家庭、个人提供高品质的健康体检、疾病检测、齿科服务、私人医生、职场医疗、疫苗接种、抗衰老、康复医疗等健康管理及医疗服务。截至2025年3月,爱康集团已在54大城市设有170家体检、齿科与医疗中心。同时,爱康集团与全国200多个城市超过800家医疗机构建立合作网络。

爱康国宾健康体检管理集团有限公司 版权所有



下载爱康APP

www.ikang.com

尊敬的周富豪先生，您好！

北京爱康国宾亚运门诊部（爱康国宾北京亚运村慧忠北里分院）感谢您的光临和对我们的信任和支持。现将您2025年07月01日的体检报告呈上。

报告阅读说明书

- 1.您本次体检报告由健康信息、本次体检主要阳性结果和异常情况、专家指导建议及本次体检结果等部分组成。
- 2.健康体检数据只是针对本次体检覆盖的相关器官的相关项目或指标的检查结果，并非能覆盖人体全部器官及全部指标。
- 3.您的体检报告结论是基于您提供的健康信息及本次临床检查结果，隐瞒和错误的信息都可能会误导医生作出错误的判断。如果您提供的健康信息不完整，可能会导致相关检查结论有偏差。
- 4.因为检查方法的不同，针对同一器官或者系统的检查结果可能会有所差异。
- 5.由于体检选项、检查方法及医学本身的局限性，本次体检未见异常并不代表没有疾病，如您有不适症状，请及时到医院就诊。

阳性结果和异常情况

【1】丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶增高

【2】血小板压积降低

【3】副脾可能

【4】慢性咽炎

【5】视力减退原因待查

【6】外痔

专家建议与指导

01 丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶增高

- 1、引发因素较多，如酒后、发热、剧烈运动；还可见于急慢性肝炎、药物性肝损伤、脂肪肝、肝硬化、心肌梗死、胆道疾病等。
- 2、建议注意劳逸结合，饮食多样化，常吃富含蛋白质、维生素食物及新鲜蔬菜水果。
- 3、建议复查，必要时请去医院专科诊治。

02 血小板压积降低

建议动态观察，如有症状专科就诊。

03 副脾可能

- 1、概述：副脾是指除正常位置的脾脏外，还有一个或多个与脾脏结构相似，功能相同的内皮组织存在。副脾主要是先天发育的原因导致。副脾一般没有特殊临床症状。副脾在少数情况下会自发性破裂，出现栓塞、蒂扭转等情况，需及时到医院就医。副脾对某些特定的患者有着重要的临床意义。
- 2、副脾容易同肿大淋巴结和胰腺、肾上腺、肾等器官的肿瘤混淆，应结合临床鉴别诊断。
- 3、建议定期复查，必要时请到医院进一步诊治。

04 慢性咽炎

- 1、慢性咽炎主要发生于上呼吸道感染治疗不彻底或长时间受刺激性食物或气体刺激的结果，常见咽部异物感，干痒、作呕等症状。
- 2、避免长时间食用刺激性食物及烟、酒等。常用淡盐水漱口，可饮用保健茶，多饮水，保持排便通畅。
- 3、在有烟尘或刺激性气体环境中工作应戴口罩。
- 4、症状严重、反复发作时，应去医院耳鼻咽喉科治疗。

05 视力减退原因待查

您目前的视力低于正常标准，引起视力减低的原因较多，常见于屈光不正、也可见于斜视、弱视、角膜病变、白内障、眼底病变等。建议您到医院眼科进一步检诊。

06 外痔

- 1、痔疮包括内痔、外痔、混合痔，是肛门直肠底部及肛门粘膜的静脉丛发生曲张而形成的一个或多个柔软的静脉团。肛管与直肠粘膜相结合处，有一条锯齿状的线叫齿线或梳状线。齿状线以上为内痔，齿状线以下为外痔；混合痔是指在肛门同一方向同时存在内痔和外痔，当痔核越过齿状线，同时患有相互连续或融合的内痔和外痔，称之为混合痔。
- 2、由于肛管或直肠下端的静脉丛充血或瘀血并肿大，易出现排便时出血、疼痛、肛门瘙痒、痔赘脱垂等症状。除了痔疮，肛裂、孤立性直肠溃疡综合征、直肠息肉、直肠脱垂、直肠炎、结肠癌、直肠癌和肛门癌等疾病也会引起相关症状，需要内镜检查和/或病理学检查才能进一步确诊。痔疮与直肠癌最突出的相似症状就是血便，一经发现应及时就医以便获得专业的评估和治疗。
- 3、需要注意的是，肛门视诊、肛门指检只能作为初步的诊断手段，对于疾病的确诊还需要依靠其他更为精确的检查方法，如肛肠镜检查、病理检查等。如果在肛门视诊、肛门指检中发现异常，应尽快就医，以便进行进一步的检查和治疗。因痔疮引起的出血在极少数情况下，会掩盖肛门直肠肿瘤引起的出



下载爱康APP
查看彩色报告

血症状，导致肿瘤无法被发现，肛门指诊局限在一定的深度，此时需要肛门镜或结肠镜等相关检查才能进行鉴别，故请到医院普外科肛肠门诊诊治。

健康体检结果

一般检查室

检查者：王印娥

检查项目	测量结果	单位	异常描述	参考区间
身高	183.1	cm		
体重	78.1	Kg		
体重指数	23.3			18.5—23.99
收缩压	120	mmHg		90.0—139.0
舒张压	66	mmHg		60.0—89.0
初步意见	未见明显异常			

内科

检查者：毕保华

检查项目	检查所见	单位
病史	无	
家族史	无特殊	
心率	68	次/分
心律	齐	
心音	正常	
肺部听诊	双侧呼吸音未闻及异常	
肝脏触诊	肝脏肋下未触及	
脾脏触诊	脾脏肋下未触及	
肾脏叩诊	双肾区无叩痛	
内科其它	无	
初步意见	未见明显异常	

外科

检查者：滕学农

检查项目	检查所见	单位
------	------	----



皮肤	未见明显异常	
浅表淋巴结	颈部、锁骨上、腋窝及腹股沟未见明显异常	
甲状腺(外科)	未见明显异常	
乳房	未见明显异常	
脊柱	未见明显异常	
四肢关节	未见明显异常	
外生殖器	未见明显异常	
肛门、直肠指诊	肛内齿状线以下扪及曲张静脉团块	
前列腺(外科)	未见明显异常	
外科其它	无	

初步意见

外痔

眼科

检查者：王颖

检查项目	检查所见	单位
裸视力(右)	1.0	
裸视力(左)	0.8	
矫正视力(右)		
矫正视力(左)		
色觉	正常	

初步意见

视力减退原因待查

耳鼻咽喉科

检查者：宿乐朋

检查项目	检查所见	单位
既往史	无特殊	
外耳	未见明显异常	
外耳道	未见明显异常	
鼓膜	未见明显异常	

鼻腔	未见明显异常	
鼻中隔	未见明显异常	
咽	咽腔慢性充血，咽后壁淋巴滤泡增生	
扁桃体	未见明显异常	
耳鼻咽喉科其它	无	

初步意见

慢性咽炎

血常规

操作者：孟雅 审核者：何培英

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
白细胞计数	WBC	4.9		3.5—9.5	10 ⁹ /L
红细胞计数	RBC	4.96		4.3—5.8	10 ¹² /L
血红蛋白	Hb	160.0		130—175	g/L
红细胞比容	HCT	0.470		0.400—0.500	L/L
平均红细胞体积	MCV	94.0		82—100	fL
平均红细胞血红蛋白含量	MCH	32.3		27—34	pg
平均红细胞血红蛋白浓度	MCHC	344.0		316—354	g/L
红细胞分布宽度-变异系数	RDW-CV	12.4		11—16	%
血小板计数	PLT	190.0		125—350	10 ⁹ /L
平均血小板体积	MPV	7.4		6.0—11.0	fL
血小板分布宽度	PDW	11.5		11—18	%
淋巴细胞百分比	LYMPH%	46.6		20—50	%
中性粒细胞百分比	NEUT%	40.5		40.0—75.0	%
淋巴细胞绝对值	LYMPH	2.3		1.1—3.2	10 ⁹ /L
中性粒细胞绝对值	NEUT	2.0		1.8—6.3	10 ⁹ /L
红细胞分布宽度-标准差	RDW-SD	42.0		39—52.0	fL
血小板压积	PCT	0.140	↓	0.15—0.50	%
单核细胞百分比	MONO%	9		3—10	%

单核细胞绝对值	MONO	0.4		0.1—0.6	10 ⁹ /L
嗜酸性细胞百分比	EOS%	4.3		0.4—8.0	%
嗜酸性细胞绝对值	EOS	0.21		0.02—0.52	10 ⁹ /L
嗜碱性细胞百分比	BASO%	0.10		0.00—1.00	%
嗜碱性细胞绝对值	BASO	0.00		0.00—0.06	10 ⁹ /L

小结

血小板压积降低

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

实验室检查

操作者：刘迪 审核者：薛亚琴

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
丙氨酸氨基转移酶	ALT	78	↑	0—50	U/L
天门冬氨酸氨基转移酶	AST	56	↑	0—40	U/L
γ-谷氨酰转移酶	GGT	17		10—60	U/L
空腹血糖	FBG	4.57		3.9—6.1	mmol/L
总胆固醇	TC	4.52		<5.2	mmol/L
甘油三酯	TG	0.77		0.45—1.70	mmol/L
高密度脂蛋白胆固醇	HDL-C	1.30		0.8—1.8	mmol/L
低密度脂蛋白胆固醇	LDL-C	2.66		0—3.37	mmol/L

小结

1.天门冬氨酸氨基转移酶增高
2.丙氨酸氨基转移酶增高

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

心电图室

检查者：高松梅

检查项目	检查所见	单位
心电图	窦性心律，心率、P波、P-R间期、QRS波群、ST段、T波、电轴、电压等系列指标参数，均在大致正常范畴内。	

初步意见

未见明显异常

腹部彩超

检查者：白静

检查项目	检查所见	单位
肝	未见明显异常	
胆	未见明显异常	
胰	未见明显异常	
脾	脾脏形态大小正常，包膜完整光滑，内部回声分布均匀，脾门血管正常，脾门处见边界清晰的低回声区，大小约8×8mm	
双肾	未见明显异常	

初步意见 副脾可能

放射科

检查者：计旭 审核者：陈军

检查项目	检查所见	单位
胸部	双肺纹理较清晰，肺野未见明显实变影。双肺门结构尚清晰。心影大小尚属正常范围之内。双侧膈面光整，肋膈角锐利。	

初步意见 未见明显异常

主检医师：郭友全

iKang爱康



下载爱康APP

想随时随地看报告？
想对比您的历史体检报告？
爱康APP，检前检后全管理

约体检 查报告 历史数据对比 专家解读 三甲医院挂号

iKangCare+ 有人管的体检

医学名词科普知识

医学名词科普知识内容，仅是帮助您解读理解体检报告使用，所有名词的解释内容，均出自国家权威性专业典籍，部分内容略有增减，仅供您阅读参考。

什么是慢性咽炎？



慢性咽炎是咽部粘膜、粘膜下及淋巴组织的慢性炎症疾病，其病因包括急性咽炎反复发作、上呼吸道慢性炎症刺激、烟酒过度、粉尘刺激、内分泌失调、贫血、慢性支气管炎、过敏因素等多种原因。慢性咽炎发病率高，病程长，症状顽固，不易治愈，全身症状不明显，部分患者无任何自觉症状，局部症状具体表现为咽部不适感、异物感、干燥感、痒感、灼热感、刺激感、微痛等。若无明显临床症状，无需特殊治疗，但避免过于劳累、紧张，适当增加体育锻炼，避免吃过热、过冷或辛辣刺激食物，多吃含维生素C的水果、蔬菜，以及富含胶原蛋白的食物。若局部症状显著，及时到耳鼻喉科进一步诊治。

什么是外痔？



痔疮分为内痔和外痔。外痔指的是血管性外痔，即肛周皮下血管丛扩张，表现为隆起的软团块。外痔的发生与习惯性便秘、腹内压力增高、直肠下端、肛管慢性感染、长期饮酒、喜食辛辣食物等因素有关。外痔临床症状有肛门不适、潮湿不洁或瘙痒，如发生血栓形成及皮下血肿时则有剧痛。外痔可发生炎症或发展成血块等并发症，没有症状的外痔无需治疗；如果痔疮出现血凝块而引起疼痛时，及时到肛肠外科就诊。平时防止便秘，保持大便通畅；避免久坐、久站；每日早晚作两次提肛运动；及时治疗肠道炎症和肛门周围炎症等措施能够有效的预防痔疮的发生。

什么是天门冬氨酸氨基转移酶？



天门冬氨酸氨基转移酶（AST）旧称谷草转氨酶（GOT）。天门冬氨酸氨基转移酶主要存在于心肌、肝脏、骨骼肌、肾脏、胰腺、脾、肺、红细胞等组织细胞中，也存在于体液如血浆（清）、脑脊液、唾液及胆汁中。测定该酶对心肌梗死、肝病及肌营养不良有很大的临床价值。

什么是丙氨酸氨基转移酶增高？



丙氨酸氨基转移酶主要存在于肝细胞的胞质中，体内其他脏器组织，如心肌、骨骼肌、肾、脑等也有此酶，当这些组织损伤或坏死时，该转移酶从细胞中释放入血液，导致丙氨酸氨基转移酶活力增高。丙氨酸氨基转移酶是肝胆疾病的酶学重要诊断指标，当肝脏发生炎症、坏死、中毒等损害，可引起不同程度的丙氨酸氨基转移酶增高。丙氨酸氨基转移酶增高还见于胆管炎、胆囊炎、心肌梗死、内分泌疾病、胰腺疾病、糖尿病、甲状腺功能亢进、严重烧伤、休克、药物中毒等。因此可知，丙氨酸氨基转移酶可以作为反映肝功能的一项重要指标，但是不能只凭丙氨酸氨基转移酶增高作出病因诊断，应结合病史、B超及有关化验，结合各种肝炎病毒标志物的检测结果进行综合分析。当丙氨酸氨基转移酶轻度增高时，如无任何基础疾病，建议排除生理性增高的原因后再复查一次；如果肝脏酶学普遍增高，建议及时到消化内科或者传染科就诊。




下载爱康APP
查看彩色报告

体检号:8520250701513

客户信息:周富豪/男/23

HR:67bpm PR:0.157s QTc:425 RV5/SV1:1.28mV/0.41mV
RR:0.884s QT:0.4s R+S:1.69 P/QRS/T轴:0° /46° /74°



检查者

高松梅