

Numerische Mathematik für Ingenieure (SS 14) - Übung 4

Merikan Koyun & Julian Andrej

May 26, 2014

T6. Householdermatrizen

a) Für $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ ist $H \in \mathbb{R}^{n \times n}$ definiert:

$$H = I - \frac{2}{v^*v}vv^* \quad (1)$$

Bei Orthogonalität gilt $HH^* = I$:

$$HH^* = \left(I - \frac{2}{v^*v}vv^*\right) \left(I - \frac{2}{v^*v}vv^*\right) \quad (2)$$

$$= I - \frac{4}{v^*v}vv^* + \frac{4}{(v^*v)^2}vv^*vv^* \quad (3)$$

$$= I - \frac{4}{v^*v}vv^* + \frac{4}{v^*v}vv^* = I \quad (4)$$

b) Nach Anwendung der Vorgaben aus b) gilt:

$$H = I - 2vv^* \quad (5)$$

$$Hx = x - 2v\langle v, x \rangle \quad (6)$$

$$= x - 2(x - ke_1) \frac{\|x\|^2 - k\langle e_1, x \rangle}{\|x\|^2 - 2k\langle x, e_1 \rangle + k^2\|e_1\|^2} \quad (7)$$

$$= x - 2(x - ke_1) \frac{k^2 - k\langle e_1, x \rangle}{2(k^2 - k\langle x, e_1 \rangle)} \quad (8)$$

$$= ke_1 \quad (9)$$

c) Die Householder Matrix H ist, wie oben bewiesen, orthogonal. Dadurch erfüllt sie eine der Bedingungen für eine QR Zerlegung, da zur Anwendung eben dieser, orthogonale Matrizen benötigt werden.

Die Anwendung der Householdermatrix auf eine Matrix A führt eine Spiegelung der Einträge a_{ij} an einer Hyperebene, beschrieben durch v , durch. Die sukzessive Anwendung der Householdermatrix auf A kann zur Bildung einer oberen-rechten Dreiecksmatrix R verwendet werden, ähnlich, wie bei der QR-Zerlegung mittels Givens-Rotationen.

Der elementare Unterschied zur QR-Zerlegung mit Givens-Rotation, besteht darin, dass die Householder Transformation pro Anwendung auf A eine gesamte (Unter-)Spalte eliminiert; im Gegensatz zu einzelnen Einträgen.

T7. Lineares Ausgleichsproblem

a) Das lineare Ausgleichsproblem lautet

$$\min = \left\| \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & x_1^2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \right\|. \quad (10)$$

Daraus folgt die Normalengleichung:

$$\begin{bmatrix} n & x_1^2 + \dots + x_n^2 \\ x_1^2 + \dots + x_n^2 & x_1^4 + \dots + x_n^4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \dots & 1 \\ x_1^2 & \dots & x_n^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}. \quad (11)$$

b) Aus dem Zahlenbeispiel ergibt sich fuer die Normalengleichung:

$$\begin{bmatrix} 30b + 4a \\ 354b + 30a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 31 \\ 375 \end{bmatrix} \quad (12)$$

die Loesung dieses Systems beschreibt die Werte a und b .

$$a = -\frac{23}{43} \approx -0.5348837 \quad (13)$$

$$b = \frac{95}{96} \approx 1.1046511 \quad (14)$$