

Практическое занятие №5**§3. Интеграл от функции комплексного переменного и его свойства**

Пусть $z = x + iy$, $f(z) = u + iv$, где $u(x, y)$, $v(x, y)$ – действительные функции переменных x и y . Тогда можно показать, что интеграл от функции $f(z)$ равен сумме двух криволинейных интегралов, а именно

$$\int_L f(z) dz = \int_L u(x, y) dx - v(x, y) dy + \\ + i \int_L u(x, y) dy + v(x, y) dx.$$

Интеграл от функции комплексного переменного обладает следующими свойствами.

1. Свойство линейности.

$$\int_L [c_1 f_1(z) \pm c_2 f_2(z)] dz = c_1 \int_L f_1(z) dz \pm c_2 \int_L f_2(z) dz,$$

где c_1, c_2 – произвольные постоянные.

2. Свойство аддитивности.

$$\int_{L_1 \cup L_2} f(z) dz = \int_{L_1} f(z) dz + \int_{L_2} f(z) dz,$$

где $L_1 \cup L_2$ – кривая, составленная из кривых L_1 и L_2 .

$$3. \quad \int_L f(z) dz = - \int_{L^-} f(z) dz,$$

где L^- – кривая, совпадающая с L , но проходимая в противоположном направлении.

4. Если функция $f(z)$ аналитическая в односвязной области D , содержащей точки z_0 и z_1 , то имеет место формула Ньютона-Лейбница

$$\int_{z_0}^{z_1} f(z) dz = \Phi(z_1) - \Phi(z_0) = \Phi(z) \Big|_{z_0}^{z_1},$$

где $\Phi(z)$ – какая-либо первообразная для функции $f(z)$, т.е. $\Phi'(z) = f(z)$ в области D .

5. Если кривая L задана параметрическими уравнениями

$$x = x(t), y = y(t)$$

начальная и конечная точки дуги L соответствуют значениям параметра $t = t_0, t = t_1$, то

$$\int_L f(z) dz = \int_{t_0}^{t_1} f[z(t)] z'(t) dt,$$

где $z(t) = x(t) + iy(t)$.

Пример. Вычислить интеграл $\int_L (2\bar{z} - 5i) dz$ по параболе $y = x^2$, соединяющей точки $z_1 = 0, z_2 = 1 + i$.

Решение. Перепишем подынтегральную функцию

$$\text{в виде } 2\bar{z} - 5i = 2x - 2yi - 5i = 2x - i(2y + 5),$$

$$\text{т.е. } u(x, y) = 2x, \quad v(x, y) = -(5 + 2y).$$

Используем для вычисления интеграла

$$\text{формулу } \int_L (2\bar{z} - 5i) dz = \int_L 2x dx + (5 + 2y) dy + i \int_L 2x dy - (5 + 2y) dx.$$

Для параболы $y = x^2$ имеем $dy = 2x dx$ ($0 \leq x \leq 1$). Тогда

$$\begin{aligned} \int_L (2\bar{z} - 5i) dz &= \int_0^1 [2x + (5 + 2x^2)2x] dx + \\ &+ i \int_0^1 [2x \cdot 2x - (5 + 2x^2)] dx = 7 + i \frac{17}{3} \end{aligned}$$

Пример. Вычислить интеграл $\int_i^{2i} (3z^2 + z + 5) dz$.

Решение. Подынтегральная функция аналитическая всюду (достаточно проверить все условия теоремы 2.2), можно применить формулу Ньютона-Лейбница

$$\begin{aligned} \int_i^{2i} (3z^2 + z + 5) dz &= \left(z^3 + \frac{z^2}{2} + 5z \right) \Big|_i^{2i} = (2i)^3 + \frac{(2i)^2}{2} + 10i - i^3 - \frac{i^2}{2} - 5i \\ &= -2i - 1,5 \end{aligned}$$

Теорема 3.1. *(теорема Коши для односвязной области).*

Если $f(z)$ – аналитическая функция в односвязной области D , а контур C – замкнутый контур, принадлежащий области D , то интеграл

$$\oint_C f(z) dz = 0.$$

Отметим, что линия называется связной, если из любой ее точки можно пройти по этой линии в любую другую ее точку.

Порядком связности ограниченной области D называется число n связных частей, на которое разбивается ее граница.

Напомним, что область называется односвязной, если любую замкнутую кривую, лежащую в этой области, можно стянуть в точку, не выходя за пределы этой области.

Например, круг $|z| \leq 3$ – односвязная область. Встречаются n -связные (многосвязные, $n > 1$) области, например, кольцо $1 \leq |z| \leq 3$ – двусвязная область ($n=2$).

Пример. Вычислить интеграл $\int_{|z|=0,5} \frac{dz}{(z+3)^2(z^2+9)}$.

Решение. Подынтегральная функция $\frac{1}{(z+3)^2(z^2+9)}$ является аналитической внутри области D , ограниченной контуром C : $|z| = 0,5$. Область D – односвязная, контур C – замкнутый контур, принадлежащий области D .

По теореме 3.1 получаем

$$\int_{|z|=0,5} \frac{dz}{(z+3)^2(z^2+9)} = 0.$$

Отметим, что точки, в которых функция под знаком интеграла не является аналитической – это точки $z_1 = -3$, $z_2 = -3i$, $z_3 = 3i$.

Все эти точки не лежат внутри области D ,

ограниченной контуром $C: |z| = 0,5$.


Теорема 3.2. (*теорема Коши для многосвязной области*).

Пусть D - n -связная область ($n > 1$) и ее граница состоит из n замкнутых кусочно-гладких линий L_0, L_1, \dots, L_n , причем контур L_0 охватывает L_1, \dots, L_n , а каждый из L_1, \dots, L_n расположен вне остальных. Пусть $f(z)$ – аналитическая функция в области D и непрерывна в замкнутой области \bar{D} . Тогда интеграл от $f(z)$ по внешнему контуру L_0 равен сумме интегралов по внутренним контурам при условии, что обход всех контуров совершается в одном направлении

$$\int_{L_0} f(z) dz = \int_{L_1} f(z) dz + \dots + \int_{L_n} f(z) dz. \quad (3.5)$$

Пример. Вычислить интеграл $\int_{|z+2|=1} \frac{dz}{(z+2)^2(z^2+1)}$.

Решение. Подынтегральная функция $\frac{1}{(z+2)^2(z^2+1)}$ является аналитической за исключением точек $z_1 = -2$ и $z_{2,3} = \pm i$. Внутри области D , ограниченной контуром $C: |z+2| = 1$, находится точка $z_1 = -2$.



В этом случае нужно применять теорему 3.2. В последующих лекциях будет построена теория для вычисления таких интегралов: теория вычетов.

Теория вычетов предполагает изучение рядов с комплексными членами, рядов Тейлора и Лорана, изучение классификации изолированных особых точек аналитической функции.

§ 4. Ряды с комплексными членами

Степенные ряды с комплексными членами

Пусть дана последовательность функций комплексной переменной

$$u_1(z), u_2(z), \dots, u_n(z), \dots,$$

определенных на некотором множестве D комплексной плоскости: $D \subset \mathbb{C}$.

Выражение вида

$$u_1(z) + u_2(z) + \dots + u_n(z) + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(z)$$

называется *функциональным* рядом с комплексными членами.

Определение. Множество значений переменной z , при которых функциональный ряд сходится, называется областью сходимости функционального ряда.

Определение. *Степенным рядом с комплексными членами называется функциональный ряд вида*

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n = c_0 + c_1 (z - z_0) + c_2 (z - z_0)^2 + \dots$$

Здесь z - комплексная переменная, c_n и z_0 - комплексные числа. При $z_0 = 0$ степенной ряд имеет вид

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n = c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + \dots$$

Теорема (теорема Абеля). Пусть степенной ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n = c_0 + c_1 (z - z_0) + c_2 (z - z_0)^2 + \dots$$

сходится в некоторой точке $z_1 \neq z_0$. Тогда этот ряд абсолютно сходится в круге $|z - z_0| < |z_1 - z_0| = R$.

Следствие. Если степенной ряд $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$ расходится в некоторой точке $z_1 \neq z_0$, то этот ряд расходится в области $|z - z_0| > |z_1 - z_0| = R$, т.е. вне круга $|z - z_0| \leq |z_1 - z_0| = R$.

Следствие. Для степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ существует число R , $0 \leq R \leq \infty$, называемое *радиусом сходимости* степенного ряда, такое, что внутри круга $|z - z_0| < R$ ряд сходится, а вне этого круга, т.е. в области $|z - z_0| > R$, ряд расходится.

Если R - радиус сходимости, то область $|z - z_0| < R$ называется *кругом сходимости* степенного ряда. В точках границы $|z - z_0| = R$ ряд может как

сходиться, так и расходиться. В этом случае требуется дополнительное исследование.

Отметим, что прослеживается аналогия с рядами с действительными членами (3 семестр).

Домашнее задание.

Учебно-методическое пособие «Теория функций комплексного переменного», часть 1. Задачи №№ 1.12.

Пособие размещено на сайте кафедры ВМ-2

<http://vm-2.mozello.ru>

раздел «Математический анализ. 4 семестр».