

Практическое занятие №8

Классификация изолированных особых точек на основе вычисления предела функции

Нули аналитической функции

Определение. Точка z_0 называется нулем n -го порядка аналитической в окрестности z_0 функции $f(z)$, если

$$f(z_0) = 0, f'(z_0) = 0, \dots, f^{(n-1)}(z_0) = 0, \\ f^{(n)}(z_0) \neq 0.$$

Если $n = 1$, то точка z_0 называется простым нулем.

Теорема. Точка z_0 является нулем n -го порядка функции $f(z)$, аналитической в точке z_0 , тогда и только тогда, когда имеет место равенство

$$f(z) = (z - z_0)^n \varphi(z)$$

где $\varphi(z)$ аналитическая в точке z_0 и $\varphi(z_0) \neq 0$.

Пример. Найти нули функции $f(z) = \cos z - 1$, определить порядок нуля.

Решение. Приравняем $f(z)$ нулю, получим $\cos z = 1$, откуда

$z_n = 2\pi n$ ($n = 0, \pm 1, \dots$) – нули данной функции.

Найдем

$$f'(z) \big|_{z=z_n} = -\sin z \big|_{z=2\pi n} = 0, \\ f''(z) \big|_{z=z_n} = -\cos z \big|_{z=2\pi n} = -1 \neq 0.$$

Согласно определению (5.1), $z_n = 2\pi n$ являются нулями второго порядка.

Пример. Найти нули функции $f(z) = z^8 - 9z^7$,
определить порядок нуля.

Решение. Приравняем $f(z)$ нулю, получим $z^7(z - 9) = 0$, $z_1 = 0$, $z_2 = 9$.
Можно воспользоваться определением (5.1), однако проще использовать теорему 5.1. Функция $f(z)$ представима в виде

$f(z) = z^7(z - 9)$, но тогда $z = 0$ является нулем порядка 7, функцией $\varphi(z)$ является сомножитель $\varphi(z) = z - 9$, $\varphi(0) = -9 \neq 0$; $z = 9$, является нулем порядка 1, функцией $\varphi(z)$ в данном случае является $\varphi(z) = z^7$,
 $\varphi(9) = 9^7 \neq 0$.

Изолированные особые точки, их классификация

Определение. Точка z_0 называется изолированной особой точкой функции $f(z)$, если $f(z)$ аналитическая в некоторой окрестности этой точки, за исключением самой точки z_0 , а в точке z_0 функция не определена или не дифференцируема.

Определение 1. Точка z_0 называется устранимой особой точкой функции $f(z)$, если существует конечный предел функции $f(z)$ в точке z_0

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = C.$$

Пример. Найти особые точки функции $f(z) = \frac{1 - e^{3z}}{2z}$ и установить их тип.

Решение. Особая точка функции $f(z)$ - это $z_0 = 0$. Вычислим

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{1 - e^{3z}}{2z} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{-3z}{2z} = -\frac{3}{2}.$$

т.е. $z_0 = 0$ – устранимая особая точка (определение 1).

Определение 2. Точка z_0 называется полюсом функции $f(z)$, если

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty.$$

Теорема. Для того, чтобы точка z_0 была полюсом функции $f(z)$ необходимо и достаточно, чтобы эта точка была нулем для функции $\varphi(z) = \frac{1}{f(z)}$.

Теорема. Пусть $f(z)$ является аналитической в окрестности точки z_0 . Если точка z_0 – нуль порядка n для $f(z)$, то точка z_0 – полюс порядка n для функции $\varphi(z) = \frac{1}{f(z)}$.

Замечание. Если точка z_0 – полюс порядка n для $f(z)$, то точка z_0 – нуль порядка n для функции $\varphi(z) = \frac{1}{f(z)}$ при условии $\frac{1}{f(z_0)} = 0$.

Отметим, что без последнего условия $\frac{1}{f(z_0)} = 0$ утверждение становится неверным. В самом деле, если $f(z) = \frac{\sin z}{z^2}$, то $z=0$ – полюс первого порядка.

Однако функция $\varphi(z) = \frac{1}{f(z)} = \frac{z^2}{\sin z}$ не определена при $z=0$.

Теорема. Если функцию $f(z)$ можно представить в виде $f(z) = \frac{\varphi(z)}{(z-z_0)^n}$, где $\varphi(z)$ аналитическая функция в точке z_0 и

$\varphi(z_0) \neq 0$, то точка z_0 является полюсом порядка n функции $f(z)$.

Замечание. Теорема остается справедливой, если z_0 – устранимая особая точка функции $\varphi(z)$ и существует $\lim_{z \rightarrow z_0} \varphi(z) \neq 0$.

Например, если $\varphi(z) = \frac{\sin z}{z}$, а $f(z) = \frac{\varphi(z)}{z}$, то $z_0=0$ – полюс первого порядка функции $f(z)$.

Пример. Найти особые точки функции $f(z) = \frac{2z+1}{z^4-2z^3}$

и установить их тип.

Решение. Найдем нули функции $\frac{1}{f(z)} = \frac{z^4-2z^3}{2z+1}$. Поскольку

$z^4 - 2z^3 = z^3(z - 2)$, то для функции $\frac{1}{f(z)}$ точка $z = 0$ – это нуль третьего порядка согласно теореме 5.1, а $z = 2$ – нуль первого порядка. Пользуясь теоремой 5.2, имеем: $z = 0$ – это полюс третьего порядка функции $f(z)$, а $z = 2$ – полюс первого порядка.

Определение 3. Точка z_0 называется существенно особой точкой, если в этой точке не существует ни конечного, ни бесконечного предела функции $f(z)$ при $z \rightarrow z_0$.

Пример. Найти особые точки функции $f(z) = \frac{e^z - 1}{(z^2 + 9)z^3}$

и установить их тип.

Решение: Изолированные особые точки функции $z_1 = 3i$, $z_2 = -3i$ и $z_3 = 0$.

Для нахождения типа каждой особой точки нужно вычислить предел функции в каждой особой точке. При этом используем определения, приведенные в данной лекции, и теорему 5.5.

$$\lim_{z \rightarrow 3i} \frac{e^z - 1}{(z^2 + 9)z^3} = \lim_{z \rightarrow 3i} \frac{e^z - 1}{(z - 3i)(z + 3i)z^3} = \infty, \text{ следовательно}$$

получаем $z_1 = 3i$ полюс первого порядка.

Рассмотрим следующую иот. $z_2 = -3i$.

$$\lim_{z \rightarrow -3i} \frac{e^z - 1}{(z^2 + 9)z^3} = \lim_{z \rightarrow -3i} \frac{e^z - 1}{(z - 3i)(z + 3i)z^3} = \infty, \text{ следовательно}$$

$z_2 = -3i$ полюс первого порядка.

Рассмотрим следующую иот. $z_3 = 0$.

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z - 1}{(z^2 + 9)z^3} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z}{(z^2 + 9)z^3} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{(z^2 + 9)z^2} = \infty$$

Отметим, что при вычислении предела использовались эквивалентности.

Получаем, что

$z_3 = 0$ полюс второго порядка.

Ответ. Заданная функция имеет 3 иот. Тип каждой иот следующий:

$z_1 = 3i$ полюс первого порядка

$z_2 = -3i$ полюс первого порядка

$z_3 = 0$ полюс второго порядка.

Пример. Найти особые точки функции $f(z) = \frac{e^{5z} - 1}{(z^2 + 9)z}$

и установить их тип.

Решение: Изолированные особые точки функции $z_1 = 3i$, $z_2 = -3i$ и $z_3 = 0$.

Для нахождения типа каждой особой точки нужно вычислить предел функции в каждой особой точке.

$$\lim_{z \rightarrow 3i} \frac{e^{5z} - 1}{(z^2 + 9)z} = \lim_{z \rightarrow 3i} \frac{e^{5z} - 1}{(z - 3i)(z + 3i)z} = \infty$$

Получаем $z_1 = 3i$ полюс первого порядка.

$$\lim_{z \rightarrow -3i} \frac{e^{5z} - 1}{(z^2 + 9)z} = \lim_{z \rightarrow -3i} \frac{e^{5z} - 1}{(z - 3i)(z + 3i)z} = \infty, \text{ тогда}$$

$z_2 = -3i$ полюс первого порядка.

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^{5z} - 1}{(z^2 + 9)z} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{5z}{(z^2 + 9)z} = \frac{5}{9}$$

Получаем, что $z_3 = 0$ устранимая особая точка. Заметим, что здесь при вычислении предела были применены эквивалентности.

Ответ. Заданная функция имеет 3 иот. Тип каждой иот следующий:

$z_1 = 3i$ полюс первого порядка

$z_2 = -3i$ полюс первого порядка

$z_3 = 0$ устранимая особая точка.

Классификация изолированных особых точек по виду главной части ряда Лорана

Теорема 1. Точка z_0 является устранимой особой точкой, если в разложении $f(z)$ в ряд Лорана в окрестности точки z_0 отсутствует главная часть, т.е.

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n.$$

Теорема 2. Точка z_0 является полюсом n -го порядка функции $f(z)$, если главная часть ряда Лорана для $f(z)$ в окрестности точки z_0 содержит конечное число слагаемых, т.е.

$$f(z) = \frac{c_{-n}}{(z-z_0)^n} + \dots + \frac{c_{-1}}{z-z_0} + \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^k, \text{ где } c_{-n} \neq 0.$$

Теорема 3. Точка z_0 является существенно особой точкой для функции $f(z)$, если главная часть ряда Лорана для $f(z)$ в окрестности z_0 содержит бесконечное количество членов.

Пример. Найти особые точки функции $f(z) = \frac{\sin 9z}{z}$.

Определить тип особой точки.

Решение. Особая точка функции $f(z)$ $z_0 = 0$. Используя разложение в ряд Тейлора для функции $\sin z$ (4.2) в окрестности точки $z_0 = 0$, т.е.

$$\sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad z \in \mathbb{C}$$

Получим разложение функции $f(z)$ в окрестности нуля в ряд Лорана

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z} \left[(9z) - \frac{(9z)^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{(9z)^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots \right] = \\ &= 9 - \frac{9^3 z^2}{2} + \dots + (-1)^n \frac{(9z)^{2n} \cdot 9}{(2n+1)!} + \dots \end{aligned}$$

Это разложение не содержит главной части.

Поэтому точка $z_0 = 0$ является устранимой особой точкой (теорема 1).

Пример. Найти особые точки функции

$f(z) = (z-3)^4 \cos \frac{1}{z-3}$ и определить тип особой точки.

Решение. Особая точка функции $z_0 = 3$.

Используя разложение (4.3), получим

$$\cos \frac{1}{z-3} = 1 - \frac{1}{2! (z-3)^2} + \frac{1}{4! (z-3)^4} - \frac{1}{6! (z-3)^6} + \frac{1}{8! (z-3)^8} - \dots$$

тогда

$$\begin{aligned} f(z) &= (z-3)^4 \left(1 - \frac{1}{2! (z-3)^2} + \frac{1}{4! (z-3)^4} - \frac{1}{6! (z-3)^6} + \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{8! (z-3)^8} - \dots \right) = (z-3)^4 - \frac{(z-3)^2}{2!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{6! (z-3)^2} + \frac{1}{8! (z-3)^4} - \dots \end{aligned}$$

Разложение справедливо в кольце $0 < |z-3| < +\infty$.

Это ряд Лорана, его главная часть

$$-\frac{1}{6!(z-3)^2} + \frac{1}{8!(z-3)^4} - \dots$$

Главная часть полученного ряда Лорана имеет бесконечное количество членов (слагаемых). Особая точка $z_0 = 3$ является существенно особой точкой (теорема 3).

Пример. Найти особые точки функции $f(z) = \frac{e^z - 1}{z^3}$.

Определить тип особой точки.

Решение. Используя разложение в ряд Тейлора для функции e^z (4.1) в окрестности точки $z_0 = 0$, т.е.

$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \dots + \frac{z^n}{n!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad z \in \mathbb{C}$$

Заданная функция $f(z) = \frac{e^z - 1}{z^3}$.

Получим разложение функции $f(z)$ в ряд Лорана

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z^3} \left[1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^4}{4!} + \frac{z^5}{5!} + \frac{z^6}{6!} + \dots \right] = \\ &= \frac{1}{z^3} + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{z}{4!} + \frac{z^2}{5!} + \frac{z^3}{6!} + \dots \end{aligned}$$

Разложение в ряд Лорана функции $f(z)$ содержит конечное число членов с отрицательными степенями z . Следовательно, точка $z_0 = 0$ является полюсом третьего порядка, т. к. наибольший показатель степени z , содержащихся в знаменателях членов главной части ряда Лорана, равен трем (теорема 2).

Домашнее задание.

Учебно-методическое пособие «Теория функций комплексного переменного»,
часть 1. Задачи №№ 1.15.

Часть 2, задачи №№ 2.1, 2.2 (выполнение типового расчета).

Пособие размещено на сайте кафедры ВМ-2

<http://vm-2.mozello.ru>

раздел «Математический анализ. 4 семестр».