

Практическое занятие №2

§ 2. Функции комплексного переменного

Изображение множеств на комплексной плоскости

Рассмотрим задачи, связанные с изображением на комплексной плоскости линий или областей, заданных уравнениями и неравенствами.

Пример. Изобразить на комплексной плоскости область, заданную неравенством $\operatorname{Re} z \leq 3$.

Решение. $\operatorname{Re} z = x$, тогда неравенство можно переписать так: $x \leq 3$. На




Рис. 6

плоскости xOy это определяет полуплоскость левее прямой $x = 3$ (см. рис. 6).

Пример. Изобразить на комплексной плоскости линию, заданную

$$|z| = 6.$$

Решение. По определению, $|z|$ – это расстояние от начала координат до точки z , т.е. $|z| = 6$ – это геометрическое множество точек, равноудаленных от начала координат. Таким геометрическим местом является окружность с центром в начале координат радиуса $R = 6$.

Также можно вывести уравнение кривой алгебраическим способом. Из понятия модуля комплексного числа $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$, т. е. уравнение переписывается в виде $\sqrt{x^2 + y^2} = 6$, или $x^2 + y^2 = 36$ – это и есть уравнение

окружности с центром в точке O и $R = 6$.

Пример. Изобразить на комплексной плоскости область, заданную неравенством $1 < |z - 1 + i| \leq 2$.

Решение. $|z - 1 + i| = |z - (1 - i)| \leq 2$

Это множество точек z , расстояние которых от точки $1 - i$ не больше 2, то есть круг с центром в $1 - i$ радиуса 2. Множество точек z таких, что

$1 < |z - (1 - i)|$ представляет собой внешность круга радиуса 1 с центром в точке $1 - i$. Таким образом, исходное множество – кольцо с центром в точке $1 - i$ (см. рис. 7).




Рис. 7

Пример. Изобразить на комплексной плоскости область, заданную неравенством $5 < |z + 3 + 2i| \leq 14$.

Решение: по аналогии с предыдущим примером получим кольцо с центром в точке $(-3 - 2i)$, радиус внутренней окружности равен 5 (линия обозначается пунктиром), радиус второй окружности равен 14 (линия сплошная).

Пример. Изобразить на комплексной плоскости область, заданную $|z| < 9$.

Решение: по аналогии с предыдущими примерами получим, что задана

внутренняя часть круга с центром в точке 0, радиус равен 9, причем граница области – окружность – обозначается пунктиром.

Заметим, что для случая $|z| > 9$, получим внешнюю часть круга.

Пример. Изобразить на комплексной плоскости область, заданную неравенством $\left| \frac{z-1}{z+1} \right| \geq 1$.

Решение: Пусть z не равно -1 . Умножим обе части неравенства на положительное число $|z + 1|$, получим $|z - 1| \geq |z + 1|$.

Положим $z = x + iy$.

$$\sqrt{(x-1)^2 + y^2} \geq \sqrt{(x+1)^2 + y^2}$$

Возведем в квадрат:

$$(x-1)^2 + y^2 \geq (x+1)^2 + y^2.$$

Переносим в левую часть все слагаемые, получим $(x-1)^2 - (x+1)^2 \geq 0$ или $-4x \geq 0$, или $x \leq 0$ – это левая полуплоскость вместе с границей $x = 0$, причем выкалывается точка $z = -1$.

Пусть $z = x + iy$, тогда

$$\omega = f(z) = u(x, y) + iv(x, y),$$

где $u(x, y) = \operatorname{Re} f(z)$ – действительная часть функции, $v(x, y) = \operatorname{Im} f(z)$ – мнимая часть функции.

Пример. Найти действительную и мнимую части функции

$$\omega = 15z + 7.$$

Решение. Положим $z = x + iy$,

тогда $\omega = 15(x + iy) + 7 = (15x + 7) + 15iy$.

Получаем

$u(x, y) = 15x + 7$ – действительная часть функции,

$v(x, y) = 15y$ – мнимая часть функции.

Пример. Найти действительную и мнимую части функции

$$\omega = 4z^2 + 5i\bar{z}.$$

Решение. Положим $z = x + iy$, тогда $\omega = 4(x + iy)^2 + 5i(x - iy) = 4x^2 + 8xyi - 4y^2 + 5ix + 5y = (4x^2 - 4y^2 + 5y) + i(8xy + 5x)$. Получаем

$u(x, y) = 4x^2 - 4y^2 + 5y$ – действительная часть функции,

$v(x, y) = 8xy + 5x$ – мнимая часть функции.

Элементарные функции комплексного переменного

Основные элементарные функции комплексного переменного определяются следующими формулами (здесь $z = x + iy$).

1. Дробно-рациональная функция

$$\omega = \frac{a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n}{b_0 z^m + b_1 z^{m-1} + \dots + a_m}.$$

В частности, рациональной функцией является многочлен $\omega = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n$.

2. Показательная функция e^z при $z=x+i\cdot y \in \mathbf{C}$ определяется равенством

$$e^z = e^x \cdot (\cos y + i \cdot \sin y).$$

В частности, при $z \in \mathbf{R}$ (т.е. при $y=0$) функция e^z совпадает с обычной экспонентой, а при $x=0$ получаем формулу Эйлера:

$$e^{i \cdot y} = \cos y + i \cdot \sin y.$$

Свойства показательной функции:

а) $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} e^{z_2}$, где z_1, z_2 – комплексные числа,

в) $e^{z+2\pi ki} = e^z$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$), т.е.

e^z – периодическая функция с периодом $2\pi i$.

3. Тригонометрические функции

Из формулы Эйлера следует, что $\forall x \in \mathbf{R}$

$$\cos x = \frac{e^{i \cdot x} + e^{-i \cdot x}}{2}, \quad \sin x = \frac{e^{i \cdot x} - e^{-i \cdot x}}{2i}.$$

По аналогии с этими равенствами введем функции комплексного переменного $\cos z$ и $\sin z$ $\forall z \in \mathbf{C}$:

$$\cos z = \frac{e^{i \cdot z} + e^{-i \cdot z}}{2}, \quad \sin z = \frac{e^{i \cdot z} - e^{-i \cdot z}}{2i}. \quad (2.1)$$

Функции $\sin z$ и $\cos z$ – периодические с периодом $T = 2\pi$. Справедливо основное тригонометрическое тождество: $\cos^2 z + \sin^2 z = 1$.

Функции tgz и $ctgz$ определяются равенствами $tgz = \frac{\sin z}{\cos z}$, $ctgz = \frac{\cos z}{\sin z}$.

Для тригонометрических функций комплексного переменного остаются в силе все формулы тригонометрии.

4. Гиперболические функции

Гиперболические функции shz , chz , thz , $cthz$ определяются равенствами

$$shz = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad chz = \frac{e^z + e^{-z}}{2},$$

$$thz = \frac{shz}{chz}, \quad cthz = \frac{chz}{shz}.$$

Основное гиперболическое тождество $ch^2 z - sh^2 z = 1$.

5. Связь между тригонометрическими и гиперболическими функциями

$$\sin z = -ish(iz), \quad \cos z = ch(iz), \quad tgz = -ith(iz),$$

$$thz = -itg(iz), cthz = ictg(iz).$$

6. **Логарифмическая функция $\text{Ln } z$** , где $z \neq 0$, определяется как функция, обратная показательной, причем

$$\begin{aligned} \text{Ln } z &= \ln|z| + i\text{Arg } z = \ln|z| + i(\arg z + 2\pi k), \\ k &= 0, \pm 1, \pm 2, \dots \end{aligned} \quad (2.2)$$

Функция $\omega = \text{Ln } z$ является многозначной.

Главным значением $\text{Ln } z$ называется значение, получаемое при $k = 0$

$$\ln z = \ln|z| + i\arg z.$$

Свойства функции $\text{Ln } z$:

$$\text{a) } \text{Ln}(z_1 z_2) = \text{Ln } z_1 + \text{Ln } z_2,$$

$$\text{b) } \text{Ln} \left(\frac{z_1}{z_2} \right) = \text{Ln } z_1 - \text{Ln } z_2.$$

7. **Общая показательная функция** определяется равенством

$$a^z = e^{z \text{Ln} a}, \quad (2.3)$$

где a – любое комплексное число, $a \neq 0$.

8. **Общая степенная функция $w = z^a$** , где a – любое комплексное число, $z \neq 0$

$$z^a = e^{a \text{Ln} z}. \quad (2.4)$$

Пример. Вычислить $\sin(3 - i)$.

Решение. Используя формулы (2.1) получаем

$$\begin{aligned} \sin(3 - i) &= \frac{1}{2i} [e^{i(3-i)} - e^{-i(3-i)}] = -\frac{i}{2} [e^{1+3i} - e^{-1-3i}] = \\ &= -\frac{i}{2} [e(\cos 3 + i \sin 3) - e^{-1}(\cos 3 - i \sin 3)] = \\ &= -i \left[\cos 3 \left(\frac{e - e^{-1}}{2} \right) + i \sin 3 \left(\frac{e + e^{-1}}{2} \right) \right] = \end{aligned}$$

$$= \sin 3ch1 - i \cos 3sh1.$$

Пример. Вычислить $5\text{Ln}(-1)$.

Решение. Из формулы (2.2) получаем

$$\begin{aligned} 5\text{Ln}(-1) &= 5\ln|-1| + 5i(\arg(-1) + 2\pi k) = 5i(\pi + 2\pi k) = \\ &= 5(2k + 1)\pi i, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \end{aligned}$$

Пример. Вычислить i^{12i} .

Решение. Положим $a = i, z = 12i$ и воспользуемся формулой (2.4)

$$i^{12i} = e^{12i\text{Ln}i}.$$

Вычислим отдельно $\text{Ln}(i)$. Используя формулу (2.2), получим:

$$\text{Ln}(i) = \ln|i| + i(\arg i + 2\pi k) = i\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right),$$

$$|i| = \sqrt{0^2 + 1^2} = 1, \ln|i| = \ln 1 = 0, \arg i = \frac{\pi}{2},$$

$$i^{12i} = e^{12i \cdot i\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right)} = e^{-6\pi - 24\pi k}, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Решение уравнений

Пример. Решить уравнение $\sin z = 3$, корни уравнения изобразить на комплексной плоскости.

Решение. Используя формулу (2.1), уравнение можно переписать в виде $\frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = 3$ или $e^{2iz} - 6ie^{iz} - 1 = 0$ – это квадратное уравнение относительно e^{iz} . Его корни

$$e^{iz} = 3i \pm 2\sqrt{2}i = i(3 \pm 2\sqrt{2})$$

Прологарифмируем полученное равенство

$$iz = \text{Ln}\left(i(3 \pm 2\sqrt{2})\right) = \ln|i(3 \pm 2\sqrt{2})| +$$

$$+ i\left(\arg\left(i(3 \pm 2\sqrt{2})\right) + 2\pi k\right), k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Вычислим $|i(3 \pm 2\sqrt{2})| = 3 \pm 2\sqrt{2}$, $\arg\left(i(3 \pm 2\sqrt{2})\right) = \frac{\pi}{2}$, получим

$$iz = \ln(3 \pm 2\sqrt{2}) + i\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right),$$

отсюда вычислим

$$z = \frac{1}{i} \ln(3 \pm 2\sqrt{2}) + \frac{\pi}{2} + 2\pi k = \frac{\pi}{2} + 2\pi k - i \ln(3 \pm 2\sqrt{2}).$$

Получили две серии корней

$$z_1 = \frac{\pi}{2} + 2\pi k - i \ln(3 + 2\sqrt{2}), z_2 = \frac{\pi}{2} + 2\pi k - i \ln(3 - 2\sqrt{2}).$$


Преобразуем z_2 .

$$-\ln(3 - 2\sqrt{2}) = \ln \frac{1}{3-2\sqrt{2}} = \ln(3 + 2\sqrt{2}),$$

поэтому

$$z_2 = \frac{\pi}{2} + 2\pi k + i \ln(3 + 2\sqrt{2}).$$

Корни находятся на двух прямых, параллельных оси Ox и отстоящих от нее на расстояние $\ln(3 + 2\sqrt{2})$ (см. рис. 8).



Домашнее задание.

Учебно-методическое пособие «Теория функций комплексного переменного», часть 1. Задачи №№ 1.4, 1.5, 1.6.

Пособие размещено на сайте кафедры ВМ-2

<http://vm-2.mozello.ru>

раздел «Математический анализ. 4 семестр».