[평가] chem-d76-reaction-density · gemma — 단계별 연습 3문제

화학 · 화학 반응식과 기체의 밀도 / 몰수·분자량·밀도 관계 · 통합 변형 · 2026. 10. 17.

원본 문제

다음은 $A(s)$와 $B(g)$가 반응하여 $C(g)$를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.

$$A(s) + bB(g) \longrightarrow C(g)\ (b\text{: 반응 계수})$$

표는 실린더에 $A(s)$와 $B(g)$의 양(mol)을 달리하여 넣고 반응을 완결시킨 실험 Ⅰ, Ⅱ에 대한 자료이다. $\frac{\text{B의 분자량}}{\text{C의 분자량}} = \frac{1}{16}$이다.

단서 B의 분자량 $= M$, C의 분자량 $= 16M$

실험	넣어 준 물질의 양(mol)		실린더 속 기체의 밀도(상댓값)	
	$A(s)$	$B(g)$	반응 전	반응 후
Ⅰ	2	7	1	7
Ⅱ	3	8	1	x 10

$b \times x$는? (단, 기체의 온도와 압력은 일정하다.) (3점) 2020 대비 수능 19

① 15 ② 20 2×10=20 ③ 21 ④ 24 ⑤ 32

원본 해설

D 76 정답 ② [정답률 28%] ✪ 1등급 대비

✪ 실린더 속 기체의 밀도를 이용하여 한계 반응물을 구하고, 반응 계수를 구하여 화학 반응식을 완성시키는 문제이다.
밀도와 분자량 비를 이용하여 첫 번째 실험에서 한계 반응물을 찾고, 반응 계수를 구하는 것이 문제 풀이의 핵심 KEY이다.

출제 개념: 화학 반응식과 기체의 밀도

| 문제 해결 과정 |

step 1 밀도와 B, C의 분자량 비를 이용하여 실험 Ⅰ에서 한계 반응물을 찾는다.

- 문제에서 실린더 속 기체의 밀도가 주어져 있다. 밀도=$\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$이고, 화학 반응식에서 $A(s)$는 고체이므로 부피에 영향을 미치지 않는다.
- 일정 온도와 압력에서 아보가드로 법칙에 의해 기체의 부피 비=몰비이고, 기체의 종류가 $B(g)$ 하나일 때 밀도 비=분자량 비이다.
- 따라서 밀도(=$\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$) ∝분자량(=$\frac{\text{질량}}{\text{몰}}$)임을 알 수 있다.
- 만약 실험 Ⅰ에서 B가 한계 반응물이라면 반응 전에는 기체가 $B(g)$만 존재하고, 반응 후에는 $C(g)$만 존재해야 한다. 이때 기체의 밀도 비는 분자량 비이므로 반응 전 : 반응 후=1 : 16이다.
- 그러나 문제에서 주어진 기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후=1 : 7이므로 실험 Ⅰ에서 A가 한계 반응물이다.

step 2 실험 Ⅰ에서 화학 반응식을 완성한다.

- 실험 Ⅰ에서의 화학 반응식은 다음과 같다.

	$A(s)$	+	$bB(g)$	→	$C(g)$
반응 전(mol)	2		7		0
반응(mol)	2		$-2b$		$+2$
반응 후(mol)	0		$7-2b$		2

- 밀도=$\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$이고, 질량 보존의 법칙에 의해 반응 전후 질량은 보존된다.
- 따라서 A의 분자량+b×B의 분자량=C의 분자량이다.
$\frac{\text{C의 분자량}}{\text{B의 분자량}}$=16이므로 B의 분자량을 M, C를 16M으로 두고 반응 전후 기체의 정보를 정리하면 다음과 같다.

	반응 전 B(g)	반응 후 C(g)
기체의 질량	7M	$(7-2b)M+32M$
기체의 부피(상댓값)	7	$(7-2b)+2$
기체의 밀도(상댓값)	M	$\frac{39M-2bM}{9-2b}$

- 기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후=1 : 7(=M : $\frac{39M-2bM}{9-2b}$)이므로 $b=2$이다. 따라서 실험 Ⅰ에서의 화학 반응식을 완성하면 다음과 같다.

	$A(s)$	+	$2B(g)$	→	$C(g)$
반응 전(mol)	2		7		0
반응(mol)	2		-4		$+2$
반응 후(mol)	0		3		2

step 3 실험 Ⅱ에서 화학 반응식을 완성하고, x를 구한다.

- 실험 Ⅱ에서의 화학 반응식은 다음과 같다.

	$A(s)$	+	$2B(g)$	→	$C(g)$
반응 전(mol)	3		8		0
반응(mol)	-3		-6		$+3$
반응 후(mol)	0		2		3

- B의 분자량을 M, C를 16M으로 두고 반응 전후 기체의 정보를 정리하면 다음과 같다.

	반응 전 B(g)	반응 후 C(g)
기체의 질량	8M	$(2\times M)+(3\times 16M)$
기체의 부피(상댓값)	8	5
기체의 밀도(상댓값)	M	10M

- 기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후=1 : 10이므로 $x=10$이다.
- 따라서 $b=2$, $x=10$이므로 $2\times 10=20$이다.

✪ 정답은 ② 20이다.

문제 풀이 Tip

- $A(s)$ 화학 반응식에서 A는 고체
화학 반응식에서 A는 고체이므로 실린더 속 기체의 밀도 계산에 영향을 주지 않는다.

- 하나의 기체만 존재할 때 밀도 ∝ 분자량이다.
화학 반응식에서 $A(s)$는 고체이므로 부피에 영향을 미치지 않는다. 따라서 기체의 밀도에 영향을 미치는 것은 반응 전 $B(g)$이다.
이때, 밀도(=$\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$)∝분자량(=$\frac{\text{질량}}{\text{몰}}$)이므로 $B(g)$의 분자량은 밀도에 비례한다.

원본 풀이 로직 — STEP 3개

STEP 1 **밀도와 B, C의 분자량 비를 이용하여 실험 Ⅰ에서 한계 반응물을 찾는다.**

핵심 기법 밀도=질량/부피, 일정한 온도와 압력에서 아보가드로 법칙에 의해 기체의 부피 비=몰비, 기체의 종류가 B(g) 하나일 때 밀도 비=분자량 비를 이용해 반응 전후 기체 밀도 비를 분자량 비로 비교한다.

• 문제에서 실린더 속 기체의 밀도가 주어져 있다. 밀도=$\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$이고, 화학 반응식에서 $\mathrm{A}(\mathrm{s})$는 고체이므로 부피에 영향을 미치지 않는다.

• 일정한 온도와 압력에서 아보가드로 법칙에 의해 기체의 부피 비=몰비이고, 기체의 종류가 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$ 하나일 때 밀도 비=분자량 비이다.

• 따라서 밀도$(=\frac{\text{질량}}{\text{부피}}) \propto$ 분자량$(=\frac{\text{몰질량}}{\text{몰}})$임을 알 수 있다.

• 만약 실험 Ⅰ에서 B가 한계 반응물이라면 반응 전에는 기체가 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$만 존재하고, 반응 후에는 $\mathrm{C}(\mathrm{g})$만 존재해야 한다. 이때 기체의 밀도 비는 분자량 비이므로 반응 전 : 반응 후 $= 1 : 16$이다.

• 그러나 문제에서 주어진 기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후 $= 1 : 7$이므로 실험 Ⅰ에서 A가 한계 반응물이다.

결론 실험 Ⅰ에서 $\mathrm{A}(\mathrm{s})$가 한계 반응물이다.

STEP 2 **실험 Ⅰ에서 화학 반응식을 완성한다.**

핵심 기법 반응 전후 기체의 몰수·질량·부피(상댓값)·밀도(상댓값)를 B의 분자량 M, C의 분자량 16M로 정리하고, 기체 밀도 비 1:7을 세우면 b가 결정된다.

• 실험 Ⅰ에서의 화학 반응식은 다음과 같다.

	$\mathrm{A}(\mathrm{s})$	$+\,b\mathrm{B}(\mathrm{g})$	$\rightarrow\ \mathrm{C}(\mathrm{g})$
반응 전(mol)	2	7	0
반응(mol)	2	$-2b$	$+2$
반응 후(mol)	0	$7-2b$	2

• 밀도=$\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$이고, 질량 보존의 법칙에 의해 반응 전후 질량은 보존된다.

• 따라서 A의 분자량 $+b\times$ B의 분자량 $=$ C의 분자량이다.

• $\frac{\text{C의 분자량}}{\text{B의 분자량}} = 16$이므로 B의 분자량을 M, C를 16M로 두고 반응 전후 기체의 정보를 정리하면 다음과 같다.

	반응 전 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$	**반응 후** $\mathrm{C}(\mathrm{g})$
기체의 질량	$7M$	$(7-2b)M+32M$
기체의 부피(상댓값)	7	$(7-2b)+2$
기체의 밀도(상댓값)	M	$\frac{39M-2bM}{9-2b}$

• 기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후 $= 1 : 7 = (M : \frac{39M-26M}{9-2b})$이므로 $b = 2$이다. 따라서 실험 Ⅰ에서의 화학 반응식을 완성하면 다음과 같다.

	$\mathrm{A}(\mathrm{s})$	$+\,2\mathrm{B}(\mathrm{g})$	$\rightarrow\ \mathrm{C}(\mathrm{g})$
반응 전(mol)	2	7	0
반응(mol)	2	-4	$+2$
반응 후(mol)	0	3	2

결론 반응 계수 $b = 2$ ($\mathrm{A}(\mathrm{s}) + 2\mathrm{B}(\mathrm{g}) \longrightarrow \mathrm{C}(\mathrm{g})$).

STEP 3 **실험 Ⅱ에서 화학 반응식을 완성하고, x를 구한다.**

핵심 기법 완성된 반응식으로 실험 Ⅱ의 반응 전후 기체 몰수를 구하고, B의 분자량 M, C의 분자량 16M로 질량·부피·밀도를 정리해 반응 전 밀도 M과 반응 후 밀도 x의 비 1:x를 세운다.

• 실험 Ⅱ에서의 화학 반응식은 다음과 같다.

	$\mathrm{A(s)}$	$+\ 2\mathrm{B(g)}$	$\rightarrow\ \mathrm{C(g)}$
반응 전(mol)	3	8	0
반응(mol)	-3	-6	$+3$
반응 후(mol)	0	2	3

• B의 분자량을 M, C를 16M로 두고 반응 전후 기체의 정보를 정리하면 다음과 같다.

	반응 전 $\mathrm{B(g)}$	**반응 후** $\mathrm{C(g)}$
기체의 질량	$8M$	$(2\times M)+(3\times 16M)$
기체의 부피(상댓값)	8	5
기체의 밀도(상댓값)	M	$10M$

• 기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후 $=1:10$이므로 $x=10$이다.

• 따라서 $b=2$, $x=10$이므로 $2\times 10=20$이다.

★ 정답은 ② 20이다.

결론 $x=10,\ b\times x=2\times 10=20$

연습 문제

1. STEP 1 연습

다음은 $\mathrm{A}(\mathrm{s})$와 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$가 반응하여 $\mathrm{C}(\mathrm{g})$를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.

$\mathrm{A}(\mathrm{s}) + b\,\mathrm{B}(\mathrm{g}) \longrightarrow \mathrm{C}(\mathrm{g})$ (b: 반응 계수)

표는 실린더에 $\mathrm{A}(\mathrm{s})$와 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$의 양(mol)을 넣고 반응을 완결시킨 실험 Ⅰ에 대한 자료이다. $\frac{\mathrm{B}\text{의 분자량}}{\mathrm{C}\text{의 분자량}} = \frac{1}{16}$이다.

실험	넣어 준 물질의 양 (mol) (A(s))	넣어 준 물질의 양 (mol) (B(g))	실린더 속 기체의 밀도 (상댓값) (반응 전)	실린더 속 기체의 밀도 (상댓값) (반응 후)
Ⅰ	2	9	1	7

실험 Ⅰ에서 한계 반응물은? (단, 기체의 온도와 압력은 일정하다.) (3점)

① $\mathrm{A}(\mathrm{s})$ ② $\mathrm{B}(\mathrm{g})$ ③ $\mathrm{A}(\mathrm{s})$와 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$가 모두 완전히 반응한다 ④ $\mathrm{A}(\mathrm{s})$와 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$가 모두 남는다 ⑤ 주어진 자료만으로 판단할 수 없다

2. STEP 1~2 연습

다음은 $\mathrm{A}(\mathrm{s})$와 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$가 반응하여 $\mathrm{C}(\mathrm{g})$를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.

$\mathrm{A}(\mathrm{s}) + b\,\mathrm{B}(\mathrm{g}) \longrightarrow \mathrm{C}(\mathrm{g})$ (b: 반응 계수)

표는 실린더에 $\mathrm{A}(\mathrm{s})$와 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$의 양(mol)을 넣고 반응을 완결시킨 실험 Ⅰ에 대한 자료이다. $\frac{\mathrm{B}\text{의 분자량}}{\mathrm{C}\text{의 분자량}} = \frac{1}{16}$이다.

실험	넣어 준 물질의 양 (mol) ($\mathrm{A}(\mathrm{s})$)	넣어 준 물질의 양 (mol) ($\mathrm{B}(\mathrm{g})$)	실린더 속 기체의 밀도 (상댓값) (반응 전)	실린더 속 기체의 밀도 (상댓값) (반응 후)
Ⅰ	2	10	1	4

b는? (단, 기체의 온도와 압력은 일정하다.) (3점)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

3. 최종 문제

다음은 $\mathrm{A}(\mathrm{s})$와 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$가 반응하여 $\mathrm{C}(\mathrm{g})$를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.

$\mathrm{A}(\mathrm{s}) + b\,\mathrm{B}(\mathrm{g}) \longrightarrow \mathrm{C}(\mathrm{g})$ (b: 반응 계수)

표는 실린더에 $\mathrm{A}(\mathrm{s})$와 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$의 양(mol)을 달리하여 넣고 반응을 완결시킨 실험 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ에 대한 자료이다. $\frac{\mathrm{B}\text{의 분자량}}{\mathrm{C}\text{의 분자량}} = \frac{1}{16}$이다.

실험	넣어 준 $\mathrm{A}(\mathrm{s})$의 양 (mol)	넣어 준 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$의 양 (mol)	기체의 밀도(상댓값) (반응 전)	기체의 밀도(상댓값) (반응 후)
Ⅰ	4	9	1	16
Ⅱ	3	11	1	10
Ⅲ	2	x	1	7

$b \times x$는? (단, 기체의 온도와 압력은 일정하다.) (3점)

① 18 ② 21 ③ 24 ④ 27 ⑤ 30

정답과 해설

1. 정답 ① STEP 1 연습

STEP 1 밀도와 B, C의 분자량 비를 이용하여 실험 Ⅰ에서 한계 반응물을 찾는다.

• 문제에서 실린더 속 기체의 밀도가 주어져 있다. 밀도=$\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$이고, 화학 반응식에서 $\mathrm{A}(\mathrm{s})$는 고체이므로 부피에 영향을 미치지 않는다.

• 일정한 온도와 압력에서 아보가드로 법칙에 의해 기체의 부피 비=몰비이고, 기체의 종류가 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$ 하나일 때 밀도 비=분자량 비이다.

• 따라서 밀도$\left(=\frac{\text{질량}}{\text{부피}}\right) \propto$ 분자량$\left(=\frac{\text{몰질량}}{\text{몰}}\right)$임을 알 수 있다.

• 만약 Ⅰ에서 B가 한계 반응물이라면 반응 전에는 기체가 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$만 존재하고, 반응 후에는 $\mathrm{C}(\mathrm{g})$만 존재해야 한다. 이때 기체의 밀도 비는 분자량 비이므로 반응 전 : 반응 후 $= 1 : 16$이다.

• 그러나 문제에서 주어진 기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후 $= 1 : 7$이므로 Ⅰ에서 A가 한계 반응물이다.

정리 실험 Ⅰ에서 $\mathrm{A}(\mathrm{s})$가 한계 반응물이다.

2. 정답 ① STEP 1~2 연습

STEP 1 밀도와 B, C의 분자량 비를 이용하여 실험 Ⅰ에서 한계 반응물을 찾는다.

• 문제에서 실린더 속 기체의 밀도가 주어져 있다. 밀도=$\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$이고, 화학 반응식에서 $\mathrm{A(s)}$는 고체이므로 부피에 영향을 미치지 않는다.

• 일정한 온도와 압력에서 아보가드로 법칙에 의해 기체의 부피 비=몰비이고, 기체의 종류가 $\mathrm{B(g)}$ 하나일 때 밀도 비=분자량 비이다.

• 따라서 밀도$(=\frac{\text{질량}}{\text{부피}}) \propto$ 분자량$(=\frac{\text{몰질량}}{\text{몰}})$임을 알 수 있다.

• 만약 Ⅰ에서 B가 한계 반응물이라면 반응 전에는 기체가 $\mathrm{B(g)}$만 존재하고, 반응 후에는 $\mathrm{C(g)}$만 존재해야 한다. 이때 기체의 밀도 비는 분자량 비이므로 반응 전 : 반응 후 $= 1 : 16$이다.

• 그러나 문제에서 주어진 기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후 $= 1 : 4$이므로 Ⅰ에서 A가 한계 반응물이다.

STEP 2 실험 Ⅰ에서 화학 반응식을 완성한다.

• 실험 Ⅰ에서의 화학 반응식은 다음과 같다.

	$\mathrm{A(s)}$	$+ b\mathrm{B(g)}$	$\rightarrow \mathrm{C(g)}$
반응 전(mol)	2	10	0
반응(mol)	2	$-2b$	$+2$
반응 후(mol)	0	$10-2b$	2

• 밀도=$\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$이고, 질량 보존의 법칙에 의해 반응 전후 질량은 보존된다.

• 따라서 A의 분자량 $+b\times$ B의 분자량 $=$ C의 분자량이다.

• $\frac{\text{C의 분자량}}{\text{B의 분자량}} = 16$이므로 B의 분자량을 M, C를 16M로 두고 반응 전후 기체의 정보를 정리하면 다음과 같다.

	반응 전 $\mathrm{B(g)}$	**반응 후 $\mathrm{C(g)}$**
기체의 질량	$10M$	$(10-2b)M+32M$
기체의 부피(상댓값)	10	$(10-2b)+2$
기체의 밀도(상댓값)	M	$\frac{42M-2bM}{12-2b}$

기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후 $= 1 : 4 = (M : \frac{42M-2bM}{12-2b})$이므로 $b=1$이다. 따라서 실험 Ⅰ에서의 화학 반응식을 완성하면 다음과 같다.

	$\mathrm{A(s)}$	$+\mathrm{B(g)}$	$\rightarrow \mathrm{C(g)}$
반응 전(mol)	2	10	0
반응(mol)	2	-2	$+2$
반응 후(mol)	0	8	2

정리 실험 I 에서 $\mathrm{A}\,(\mathrm{s})$가 한계 반응물이므로 $b = 1$이다.

3. 정답 ④ 최종 문제

STEP 1 **밀도와 B, C의 분자량 비를 이용하여 실험 Ⅱ에서 한계 반응물을 찾는다.**

• 문제에서 실린더 속 기체의 밀도가 주어져 있다. 밀도=$\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$이고, 화학 반응식에서 $\mathrm{A}(\mathrm{s})$는 고체이므로 부피에 영향을 미치지 않는다.

• 일정한 온도와 압력에서 아보가드로 법칙에 의해 기체의 부피 비=몰비이고, 기체의 종류가 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$ 하나일 때 밀도 비=분자량 비이다.

• 따라서 밀도$(=\frac{\text{질량}}{\text{부피}}) \propto$ 분자량$(=\frac{\text{몰질량}}{\text{몰}})$임을 알 수 있다.

• 만약 Ⅱ에서 B가 한계 반응물이라면 반응 전에는 기체가 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$만 존재하고, 반응 후에는 $\mathrm{C}(\mathrm{g})$만 존재해야 한다. 이때 기체의 밀도 비는 분자량 비이므로 반응 전 : 반응 후 $= 1 : 16$이다.

• 그러나 문제에서 주어진 기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후 $= 1 : 10$이므로 Ⅱ에서 A가 한계 반응물이다.

STEP 2 **실험 Ⅱ에서 화학 반응식을 완성한다.**

• 실험 Ⅱ에서의 화학 반응식은 다음과 같다.

	$\mathrm{A}(\mathrm{s})$	$+\ b\mathrm{B}(\mathrm{g})$	$\rightarrow\ \mathrm{C}(\mathrm{g})$
반응 전(mol)	3	11	0
반응(mol)	3	$-3b$	$+3$
반응 후(mol)	0	$11-3b$	3

• 밀도=$\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$이고, 질량 보존의 법칙에 의해 반응 전후 질량은 보존된다.

• 따라서 A의 분자량 $+b\times$ B의 분자량 $=$ C의 분자량이다.

• $\frac{\text{C의 분자량}}{\text{B의 분자량}} = 16$이므로 B의 분자량을 M, C를 16M로 두고 반응 전후 기체의 정보를 정리하면 다음과 같다.

	반응 전 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$	**반응 후** $\mathrm{B}(\mathrm{g})+\mathrm{C}(\mathrm{g})$
기체의 질량	$11M$	$(11-3b)M+48M$
기체의 부피(상댓값)	11	$(11-3b)+3$
기체의 밀도(상댓값)	M	$\frac{59M-3bM}{14-3b}$

기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후 $= 1 : 10 = (M : \frac{59M-3bM}{14-3b})$이므로 $b=3$이다. 따라서 실험 Ⅱ에서의 화학 반응식을 완성하면 다음과 같다.

	$\mathrm{A}(\mathrm{s})$	$+\ 3\mathrm{B}(\mathrm{g})$	$\rightarrow\ \mathrm{C}(\mathrm{g})$
반응 전(mol)	3	11	0
반응(mol)	3	-9	$+3$
반응 후(mol)	0	2	3

STEP 3 **실험 Ⅲ에서 화학 반응식을 완성하고, x를 구한다.**

• 실험 Ⅲ에서의 화학 반응식은 다음과 같다.

	$\mathrm{A(s)}$	$+3\mathrm{B(g)}$	$\rightarrow\ \mathrm{C(g)}$
반응 전(mol)	2	x	0
반응(mol)	2	-6	$+2$
반응 후(mol)	0	$x-6$	2

• B의 분자량을 M, C를 16M로 두고 반응 전후 기체의 정보를 정리하면 다음과 같다.

	반응 전 $\mathrm{B(g)}$	**반응 후** $\mathrm{B(g)}+\mathrm{C(g)}$
기체의 질량	xM	$(x-6)M+32M$
기체의 부피(상댓값)	x	$(x-6)+2$
기체의 밀도(상댓값)	M	$\frac{26M+xM}{x-4}$

• 기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후 $=1:7$이므로 $x=9$이다.

• 따라서 $b=3$, $x=9$이므로 $3\times 9=27$이다.

★ 정답은 ② 20이다.

정리 $b=3$, $x=9$이므로 $b\times x=3\times 9=27$이다.