$\tilde{y}_t^n$

l

Box-
$Jenkins$

i
a
i
l

$\Delta y_t =$
a_0

ó
e

o
$y_t =$
$y_0 +$
$a_0 t$
y_0
ó
i
ó

$\Delta y_t =$
a_0

í
y_0
a_0
$A(L)\varepsilon_t$

$$y_t = y_0 + a_0 t + A(L)\varepsilon_t$$
(1)

1
y_t
a_0
á
e

$$\Delta y_t = a_0 + \varepsilon_t$$
(2)

y_0
ó
ó
ó

$$y_t = y_0 + \sum_{i=1}^{t} \varepsilon_i + a_0 t$$

y_t
á
ó
ε_i ó
á
a
E
e
ó
2
í
a
e
ó
$d-$
$\acute{e}sima$
d
i
d
$I(d)$
í
3
ó
a

6

$\hat{g}(x)$

q

$q \leq$

n

q

x_i

x_i

x

é

é

$\lambda_q(x)$

x_i

á

qé

ó

x

W

ó

$$W(u) = \{ \, (\, 1-u^3)^3 \, para \, 0 \leq u < 1 \, 0 \, para \, u \geq 1$$

x_i

$$v_i(x) = W\left(\frac{|x_i - x|}{\lambda_q(x)}\right)$$

$u = $

$\frac{|x_i - x|}{\lambda_q(x)}$

x_i

á

x_i

x

á

qé

á

d

$v_i(x)$

$(x_i, y_i)^7$

x

$\hat{g}(x)$

$q >$

n

$\lambda_n(x)$

x_i

á

x

$$\lambda_q(x) = \lambda_n(x)\frac{q}{n}$$

ó

$\lambda_n(x)$

q

d

q

$\hat{g}(x)$

á

$d = $

1

$q = $

2

ó

ó

(x_i, y_i)

ρ_i

ó

$h_{(i)}$

á

ó

ó

á

á

$h_{(0)}$

í

$h_{(p)}$

$n_{(p)} = $

12

$h_{(p)}$

bu-

cle

in-

terno

ó

ó

$S_v^{(k)}$

$T_v^{(k)}$

$v = $

$1, ..., N$

ké

$(k+$

$1)$é

De-

trend-

ing[8]

$Y_v - $

$T_v^{(k)}$

é

á

ó

í
é
1₀

í
é
1o
ó
i

$_0) \gamma = 0$

$H_1) \gamma \neq 0$

o

H_0

$\Delta y_t = \gamma y_{t-1} + \sum_{i=2}^{p} \beta_i \Delta y_{t-i+1} + \varepsilon_t$

$\Delta y_t = a_0 + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=2}^{p} \beta_i \Delta y_{t-i+1} + \varepsilon_t$

$\Delta y_t = a_0 + \gamma y_{t-1} + a_2 t + \sum_{i=2}^{p} \beta_i \Delta y_{t-i+1} + \varepsilon_t$

í, τ_μ, τ_τ

ó

$H_0) \gamma = 0$

a

$F-$í

ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3

í

ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3

F

$$\phi_i = \frac{[SSR_{restringido} - SSR_{no\ restringido}]/r}{SSR_{no\ restringido}/(t-k)}$$

r
T
k
a
í =
1, 2, 3
T −
k
i
ó
ó
o
ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3
i
ó
i
ó
i
¿?
ó
i

	$H_0)$	í
$\Delta y_t = a_0 + \gamma y_{t-1} + a_2 t + \sum_{i=2}^{p} \beta_i \Delta y_{t-i+1} + \varepsilon_t$	$\gamma = 0$	τ_τ
	$\gamma = a_2 = 0$	ϕ_3
	$\gamma = a_2 = a_0 = 0$	ϕ_2
$\Delta y_t = a_0 + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=2}^{p} \beta_i \Delta y_{t-i+1} + \varepsilon_t$	$\gamma = 0$	τ_μ
	$\gamma = a_0 = 0$	ϕ_1
$\Delta y_t = \gamma y_{t-1} + \sum_{i=2}^{p} \beta_i \Delta y_{t-i+1} + \varepsilon_t$	$\gamma = 0$	τ

ñ
ó
ú
í
ó
é
á
á
á
í
ú
á
á
_teorico/ADF.png

ñ
á
l
a_0
a_2
ó
í
á
ú
í
á
á
H_0)
ó
é
ó
é
í
é
á
é
a_0
a_1
ó
γ
á
á
é
l
$\mathcal{I}_\mu$
$\mathcal{T}^\tau$
$t—$
estándar
γ
ó
í
γ

    á

é
é

í
ó
í
ó
í
í
ó
í
ó
í

$H_0)$ $la\ serie\ es\ estacionaria\ alrededor\ de\ una\ tendencia$

ó
ran-
dom
$walk$
í
ó
y_t
$t = 1, 2, ..., T$
í

$$y_t = \xi t + r_t + \varepsilon_t$$
(3)
r_t

$$r_t = r_{t-1} + u_t,$$
(4)
u_t
$iid(0, \sigma_u^2)$
r_0
ó
$\sigma_u^2 = 0$
ε_t
ó
y_t
$\xi = 0$
ó
y_t
r_0
e_t
$t = 1, 2, ..., T$
ó
y
$\hat{\sigma}_\varepsilon^2$
ó
T

$$S_t = \sum_{i=1}^{t} r_i, t = 1, ..., T$$
(5)
í

$$ML = \sum_{t=1}^{T} S_t^2 / \hat{\sigma}_\varepsilon^2$$
(6)
ó
e_t
ó
y
$e_t = y_t - \bar{y})$
í
á
ε_t
$iidN(0, \sigma_\varepsilon^2)$
á
é
ó