

QUY TRÌNH SẢN XUẤT NHÓM CÂY LẤY GỖ SINH TRƯỞNG CHẬM

I. KHÁI QUÁT CHUNG:

1. Nhóm cây lấy gỗ sinh trưởng chậm bao gồm

- Cây Sưa, Lim xẹt, Giáng hương;
- Cây Gù hương, Mun, Nghiến, Trầm hương (Gió bầu), Cẩm lai;
- Lim xanh, Xà cừ, Lát, Dổi.

2. Vị trí trồng

Vườn nhà, vùng đất chuyển đổi, bãi sông, bờ vùng, bờ thửa, đường giao thông,...

II. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Cây giống, vật tư

1.1. Cây giống

Sử dụng cây con có bầu được gieo ươm ≥ 6 tháng tuổi. Cây thân thẳng, khỏe mạnh, không cụt ngọn, không sâu bệnh, bầu còn nguyên vẹn...

1.2. Vật tư sử dụng

- Phân bón: sử dụng phân NPK (tỷ lệ 5: 10: 3 hoặc có tỷ lệ tương đương) hoặc phân vi sinh.

STT	Thời điểm sử dụng	Phân NPK (Kg/cây)	Phân vi sinh (Kg/cây)
Năm thứ nhất	Bón lót khi trồng	0,2	0,3
	Bón khi chăm sóc	0,3	0,4
Năm thứ 2	Bón khi chăm sóc	0,4	0,5
Năm thứ 3	Bón khi chăm sóc	0,4	0,5

(Tùy theo mục đích sản xuất và điều kiện thổ nhưỡng có thể điều chỉnh số lượng phân bón cho phù hợp)

- Cọc cắm giữ cây: có thể sử dụng cọc tre để cắm giữ cây ở giai đoạn mới trồng, số lượng mỗi cây 01 cọc.

2. Thời vụ trồng: trồng vào vụ xuân hè hoặc hè thu.

3. Kỹ thuật trồng

3.1. Làm đất

Những nơi úng, trũng, thoát nước kém phải lên luống trồng cây hoặc tạo rãnh thoát nước.

- Đào hố: khi đào hố để phần đất mặt tơi xốp một bên và phần đất phía dưới một bên. Kích thước hố đào: 40 x 40 x 40 cm.

- Lấp hố, bón lót: đưa phần đất mặt tơi xới trộn với phân bón lót xuống đáy hố. Thời điểm bón lót và lấp hố tốt nhất là trước khi trồng từ 05 đến 10 ngày.

3.2. Khoảng cách và mật độ trồng

Loại cây	Khoảng cách trồng	Mật độ trồng tương ứng (cây/ha)
Cây Sưa, Lim xẹt, Giáng hương	Cây cách cây 3m, hàng cách hàng 3m	1.100
Cây Gù hương, Mun, Nghiến, Tràm hương (Gió bầu), Cẩm lai	Cây cách cây 5m, hàng cách hàng 5m	400
Lim xanh, Xà cừ, Lát, Dổi	Cây cách cây 4m, hàng cách hàng 4,2m	600

3.3. Trồng cây

- Trồng cây vào những ngày râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm (tránh ngày nắng nóng trên 30°C hoặc gió bão). Rải cây giống đến đâu, trồng ngay đến đó và trồng hết trong ngày. Dùng vật dụng như cuốc, xẻng, xuống...đào giữa hố trồng với kích thước đủ để đặt bầu cây.

- Khi trồng cây phải xé bỏ vỏ bầu, đặt cây thẳng đứng vào giữa hố, lấp đất đầy hố cao hơn cổ rễ từ 01 đến 02 cm, lèn chặt đất xung quanh bầu, tránh làm vỡ bầu; nếu địa hình bằng phẳng, lấp hố đầy hình mâm xôi cho thoát nước; nơi địa hình dốc, lấp hố thấp hơn hoặc bằng miệng hố để giữ ẩm; thu dọn vỏ bầu sau khi trồng, đảm bảo vệ sinh môi trường.

3.4. Chăm sóc

- Trồng dặm: sau khi trồng 15 ngày, tiến hành kiểm tra tỷ lệ cây sống và trồng dặm những cây bị chết;

- Chăm sóc năm thứ nhất: sau 2-3 tháng kể từ thời điểm trồng, tiến hành phát cỏ, vun gốc và bón phân chăm sóc theo tỷ lệ;

- Chăm sóc năm thứ 2 và năm thứ 3: thực hiện vào đầu mùa sinh trưởng, tiến hành phát cỏ, dây leo, tỉa cành, vun gốc và bón phân theo tỷ lệ.

3.5. Bảo vệ

- Cây trồng cần được kiểm tra, bảo vệ thường xuyên, kịp thời ngăn chặn gia súc phá hoại.

- Thường xuyên theo dõi tình hình sâu bệnh: khi sâu bệnh xuất hiện phải phòng, trừ theo tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT NHÓM CÂY LẤY GỖ SINH TRƯỞNG NHANH

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Nhóm cây lấy gỗ sinh trưởng nhanh bao gồm

- Cây Bạch đàn, Keo, Phi lao, Xoan;
- Cây Bò đề, Gạo, Nhội, Sao đen, Bông gai.

2. Vị trí trồng

Vườn nhà, vùng đất chuyển đổi, bãi sông, bờ vùng, bờ thửa, đường giao thông,...

II. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Cây giống, vật tư

1.1. Cây giống

Sử dụng cây con có bầu được gieo ươm ≥ 6 tháng tuổi. Cây thân thẳng, khỏe mạnh, không cụt ngọn, không sâu bệnh, bầu còn nguyên vẹn...

1.2. Vật tư sử dụng

- Phân bón: sử dụng phân NPK (tỷ lệ 5: 10: 3 hoặc có tỷ lệ tương đương) hoặc phân vi sinh.

STT	Thời điểm sử dụng	Phân NPK (Kg/cây)	Phân vi sinh (Kg/cây)
Năm thứ nhất	Bón lót khi trồng	0,2	0,3
	Bón khi chăm sóc	0,3	0,4
Năm thứ 2	Bón khi chăm sóc	0,4	0,5
Năm thứ 3	Bón khi chăm sóc	0,4	0,5

(Tùy theo mục đích sản xuất và điều kiện thổ nhưỡng có thể điều chỉnh số lượng phân bón cho phù hợp)

- Cọc cắm giữ cây: có thể sử dụng cọc tre để cắm giữ cây ở giai đoạn mới trồng, số lượng mỗi cây 01 cọc.

2. Thời vụ trồng: trồng vào vụ xuân hè hoặc hè thu.

3. Kỹ thuật trồng

3.1. Làm đất

Những nơi úng, trũng, thoát nước kém phải lên luống trồng cây hoặc tạo rãnh thoát nước.

- Đào hố: khi đào hố để phân đất mặt tơi xấp một bên và phân đất phía dưới một bên. Kích thước hố đào: 40 x 40 x 40 cm.

- Lấp hố, bón lót: đưa phân đất mặt tơi xới trộn với phân bón lót xuống đáy hố. Thời điểm bón lót và lấp hố tốt nhất là trước khi trồng từ 05 đến 10 ngày.

3.2. Khoảng cách và mật độ trồng

<i>Loại cây</i>	<i>Khoảng cách trồng</i>	<i>Mật độ trồng tương ứng (cây/ha)</i>
Bạch đàn, Keo, Phi lao, Xoan	Cây cách cây 2m, hàng cách hàng 3m	1.660
Bồ đề, Gạo, Nhội, Sao đen, Bông gai	Cây cách cây 5m, hàng cách hàng 5m	400

3.3. Trồng cây

- Trồng cây vào những ngày râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm (tránh ngày nắng nóng trên 30°C hoặc gió bão). Rải cây giống đến đâu, trồng ngay đến đó và trồng hết trong ngày. Dùng vật dụng như cuốc, xẻng, xuống...đào giữa hố trồng với kích thước đủ để đặt bầu cây.

- Khi trồng cây phải xé bỏ vỏ bầu, đặt cây thẳng đứng vào giữa hố, lấp đất đầy hố cao hơn cổ rễ từ 01 đến 02 cm, lèn chặt đất xung quanh bầu, tránh làm vỡ bầu; nếu địa hình bằng phẳng, lấp hố đầy hình mâm xôi cho thoát nước; nơi địa hình dốc, lấp hố thấp hơn hoặc bằng miệng hố để giữ ẩm; thu dọn vỏ bầu sau khi trồng, đảm bảo vệ sinh môi trường.

3.4. Chăm sóc

- Trồng dặm: sau khi trồng 15 ngày, tiến hành kiểm tra tỷ lệ cây sống và trồng dặm những cây bị chết;

- Chăm sóc năm thứ nhất: sau 2-3 tháng kể từ thời điểm trồng, tiến hành phát cỏ, vun gốc và bón phân chăm sóc theo tỷ lệ;

- Chăm sóc năm thứ 2 và năm thứ 3: thực hiện vào đầu mùa sinh trưởng, tiến hành phát cỏ, dây leo, tỉa cành, vun gốc và bón phân theo tỷ lệ.

3.5. Bảo vệ

- Cây trồng cần được kiểm tra, bảo vệ thường xuyên, kịp thời ngăn chặn gia súc phá hoại.

- Thường xuyên theo dõi tình hình sâu bệnh: khi sâu bệnh xuất hiện phải phòng, trừ theo tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT NHÓM CÂY LÀM CẢNH, BÓNG MÁT, LÂM SẢ NGOÀI GỖ

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Nhóm cây làm cảnh, bóng mát, lâm sản ngoài gỗ

Cây Bàng, Hoa sữa, Sấu, Viêt, Phượng vĩ, Đa, Bàng lẵng, Osaka, Ngọc Lan, Liễu, Bách tán, Lộc vừng, Vọng cách, Cau búng, Cau Sâm panh, Vôi, Tùng, Quế, Đàn hương, Long não, Chuông vàng, Sanh, Si.

2. Vị trí trồng

Vườn nhà, vùng đất chuyển đổi, bãi sông, bờ vùng, bờ thửa, đường giao thông,...

II. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Cây giống, vật tư

1.1. Cây giống

Sử dụng cây con có bầu được gieo ươm ≥ 6 tháng tuổi. Cây thân thẳng, khỏe mạnh, không cụt ngọn, không sâu bệnh, bầu còn nguyên vẹn...

1.2. Vật tư sử dụng

- Phân bón: sử dụng phân NPK (tỷ lệ 5: 10: 3 hoặc có tỷ lệ tương đương) hoặc phân vi sinh.

STT	Thời điểm sử dụng	Phân NPK (Kg/cây)	Phân vi sinh (Kg/cây)
Năm thứ nhất	Bón lót khi trồng	0,2	0,3
	Bón khi chăm sóc	0,3	0,4
Năm thứ 2	Bón khi chăm sóc	0,4	0,5
Năm thứ 3	Bón khi chăm sóc	0,4	0,5

(Tùy theo mục đích sản xuất và điều kiện thổ nhưỡng có thể điều chỉnh số lượng phân bón cho phù hợp)

- Cọc cắm giữ cây: có thể sử dụng cọc tre để cắm giữ cây ở giai đoạn mới trồng, số lượng mỗi cây 01 cọc.

2. Thời vụ trồng: trồng vào vụ xuân hè hoặc hè thu.

3. Kỹ thuật trồng

3.1. Làm đất

Những nơi úng, trũng, thoát nước kém phải lên luống trồng cây hoặc tạo rãnh thoát nước.

- Đào hố: khi đào hố để phần đất mặt tơi xốp một bên và phần đất phía dưới một bên. Kích thước hố đào: 40 x 40 x 40 cm.

- Lấp hố, bón lót: đưa phần đất mặt tơi xốp trộn với phân bón lót xuống đáy hố. Thời điểm bón lót và lấp hố tốt nhất là trước khi trồng từ 05 đến 10 ngày.

3.2. Khoảng cách và mật độ trồng

Loại cây	Khoảng cách trồng	Mật độ trồng tương ứng (Cây/ha)
Bàng, Hoa sữa, Sấu, Viêt, Phượng vĩ, Đa, Bằng lăng, Osaka, Ngọc Lan, Liễu, Bách tán, Lộc vừng, Vọng cách, Cau búng, Cau Sâm panh, Vôi, Tùng, Quế, Đàn hương, Long não, Chuông vàng	Cây cách cây 5m, hàng cách hàng 5m	400
Sanh, Si	Cây cách cây 2m, hàng cách hàng 3 m	1500

3.3. Trồng cây

- Trồng cây vào những ngày râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm (tránh ngày nắng nóng trên 30°C hoặc gió bão). Rải cây giống đến đâu, trồng ngay đến đó và trồng hết trong ngày. Dùng vật dụng như cuốc, xẻng, xuống...đào giữa hố trồng với kích thước đủ để đặt bầu cây.

- Khi trồng cây phải xé bỏ vỏ bầu, đặt cây thẳng đứng vào giữa hố, lấp đất đầy hố cao hơn cổ rễ từ 01 đến 02 cm, lèn chặt đất xung quanh bầu, tránh làm vỡ bầu; nếu địa hình bằng phẳng, lấp hố đầy hình mâm xôi cho thoát nước; nơi địa hình dốc, lấp hố thấp hơn hoặc bằng miệng hố để giữ ẩm; thu dọn vỏ bầu sau khi trồng, đảm bảo vệ sinh môi trường.

3.4. Chăm sóc

- Trồng dặm: sau khi trồng 15 ngày, tiến hành kiểm tra tỷ lệ cây sống và trồng dặm những cây bị chết;

- Chăm sóc năm thứ nhất: sau 2-3 tháng kể từ thời điểm trồng, tiến hành phát cỏ, vun gốc và bón phân chăm sóc theo tỷ lệ;

- Chăm sóc năm thứ 2 và năm thứ 3: thực hiện vào đầu mùa sinh trưởng, tiến hành phát cỏ, dây leo, tỉa cành, vun gốc và bón phân theo tỷ lệ.

3.5. Bảo vệ

- Cây trồng cần được kiểm tra, bảo vệ thường xuyên, kịp thời ngăn chặn gia súc phá hoại.

- Thường xuyên theo dõi tình hình sâu bệnh: khi sâu bệnh xuất hiện phải phòng, trừ theo tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh./.