

Задача 1: Найти базис линейной оболочки системы векторов

Найти какой-нибудь базис пространства X , заданного в виде линейной оболочки векторов $\{x_i\}_{i=1}^m$.

Данные:

$$x_1 = (-1 \ 4 \ -3 \ -2)^T, \quad x_2 = (3 \ -7 \ 5 \ 3)^T, \\ x_3 = (3 \ -2 \ 1 \ 0)^T, \quad x_4 = (-4 \ 1 \ 0 \ 1)^T.$$

Решение:

1. Для нахождения базиса пространства X , заданного в виде линейной оболочки системы векторов, нужно выделить в этой системе максимальную линейно независимую подсистему.
2. Составим матрицу из исходных векторов, разместив их по строкам:

$$\begin{pmatrix} -1 & 4 & -3 & -2 \\ 3 & -7 & 5 & 3 \\ 3 & -2 & 1 & 0 \\ -4 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Теперь пространство X является линейной оболочкой строк этой матрицы. Нам нужно найти базис пространства строк этой матрицы.

3. Для нахождения базиса пространства строк этой матрицы приведём её к ступенчатому виду, используя элементарные преобразования строк. Мы знаем, что любую матрицу можно привести к ступенчатому виду.
4. Умножим первую строку на 3 и вычтем её из второй и третьей строк, и умножим первую строку на 4 и вычтем её из четвёртой строки. Получим матрицу

$$\begin{pmatrix} -1 & 4 & -3 & -2 \\ 0 & 5 & -4 & -3 \\ 0 & 10 & -8 & 6 \\ 0 & 17 & -12 & 9 \end{pmatrix}.$$

5. Умножим вторую строку на 2 и вычтем её из третьей строки, и умножим вторую строку на $\frac{17}{5}$ и вычтем её из четвёртой строки. Получим матрицу

$$\begin{pmatrix} -1 & 4 & -3 & -2 \\ 0 & 5 & -4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{4}{5} & \frac{9}{5} \end{pmatrix}.$$

6. Видим, что одна из строк оказалась нулевой. Это означает, что она была линейной комбинацией предыдущих строк. Нулевую строку можно не писать — уберём её. Получим матрицу

$$\begin{pmatrix} -1 & 4 & -3 & -2 \\ 0 & 5 & -4 & -3 \\ 0 & 0 & -\frac{4}{5} & \frac{9}{5} \end{pmatrix}.$$

Она имеет ступенчатый вид. Её ненулевые строки являются базисом пространства строк исходной матрицы.

7. Таким образом, в качестве базиса пространства X можно взять векторы

$$(-1 \ 4 \ -3 \ -2)^T, \quad (0 \ 5 \ -4 \ -3)^T, \quad (0 \ 0 \ -\frac{4}{5} \ \frac{9}{5})^T.$$

8. Из соображений удобства можно сделать все векторы целочисленными. Для этого нужно умножить последний вектор на 5. Получим вектор $(0 \ 0 \ -4 \ 9)^T$.

Ответ:

$$(-1 \ 4 \ -3 \ -2)^T, \quad (0 \ 5 \ -4 \ -3)^T, \quad (0 \ 0 \ -4 \ 9)^T.$$