数学 2.2 基本不等式 人教A版 必修第一册 · 零基础首学版 v1.0 · 2026-10-31

开场一句话：上一节我们用不等式的性质做"比较大小"，这一节要认识一条大名鼎鼎的公式级不等式——它长得很像乘法公式的"不等号亲戚"，是高中求最大值、最小值的第一把钥匙。教材原话："是否也有一些不等式，它们在解决不等式问题时有着与乘法公式类似的重要作用呢？"（p44）

读完这节你能：

- 从完全平方公式出发，亲手推出基本不等式，并说清"当且仅当 a=b"的含义；
- 用半圆几何图解释 √ab ≤ (a+b)/2 为什么成立；
- 背出并会查"最值双引擎"：积定和最小、和定积最大；
- 解出教材例1、例3、例4 这一类的最值题，并验证等号取得到。

预备预备块：你初中就有两件旧工具

旧工具一（完全平方公式）：$(a\pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$，展开永远不错位。

旧工具二（平方非负）：任何实数的平方不小于 0，即 $x^2 \geq 0$，等号当且仅当 x=0。就这两件，本节全靠它们起家。

第一步重要不等式：从 $(\mathbf{a-b})^2$ 里长出来的不等号

把平方非负用在 $(a-b)$ 上：$(a-b)^2 \geq 0$。展开：

$$a^2 - 2ab + b^2 \geq 0 \implies a^2 + b^2 \geq 2ab$$

当且仅当 a=b 时（此时 $(a-b)^2=0$），等号成立。教材称它为重要不等式（p44，$\forall a, b \in R$）。

验一验①：取 a=3，b=5：$a^2+b^2=34$，$2ab=30$，$34 \geq 30$ ✓；取 a=b=2：8=8，等号成立 ✓。对号入座：左边减右边=$(\mathbf{a-b})^2$，永远非负。

易错变形："$a^2+b^2 \geq 2ab$"对 所有实数 都成立，别只记正数情形。

特别地，如果 $a>0$，$b>0$，用 $\sqrt{a}$、$\sqrt{b}$ 分别代替上式中的 a、b（教材原句），得：

$$\sqrt{ab} \leq (a+b)/2 \quad (1) \quad \text{当且仅当 } a=b \text{ 时等号成立}$$

教材 p44：通常称不等式(1)为基本不等式（basic inequality）。

第二步两个平均数：算 ≥ 几，外加一张半圆图

基本不等式里的两个"主角"（p44 原文定义）：

名字	式子	一句话
算术平均数	(a+b)/2	加起来除以 2（平常说的"平均"）
几何平均数	√ab	乘起来开平方

所以基本不等式读作：两个正数的算术平均数不小于它们的几何平均数（p44 原句）。




图 2.2-1（依教材 p45 复刻）

半圆几何解释：AB 是直径，C 在 AB 上，AC=a，BC=b，过 C 作 AB 的垂线交半圆于 D。可证 △ACD ∽ △DCB，于是 CD=√ab；而 CD ≤ 半径=(a+b)/2。当且仅当 C 与圆心重合（a=b）时，CD 恰好等于半径，等号成立。（p45 原文逻辑）

分析法证明（教材 **p44** 五步链，倒着读就是"显然成立"）：要证 $\sqrt{ab} \le \frac{a+b}{2}$（①），只要证 $2\sqrt{ab} \le a+b$（②），只要证 $2\sqrt{ab} - a - b \le 0$（③），只要证 $-(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 \le 0$（④），只要证 $(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 \ge 0$（⑤）。⑤显然成立，当且仅当 a=b 时⑤中的等号成立。每一步"只要证"都是可逆的等价变形，所以链条成立。

第三步最值双引擎：积定和最小，和定积最大

教材例2（p45-46）给出一对"发动机"，考试九成最值题由它们变形而来：

发动机	条件	结论（当 **x=y** 时等号成立）
① 积定 → 和最小	xy = P（定值）	x+y 有最小值 **2√P**
② 和定 → 积最大	x+y = S（定值）	xy 有最大值 **S²/4**

证明骨架（①）：(x+y)/2 ≥ √xy = √P，所以 x+y ≥ 2√P；等号当且仅当 x=y。（②）同理：√xy ≤ (x+y)/2 = S/2，所以 xy ≤ S²/4。

用引擎前必查"一正二定三相等"：①字母全为正；②积或和确实是定值；③等号能取到（x=y 在允许范围内有解）。三查缺一，结论报废。

教材例1（p45）：已知 x＞0，求 x + 1/x 的最小值。解：x + 1/x ≥ 2√(x·1/x)=2，当且仅当 x=1/x 即 x=1 时等号成立，最小值为 2。教材"想一想"追问：当 $y_0<2$ 时，x+1/x ≥ y_0 恒成立，但 y_0 不是最小值——因为 2 这个值确实取得到，而 $y_0<2$ 取不到。这就是"三相等"要查的原因。

验一验②（负数不能用引擎）：x＜0 时，x + 1/x 有最大值还是最小值？**x+1/x = −[(−x)+(−1/x)] ≤ −2**，最大值 -2（**x=−1** 时取到）。引擎只对正数有效，负数要提出负号再造。

易错变形（和没定）：x + 4/x（x＞0）最小值是 2√4=4？✓（x=2 取到）；但 x + 4/x² 想套"积定"就没那么直接——x·(4/x²)=4/x 不是定值，引擎失效，不能硬套。

验一验③（升幂变形）：x＞0 时 x² + 1/x² 的最小值？配成 **(x+1/x)²** − 2 ≥ 2² − 2 = 2，当 **x=1** 时取到（教材 **p46** 练习3）。

验一验④（等号取不到的经典）：x∈(0, 4)，求 x + 16/x 的最小值。若硬套得 8（**x=4** 取到），但 **x=4** 不在开区间内！真最小值在 **x→4⁻** 处逼近 8 却取不到，此题无最小值——"三相等"第三查就是防这个。

（拓展 · 可跳过）综合运用4（p49）：x，y，z 都是正数，(x+y)(y+z)(z+x) ≥ 8xyz。骨架：x+y ≥ 2√xy，y+z ≥ 2√yz，z+x ≥ 2√zx，三式连乘即得，等号当 x=y=z。这是"双引擎"的连乘放大版。

（拓展 · 可跳过）拓广探索7（p49）天平称黄金：不等臂天平两次各称得 a g、b g，顾客实得 √ab g，由 √ab ≤ (a+b)/2 = 5 g 知总重 小于 10 g——几何平均数严格小于算术平均数（a≠b 时），顾客吃亏。

第四步实战两例：把引擎装到应用题上

教材例3（**p46-47**）矩形菜园。（1）用篱笆围一个面积为 100 m² 的矩形菜园，边长多少时篱笆最短？设两边 x，y（m），xy=100，篱笆长 2(x+y) ≥ 2×2√(xy) = 40，当且仅当 x=y=10 时等号成立——边长 10 m 的正方形，最短篱笆 40 m。这里是"积定和最小"。

（2）用一段长为 36 m 的篱笆围矩形菜园，边长多少时面积最大？2(x+y)=36，xy ≤ ((x+y)/2)² = 81，当且仅当 x=y=9 等号成立——边长 9 m 的正方形，最大面积 81 m²。"和定积最大"。（教材 p47 解答逐句锚定）

教材例4（**p47-48**）无盖贮水池。容积 4800 m³、深 3 m，池底造价 150 元/m²，池壁 120 元/m²。设底面两边 x，y（m），总造价 z = 150×(4800/3) + 120(2×3x+2×3y) = 240000 + 720(x+y)；由 3xy=4800 得 xy=1600，所以 z ≥ 240000 + 720×2×40 = 297600，当且仅当 x=y=40 时等号成立——池底设计成边长 40 m 的正方形，最低总造价 297600 元（p48 解答逐句锚定）。

> 验一验⑤（教材 **p48** 练习1）：用 20 cm 铁丝折面积最大的矩形：周长定 20，和定积最大，x=y=5，最大面积 25 cm²。两问同构：一边靠墙（练习2）时 "30−2**x ≤ 18**" 的墙长限制要单独检查，**x=7.5** 合法，最大面积 112.5 **m²**。

收口三句话带走 + 自测四连

三句话带走：

- ① $(a-b)^2\geq 0 \Rightarrow a^2+b^2\geq 2ab$；换元得 $\sqrt{ab}\leq (a+b)/2$（$a,b>0$，当且仅当 $a=b$ 等号成立）；
- ② 半圆图里：半弦 $CD=\sqrt{ab}$ 永不高于半径 $(a+b)/2$，C 与圆心重合时相等；
- ③ 求最值先查一正二定三相等：积定→和最小 $2\sqrt{P}$；和定→积最大 $S^2/4$。

自测四连（先做再看答案，全部取自教材本节域）：

1. 判断结构：$\forall a,b\in R$，"$a^2+b^2\geq 2ab$"等号成立条件？答：$a=b$（p44 原句）。
2. 教材 **p48** 练习3：x 取何值时 x^2+1/x^2 最小？答：$x=1$ 时最小值 2（$x^2+1/x^2=(x+1/x)^2-2\geq 4-2=2$）。
3. 教材 **p48** 习题2.2 复习巩固1(1)：$x>1$，求 $x+1/(x-1)$ 的最小值。答：拆 $(x-1)+1/(x-1)+1\geq 2+1=3$，当 $x=2$ 时取到。
4. 教材 **p48** 习题2.2 复习巩固1(2)：求 $\sqrt{(x(10-x))}$ 的最大值。答：$x(10-x)\leq ((x+10-x)/2)^2=25$（$0<x<10$），最大值 5，$x=5$ 时取到。

高考怎么考 · 考位锚（**T11**）

· 基本不等式最值是高考小题常客：正数条件下的"和定积最大/积定和最小"+ 三相等检验；
· 多以"分式代数式最值、实际应用（篱笆/造价/材料）"形态出现；
· 本节暂未收录对口真题，候补。

下一站：2.3 二次函数与一元二次方程、不等式——本节磨好的最值引擎，下一站装到二次函数身上（p50 起）。



位置图：2.2 是承上（2.1 不等式性质）启下（2.3 二次不等式）的工具节；节界 p44-49，p50=2.3 节题页）。

—— 本件节界：2.2 全节 p44-49（p44 节题页·p49 习题2.2 拓广探索尾·p50=2.3 节题页边界）。