铁的多样性：一张"价-类二维地图"走遍铁的化合态与游离态

化学 3.1 · 第3章 物质的性质与转化（鲁科版《普通高中教科书·化学 必修 第一册》·山东科学技术出版社·正文 p86–96）

📍 本件属于第3章"物质的性质与转化"模块首节，前面已学：2.3氧化还原反应（电子转移·氧化剂还原剂·价态趋势）。没读过2.3？看这句就够：化合价升高=失电子=被氧化，化合价降低=得电子=被还原——本节全程用这把钥匙开铁的锁。

看教材p86那张大图（图3-1-1）：绿矾晶体$FeSO_4·7H_2O$、实验室的铁粉、黄色的$FeCl_3$溶液、黄铁矿FeS_2、磁铁矿Fe_3O_4、赤铁矿Fe_2O_3，还有墙上的红色涂料、家里的铁锅、药盒里的补铁保健品——全都是"铁"。

同一个元素，在不同物质里"性格"完全不同：有的能被磁铁吸住，有的能让血红蛋白扛着氧气跑，有的能把铜从溶液里"顶"出来。教材说：铁元素在地壳中的含量仅次于氧、硅和铝元素（p86原句），自然界里有的以游离态（如陨铁）存在，更多的以+2价或+3价的化合态存在。

本节干一件事：给铁建一张"价-类二维地图"——纵轴0／+2／+3三种价态，横轴单质／氧化物／盐／碱四类物质，铁的全部"性格"与"路线"都画在这张图上。

读完这节你能

① 用物质类别+核心元素化合价两个基本角度预测含铁物质的性质（教材p88方法导引原思路）；

② 会用**KSCN**溶液检验Fe^{3+}，说清铁盐的氧化性、亚铁盐的"两性"（既氧化又还原）；

③ 画出铁的价-类二维图并标注转化路线（同价态走复分解、异价态走氧化还原）；

④ 设计补铁剂中铁元素价态检验的实验方案（教材学生必做实验）。

先拆掉两个旧印象

误会一："铁锈就是**Fe_3O_4**"。铁锈的主要成分是**Fe_2O_3**（红棕色粉末）——所以油漆、涂料、油墨用它当红色颜料（p90原句）；**Fe_3O_4**是黑色有磁性的固体（磁铁矿·磁性材料），跟铁锈不是一回事。

误会二："+2价的铁盐也叫'铁盐'"。教材的命名规矩（p87）：含+2价铁的盐叫亚铁盐（硫酸亚铁$FeSO_4$、氯化亚铁$FeCl_2$），含+3价铁的盐才叫铁盐（硫酸铁、氯化铁$FeCl_3$）。一个"亚"字，价态差1、性质两重天。

名词补齐 游离态：元素以单质形式存在（如陨铁里的Fe）；化合态：元素藏在化合物里（如Fe_2O_3）。**KSCN**（硫氰酸钾）：一种盐，它的SCN^-遇到Fe^{3+}会让溶液变红色——本节的"显色试剂"（p88）。

第1步 研究物质的两个基本角度

教材方法导引（p88蓝框原思路）：在研究物质的性质时，可以从物质类别、物质所含核心元素的化合价这两个基本角度预测物质可能具有的性质，并通过实验进行验证。本章所有节都用这把"双角度"尺子，本节拿铁先示范一遍。

活动·探究（学生必做实验）：亚铁盐和铁盐的性质（**p87**）

实验用品（p87原单）：$FeSO_4$溶液、$FeCl_3$溶液、NaOH溶液、酸性$KMnO_4$溶液、氯水、KSCN溶液、KI溶液、淀粉溶液、铁粉、锌片、铜片；试管、胶

头滴管、镊子、药匙。安全提示：氯水、稀硫酸、酸性$KMnO_4$等有腐蚀性，沾到皮肤立即大量清水冲洗。

预测（两把尺子齐上）：

① 类别角度——亚铁盐、铁盐都属于盐，都能与碱溶液反应生成相应的铁的氢氧化物（p88原句）；

② 价态角度——铁盐含+3价铁（最高价·只能降）→可能具氧化性；亚铁盐含+2价铁（中间价·可升可降）→既可能氧化性又可能还原性。

> 卡住了？换个说法 把"+2价中间价态"想成楼层：+3是顶楼、0是地面。住在顶楼的Fe^{3+}只能下楼（被还原=氧化剂）；住地面的Fe单质只能上楼（被氧化=还原剂）；住中间的Fe^{2+}上下楼都行——先上去再下来，或者反过来，全看对手是谁。

第2步 铁盐的氧化性：**Fe^{3+}**的"抢电子"三连

先解决"怎么认出**Fe^{3+}**"：**KSCN**显色法（**p88**）

依据Fe^{3+}与SCN^-反应使溶液显红色的性质，可以用KSCN溶液检验Fe^{3+}的存在（p88原句）——$FeCl_3$溶液滴加KSCN，黄色变红色（图3-1-2）。这一手后面每个实验都要用，先装进口袋。

从化合价的角度看，铁盐因含有+3价铁元素而具有氧化性（p88原句）。三个经典离子方程式（p88蓝底原式）：


```
2Fe³⁺ + Fe = 3Fe²⁺
```

```
2Fe³⁺ + Cu = 2Fe²⁺ + Cu²⁺
```

```
2Fe³⁺ + 2I⁻ = 2Fe²⁺ + I₂
```

三个式子一个道理：Fe^{3+}降价（+3→+2·被还原·做氧化剂），对手Fe/Cu/I^-升价（被氧化）。注意第一式——**Fe^{3+}**连"自己人"单质铁都抢电子，这正是工业

上"$FeCl_3$溶液腐蚀铜箔制印刷电路板"（p96 T12）与"$FeCl_2$溶液里加铁粉防变质"（p95 T11）的原理两头。



图A 铁三角转化图——0／+2／+3三个价态间"谁抢谁、谁被抢"的全部路线（依p88-89离子方程与价态趋势重绘）

⚡ 30秒自验 1

$FeCl_2$溶液和$FeCl_3$溶液各是什么颜色？（p94练习T2的易错点）

$FeCl_2$浅绿色（亚铁·+2价）——不是黄色；**$FeCl_3$**黄色（铁·+3价）。答完再想一层：颜色也是"价态身份证"的一部分。

第3步 亚铁盐的两性：上下楼都行的Fe^{2+}

亚铁盐因含有+2价铁元素，既具有氧化性，又具有较强的还原性（p88-89原句）。两个方向各给实证（p89）：

① 表现氧化性（Fe^{2+}降价+2→0）：与金属锌反应，Fe^{2+}被还原为铁单质——$Fe^{2+} + Zn = Zn^{2+} + Fe$；

② 表现还原性（Fe^{2+}升价+2→+3）：与氯水反应，$2Fe^{2+} + Cl_2 = 2Fe^{3+} + 2Cl^-$；与酸性$KMnO_4$溶液反应，紫色褪去（图3-1-4、图3-1-5两个实物对照实验）。

易错 检验Fe^{2+}的还原性时，"变色"的证人得选对：$FeSO_4$里先加好**KSCN**不变红（证明无Fe^{3+}），再滴氯水——变红（Fe^{3+}新生成）才能坐实Fe^{2+}被氧化（图3-1-4的原设计）。直接往$FeCl_3$里滴氯水什么也证不了。

⚡ 30秒自验 2

铁分别与氯气、盐酸反应，产物滴**KSCN**谁会变红？（**p95**练习**T7**原题）

只有氯气那管变红——Cl_2是强氧化剂直接把铁"送顶楼"（→Fe^{3+}）；盐酸里H^+是弱氧化剂只到Fe^{2+}（KSCN不认）。边界补一刀：$CuSO_4$那管也只到+2（$Fe+Cu^{2+}=Fe^{2+}+Cu$）。

随手解一道教材题：实验室怎么保存**$FeSO_4$**溶液？（**p87**思考4问·**p95 T11**）

答案两手：加少量铁粉（万一氧化出了Fe^{3+}，$2Fe^{3+}+Fe=3Fe^{2+}$就地"还原归队"）＋密封隔绝空气（防O_2慢慢氧化）。

第4步 铁单质、铁的氧化物、铁的氢氧化物（**p89-91**）

铁单质（0价·只能上楼）

纯净的铁（Fe，iron）是光亮的银白色金属，密度为**7.86 g·cm⁻³**，熔点为1538℃。纯铁的抗腐蚀能力很强，具有良好的延展性和导热性，导电性比铜、铝差，能被磁铁吸引（p90原句）。化学上：与稀盐酸、稀硫酸发生置换

反应放出氢气（0→+2·还原剂本色）；与某些盐溶液发生置换反应生成亚铁盐（如Fe+$CuSO_4$）；不能与冷水、热水反应，但能与水蒸气在高温下反应（p89）：

$$3Fe + 4H_20(g) \xrightarrow{高温} Fe_3O_4 + 4H_2$$

图3-1-6装置：硬质试管里湿棉花（水源）+还原铁粉，加热后肥皂液里吹出气泡——点火有爆鸣声=氢气（实验现象分析见p89交流·研讨2问）。

三种氧化物（+2／+2与+3混合／+3）

FeO（氧化亚铁）是一种黑色粉末，可以用作色素，如应用于瓷器制作中使釉呈绿色；**Fe_3O_4**（四氧化三铁）是具有磁性的黑色固体，是一种常用的磁性材料；**Fe_2O_3**（三氧化二铁）是一种红棕色粉末，常用作油漆、涂料、油墨的红色颜料。铁的氧化物都不溶于水，也不与水反应。氧化亚铁和三氧化二铁都是金属氧化物，它们皆能与稀盐酸或稀硫酸发生反应，生成相应的亚铁盐或铁盐（p90原句）：

$$Fe0 + 2H^+ = Fe^{2+} + H_20 \qquad Fe_2O_3 + 6H^+ = 2Fe^{3+} + 3H_20$$

（注：Fe_3O_4中Fe为+2、+3混合价态·教材本页未展开其与酸的离子方程——留待后续课程。）


两种氢氧化物：一个"短命"，一个"稳定"（**p90-91**）

$Fe(OH)_2$[iron(II) hydroxide]白色固体，难溶于水；**$Fe(OH)_3$**[iron(III) hydroxide]红褐色固体，也难溶于水。都能与稀盐酸或稀硫酸反应（复分解·同价态路线）：

$$Fe(0H)_2 + 2H^+ = Fe^{2+} + 2H_20 \qquad Fe(0H)_3 + 3H^+ = Fe^{3+} + 3H_20$$

价态角度：$Fe(OH)_2$里铁+2价（可升）→很不稳定，容易被氧化。$FeSO_4$溶液与NaOH溶液反应产生的白色沉淀，在空气中迅速变成灰绿色，最后变成红褐色——被O_2氧化成$Fe(OH)_3$的"变色三连"（p90-91原句+图3-1-8）：

$$4Fe(0H)_2 + 0_2 + 2H_20 = 4Fe(0H)_3$$



图C 白→灰绿→红褐变色三连——Fe(OH)₂被空气中O₂氧化的全程（依p91图3-1-8复绘）


红笔旁批：这"白→灰绿→红褐"是高中化学最著名的颜色序列之一，实验题问"预测现象"就按这个顺序写全三段，只写两端要丢分。

第5步 转化关系：把全部路线画成一张图（**p91-93**）

教材交流·研讨（p91）：在"价—类"二维图（纵轴0／+2／+3价，横轴单质／氧化物／盐／碱）上标注含铁物质并画转化箭头。铁及其化合物之间存在两种转化关系（p91原句）：

① 含有相同价态铁元素的物质之间的转化——可借助复分解反应等实现；

② 含有不同价态铁元素的物质之间的转化——可借助氧化还原反应实现。



价—类二维图（依教材p93"概括·整合"示例复绘）

图B 铁的价—类二维地图——纵轴价态0／+2／+3·横轴单质／氧化物／盐／碱·实线箭头为转化路线（依p93"概括·整合"示例图复绘）

这张图怎么用？看两个实例：制备——想要$Fe(OH)_3$，就从图上找Fe^{3+}（如$FeCl_3$）加碱走复分解；想要Fe单质，就找含+2、+3价的东西还原（工业高炉/铝热p89）。保存——亚铁盐怕氧化，加铁粉"备一个向下拉的把手"（$2Fe^{3+}+Fe=3Fe^{2+}$）。

活动·探究（学生必做实验）：补铁剂中铁元素价态的检验（**p92**）

背景（p92原句）：补铁口服液是常见的补铁剂，其中除了含铁化合物外，还常添加抗氧化物质（如维生素C）、甜味剂、香精等。例如，某补铁口服液100 mL含铁元素**20~30 mg**、维生素C**200~300 mg**。实验目的：检验某补铁口服液中铁元素的价态。实验用品：某补铁口服液、H_2SO_4溶液、NaOH溶液、酸性$KMnO_4$溶液、氯水、KSCN溶液；试管、胶头滴管。

参考方案（教材原表为学生填写·成稿给出供对照）：

实验步骤	实验现象	实验结论
取口服液稀释，滴加KSCN溶液	不变红	无Fe^{3+}（或量极少）
另取稀释液滴加酸性$KMnO_4$溶液	紫色褪去	含还原性Fe^{2+}（被氧化为Fe^{3+}）
再取稀释液滴加NaOH溶液	白色沉淀→灰绿→红褐	旁证Fe^{2+}（三段变色）

（思考3问的钥匙：①方案涉及$Fe^{2+}\rightarrow Fe^{3+}$转化·因KSCN只认$Fe^{3+}$不认$Fe^{2+}$，需"先转化后显色"的间接思路；②不能用NaOH直接检验价态——两种氢氧化物都立刻变色且$Fe(OH)_2$极不稳定；③维C等抗氧化成分可能先于Fe^{2+}还原$KMnO_4$造成干扰·需对照实验排除。）

第6步 身边的化学：铁元素与人体健康（**p93**）

铁元素是人体中含量最高的生命必需微量元素，承担着极其重要的生理功能。血红蛋白分子含有Fe^{2+}——正是这些Fe^{2+}使血红蛋白分子具有载氧功能，能将肺部吸入的氧气输送到全身各组织，供细胞使用；若Fe^{2+}被氧化成Fe^{3+}，血红蛋白分子就会丧失载氧能力，使人体出现缺氧症状（p93原句——"价态决定性质"在身体里的版本）。人体只能吸收**Fe^{2+}**；维生素C具还原性，能把Fe^{3+}

还原成Fe^{2+}促进吸收——所以补铁剂里要加维C，吃菠菜时配点维C高的水果也是同款道理（p93框原意）。

练习与活动（**p94–96**）·答案速查

高考怎么考（考位导览·三行）

① KSCN检验+离子方程式书写（Fe^{3+}/Fe^{2+}转化）——选择题与填空双高频；② 实验方案设计（价态检验/除杂/保存）——实验题核心素材；③ 价-类二维图转化路线——推断题骨架。命题频率：高（元素化合物主干节·学生必做实验双落点）。

T1 连线（**p94**）：具有磁性的黑色固体→**Fe_3O_4**｜治疗缺铁性贫血→亚铁盐｜涂料红色颜料→**Fe_2O_3**｜保存亚铁盐溶液→铁单质｜空气中很不稳定→**$Fe(OH)_2$**｜遇**KSCN**变色→铁盐。

T2 不正确的是 **A——$FeCl_2$**是浅绿色不是黄色（**$FeCl_3$**才黄）。

T3 与稀盐酸反应且铁元素被氧化的是 **A**（**Fe**）**——0→+2**；**B/C/D**铁价态不变（复分解）。

T4 **Fe^{3+}**表现氧化性的是 **A**——使淀粉碘化钾试纸变蓝（**$2Fe^{3+}+2I^-=2Fe^{2+}+I_2$**）；**B/C**为复分解·**D**中**$Fe^{3+}$**在变化但问的是"表现氧化性"且**D**是**Fe^{3+}**被还原的题眼变体（铁粉消失=**$Fe^{3+}\rightarrow Fe^{2+}$**）——按题意答案**A**（试纸变蓝是**$I^-$**被氧化的直接证据）。

T5 不能一步实现的是 **D——Fe**与**HCl**只能到**$FeCl_2$**（**H^+**是弱氧化剂）；**A**（**Cl_2**强氧化剂直接+3）**/B**（点燃+**O_2**）**/C**（高温水蒸气）均可一步。

T6 讨论**Fe^{2+}**的还原性：理论（+2中间价可升）→实验事实（被**Cl_2**/酸性**$KMnO_4$**/H_2O_2氧化·**p89**图3-1-4/3-1-5）→实际应用（**$FeSO_4$**保存加铁粉·防**O_2**）。

T7 与铁反应产物能与**KSCN**显红的是 **B**（氯气）——**Cl_2**把**Fe**氧化到+3；盐酸/稀硫酸/**$CuSO_4$**都只到+2。

T8 错误的是 **B**——事实是**Cl_2**氧化**Fe^{2+}**，氧化性**$Cl_2 > Fe^{3+}$**（不能反写）；**A/C/D**均对。

T9 不会出现的是 **D**（有铁无铜）——**Fe^{3+}**先氧化谁？**Cu**还原性＜**Fe**，若连**Cu**都没反应完铁不可能消失；"铁、铜均无"只在**Fe^{3+}**足量时出现（**D**为不可能·因铁粉先失电子）。（解析为成稿给出）

T10 除杂：**$FeCl_2$**中除**$FeCl_3$**→加过量铁粉后过滤（**$2Fe^{3+}+Fe=3Fe^{2+}$**）；**$FeCl_3$**中除**$FeCl_2$**→通足量**Cl_2**（**$2Fe^{2+}+Cl_2=2Fe^{3+}+2Cl^-$**·不引入新杂质）。

T11 探究**$FeCl_2$**：（**1**）加铁粉目的=防止**Fe^{2+}**被空气氧化；（2）预测依据=**Fe**为+2价中间价态·既可升可降；（3）①滴氯水探究的是**Fe^{2+}**的还原性·**$2Fe^{2+}+Cl_2=2Fe^{3+}+2Cl^-$**；②选**KSCN**溶液·变红；③证明氧化性：向**$FeCl_2$**溶液加入锌片，锌片表面析出黑色（灰）固体、溶液质量变化——**$Fe^{2+}+Zn=Zn^{2+}+Fe$**（解析为成稿给出）。

T12 印刷电路板：（1）**$2Fe^{3+}+Cu=2Fe^{2+}+Cu^{2+}$**·未被油墨覆盖的**Cu**被**$Fe^{3+}$**氧化溶解；（2）①**Fe**（过量铁粉）②**$FeCl_2$** ③**Cu**与**Fe**（滤渣）④盐酸（过量·溶**Fe**留**Cu**）⑤**$FeCl_2$** ⑥**Cl_2**（合并滤液通氯气重获**$FeCl_3$**）；**B**方程式：**$Fe+2FeCl_3=3FeCl_2$**／**$Fe+2HCl=FeCl_2+H_2\uparrow$**／**$2FeCl_2+Cl_2=2FeCl_3$**（解析为成稿给出）。

三句话带走 + 自测四连

① 研究铁的"双角度"：类别定通性（盐遇碱沉淀·碱性氧化物遇酸成盐），价态定性格（+3只降=氧化剂·0只升=还原剂·+2上下都行）；

② 一句口诀挂墙上：三点一线记转化——同价态复分解换装、异价态氧化还原搬家；KSCN专认Fe^{3+}（红）；

③ 最容易错：Fe^{2+}检验要先"藏起Fe^{3+}"再变红（图3-1-4设计）；颜色三连白→灰绿→红褐写全；除杂选试剂"不引新杂质"。

⚡ 自测四连（先做再看答案·答案直接可见）

1. $Fe_2O_3+6H^+=2Fe^{3+}+3H_2O$属于氧化还原反应吗？

不属于——Fe+3→+3、H+1→+1，全无升降，纯复分解（同价态路线）。

2. 把**Fe^{3+}**变**Fe^{2+}**，选铁粉还是氯水？

铁粉（$2Fe^{3+}+Fe=3Fe^{2+}$·Fe^{3+}被还原）；氯水干的是反方向（把Fe^{2+}变Fe^{3+}）。

3. 补铁剂里加维**C**，用了铁的哪条性质？

维**C**的还原性——把可能被氧化的Fe^{3+}拉回Fe^{2+}（人体只吸收Fe^{2+}·p93），呼应"剂性正相反"。

4. $Fe(OH)_2$白色沉淀久置为什么最后是红褐色而不是"铁锈色"焦虑？

就是被**O_2**氧化成了**$Fe(OH)_3$**（红褐）——$4Fe(OH)_2+O_2+2H_2O=4Fe(OH)_3$；"灰绿色"是过渡态的中间颜值。

真题锚 高考真题实证

2023年6月浙江卷·第3题（2分）：氯化铁是一种重要的盐，下列说法不正确的是（　）

A. 氯化铁属于弱电解质　B. 氯化铁溶液可腐蚀覆铜板　C. 氯化铁可由铁与氯气反应制得　D. 氯化铁溶液可制备氢氧化铁胶体

答案 A。0基础版拆解：先写依据——盐是不是弱电解质，看它溶于水后“是否还有分子形态存在”：$FeCl_3$ 是盐，溶于水完全电离出 Fe^{3+} 和 Cl^-，属于强电解质（H_2O 参与“微弱水解”是另一件事，不改变“盐=强电解质”的判定）；代数——B 覆铜板腐蚀是 $Fe^{3+}+Cu$ 反应（+3→+2 有氧化性）✓；C 铁在氯气中燃烧 $Fe+Cl_2\rightarrow FeCl_3$（强氧化剂把铁拉到最高价）✓；D 沸水中滴饱和 $FeCl_3$ 溶液制 $Fe(OH)_3$ 胶体 ✓；读答案——A 说法不正确，选A。这题把本节“高价态有氧化性”的尺子放进四个真实用途里考。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 一道挑刺 + 一道解答，全做完再看块末“答案与解析”。

选择1（易·自编） 下列关于铁及其化合物的说法正确的是（　）
A. Fe_2O_3 是黑色固体　B. $FeSO_4$ 溶液呈浅绿色　C. Fe_3O_4 中铁全部为 +2 价　D. Fe 与 Cl_2 反应生成 $FeCl_2$

选择2（中·自编） 能实现“$Fe^{3+}\rightarrow Fe^{2+}$”转化的是（　）
A. 加入氯水　B. 加入铁粉　C. 加入 KSCN 溶液　D. 加入稀盐酸

选择3（难·自编综合） 除去 $FeCl_2$ 溶液中少量 $FeCl_3$，最适宜的操作是（　）
A. 通入足量 Cl_2　B. 加入足量铁粉后过滤　C. 加入足量锌粉　D. 加入足量铜粉

填空（中·自编） 检验某溶液中含 Fe^{2+}：先滴加 KSCN 溶液无明显现象（排除 Fe^{3+} 干扰），再滴加_____（填一种试剂），溶液变红，证明原溶液含 Fe^{2+}。

挑刺（中·自编） 小华复习完说：“①Fe 与 Cl_2 反应生成 $FeCl_2$——铁常见 +2 价嘛；②$FeCl_2$ 溶液滴加 KSCN 会变红——它会转化出 Fe^{3+} 嘛。”请你把两处错都挑出来。

解答1（中·自编） 向 $FeSO_4$ 溶液中通入足量氯水后，再滴加 KSCN 溶液变红。⑴ 写出通氯水时发生反应的离子方程式，并标出电子转移的方向和数目；⑵ 解释溶液变红的原因。

答案与解析（先做完再看）：

选择1：**B**。Fe_2O_3 是红棕色固体（A 错——黑色的是 Fe_3O_4/FeO）；Fe^{2+} 水合离子浅绿色 ✓（B 对）；Fe_3O_4 是“+2 与 +3 混装”（1 个 +2、2 个 +3，C 错）；Cl_2 是强氧化剂，把铁直接拉到最高价生成 $FeCl_3$（D 错——生成 +2 价的是弱氧化剂 H^+）。


选择2：**B**。+3 → +2 是降价（被还原），需要还原剂：铁粉 ✓（$2Fe^{3+}+Fe=3Fe^{2+}$）。A 氯水是氧化剂（+2→+3 方向）；C 只显色不转化；D 不与 Fe^{3+} 作用。选B。

选择3：**B**。除杂三问：不引新杂、不耗主物、操作可行。A 方向反了（越除越多）；C 锌粉会与 $FeCl_2$ 继续反应还引入 Zn^{2+}；D 引入 Cu^{2+}（$Fe^{3+}+Cu=Fe^{2+}+Cu^{2+}$）；B 铁粉只“吃” Fe^{3+} 不引新杂，过量铁粉过滤即可 ✓。

填空：氯水（或 **H_2O_2** 等）。思路=“先藏后显”：KSCN 无现象说明原液无 Fe^{3+}；再加氧化剂把 Fe^{2+} 氧化成 Fe^{3+}，变红 → 反证原液含 Fe^{2+}。顺序不能反——先加氧化剂再 KSCN 无法区分原液里有没有现成的 Fe^{3+}。

挑刺：错①强氧化剂决定最高价——Fe 与 Cl_2 生成 $FeCl_3$（Cl_2 把铁拉到 +3）；生成 $FeCl_2$ 的是弱氧化剂 H^+（$Fe+2HCl=FeCl_2+H_2\uparrow$）。“铁常见 +2 价”不是和谁反应都 +2 的理由。错②变红要“真转化”不许“凭空转化”——纯 $FeCl_2$ 溶液不含 Fe^{3+}，滴 KSCN 不变红；说“会转化出 Fe^{3+}”得先有氧化剂真的反应了——检验结论必须有操作证据。

解答1：(1) $2Fe^{2+} + Cl_2 = 2Fe^{3+} + 2Cl^-$——$Fe^{2+}$ 失 2×1 个电子（+2→+3），Cl_2 得 2 个电子（0→-1）；电荷守恒核：左边 2×(+2)=+4，右边 2×(+3)+2×(-1)=+4 ✓。(2) 氯水把 Fe^{2+} 氧化成了 Fe^{3+}，Fe^{3+} 遇 SCN^- 生成红色络合物使溶液变红——变红正是“生成了 Fe^{3+}”的证据。格式示范：写方程 → 标电子转移 → 电荷守恒自查 → 现象归因。



图D 本节在模块中的位置——第3章首节·用2.3的氧化还原钥匙开铁的锁·通向3.2硫的转化