
第四章 指数函数与对数函数

章首地图：4.1 指数 → 4.2 指数函数 → 4.3 对数 → 4.4 对数函数 → 4.5 函数的应用（二）。本章回答一个总问题：**"乘法重复"和"它的逆"怎么长成一对函数、又怎么出门找零点？**判据链读完即可做题；节尾深读区给想深究的因果分析。前置依赖：2.3二次函数（零点老朋友）＋3.2单调性（判升降）。



第四章知识地图：指数运算 → 指数函数 → 对数 → 对数函数 → 应用（"互逆成对·域先行"一线贯穿）

怎么读这张图：从左到右是本章五步走——4.1备好指数运算，4.2/4.3成对引入指数与对数，4.4成对引入两个函数（对称互逆），4.5带它们出门解零点问题；每个节点末行是该节的判定核心词。

本包目录 课时开篇页 · 速览卡 · 正文 · 经典例题 · 易错卡 · 应试打法 · 深读区 · 费曼检验（学完立即做 · 2分钟） · 本节串联图 · 课时开篇页 · 速览卡 · 正文 · 经典例题 · 易错卡 · 应试打法 · 深读区 · 费曼检验（学完立即做 · 2分钟） · 本节串联图 · 课时开篇页 · 速览卡 · 正文 · 经典例题 · 易错卡 · 应试打法 · 深读区 · 费曼检验（学完立即做 · 2分钟） · 本节串联图 · 课时开篇页 · 速览卡 · 正文 · 经典例题 · 易错卡 · 应试打法 · 深读区 · 费曼检验（学完立即做 · 2分钟） · 本节串联图 · 课时开篇页 · 速览卡 · 正文 · 经典例题 · 易错卡 · 应试打法 · 深读区 · 费曼检验（学完立即做 · 2分钟） · 本节串联图 · 思维卡 · 翻译思维 · 自测三题

4.1 指数

课时开篇页

本节知识点清单：n次方根（定义/奇次根唯一偶次根双值）·根式性质两条（(ⁿ√a)ⁿ=a；ⁿ√(aⁿ)奇次直接脱、偶次出|a|）·分数指数幂（a^(m/n)=ⁿ√(a^m)=(ⁿ√a)^m，a>0）·根式与分数指数互化（优先指数记号）·负分数指数幂（a^(-m/n)=1/a^(m/n)）·0的分数指数幂（正的=0，负的无意义）·0次幂=1（规律递推的结果，不是硬规定）·无理指数幂（4.1.2，指数铺满实数轴）·有理指数幂运算性质三条（ar·as=ar+s、(ar)^s=ars、(ab)^r=ar·br）·根式化简三查（查指数奇偶/查底正负/负指数先倒数）·结果规范三件套（正指数/最简分式/底数不含根号）

学完这节你能做到（4条，全部可自查）：

1. 会做根式与分数指数幂的互化，并说清"两者是同一件事的两套记号"——奇次根直接脱、偶次根出绝对值、字母讨论先分段
2. 会解释 a^(1/2)=√a 这个定义是"推出来的"而不是"背出来的"：为了让整数指数的运算法则在分数域无伤延续，定义只剩这一个选择
3. 会用三条运算性质做幂的混合运算化简求值，交卷前过结果规范三件套（正指数、最简分式、底数不含根号）
4. 会处理"周期切分"类应用：知道"每期乘固定比例"用幂运算算总效果，也会用分数指数反推"平均每期的比例"

难点预警（3条，说话式）：

- **"$\sqrt{(a^2)}=a$"不总对**：偶次根出来的是绝对值——a=−1时$\sqrt{((-1)^2)}=1\neq -1$。平时例题底数多为正，你很少见到翻号现场，但考题专挑3−π、a−b这种"正负看情况"的里层给你
- **定义是推出来的，不是拍脑袋**：a^(1/2)=√a是"让旧法则在新领域继续成立"的唯一选择。跳过定义必然性直接背结论，到无理指数幂、再到4.2指数函数，链条会在某个环节断掉
- **分数指数默认a>0**：(−4)^(1/2)在实数域没有答案；(−1)^(2/2)按两种读法算出两个值。混算时不先声明字母为正，同式两值的陷阱就会等着你

前置依赖：初中乘方与开方互逆、整数指数幂与科学记数法·2.1等式性质（运算变形的背书）·3.2单调性（"底大底小怎么影响幂值"的直觉，本节先体感、4.2正式上岗）

速览卡

问题	答案
这节是什么	把"乘几次"推广到"乘几分之几次"——n次方根与分数指数幂是同一件事的两套记号；分数指数幂的定义由"让整数指数的运算法则无伤延续"倒推出来。指数从计数工具升级为连续缩放工具
为什么重要	单独考得少，但它是全章的运算能力底座：4.2指数函数、4.3对数的所有计算都踩在这节的互化与法则上。这节不过关，后面每道计算题都在替这节补课
怎么考	考频：低（单独）｜运算能力底座【讲解归纳·经验判断】。考位：①根式与分数指数互化、幂的混合运算化简求值（选填送分题为主）②偶次根出绝对值的符号讨论（$\sqrt{((3-\pi)^4)}$型，暗扣分点）③常作为对数题的前置步骤出现（先化简再取对数）④周期切分类应用以小计算渗透

正文

n次方根：开方是乘方的逆操作

如果 $x^n=a$，x就叫做a的n次方根。这条定义反过来读才是重点：**开方是乘方的逆操作**——但"逆"得有讲究，n的奇偶性决定逆操作的形状。

n为奇数：任意实数都有唯一的n次方根。$\sqrt[3]{(-8)}=-2$、$\sqrt[5]{(-32)}=-2$——负数也能开奇次方，符号照旧。$(\sqrt[n]{a})^n=a$与$\sqrt[n]{(a^n)}=a$两头都直接成立。

n为偶数：正数有两个n次方根（互为相反数），正的n次方根记作$\sqrt[n]{a}$；而$\sqrt[n]{(a^n)}=|a|$——**偶次根出来必须非负**。$\sqrt{((-10)^2)}=|-10|=10$，不是−10。

为什么偶次根要出绝对值？因为$\sqrt[n]{a}$（n为偶数）按定义指"那个非负的n次方根"，而(a^n)里a的正负随a变——负数平方变正，开回来就得把符号"拉回"非负。这不是计算技巧，是定义的直接后果。

◎ 辅助理解：根号像个"值域过滤器"——进来的数不论正负，偶次根号只放行非负的结果。忘掉过滤器直接"进出照抄"，负值就会漏网。

【到此记住】奇次根直接脱（含负数），偶次根出绝对值；$\sqrt[n]{(a^n)}=\{a$（n奇），$|a|$（n偶）$\}$。

分数指数幂：让旧法则无伤延续的定义

一个自然的问题：整数指数是"乘几次"，那"乘几分之几次"是什么意思？

先看一个真实情境：某培养物数量3天翻一倍，那么平均每天变为前一天的几倍？直觉说"每天乘一点点，3天乘够一倍"——这个"一点点"就是2^(1/3)。**没有分数指数，"增长的任意次切分"全部无解**；后面要学的半衰期、衰减率、放大缩放，全是分数指数运算。

定义怎么定？教材的推进分两步：

第一步，从整除情形切入。根式本可以写成幂：$\sqrt[n]{a^n}=a=a^{(n/n)}$。当被开方数的指数能被根指数整除时，根式天然就是分数指数幂——$\sqrt[5]{a^{10}}=a^2=a^{(10/5)}$。

第二步，整除不了也要延续。$\sqrt{a}$、$\sqrt[5]{a^3}$这类"除不尽"的，我们**规定**：正数的正分数指数幂$a^{(m/n)}=\sqrt[n]{a^m}=(\sqrt[n]{a})^m$（a>0，m、n∈N*，n>1）；负分数指数幂$a^{(-m/n)}=1/a^{(m/n)}$；0的正分数指数幂等于0，0的负分数指数幂没有意义。

为什么规定偏偏长这样？做一个思想实验：假如我们把$a^{(1/2)}$定义为别的数（比如a/2），那么$((a^{(1/2)}))^2=a/4\neq a$——**运算法则当场崩塌**，指数记号退化成无意义的涂鸦。而定义$a^{(1/2)}=\sqrt{a}$，则$(a^{(1/2)})^2=(\sqrt{a})^2=a$，法则原封不动。数学每次扩张（负数、分数指数、无理指数），都选那个**让已有规则无伤延续**的定义——先保住运算法则，再让记号去适配。定义服务于结构，不是结构迁就定义。

两套记号怎么选？教材明确：**条件a>0下优先用指数记号**。根式套根式（$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}}$）会越套越乱，指数记号只做指数加法——$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}}=a^{(1/m\cdot 1/n)}=a^{(1/(mn))}$，一步到底。

【到此记住】$a^{(m/n)}=\sqrt[n]{a^m}=(\sqrt[n]{a})^m$（a>0）是"让法则延续"的唯一选择；互化优先指数记号；0的负分数指数幂无意义。

负指数与0次幂：倒退与归一

负指数=倒数：$a^{(-p)}=1/a^p$。看一列数就懂：$2^3=8$，$2^2=4$，$2^1=2$，$2^0=1$，$2^{(-1)}=1/2$——指数每降1次，值就除以2。**0次幂等于1不是硬性规定，是这条规律递推的自然结果**：要规律的链条不断，2^0只能等于1。

这套"倒退"的读法在切分情境里同样自洽：日增长因子与"倒退一天"互为倒数——涨到$2^{(1/3)}$倍的过程，倒退就是乘$2^{(-1/3)}$。

【到此记住】负指数=倒数；0次幂=1是规律自洽的推理结果；0的负分数指数幂无意义。

无理指数幂：指数铺满实数轴

分数指数立住之后，指数的取值范围从整数拓展到了有理数。最后一步：$2^{\sqrt{2}}$是什么？

用**不足近似逼近**：$\sqrt{2}\approx 1.4$、1.41、1.414、1.4142……一列越来越准的分数，$2^{\sqrt{2}}$就沿着一列对应的值（$2^{1.4}$、$2^{1.41}$、$2^{1.414}$……）逼近过去——逼近序列稳定，值就稳定。教材在4.1.2正是这样把指数铺满实数轴：每个无理指数都被一列有理指数从下方逼近。

配齐之后，运算性质在实数范围通吃（本册先在有理数范围使用）：

$a^r\cdot a^s=a^{(r+s)}$；$(a^r)^s=a^{(rs)}$；$(ab)^r=a^r\cdot b^r$（a>0，b>0，r、s为有理数）。

三条全部由整数情形的规律延续而来——这正是"延拓"的胜利：换到新领域，旧工具原样能用。

【到此记住】无理指数靠不足近似逼近立起；运算性质三条（指数加、指数乘、积的幂各自乘）是全章计算的总工具箱。

运算纪律：三查与考试规范

幂的混合运算速度可以快，但三道检查必须在场：

1. **查指数奇偶**：偶次根出绝对值——$\sqrt[4]{a^4}=|a|$，不是a。

2. **查底的正负约定**：分数指数幂默认底为正；题目给字母时先声明a>0再动法则。负底数先转正讨论——(−1)^(2/2)按$(-1)^2$再开方读出1，按负底数的分数指数读无定义，**同一串符号两种读法两个结果，纪律就是不让它发生**。
3. **负指数先倒数**：a^(−p)先写成1/a^p再动分子，比在负指数上直接变形稳妥得多。

交卷前的结果规范三件套：化为正指数、写最简分式、底数不含根号。2^(−1/2)要写成1/√2再写成√2/2才算写完——阅卷场上"算对了"和"写规范了"是两件事。

【到此记住】三查=奇偶、正负、倒数；三件套=正指数、最简、不含根号。

经典例题

例1【教材·保底】四小问求值：n次方根性质现场

【题干】 例1 求下列各式的值：（1）$\sqrt[3]{(-8)^3}$；（2）$\sqrt{(-10)^2}$；（3）$\sqrt[4]{(3-\pi)^4}$；（4）$\sqrt{(a-b)^2}$。（人教A版必修第一册·教材例1）

【解答】 （1）$\sqrt[3]{(-8)^3}=-8$（奇次根直接脱）；（2）$\sqrt{(-10)^2}=|-10|=10$；（3）$\sqrt[4]{(3-\pi)^4}=|3-\pi|=\pi-3$（π>3，3−π<0，翻号）；（4）$\sqrt{(a-b)^2}=|a-b|=\{a-b,\ a\geqslant b;\ b-a,\ a<b\}$。

【怎么想到的】每小问的触发信号都是"根号"+指数——先问根指数的奇偶，奇偶定了处理方式就定了。最诱人的岔路在第（3）问：把$\sqrt[4]{(3-\pi)^4}$直接脱成3−π——死因是没过"偶次根非负"这道过滤器：里层3−π是负的，直接脱出来一个负值，而四次方根必非负；卡壳动作是把里层翻号（π−3）或先写绝对值再讨论。第（4）问把"a、b大小不定"摆到明面上，答案只能分段——这正是考点本身：字母进来，讨论就进来。给外行一句话：**根号是值域过滤器，偶次根只放行非负**。

【定级】 教材·保底｜n次方根性质母型——奇次直接脱、偶次出绝对值、字母要分段

【同类一题自测】（先试后看，做完再对）：求$\sqrt[5]{(-2)^5}+\sqrt{(2-\sqrt{5})^2}$的值。（答：$\sqrt[5]{(-2)^5}=-2$；$\sqrt{(2-\sqrt{5})^2}=|2-\sqrt{5}|=\sqrt{5}-2$（$\sqrt{5}\approx2.236>2$）；和=$\sqrt{5}-4$）

例2【标准·精进】混合运算完整流：四法则一次走完

【题干】 化简：(a^(1/2)·b^(−1/3))^6 ÷ $(a^{-1}b)^2$，其中各字母均为正。

【解答】 分子=(a^(1/2))^6·(b^(−1/3))^6=a^3b^{-2}；分母=$(a^{-1})^2b^2=a^{-2}b^2$；相除=a^(3−(−2))·b^(−2−2)=$a^5b^{-4}=a^5/b^4$。
四法则逐个上岗：幂的乘方=指数相乘、积的幂=各自乘、同底相除=指数相减、负指数=倒数。每步只动一件事，顺序不乱。

【怎么想到的】触发信号是"括号+乘方+除法"的标准混合结构——套路固定：先拆积的幂（各自处理），再做幂的乘方（指数相乘），最后同底合并（指数相减）。你可能卡在"指数3−(−2)的负负"——断点是"除以a^{-2}=加上a^2"，减负指数时最易丢负号；岔路是分子分母先各自全展开再硬算——能走但慢，死因是把"拆开算"等同于"必须拆到底"，先约再算更快。负指数通通先倒数（a^{-2}→放到分母），比在负指数上硬变形稳。一句话带走：**混合运算四法则逐个用，负指数先倒数，交卷前三件套**。

【定级】 标准·精进｜考点=幂的四法则串联+负指数处理+结果规范

【同类一题自测】（先试后看，做完再对）：化简(x^(1/3)·y^(1/2))^6 ÷ (x^2y^3)。（答：分子=x^2y^3，分母=x^2y^3，商=1）

例3【标准】比较幂值先定底：底在(0,1)与底大于1

【题干】 比较大小：（1）0.5^{10}与0.4^{10}；（2）0.5^(1/2)与0.4^(1/2)。两对比较里藏着同一条规律，把它说出来。

【解答】 （1）$0.5^{10}\approx0.001$，$0.4^{10}\approx0.0001$（精确值约0.00010），故$0.5^{10}>0.4^{10}$。（2）0.5^(1/2)≈0.707，0.4^(1/2)≈0.632，故0.5^(1/2)>0.4^(1/2)。
两问同构：**同指数、不同底**——底都在(0,1)内，底越大值越大。规律：底∈(0,1)时，指数越大幅值越小（$0.5^{10}\approx0.001<0.5$本身）；底>1时，指数越大幅值越大。比较幂值先定底与1的相对位置。

【怎么想到的】触发信号是"同指数不同底"——底1/2、2/5都在(0,1)，增减走向一致，直接比底。你可能卡在"第（1）问要不要真算0.4^{10}"——不用硬算：$0.4^{10}<0.5^{10}$且$0.5^{10}<0.5=1$已经够定位；岔路是想用4.2的指数函数图像通法——方向对但还没学，本节用"乘固定比例的体感"就够了：0.5乘自己10次、0.4乘自己10次，每一步前者都更大。一句话带走：**比较幂值先问底在哪边——(0,1)与>1，两族行为相反**。

【定级】 标准｜考点=底与1的相对位置定幂值走向（4.2指数函数单调性的前置体感）

【同类一题自测】（先试后看，做完再对）：1.1^3与1.1^2、0.9^3与0.9^2各谁大？（答：1.1>1，指数大者大，$1.1^3>1.1^2$；0.9∈(0,1)，指数大者小，$0.9^3<0.9^2$）

例4【自造·标准】周期切分：月保持率与总保持率

【题干】 某手机电池健康度每月保持为前月的98.5%。（1）两年（24个月）后健康度约为初始的百分之几？（2）若某电池两年后健康度恰为70%，平均每月保持率约为百分之几（精确到0.1%）？

【解答】 （1）每月乘0.985，乘24次：$0.985^{24}\approx0.696$，约69.6%。
（2）设月保持率为x，则$x^{24}=0.70$，x=0.70^(1/24)——24次方根，分数指数上岗。0.70^(1/24)≈0.9853，约98.5%。
两问互为逆操作：已知月率求总效果是乘方（指数24），已知总效果求月率是开方（指数1/24）——正指数与负指数之外的"分数位"登场。

【怎么想到的】第（1）问触发信号是"每月保持为前月的98.5%"——"每期乘固定比例"=乘法过程，24期就是0.985自乘24次。最诱人的岔路：按"每月降1.5%，两年降24×1.5%=36%"算成64%——死因是把比例机制当成了加法（3.4单利利滚利之辨的本节化身）：每月降的是"当时的1.5%"不是"初始的1.5%"。第（2）问卡点在"$x^{24}=0.70$怎么解"——断点是"开24次方=指数取1/24"（4.3学对数后会有另一套解法，殊途同归）。一句话带走：**每期乘固定比例，总效果=幂；反推每期比例，=分数指数开方**。

【定级】 自造·标准｜考点=周期切分幂运算+分数指数开方反推（比例机制与加法机制之辨）

【同类一题自测】（先试后看，做完再对）：某植物高度每天为前一天的1.02倍，两周（14天）后约为初始的几倍？（答：$1.02^{14}\approx1.32$倍）

易错卡

症状	错因	维持机制	钉死
把a^(1/2)算成a/2（2^(1/2)写成1）	把分数指数当成除法——指数m/n里的"/n"触发了分数除法语感	"1/2"这个记号在分数世界太熟悉，抄起来就除；没建立"指数=乘几分之几次"的语义	记住指数语义：a^(1/2)是"乘半次"=√a；自检：2^(1/2)≈1.414，若算出1立即报警

$\sqrt[4]{(a^4)}$直接写a	偶次根漏绝对值——忘了根号是"值域过滤器"	平时例题底数多为正，直接脱碰巧全对；符号讨论从没被强制过	三查第一查：偶次根出	a	；反例：a=−1时$\sqrt[4]{((-1)^4)}$=1，而写a得−1，翻号现场当场打脸
认为0^0=1是"规定"，与0的负分数指数幂无意义混淆	没分清"整数域规律递推的约定"与"待定型"两个层次	0次幂=1的递推直觉太强（2^0=1、1^0=1……），直接外推到0^0并定成"规定"	整数域0^0=1是空乘约定；分析里0^0是待定型；教材口径：0的正分数指数幂=0，0的负分数指数幂无意义——逐字记		
(−1)^(2/2)按两种读法算出两个值（1和−1）	负底数直接套指数法则——没先声明a>0	法则背得很熟，"适用前提"一栏从来没进过眼睛；两种读法各自都"看起来合法"	混算第一步先声明字母为正；负底数先转正讨论（奇偶分开说），不同时套两个法则		
2^(3/2)算成$2^3\div2$=4（先乘后除）	分数指数记号语法没立住——m/n被读成"a^m再除n"	记号hierarchy弱：分数指数幂整体是一层记号，不是"幂再除法"两层动作	a^(m/n)=($\sqrt[n]{}$a)^m整体读；自检：2^(3/2)=$\sqrt{8}\approx2.83\neq4$		
化简出2^(−1/2)、$\sqrt[3]{(x^2)}$直接交卷	结果规范三件套没进流程——"算对了"的完成感覆盖"写规范了"	平时对答案只对数值不对形态，形态失分从未被量化过	交卷前三查结果：正指数（2^(−1/2)→$\sqrt{2}/2$）、最简分式、底数不含根号（$\sqrt[3]{(x^2)}$→x^(2/3)）		

应试打法

1. **根式与分数指数互化（选填送分）**：奇次根直接脱、偶次根出绝对值；互化用a^(m/n)=$\sqrt[n]{(a^m)}$=($\sqrt[n]{}$a)^m，最终形态优先指数记号——写出即得分，别在根号套根号里恋战。
2. **幂的混合运算化简求值**：固定流水线——先声明字母为正→负指数先倒数→积的幂各自处理→幂的乘方指数相乘→同底合并指数加减→结果过三件套。
3. **符号讨论题（$\sqrt{((3-\pi)^4)}$型）**：先判里层符号再脱绝对值——π−3>0、a−b分段，判断过程要写出来，这是采分点不是装饰。
4. **条件求值/整体代换**：x^(1/2)+x^(−1/2)=3求$x+x^{-1}$这类，把x^(1/2)+x^(−1/2)整体平方（1/x/x一凑就是$2+x+x^{-1}$）——平方降次是本节最常上的套路。
5. **对数题前置步骤**：先化简幂式（底数尽量统一、指数合并）再取对数；底∈(0,1)与底>1的幂值比较体感先立住，4.2单调性上岗后升级为通法。

深读区

> 不读不影响做题，想深究再看。

追问一：为什么定义偏偏是a^(m/n)=$\sqrt[n]{(a^m)}$，不能是别的？正文给了思想实验，这里把"唯一"说透：要求$(a^{(1/2)})^2$=a（法则在分数域延续），两边开方得a^(1/2)=$\sqrt{a}$——**解唯一，定义别无选择**。一般地，要求$(a^{(m/n)})^n$=a^m且$(a^{(1/n)})^n$=a，同时指向$\sqrt[n]{(a^m)}$。更妙的是等价性：$\sqrt[n]{(a^m)}$与($\sqrt[n]{}$a)^m在a>0时相等——先乘后开、先开后乘殊途同归，这不是巧合，是幂运算可交换性的镜像。延拓原则的深层逻辑：定义服务于结构——先保住运算法则（结构），再让记号（定义）适配。这条原则反过来也是体检表：任何"新定义"若让旧法则失效，淘汰。

追问二：无理指数幂的逼近，为什么值一定"稳定"？2^1.4、2^1.41、2^1.414……这列数随$\sqrt{2}$的近似越来越准而变化越来越小。严格说这是"单调有界必收敛"的领地（3.2单调性工具的远方亲戚，大学极限课程正式交

接)；高中层级的理解：√2的近似每多一位小数，指数变动不足千分之一，对应幂值变动更小——逼近列天然是"越挤越拢"的。你不需要会证，但要知道这不是教材含糊，而是"高中只立直觉、严格化在大学"的分工。

升维工具一：延拓原则。"新定义=让旧规则无伤延续的最优解"。可迁移到任何系统扩展场景：给系统加新能力时，选让旧接口语义不变的方案——旧部件一个不用改，新能力无缝接上；若扩展逼你重写旧件，先怀疑扩展姿势不对，再怀疑系统本身。

升维工具二：一套结构，三套记号。根式ⁿ√(a^m)、分数指数a^(m/n)、幂运算"乘m次n分之一次"是同一结构的三个视图——根式视图擅长单次开方、指数视图擅长串联合并（指数只做加法）、语义视图（"乘几分之几次"）擅长建模直觉。换视图不是换对象，是换工具箱：卡住时换一套记号重写，常常一步解开。

趣味件·0次幂=1的推理链：$2^3=8$，$2^2=4$，$2^1=2$——指数每降1，值除以底。链条要延续，2^0只能=1（8→4→2→1，每次除2)。再看负方向：2^(−1)=1/2、2^(−2)=1/4——"倒退"就是倒数。整条数轴的指数语义由一条递推律一路推开：这不是规定堆出来的表格，是一条规律自己长出来的森林。0^0的立场在易错卡3：整数域空乘约定，分析中待定型——分清"0的0次幂"与"幂函数在0处的极限"，是两回事。

费曼检验（学完立即做 · 2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988)。你以为你懂了——讲一遍才知道缺口在哪。

仪式：先口述录音60秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链)：给同桌讲明白——a^(m/n)=ⁿ√(a^m)这个桥为什么立得住?

第一步·先说结论（分数指数幂=根式的另一件外套——n次根号与1/n次幂互为翻译）→第二步·再说为什么（指数运算三条法则（同底相乘幂相加/幂的幂相乘/积的幂各自乘）在整数指数已验证，扩到分数时要求a>0保合法——运算性质穿越扩容一致）→第三步·举个例子（2^(1/2)·2^(1/2)=2^(1/2+1/2)=2——若2^(1/2)无定义，法则当场破产；⚠简化边界：无理指数幂（x^π）的严格定义用极限思想，册内只到"逼近"体感）

照妖镜（讲完对照)：典型错误讲法＝"根式和指数幂是两套东西"（桥没搭起来）或"负数也能开偶次方再套指数法则"（合法域丢了)。正确讲法必须守住**互译等价＋a>0合法域**。两处错误分别可溯易错卡卡①与卡②。

卡壳路由：卡在"分数指数互化"→回正文根式节；卡在"运算法则"→回正文性质节＋例题；卡在"负数底"→回正文合法域节/易错卡卡②。

本节串联图

上游：初中乘方开方互逆＋整数指数幂（负指数/科学记数法）＋2.1等式性质（变形背书）＋3.2单调性（底与1比较的直觉预装）

本节：4.1 指数 = n次方根（奇次直接脱/偶次出|a|）＋分数指数幂（a^(m/n)=ⁿ√(a^m)，延拓定义）＋负指数与0次幂（倒数与归一）＋无理指数幂（不足近似逼近，4.1.2）＋运算性质三条（加/乘/各自乘）

平行：3.3幂函数（那里幂做函数y=x^α；这里幂做运算a^(m/n)——同一记号两种身份，α与m/n记号相通）

下游：4.2指数函数（指数从运算变成函数y=b^x，底>1与(0,1)两族图像登场）＋4.3对数（"求指数"的逆运算，开方精神的升级版）＋4.5函数的应用（二)（周期切分模型计算工具回填）

边界：分数指数默认a>0（负底数偶次无定义/同式两值陷阱)；偶次根出绝对值（值域过滤器)；0的负分数指数幂无意义；结果三件套（正指数/最简/不含根号）

4.2 指数函数

课时开篇页

本节知识点清单：指数函数定义（y=a^x，a>0且a≠1）·底数两条禁令的必然性（a>0防定义域碎裂/a≠1防常数冒充）·标准形（系数恰为1）·两族图像（增长族a>1/衰减族0<a<1）·恒过定点(0,1)·值域(0,+∞)与x轴渐近线·单调性由底决定（底与1比）·两族镜像关系（y=a^x与y=(1/a)^x关于y轴对称）·比较大小通法（同底看单调/异底借中间量1）·图像变换辨析（x上加减=左右平移/整体加减=上下平移/倍乘=拉伸）·指数型复合函数单调区间（3.2同增异减上岗）·特殊底e的预告（连续按比例变化的"天然底"）

学完这节你能做到（4条，全部可自查）：

1. 会判断一个函数是不是指数函数：两处卡点逐条查——系数恰为1吗？底数a>0且a≠1吗?
2. 会徒手画两族草图，并说清三条共同特征（恒过(0,1)、值域(0,+∞)、底与1的位置决定增减）
3. 会比较幂值大小：同底直接用单调性，异底异指借中间量1搭桥——三步内收工
4. 会辨认图像变换的"作用位置"（2^(x+1)与2^x+1一个是左移一个是上移，说得出为什么），并会求指数型复合函数的单调区间

难点预警（3条，说话式）：

- **底看错，方向全反**：解(1/3)^x>9时，按增函数习惯得x>−2——错。底1/3<1是减函数，"值大⇔自变量小"，答案是x<−2。比较与解不等式的第一步永远是查底与1的关系，这步不过手，后面全白干
- **y=2·3^x不是指数函数**：系数2挂在a^x外面，它就偏离了标准形——高考判卷按非标准形处理。研究性质前先写标准形（y=a^x，系数恰为1），这不是洁癖，是定义
- **2^(x+1)不是"向右平移1"**：x"里面"加减与"外面"加减的作用方向相反——2^(x+1)可看作图像左移1个单位（也可看作纵向拉伸2倍，殊途同归）；2^x+1才是向上平移。变换类选择题专考这个位置感

前置依赖：4.1指数（分数指数幂把指数铺满全体实数——没有它y=2^x只剩整数点的散点）·3.1函数的概念及其表示、3.2函数的基本性质（对应法则/单调性定义/复合单调"同增异减"——本节主工具）·3.4函数的应用（一）（"每期乘固定比例"的家族识别信号+增长阶比较框架——本节兑现3.4留下的指数模型预告位）

速览卡

问题	答案
这节是什么	自变量当指数用的函数y=a^x——"按固定比例持续变化"的标准模型：一切每期乘固定比例的增长与衰减过程，形状都是它
为什么重要	3.4识别函数家族时，"指数型"只停在一个信号（每期按固定比例翻）；本节把这族的定义、图像、性质、比大小通法一次配齐——3.4留下的指数模型预告位从本节起正式回填。它还是4.3对数的母体（对数=它的逆问题）、4.4对数函数的镜像家族
怎么考	考频：高｜指数比大小为高频小题母型【讲解归纳·经验判断】。考位：①图像过定点（恒过(0,1)型，选填高频）②比较大小（同底看单调/异底借中间量1或0）③指数型复合函数单调区间（与3.2同增异减联考）④定义辨析（系数恰为1+底数a>0且a≠1两处卡点）

正文

两种增长：加法机制与比例机制

先看两种增长差多远：

加法机制：每期固定加同样的量——存钱罐每天加10元，10天后多100元。
比例机制：每期变为原来的固定倍数——培养皿细菌每小时变为前1小时的1.5倍，10小时后是初始的1.5^10≈57.7倍。

每期只多50%，十期下来却翻了近58倍——比例机制的增长在尾部会碾压一切加法直觉。为什么？因为比例机制的**增量与当前总量成正比**：总量越大，每期长出来的越多，增量又滚进下一期——"越多越快"的自增强过程。3.4增长阶比较立过框架（指数>幂>线性>对数），当时用的是数值表和增量递推；本节把这个"指数家族"的形状、性质、算法一次配齐。

数感先校准一档：2^10≈10^3（1024），2^20≈10^6——**翻倍7次约100倍（2^7=128），翻倍10次约1000倍**。这套"翻倍思维"是比例机制的口算引擎，后面比较大小、估算模型全用得上。

◎辅助理解｜判断一个现象是不是指数型，只问一句：增量是"加法"（每期加固定量）还是"比例"（每期乘固定比例）？加法→线性家族，比例→指数家族。

【到此记住】比例机制=每期乘固定比例，增量与当前量成正比；2^10≈10^3是它的口算基准。

指数函数的定义：两条禁令的必然性

定义：函数y=a^x（a>0，且a≠1）叫做指数函数——指数x是自变量，底数a是常数。

两条禁令不是规定刁难，是排除两种"废装置"：

为什么a>0？——分数指数（4.1）要求底数为正：a≤0时，a^(1/2)这类偶次分数指数在实数域无定义（(−4)^(1/2)没有实数答案），定义域当场碎裂，图像断成孤点。禁令一保住"定义域=全体实数"。

为什么a≠1？——a=1时y=1^x≡1，无论x怎么变输出永远是1：一条水平线冒充指数函数，装置没有信息量，单调性、图像研究全部落空。禁令二保住"函数值得研究"。

标准形卡点：指数函数的解析式必须写成y=a^x——**系数恰为1**。y=2·3^x是a^x的纵向拉伸（把图整体抬高2倍），不是指数函数；y=−3^x（系数−1）同样不是。高考在定义辨析题上专设这两个卡点：系数恰为1+底数a>0且a≠1，逐条查。

标准形还有一个红利：解析式里只有a一个未知数——**给图象上一个点，就能定出整个函数**（例2演示）。

【到此记住】指数函数=y=a^x（a>0且a≠1，系数恰为1）；两条禁令分别保定义域完整与装置有信息量。

两族图像与共同特征

底数a分两族（画草图先定族，再看三条共同特征）：

增长族（a>1）：单调递增，越跑越快；**衰减族（0<a<1）**：单调递减，越跑越慢但不回头。两族互为y轴镜像：y=(1/a)^x=a^(−x)——把y=2^x沿y轴翻折就是y=(1/2)^x（例3自测同构）。

三条共同特征（对一切a>0且a≠1成立）：

1. **恒过定点(0,1)**：a^0=1（乘零次=乘法单位元1），任何底都一样——这是验图像最快的一招：草图先钉死(0,1)。
2. **值域(0,+∞)**：正数自乘任意次永远是正数（正数域对乘法封闭，没有零因子）——图象**永远在x轴上方，永不触零**。
3. **x轴是渐近线**：衰减族向右无限贴近x轴（0.9^100≈2.7×10^−5，想多小有多小但永不为0）；增长族向左延伸同理（2^(−100)≈7.9×10^−31）。

【到此记住】底与1比定族（a>1增/0<a<1减）；恒过(0,1)；值域(0,+∞)，x轴是渐近线永不相交。

比较大小：同底看单调，异底借中间量

指数比大小是本节的高频考位，通法两板斧：

同底：直接用单调性——底a>1时"指数大值大"，0<a<1时"指数大值小"。
异底异指：两个值谁也不挨着谁——**借中间量1搭桥**（或0）：底大于1的正指数幂>1，底小于1的正指数幂<1。1.7^0.3与0.9^3.1没法直接比，但1.7^0.3>1>0.9^3.1，一座桥分高下。

配套纪律（解指数不等式同款三步）：①两边同底化→②查底与1的关系定增减→③按单调性去指数。底小于1时方向要**反向**——(1/3)^x>9即(1/3)^x>(1/3)^(−2)，减函数上"值大⇔自变量小"，得x<−2。

复合函数预告：y=2^(x^2−1)这类"指数位套函数"的单调区间，外层y=2^u（增）+内层u=x^2−1（先减后增），3.2同增异减直接上岗——先写定义域，再谈区间。

【到此记住】同底看单调；异底借1搭桥；去指数前先查底与1，底小于1必反向。

图像变换与特殊底e

变换先认"作用位置"——动x还是动整体，方向完全不同：

变换	形态	效果
x上加减	y=2^(x+1)	图像**左移**1个单位（也可看作y=2·2^x纵向拉伸2倍，两读法等价）
整体加减	y=2^x+1	图像**上移**1个单位——渐近线从y=0升到y=1
整体倍乘	y=2·2^x	纵向拉伸2倍

x"里面"加正数反而左移，是变换题的头号陷阱——记"左加右减"作用在x上，与数轴直觉相反。

特殊底e的预告：底数家族里有位"明星选手"e≈2.71828…。它的来历藏在一刀切分里：一段固定的增长量，切成n份分步实现，每份按比例r/n走，总效果(1+r/n)^n随切分越细而增大，却始终有个上界——切分无限变细时，总效果逼近一个确定的极限，这个极限对应的底就是e。"连续按比例变化"用它描述最干净；4.3学自然对数ln（以e为底）时正式接手，现在先立"存在这样一个天然底"的直觉即可。

【到此记住】x上加减=左右移（左加右减）、整体加减=上下移（渐近线跟着走）、倍乘=拉伸；e≈2.71828…是"连续按比例"的天然底，工具在4.3接续。

经典例题

例1【教材·标准】三类比大小一次走全：单调性与中间量

【题干】 例3 比较下列各题中两个值的大小：(1) 1.7^2.5与1.7^3；(2) 0.8^(−√2)与0.8^(−√3)；(3) 1.7^0.3与0.9^3.1。（人教A版必修第一册·教材例3）

【解答】 (1) 1.7^2.5和1.7^3可看作函数y=1.7^x当x分别取2.5和3时对应的两个函数值。因为底数1.7>1，指数函数y=1.7^x是增函数；因为2.5<3，所以1.7^2.5<1.7^3。
(2) 同(1)理，因为0<0.8<1，指数函数y=0.8^x是减函数；因为−√2>−√3，所以0.8^(−√2)<0.8^(−√3)。
(3) 1.7^0.3和0.9^3.1不能看作同一个指数函数的两个函数值——利用y=1.7^x与y=0.9^x的单调性，以及"x=0时，y=1"这条性质搭桥：由指数函数的性质知1.7^0.3>1.7^0=1，0.9^3.1<0.9^0=1，所以1.7^0.3>0.9^3.1。
教材边注：利用指数函数的单调性，通过自变量的大小关系可以判断相应函数值的大小关系。

【怎么想到的】触发信号是"幂值比大小"——先问两个值能不能装进同一个y=a^x：能（同底），单调性直接判（第(1)(2)问）；不能（异底异指），退一步找公共参照——1是所有指数幂的"分水岭"（底>1正指数>1、底<1正指数<1），第(3)问两边各自和1比就分出高下。最诱人的岔路在第(2)问：看到−√2>−√3就顺着写"大"——死因

是没先查底：0.8<1是减函数，指数大反而值小；卡壳动作是负指数看着别扭——把0.8^(−√2)看成(1/0.8)^√2=1.25^√2，换成增长族再比，同一套逻辑换了个马甲。一句话带走：**比幂值三步——同底化、查底与1、（异底）借1搭桥**。

【定级】 教材·标准｜考点=指数函数单调性比大小三型（同底增/同底减/异底借中间量1）

【同类一题自测】（先试后看，做完再对）：比较大小：(1) 0.3^1.5与0.3^2.1；(2) 1.2^0.8与0.7^1.3。（答：(1) 底0.3<1减函数，1.5<2.1，所以0.3^1.5>0.3^2.1；(2) 1.2^0.8>1.2^0=1>0.7^1.3）

例2【标准·精进】一个点定全函数+单调性解不等式

【题干】 指数函数y=f(x)的图象过点(2, 9/4)。(1) 求解析式；(2) 解不等式f(x)≤27/8。

【解答】 (1) 设f(x)=a^x（a>0且a≠1）。代入(2, 9/4)：a^2=9/4，a=3/2（a>0取正根），所以f(x)=(3/2)^x。(2) (3/2)^x≤27/8=(3/2)^3。底3/2>1是增函数，所以x≤3。

【怎么想到的】第(1)问触发信号是"指数函数+图象过一个点"——标准形只有一个未知数a，一个点就是一条方程a^2=9/4，立即可解（这正是标准形的红利；开平方取a=3/2，负根被"a>0"禁令挡掉）。第(2)问的卡点是27/8和(3/2)^x"不像一家人"——断点是同底化：27/8=(3/2)^3（分子分母同乘8即可验证），两边装进同一个底，比大小就变成比指数。岔路是两边取对数硬解——4.3的工具还没上岗，本节同底化就够；底3/2>1不用反向，若换成(2/3)^x就得小心方向。一句话带走：**过点定a、同底化比指数——指数函数两件套起手式**。

【定级】 标准·精进｜考点=待定系数求解析式+同底化解指数不等式

【同类一题自测】（先试后看，做完再对）：指数函数y=f(x)的图象过点(1, 1/3)，求解析式并解f(x)≥1/27。（答：f(x)=(1/3)^x；1/27=(1/3)^3，底1/3<1是减函数，方向反向，x≤3）

例3【标准】变换三兄弟：拉伸与平移的位置感

【题干】 同一坐标系里画y=2^x、y=2^(x+1)、y=2^x+1的草图，并说明三者的关系。

【解答】 y=2^x是基准图像（增长族，恒过(0,1)）。
y=2^(x+1)=2·2^x：基准图像**纵向拉伸2倍**（也可看作整体左移1个单位——两读法等价，因为加减作用在x上）；图象恒过(0,2)。
y=2^x+1：基准图像**向上平移1个单位**；图象恒过(0,2)，渐近线从y=0升到y=1。

【怎么想到的】触发信号是"一母两变"——变换题第一步永远问"改动作用在哪"：x+1是加在**x上**（左右平移，左加右减），+1是加在**整体上**（上下平移）。最诱人的岔路：把2^(x+1)当"向右平移1"——直觉里"+1=往右"，但作用在x上时方向反着来（代入验证：x=−1时2^(x+1)=2^0=1，过点(−1,1)，这正是基准图像的(0,1)左移一格的落点）。第二个岔路：把2^(x+1)与2^x+1看混——前者指数变了（每处指数抬1，整条曲线按比例抬高），后者整体加1（所有函数值平移抬高，渐近线跟着搬家）。一句话带走：**x上加减左右移（左加右减）、整体加减上下移、倍乘是拉伸**。

【定级】 标准｜考点=图像变换的作用位置辨析（平移vs拉伸/渐近线移动）

【同类一题自测】（先试后看，做完再对）：y=(1/2)^x、y=(1/2)^(x−1)、y=(1/2)^x+1三者关系？（答：(1/2)^(x−1)=2·(1/2)^x纵向拉伸2倍（也可右移1）；(1/2)^x+1上移1、渐近线变y=1；定点各自代入验：基准曲线恒过(0,1)，后两条变换后恒过(0,2)——变换不保定点，新定点把基准点(0,1)代入变换式即知）

例4【自造·标准】培养皿里的两族曲线：比例机制的增与衰

【题干】 甲培养皿中细菌每小时变为前1小时的1.5倍，初始500个。(1) 写出n小时后细菌数量$N_1(n)$，判断其增减性并指出图象恒过的点。(2) 若向培养皿中加入抑菌剂，细菌每小时存活为前1小时的0.6倍，数量

$N_2(n)=500\times0.6^n$——10小时后约剩多少个（精确到个位）？(3) 同学乙按"每小时增加0.5×500个"做加法外推：10小时后$N_1=500\times(1+0.5\times10)=3000$个。两种算法差了多少？说明哪种符合比例机制。

【解答】 (1) $N_1(n)=500\times1.5^n$（$n\in N^*$）。每期乘1.5>1，比例机制增长族，单调递增；图象恒过(0,500)（系数挂在外面的函数，定点带着初始量走）。
(2) $500\times0.6^{10}=500\times0.00605\approx3$个。每期乘0.6<1，衰减族——同样的数学形状，底在(0,1)一侧。
(3) 指数算法$500\times1.5^{10}\approx500\times57.7\approx28832$个，加法外推3000个——差了近10倍。比例机制的增量随总量滚雪球（10小时里后半段的增量远超前半段），加法外推把增量钉死在常数上，尾部必然大幅低估——这正是3.4增长阶比较（指数碾压线性）在10小时尺度上的现场版。

【怎么想到的】第(1)问触发信号是"每小时变为前1小时的1.5倍"——"变为"就是乘法，每期乘固定比例，n期就是1.5自乘n次，套进模型$A\cdot a^n$（A初始量、a每期因子）。最诱人的岔路在第(3)问：加法外推看着也算"每小时涨50%"——死因是把比例机制当成了加法机制（3.4家族识别的头号分岔：看增量是加法还是比例）。第(2)问卡点在0.6^{10}"算不动"——断点是翻倍思维倒着用：$0.6^5\approx0.078$，再平方$0.078^2\approx0.006$，两步口算收工，不必硬乘10个0.6。一句话带走：**每期乘固定比例→$A\cdot a^n$；a>1增长族、0<a<1衰减族；增量是滚雪球还是钉死，是两种机制的试金石。**

【定级】 自造·标准｜考点=指数模型建模（增长族/衰减族）+比例与加法机制之辨（3.4预告位回填落点）

【同类一题自测】（先试后看，做完再对）：某菌群初始10^4个，每小时存活为前1小时的90%。(1) 60小时后约剩多少个？(2) 若按"每小时减少10%×10^4个"线性外推，会得出什么荒谬结果？（答：(1) $10^4\times0.9^{60}\approx10^4\times0.0018\approx18$个；(2) $10^4-60\times10^3=-5$万——线性外推把比例衰减算成负数，直接暴露两种机制的鸿沟）

易错卡

症状	错因	维持机制	钉死
解$(1/3)^x>9$得$x>-2$	底1/3<1是减函数，去指数忘了反向	增函数解题的肌肉记忆太强（比大小多数题底>1），"底小于1反向"从没变成前置检查	三步法第二查永不跳：底与1比——0<a<1时"值大⇔自变量小"；$(1/3)^x>(1/3)^{(-2)}\Longrightarrow x<-2$。边界回验：$x=-2$代入左边=9，不合">"，反向结论自证
把$y=2\cdot3^x$当指数函数	"长得像"就归类——系数挂在a^x外面没进眼睛	草图上它和指数函数几乎同形，视觉像覆盖了定义查	标准形$y=a^x$系数恰为1；$y=2\cdot3^x$是纵向拉伸、$y=-3^x$系数为负都不是——定义辨析两卡点（系数恰为1/底数a>0且$a\neq1$）逐条过
认为指数函数图象能碰到x轴、能取到0或负值	草图画得太贴x轴，视觉上"贴着"被读成"交着"	手绘草图精度有限，触不触零根本画不出来，全靠性质兜底	正数自乘永为正（正数域乘法封闭）：值域$(0,+\infty)$；x轴是渐近线不是交点。自检：找$a^x=0$的解——不存在，题目让你找就是陷阱
$y=2^x$与$y=x^2$增长快慢分不清（x大时）	自变量位置感缺失——一个在指数位、一个在底数位	前几个整数点太接近（$x=2$时$2^2=4=x^2$；$x=4$时16=16打平），"打平带"掩盖了分岔	拉开看：$x=10$处$2^{10}=1024$ vs $10^2=100$，已差10倍；$x=20$处$2^{20}\approx10^6$ vs 400，差约2600倍——指数位碾压底数位
增长族衰减族记反（以为$(1/2)^x$递增）	死记结论不验算——"指数函数"四个字覆盖了底数信息	底数a在题目里只是个小字母，注意力全在指数上	底与1比口诀：a>1越乘越大、0<a<1越乘越小。试算钉死：$2^3=8$（增）、$(1/2)^3=1/8$（减）
$2^{(x+1)}$当成"向右平移1"	"+1=往右"的数轴直觉平移进了函数变换——没注意加法作用在x上	直觉与规则冲突时靠直觉；变换题选项里左右一放就中招	作用位置三判：x上加减=左右移（左加右减）、整体加减=上下移、倍乘=拉伸。代入验证：$2^{(x+1)}$过$(-1,1)$——基准点(0,1)左移一格的落点

应试打法

1. **图像过定点（选填高频）**：标准形y=a^x恒过(0,1)；y=2·3^x过(0,2)（定点带系数走）；y=2^(x+1)过(−1,1)。把"定点"当图像身份证，四个选项先按定点排除，比描点快得多。
2. **比较大小三步**：①能同底就同底（化指数、通分、同底数幂转化）→②同底查单调（底>1同向、底<1反向）→③异底异指借中间量1或0搭桥（底>1正指数>1；底<1正指数<1；底>1负指数∈(0,1)）。
3. **指数不等式**：同底化→查底定方向→去指数——底小于1必反向；解完代边界值回验（x取端点代入原不等式核等号）。
4. **指数型复合函数单调区间**：外层y=a^u的单调性由底定，内层u=g(x)照常分析，3.2"同增异减"上岗；第一笔先写定义域（真数、根号、分母约束），再谈区间。
5. **指数模型应用题**："每期变为前一期固定倍数"信号→N(n)=A·a^n（A初始量、a每期因子；增长r%乘(1+r)，衰减r%乘(1−r)）；增长阶比较用3.4框架估量级，精确比大小本节单调性上岗——半衰期、翻倍期的"反解年限"要等4.3对数工具到位。

深读区

> 不读不影响做题，想深究再看。

追问一：恒过(0,1)与值域恒正，为什么是结构而不是巧合？ a^0=1源于"乘零次"——空乘=乘法单位元1，任何底都逃不出这条；a^x>0则源于正数域对乘法的封闭性：正×正=正，乘多少次都出不了正数域，没有零因子、没有负数入口。两条合起来：指数函数天然是"比例传播"的载体——比例传播保号（正正得正），所以现实中"乘下去永远为正"的量（种群繁衍、衰变余量），本体就是指数函数。这不是巧合清单，是代数结构的直接投影。

追问二：指数尾部为什么"碾压"一切固定次幂？ 3.4用增量递推立过增长阶；这里补上指数的"自复制"视角：y=2^x的增量=2^(x+1)−2^x=2^x——**增量恰好等于当前值本身**。每翻一倍，多出来的量=已有的量，增量与自身同构。再硬的幂y=x^k，它的增量也只是一次"低一阶"的多项式，永远追不上"增量=自己"的选手。一句话：指数增长是"每一步都复制自己再合并"的函数族，这就是碾压的来源。

升维工具一：机制识别器。拿到任何"增长/衰减"数据或情境，第一问永远是：增量是加法还是比例？加法→线性家族（等差递推）；比例→指数家族（等比递推）。识别错机制，后面全部白算——例4第(3)问的近10倍差距就是识别错误的代价。这个识别器同样适用非数学场景：技能练习（每天固定加练10题，还是按"熟练度翻倍"安排——机制不同，长期曲线完全两样）。

升维工具二：两族一套记号。y=a^x与y=(1/a)^x=a^(−x)是同一条曲线的两种读法——增长与衰减不是两个家族，是同一族换个底数位置。"倒退=倒数"（4.1负指数语义）在这里升级为"倒退曲线=镜像曲线"：记住一个，白拿一个。

趣味件·70法则的本体兑现：3.4深读区埋过口算版——"翻倍时间≈70÷每期增长率的百分数"。现在用指数函数把它兑现：1.07^n≈2的解，就是曲线y=1.07^x与水平线y=2交点的横坐标，n≈10（精确值约10.2）——"每期乘1.07、连乘10次约翻倍"，因为1.07^10≈1.967≈2。反方向同样成立：每期衰减到90%的菌群，"减半"约需7期（0.9^7≈0.478≈1/2）。70法则的前提本节看得更清：每期比例恒定——比例一变（容量约束、环境变化），口算失效。

费曼检验（学完立即做·2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）。你以为你懂了——讲一遍才知道缺口在哪。

仪式：先口述录音60秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白——底数从3换成1/3，图象怎么变？为什么定义域恒R、值域恒(0,+∞)？

第一步·先说结论（a>1递增、0<a<1递减——升降由底数定；图象恒过(0,1)、以x轴为渐近线）→第二步·再说为什么（a^x>0对一切x恒成立=值域天花板；a^0=1=过(0,1)——与2.2/2.3的"先问域"呼应：这里域与值天然锁定）→第三步·举个例子（2^x与$(1/2)^x$关于y轴镜像——递增递减一体两面；⚠简化边界：e与自然对数的来历在后续课程，本册底数取具体数）

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"指数函数就是指数幂运算"（混同4.1运算与本节函数）或"底数可以是负数"（合法域丢失——a>0且a≠1）。正确讲法必须守住**升降由底数定＋定义先行（a>0且a≠1）**。两处错误分别可溯易错卡卡①与卡③。

卡壳路由：卡在"图象三特征"→回正文图象节；卡在"比大小"→回正文单调性节＋例题；卡在"底数范围"→回正文定义节/易错卡卡③。

本节串联图

上游：4.1指数（分数指数铺满定义域+运算性质三条）＋3.1函数的概念及其表示、3.2函数的基本性质（单调性定义+复合单调同增异减）＋3.4函数的应用（一）（增长阶比较框架+"每期乘固定比例"家族信号）

本节：4.2 指数函数 = 定义y=a^x（a>0且a≠1/系数恰为1）＋两族图像（a>1增长族/0<a<1衰减族/恒过(0,1)）＋值域(0,+∞)与x轴渐近线＋比较大小通法（同底看单调/异底借中间量1）＋图像变换位置感（x上加减左右移/整体加减上下移/倍乘拉伸）＋特殊底e预告（连续按比例的天然底）

平行：3.3幂函数（y=x^α底数位当变量；本节y=a^x指数位当变量——记号位置定家族归属）

下游：4.3对数（"已知结果反推指数"的逆问题，e与ln正式上岗）＋4.4对数函数（两族图像的镜像家族+底含参讨论）＋4.5函数的应用（二）（指数模型方程的求解器：零点与二分法）

边界：定义两卡点（系数恰为1/底数a>0且a≠1）；底与1的关系定单调方向（底<1去指数必反向）；x轴是渐近线永不相交（值域恒正）；比例机制外推有容量上限（长期按固定倍数增长必失真，模型修正后续课程）

4.3 对数

课时开篇页

本节知识点清单：对数定义log_a N（a^x=N⟺x=log_a N，a>0且a≠1，N>0)·读法钉死（log_a N是一个数，不是运算待办）·两条禁令的必然性（N>0被指数函数值域反向锁死/a≠1防装置不可逆）·两类特殊值（log_a 1=0/log_a a=1）·两条恒等式（a^(log_a N)=N与log_a (a^x)=x双向往返）·三条运算法则（乘变加/除变减/幂提系数——全部由指数法则直译）·对数对加法无分配律·合成验真数纪律（"无中生有"案例）·换底公式与两个实用形式（倒数关系/换成lg）·两个特殊底（lg=$\log_{10}$/ln=log_e，e≈2.71828）·对数比大小三板斧（同底看单调/异底换底或借中间量/含参设公共值）·对数方程四步（化同底→解→逐根验真数→舍非法根）

学完这节你能做到（4条，全部可自查）：

1. 会双向翻译指数式⇄对数式（a^x=N⇄x=log_a N），并说清真数恒正、底数a≠1为什么不是规定而是推理结果
2. 会用三条运算法则化简求值（同底拆零件、幂提系数、乘变加），并在合成/分拆的最后一步验真数、舍掉非法根

3. 会用换底公式算出任意对数的近似值（化成两个lg相除），并解出"翻倍要几年、减半要几年"这类反解年限问题
4. 会用三板斧比较对数值大小（同底单调/换底统一/设公共值参数化），会解对数方程并说出每一根的合法性

难点预警（3条，说话式）：

- **log_a(M+N)≠log_a M+log_a N**：对数只对乘除分发（乘变加/除变减），对加法没有分配律——这是全学段最高频的错误，没有之一。见到加法想拆，先停：法则清单里根本没有这一条
- **合成会"无中生有"**：$\log_2(-2)+\log_2(-4)$两个式子各自非法（真数为负），但按"乘变加"合成出的$\log_2((-2)\times(-4))=\log_2 8=3$却是合法等式——合成这一步本身制造了原式没有的定义域。所以：合成/分拆的最后一步必须回头验真数，x=−3这种候选根就是这样混进来的
- **换底公式分母是"底"**：log_a b=lgb/lga——分子放真数b、分母放底数a。记反了全盘皆错。自检口诀：$\log_2 8=\lg 8/\lg 2=3$，代一次数立刻验证（换底只换记号不换值，永远可以这么查）

前置依赖：4.1指数（幂运算法则是对数法则的翻译源——每条对数法则都能翻回指数法则）·4.2指数函数（对数是它的逆问题；真数范围被指数函数值域反向锁死；"反解年限要等4.3工具到位"的本节正式收口）·3.1函数的概念及其表示（对应法则记号——log_a对应f，是"以a为底取对数"这个动作）·3.4函数的应用（一）（考位④指数对数模型占位+70法则口算版预告——本节兑现精确版）

速览卡

问题	答案
这节是什么	log_a N——"底数a自乘多少次恰好得到N"的答案，一个具体的数。指数管"乘下去变多大"，对数管"乘几次恰好到"：同一装置的正反两面
为什么重要	4.2立起指数函数后，"反解指数"当场卡住（翻倍年限、减半周期、"多少倍"反查）——4.2应试打法明说"反解年限要等4.3对数工具到位"。本节把"读出指数"的装置一次配齐：定义、恒等式、三条法则、换底、验真数。它同时是4.4对数函数的物料（log_a x正式成为函数）和4.5二分法"步数公式"的公式源
怎么考	考频：高｜2025新高考I单8（对数比大小压轴单选）【一手·真题统计】。考位：①运算法则化简求值（选填必考）②对数方程（含参数真数范围讨论，大题第一问常考"解对数方程+验根"）③换底公式应用④对数比大小（含设参压轴单选）⑤指数对数模型应用大题（3.4考位④回填：翻倍/减半年限=两个lg相除）

正文

对数是什么：指数的逆向提问器

先看一个正向算不动的问题：年利率7%按年计息，几年翻倍？设n年后总额变为最初的2倍，方程是$1.07^n=2$——答案藏在指数位上，硬乘1.07要试很多次，而且大多数n根本不是整数。

对数就是为这类"已知结果反问次数"的问题造的装置：

定义：若$a^x=N$（a>0且a≠1，N>0），则x=log_a N，读作"以a为底N的对数"。

$1.07^n=2$的解就记作$n=\log_{1.07}2$——"1.07自乘几次得2"这个问题的答案本身（具体值由换底公式算出，见正文"换底公式与两个特殊底"一节）。

读法钉死：log_a N是一个数（就是那个指数），不是"还没做的运算"。对照3.1的记号：y=f(x)里f是"作用规则"，log_a也是作用规则（"以a为底取对数"这个动作），而整体的log_a N才是作用之后得到的那个数——这

个读法不过关，后面所有式子都会读歪。

指数式与对数式是同一个等式的两种记法，互为翻译轴：

指数式	对数式	一句话
$2^3=8$	$\log_2 8=3$	2自乘3次得8
$10^2=100$	$\lg 100=2$	10自乘2次得100
(1/2)^(−1)=2	$\log_{1/2} 2=-1$	半数的负1次方得2

◎辅助理解｜指数式正向算值（给x问a^x多大），对数式逆向问次（给N问乘几次）——两者是同一等式的正反两面，翻译时底数不变、位置互换。

【到此记住】$a^x=N \Leftrightarrow x=\log_a N$（a>0且a≠1，N>0）；log_a N是一个数——"底a自乘几次恰好得N"的答案，不是待办事项。

两条禁令的必然性：真数恒正与底数≠1

定义里的两个限制不是刁难，各自有硬理由：

为什么N>0？——a>0时a^x恒为正数（正数域对乘法封闭，4.2立过），所以指数函数的输出永远落在正数区：负数和零**没有对应的指数**，"log_a(−4)"在问"a自乘几次得−4"——这个问题永远无解。真数范围不是新规定，是被指数函数的值域**反向锁死**的。

为什么a≠1？——a=1时$1^x \equiv 1$，方程$1^x=N$在N=1时任何x都成立（答案不唯一）、在N≠1时永远无解——无论哪种情况都问不出确定的次数，装置不可逆。禁令保住"反问必有唯一答案"。

两类特殊值（由定义直接读出）：log_a 1=0（$a^0=1$，乘零次=没乘）；log_a a=1（$a^1=a$，乘一次=它自己）。这两块"自带答案的砖"在化简求值里出场率极高。

两条恒等式（一切对数运算的地基，互为倒放）：

- a^(log_a N)=N——"取对数再放回去，原值分毫不动"（装置往返）；
- log_a (a^x)=x——"先乘后问，次数就是x"（绕回起点）。

证明只需翻译轴：设log_a N=x，按定义$a^x=N$，代入即得第一条；第二条把N换成a^x同理。这对恒等式是"对数化简后回验"的标准动作。

【到此记住】N>0是值域反向锁死、a≠1是保证反问唯一——都是推理结果；log_a 1=0、log_a a=1；a^(log_a N)=N与log_a (a^x)=x双向往返。

三条运算法则：指数法则的直译

对数法则不需要死记——每一条都是指数法则翻过来的：

对数法则	指数侧来源	口语
log_a(MN)=log_a M+log_a N	a^p·a^q=a^(p+q)（同底相乘指数相加）	乘变加
log_a(M/N)=log_a M−log_a N	a^p÷a^q=a^(p−q)	除变减
log_a(M^k)=k·log_a M	(a^p)^k=a^(pk)（幂的幂指数相乘）	幂提系数

推导无跳步（以乘变加为例）：设M=a^p、N=a^q（按对数定义，p=log_a M、q=log_a N）。则MN=a^(p+q)，再取对数：log_a(MN)=p+q=log_a M+log_a N。三条法则全部回溯到"同底幂相乘指数相加"这一条——记不清时自己翻回去推，三行的事。

两条红线：

1. **对加法无分配律**：log_a(M+N)≠log_a M+log_a N。反例一眼见：$\log_2(1+1)=\log_2 2=1$，而$\log_2 1+\log_2 1=0+0=0$——1和0，当面对不上。法则清单里没有这条，见到加法先停手。
2. **合成/分拆的最后一步必验真数**：$\log_2(-2)$与$\log_2(-4)$各自非法（真数为负），但"乘变加"合成出的$\log_2(-2\times(-4))=\log_2 8=3$是合法等式——合成动作制造了原式没有的定义域。所以解方程的候选根、化简的最后一步，都要回头逐个真数位置验"是否>0"。

【到此记住】乘变加/除变减/幂提系数，三条全是指数法则的直译；对加法无分配律；合成出真数之前，回头验每一个真数位置。

换底公式与两个特殊底

换底公式：log_a b=log_c b/log_c a——任何底的对数，都能换成你手头有表可查的底。

推导三步：设x=log_a b，按定义$a^x=b$；两边取以c为底的对数：$\log_c(a^x)=\log_c b$，用幂提系数：$x\cdot\log_c a=\log_c b$；除以log_c a即得。

两个实用形式：

- **倒数关系**：log_a b=1/log_b a（交换a、b位置，分式倒过来）；
- **换成常用对数**：log_a b=lgb/lga（计算器上现成的两个键）。

换底只换记号不换值：$\log_2 8=\lg 8/\lg 2=3$；换成底4：$\log_4 64=\lg 64/\lg 4=6/2=3$——底随便换，答案钉死。选哪个底是工程决策：手算查表用lg，理论推导用ln，链式约分选能约掉的底（$\log_2 3\cdot\log_3 4=\lg 3/\lg 2\times\lg 4/\lg 3=\lg 4/\lg 2=2$，中间的lg3两头消掉——这就是"换底成链"的用法）。

两个特殊底：$\lg=\log_{10}$（以10为底，常用对数——十进制计数法的遗产，任何数对10取对数=数它的"数量级"）；ln=log_e（以e为底，自然对数——4.2立过e≈2.71828是"连续按比例变化"的天然底，连续增长语境里ln是母语，第5章e^x与lnx正式成对上岗）。

【到此记住】log_a b=lgb/lga（分母是底）；log_a b=1/log_b a；lg以10为底、ln以e为底；换底不换值，选底看手头工具。

比大小与解方程：通法起手式

对数比大小三板斧：

1. **同底**：直接用单调性——a>1时"真数大值大"，0<a<1时反向（对数函数的增减由底定，4.4正式展开，本节先用结论）；
2. **异底**：换底公式统一到底（如全换成lg），或借中间量搭桥——与1比最快：a>1时，真数>1⟹log_a N>0、真数>a⟹log_a N>1（log_a a=1是分水岭）；
3. **含公共参量（压轴形态）**：设公共值为t，把每个未知数参数化（对数式→指数式翻译轴），再逐一"比大小⟺解t的区间"，交叉取交集——交集为空的序就是"不可能"（本节例3真题全套演示）。

对数方程四步（大题第一问常客）：

① 化同底（或两边取对数）→ ② 解出候选根 → ③ 逐根验真数（每个真数位置都>0才算数）→ ④ 舍非法根、下结论。

动笔前置动作：见到log先写"真数>0"——定义域是隐含约束，必须比解方程更早落笔，否则舍根环节必然漏人。

【到此记住】比大小三斧：同底看单调、异底换底或借1、含参设公共值取交集；解方程四步：化同底→解→验真数→舍；先写"真数>0"再动笔。

经典例题

例1【教材·保底】求值：拆零件+幂提系数

【题干】 求下列各式的值：(1) $\lg\sqrt[5]{100}$；(2) $\log_2(4^7\times2^5)$。（人教A版必修第一册·教材例3）

【解答】 (1) $\lg\sqrt[5]{100}=\lg(100^{(1/5)})=(1/5)\cdot\lg100=(1/5)\times2=2/5$。
(2) $\log_2(4^7\times2^5)=\log_2 4^7+\log_2 2^5=7\log_2 4+5\log_2 2=7\times2+5\times1=19$。

【怎么想到的】 触发信号是"求对数值"——第一反应不是找计算器，而是问：这堆式子能不能拆成"底自带答案"的标准砖（$\lg100=2$、$\log_2 4=2$、$\log_2 2=1$）？第(1)问最诱人的岔路是把$\sqrt[5]{100}$硬算成小数（≈2.512）再取lg——没有对数表根本走不动；断点是先把根式改写成幂（$\sqrt[5]{100}=100^{(1/5)}$），让"幂提系数"接管，硬骨头立刻变成"lg100除以5"。第(2)问的卡点是$4^7\times2^5$底不统一——两条路都合法：先同底化（$4^7=2^{14}$）再用乘变加得$\log_2 2^{19}=19$；或直接乘变加劈成$7\log_2 4+5\log_2 2$。算子别丢了：$\log_a(M^k)=k\cdot\log_a M$的k只管真数上的幂，别把系数提前塞进真数。一句话带走：**见对数先拆零件——根式化幂、同底化、幂提系数，标准砖随身带**。

【定级】 教材·保底｜考点=根式化幂+幂提系数+乘变加（三条法则与特殊值联合上岗）

【同类一题自测】（先试后看，做完再对）：求值：(1) $\log_3(27\times9^2)$；(2) $\lg5+\lg2$。（答：(1) $\log_3 27+2\log_3 9=3+2\times2=7$；(2) $\lg(5\times2)=\lg10=1$）〔取自教材4.3节后练习〕

例2【教材·标准】地震能量比：对数标度里"比商=作差"

【题干】 地震释放的能量E（单位：焦耳）与里氏震级M之间的关系为$\lg E=4.8+1.5M$。2011年3月11日，日本东北部海域发生里氏9.0级地震，它所释放的能量是2008年5月12日我国汶川里氏8.0级地震的多少倍（精确到1）？（人教A版必修第一册·教材例5）

【解答】 设里氏9.0级和8.0级地震的能量分别为E_1和E_2。由$\lg E=4.8+1.5M$，可得
$\lg E_1=4.8+1.5\times9.0$，$\lg E_2=4.8+1.5\times8.0$。
于是$\lg(E_1/E_2)=\lg E_1-\lg E_2=(4.8+1.5\times9.0)-(4.8+1.5\times8.0)=1.5$。
所以$E_1/E_2=10^{1.5}\approx32$，即里氏9.0级地震释放的能量约是8.0级地震的32倍。
教材边注：想一想，为什么两次地震的里氏震级仅差1级，而释放的能量却相差那么多呢？

【怎么想到的】 触发信号是"多少倍"——求比值E_1/E_2。最诱人的岔路是先算$E_1=10^{18.3}$、$E_2=10^{16.8}$的焦耳数再相除——18次方的天文数字，硬算必翻车；断点是对数标度里"比商=作差"：$\lg(E_1/E_2)=\lg E_1-\lg E_2$（法则二反向通行，运算法则从来都是双向的），能量比直接落到指数上，E_1、E_2本身根本不用算出来。卡壳动作是忘了$10^{1.5}$的量级——$10^{1.5}=10\times10^{0.5}\approx10\times3.16\approx31.6$，口算就收工（$\sqrt{10}\approx3.16$值得当一块标准砖随身带）。外行连接一句：新闻里说"震级差1级、能量差约32倍"，就是$\lg E=4.8+1.5M$这条一次式的直接读数——震级刻度（加法）背后是能量跳变（乘法），对数标度专管这种"刻度走一步、真值翻几番"。一句话带走：**对数标度里比商=作差，倍数=10^(对数差)**。

【定级】 教材·标准｜考点=对数式求值+除变减反向用+$10^{1.5}$量级口算（对数标度首次落地）

【同类一题自测】（先试后看，做完再对）：响度L（分贝）与声强I满足$L=10\cdot\lg(I/I_0)$（I_0为基准）。甲处声强是乙处的100倍，两处响度差多少分贝？（答：$\Delta L=10\cdot\lg100=20$分贝——对数标度里"倍数"直接变"加法刻度"）

例3【真题·进阶】对数比大小压轴单选：设公共值+可行域交集

【题干】 已知$2+\log_2 x=3+\log_3 y=5+\log_5 z$，则x，y，z的大小关系不可能为（　）(A)x>y>z　(B)x>z>y　(C)y>x>z　(D)y>z>x（2025年新高考Ⅰ卷·单选8）

【解答】 设公共值为t，则x=2^(t−2)，y=3^(t−3)，z=5^(t−5)。
两两比较的可行阈值（对不等式两边取对数、按底移项解出；除以负系数时方向反向）：
x>y⟺t<4.71；x>z⟺t<7.27；y>z⟺t<9.30（各自取反即另三序）。
逐项判定：(A)需t<4.71且t<9.30——交集t<4.71非空，t=3时x=2、y=1、z=5^(−2)，序成立；
(C)需t>4.71且t<7.27——交集非空，t=7.2时序成立；
(D)需t>7.27且t<9.30——交集非空，t=8时$y=3^5=243$、$z=5^3=125$、$x=2^6=64$，序成立；
(B)需t<7.27且t>9.30——区间不相交，**不可能**，选B。

【怎么想到的】触发信号是"三个不同底不同真数的对数被等号串起来"——设公共值t，把三个未知数统一参数化（x=2^(t−2)等，每条都是对数式→指数式的翻译）。最诱人的岔路是给t赋具体值逐个试选项——t的取值无限，枚举永远碰不全；断点是"不可能"=可行域为空：每句"谁比谁大"都翻译成t的一个区间（如x>y两边取对数移项，(t−2)lg2>(t−3)lg3，注意lg2−lg3<0除过去方向要反向），四个选项是四组区间交集，空的那个就是答案。卡壳动作是阈值算不出来——4.71这类小数不必手工精算：lg2≈0.30、lg3≈0.48、lg5≈0.70代入，两三位小数足够排出大小。外行连接一句：这是"多门槛筛选"——每个序号=两条资格线的交集，全不达标的候选就是"不可能"，与生活里"既要又要还要"的筛选逻辑同款。一句话带走：**公共参量比大小=参数化+区间化+交集判定，空集即"不可能"**。

【定级】 真题·进阶｜考点=对数式互化+移项解含参不等式（负系数反向）+可行域交集判定

【同类一题自测】（先试后看，做完再对）：已知$1+\log_2 x=2+\log_4 y=3+\log_8 z=t$，则x，y，z的大小关系不可能为（　）(A)x>y>z　(B)x>z>y　(C)y>x>z　(D)y>z>x。（答：统一为底2：x=2^(t−1)，y=4^(t−2)=2^(2t−4)，z=8^(t−3)=2^(3t−9)，指数直接比：x>y⟺t<3，x>z⟺t<4，y>z⟺t<5。(A)需t<3∩t<5=t<3，t=2可构造；(C)需t>3∩t<4，t=3.5可构造；(D)需t>4∩t<5，t=4.5可构造；(B)需t<4∩t>5，空集——不可能，选B）

例4【自造·标准】翻倍要几年：换底公式上岗+70法则精确收口

【题干】 某笔资金按年利率7%计息（每年年末总额变为上一年的1.07倍），初始1万元。(1) 多少年后总额首次超过2万元（精确到0.1年；lg2≈0.301，lg1.07≈0.029）？(2) 另一笔资金每年年末变为上一年的0.95倍，多少年后总额恰好减半（精确到0.1年；lg0.95≈−0.0223）？说明(1)(2)的共同数学形状。(3) 同学丙口算："每年涨7%，十年就是7成，肯定翻倍还多。"错在哪里？

【解答】 (1) 设n年后总额翻倍：$1.07^n=2$。指数式→对数式：$n=\log_{1.07}2$。换底：
n=lg2/lg1.07≈0.301/0.0294≈10.2（年），即约10.2年后首次超过2万元。〔lg1.07这里取四位0.0294——题给的0.029只有三位，拿它做除法会偏到10.4，要"精确到0.1年"中间值得多留一位；全精度算出来10.245，收在10.2，与4.2深读区70法则趣味件"精确值约10.2"同一件事。70法则口算版：70÷7=10年——3.4深读区立过的口算件，10.2与口算版基本吻合〕
(2) 设m年后减半：$0.95^m=0.5$。$m=\log_{0.95}0.5=\lg0.5/\lg0.95\approx(-0.301)/(-0.0223)\approx13.5$（年）。共同形状：都是"指数方程反解年限"——底大于1问翻倍、底小于1问减半，对数一律直接给出答案"底自乘几次恰好到目标"。
(3) 丙把比例机制当成了加法机制（3.4家族识别的头号分岔）：每年涨7%是"乘1.07"，不是"加0.07万元"。加法十年涨七成听着更多，但比例机制$1.07^{10}\approx1.967$——不到2倍，翻倍要10.2年而不是"十年内稳成"。反解年限的工具正是对数：把藏在指数位上的"乘几次"直接读出来。

【怎么想到的】第(1)问触发信号是"多少年翻倍"——列方程$1.07^n=2$后，n在指数位上正向算不动，这正是对数的出生地：$n=\log_{1.07}2$。第(1)问卡壳点是$\log_{1.07}2$计算器上没有直接的键——换底公式上岗：化成$\lg2/\lg1.07$，两个现成对数一除收工。第(2)问岔路：看到$\lg0.95\approx-0.0223$是负数就慌——两个负数相除得正数，减半年限本来就是正的，符号自洽不用怕。第(3)问最诱人的岔路是顺着丙的加法外推走——死因是3.4立过的机制识别题：增量是加法还是比例？比例机制的"7%"每期作用在**当前总额**上，十年复合是1.07^{10}不是$1+10\times0.07$。一句话带走：**翻倍/减半年限=换底公式+两个lg相除；比例机制的反解只能靠对数，加法外推必失真**。

【定级】 自造·标准｜考点=对数解指数方程（换底公式）+比例机制识别（3.4考位④"指数对数模型"回填落点）

【同类一题自测】（先试后看，做完再对）：某物质每年年末变为上一年的0.9倍，初始800克，衰变到200克需要几年（$\lg2\approx0.301$，$\lg0.9\approx-0.046$，精确到1年）？（答：$0.9^n=200/800=1/4$，$n=\lg(1/4)/\lg0.9=2\times(-0.301)/(-0.046)\approx13$年）

易错卡

症状	错因	维持机制	钉死
$\log_2(3+4)$算成$\log_23+\log_24$	"乘变加"过度泛化成"加也能拆"——法则边界没立住	乘法版口诀念得太熟，遇到加法顺手照搬；法则清单从没被逼着逐条回看	对数只对乘除分发；对加法无分配律。反例钉死：$\log_2(1+1)=1$而$\log_21+\log_21=0$，当面对不上
$\log_23\cdot\log_34$误算成$\log_27$或$\log_212$	把"对数相乘"当"真数相乘/底相加"——乘法结构错译	对数的积/和结构混淆（乘变加口诀反向误触发）；没意识到"对数相乘"根本不在三条法则里	对数相乘≠法则覆盖的对象——换底成链：$\log_23\cdot\log_34=\lg3/\lg2\times\lg4/\lg3=\lg4/\lg2=2$（中间lg3两头约掉）。口诀"换底成链积为1"的变体
解$\log_2(x-1)+\log_2(x+1)=3$得$x=\pm3$后全要	合成后忘验真数——"无中生有"的合成步骤制造了非法根	只记得"解完代回方程左右"，忘了对数方程验的是**定义域**（每个真数位置>0），代回会伪装通过	四步法第三步永不跳：逐根验每个真数位置。$x=-3$时$x-1=-4<0$、$x+1=-2<0$双双非法，舍——唯一解$x=3$
$(\ln x)^2$与$\ln x^2$混为一谈	括号位置就是含义——前者是平方挂在对数整体上，后者是真数先平方	记号阅读粗糙，见ln就当"一体符号"，幂的位置感缺失	$(\ln x)^2=\ln x\cdot\ln x$（先取对数再平方）；$\ln x^2=2\ln x$（真数平方后幂提系数）。两式一般不等：取$x=e$，前者$=(\ln e)^2=1$，后者$=\ln e^2=2$
把log_a N读成"log×a×N"或把log_a当数	算子记号没立住——log_a是动作（"以a为底取对数"），不是可拆的乘数	照四则运算习惯"见符号就拆"；f(x)读法（3.1）没迁移过来	对照f(x)读法：log_a对应f（动作），整体log_a N才是一个数（结果）。log_a单独出现无意义
换底公式写反（log_a b=lga/lgb）	分子分母位置记混——"底"和"真数"谁上谁下没锚点	公式当纯记号背，无自检动作；一处写反，链式约分全盘崩	自检口诀：$\log_28=\lg8/\lg2=3$（真数8上、底2下）。代一次数立刻验证——换底只换记号不换值

应试打法

1. **指数式⇄对数式互化（起手式）**：$a^x=N\Longleftrightarrow x=\log_a N$，底数不动、位置互换。定义辨析题先查三卡点：真数N>0、底a>0且a≠1、读法（log_a N是一个数）。特殊值砖随身带：log_a 1=0、log_a a=1。
2. **运算法则化简求值（选填必考）**：先拆零件（根式化幂、带分数化指数、乘积劈开），再幂提系数，最后用特殊值砖收口（lg100=2、$\log_2 4=2$）。反向同样通行：$\lg E_1-\lg E_2=\lg(E_1/E_2)$——比商=作差（例2）。
3. **对数相乘走换底链**：$\log_2 3\cdot\log_3 4$这类"对数×对数"不在三条法则里——统一换底后链式约分（中间因子两头消），口诀"换底成链"。
4. **对数方程四步+舍根**：化同底→解候选根→逐根验真数（每个真数位置>0）→舍非法根。见到log先写"真数>0"再动笔；含参数时真数范围讨论就是采分点本身。
5. **对数比大小+应用大题（3.4考位④回填）**：同底看单调；异底换底统一或借中间量1（a>1时真数>1⟹值>0、真数>a⟹值>1）；含公共参量设t参数化+区间交集判定（2025新高考I单8全套打法）。指数对数模型应用题（翻倍/减半/多少倍反查）=列指数方程→取对数→换底两个lg相除——3.4留下的应用大题核心位从本节起正式接续。

深读区

> 不读不影响做题，想深究再看。

追问一：为什么"底确定后，对数总是唯一"？——对数运算的合法性，本体是指数函数的**单调性**：a>1时a^x严格递增、0<a<1时严格递减——无论哪种，一条水平线y=N至多与曲线交于一点（4.2图像三特征），所以"乘几次得到N"要么无解（N≤0，值域外）、要么唯一。单调⇔可逆，这是"反问必有唯一答案"的结构保证。同一思想在第5章收网：三角函数在全体实数上不单调，所以"取反函数"必须先限单调区间——可逆性从来不是免费的，是单调性买的单。

追问二：对数为什么能把乘法压成加法？——三条法则的推导全部回溯到"同底幂相乘指数相加"（见"三条运算法则"一节的推导），而那条法则源于乘法的重复本性：乘10次=加10个指数步。这条"压缩"性质造就了一切**对数标度**：跨越多个数量级的量（氢离子浓度、声强、震级能量），直接读数字毫无感觉，取对数后变成舒服的加法刻度——pH每降1，浓度翻10倍；分贝每加10，声强翻10倍；震级每加1，能量翻约32倍（例2）。算术差很小、真值差悬殊，是对数标度的签名。

升维工具一：逆向运算思维。每个正向运算都值得问三句：逆运算存在吗（真数>0才有对数）？唯一吗（单调性保证）？怎么算（换底化成有表的底）？求根、反函数、反演，全是同一个问题族——正向装置造出来只是半件事，"逆向可问"才是它成为工具的完整标志。log_a N从"指数的逆向提问器"长成独立运算，就是这个标志的数学实例。

升维工具二：换底=选单位。换底公式说"对数值与底绑定，但不同底之间只差一个常数因子"（log_a b=log_c b/log_c a）。这像度量衡换算：同一长度，米和英尺数值不同、信息相同。选底=选单位：手算用lg（查表方便）、理论用ln（连续增长语境的母语，第5章见）、链式约分选能消掉的底——值不变，表达成本不同。工程决策的雏形就在这一步里。

趣味件·lg九九口算表：五块砖背下，任意lg三步口算——$\lg2\approx0.301$、$\lg3\approx0.477$、$\lg5\approx0.699$、$\lg7\approx0.845$、$\lg10=1$。组合拳：$\lg4=2\lg2\approx0.602$；$\lg6=\lg2+\lg3\approx0.778$；$\lg8=3\lg2\approx0.903$；$\lg9=2\lg3\approx0.954$；$\lg12=\lg3+2\lg2\approx1.079$；$\lg50=\lg(100/2)=2-0.301\approx1.699$。位数秒答：3.6万$=3.6\times10^4$，$\lg\approx0.556+4=4.556$→3.6万≈10^4.56。例3真题里"$\lg5\approx0.70$"就是这块砖——考场上比大小，口算表就是你的换底引擎。顺带精算4.2的口算件：$10\times\lg2\approx3.01$，所以$2^{10}=10^{(10\lg2)}\approx10^{3.01}\approx10^3$（真值1024）——"翻倍10次约一千倍"从口算版升到精算版。

费曼检验（学完立即做·2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）。你以为你懂了——讲一遍才知道缺口在哪。

仪式：先口述录音60秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白——$\log_2 8=3$这句怎么读，真数为什么必须是正数?

第一步·先说结论（$\log_2 8=3 \Longleftrightarrow 2^3=8$——对数是指数的"问次数"形式：2的几次方等于8？答3）→第二步·再说为什么（2的任何实数次幂恒为正——"负数与0没有对数"不是规定，是指数函数值域$(0,+\infty)$的镜像投影）→第三步·举个例子（$\log_2(-4)=?$ ——2的几次方等于−4？没有这样的数，式子根本不成立；⚠简化边界：log恒等式$\log_a a^x=x$与对数换底（选必）本册不展开）

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"对数就是指数"（同体不同问——一个问幂值一个问次数）或"负数也能取对数"（真数>0纪律丢）。正确讲法必须守住**互逆双问**＋**真数>0先行**。两处错误分别可溯易错卡卡①与卡②。

卡壳路由：卡在"对数恒等式"→回正文定义节；卡在"运算法则"→回正文性质节＋例题（乘变加）；卡在"真数范围"→回正文定义域节/易错卡卡②。

本节串联图

上游：4.1指数（幂运算法则=对数法则的翻译源）＋4.2指数函数（对数=逆问题；真数范围被值域反向锁死；"反解年限等4.3到位"本节收口）＋3.1函数的概念（对应法则记号：log_a对应f）＋3.4函数的应用（一）（考位④指数对数模型占位+70法则口算版预告）

本节：4.3 对数 = 定义log_a N（N>0/a≠1均为推理结果）＋两类特殊值（log_a 1=0/log_a a=1）＋两恒等式（a^(log_a N)=N⇄log_a (a^x)=x）＋三条法则（乘变加/除变减/幂提系数·对加法无分配律·合成验真数）＋换底公式（lgb/lga·倒数关系·换底不换值）＋两个特殊底（lg/ln）＋比大小三斧与方程四步

平行：与4.2构成同一装置的正反两面（指数正向算值/对数逆向问次——记号位置定角色，同3.3幂函数与4.2的对照关系）

下游：4.4对数函数（log_a x正式成为函数：定义域$(0,+\infty)$被本节锁死，图像三特征与单调性由底定）＋4.5函数的应用（二）（二分法步数公式$n>\log_2((b-a)/\varepsilon)$——对数当步数计算器）＋第5章三角（"限单调区间才谈反函数"的可逆性收网）

边界：真数恒正（log负数=问题本身非法）；法则只覆盖乘除幂（对加法无分配律、对数相乘不在清单）；合成/分拆最后一步必验真数；换底只换记号不换值（选底是工具决策）

4.4 对数函数

课时开篇页

本节知识点清单：对数函数定义y=log_a x（a>0且a≠1）·定义域$(0,+\infty)$与值域R（真数范围由4.3反向锁死/值域是指数函数定义域的镜像）·反函数结构（y=a^x与y=log_a x互为反函数·图像关于直线y=x对称·互逆验证往返无残差）·两族图像（a>1递增族/0<a<1递减族）·恒过定点(1,0)·y轴是渐近线（真数取不到0）·底与1/a两支图像关于x轴对称（$\log_{1/a}x=-\log_a x$）·增长节奏（每加1需真数乘a倍——最慢的常见增长）·对数刻度（pH/分贝/震级背后的"保序压缩"）·图像变换（真数括号内平移看(x−m)整体/定点(1,0)跟着走）·复合单调两层校验（同增异减+真数恒正缺一不可）·比较大小三策略（同底单调/同真数底反序/换底统一）·对数不等式四步（定真数→同底化→查底定向→取交）

学完这节你能做到（4条，全部可自查）：

1. 会求对数型函数的定义域（每个真数位置>0，逐条列约束取交），并说出值域为什么是R
2. 会徒手画两族对数函数草图：说出恒过(1,0)、y轴渐近线、增减由底定三条特征，并描出(a,1)第二个定点定位曲线
3. 会做图像变换题：说清$\log_2(2x-4)$这类"真数含系数"式子先整理再平移，追踪定点(1,0)落点，会写$\log_{1/a}x=-\log_a x$的对称关系
4. 会按四步法解对数不等式（先定真数范围再动手），会按两层校验讨论复合函数单调性（外层内层同向+真数恒正）

难点预警（3条，说话式）：

- **图像不过原点**：定义域(0,+∞)，x=0根本不在场——对数函数图像恒过的是(1,0)不是(0,0)。选择题拿"过原点"当选项，就是在钓这条。自检动作：画完草图先问"真数能取0吗"
- **底小于1，去对数要反向**：解$\log_{1/2}x<2$，直接"去对数"得x<1/4——错。底1/2<1是减函数，"值小⇔真数大"，正确答案是x>1/4（且必须写定义域x>0，本次被x>1/4覆盖是侥幸不是不用写）。底与1的关系没查就去对数，等于没学本节
- **真数含系数的平移看走眼**：$\log_2(2x-4)$不是"右移4"——真数=2(x−2)，先提系数化成$\log_2(x-2)+1$，平移量由括号里的(x−2)说了算：右移2。判断平移只认"括号内相对自变量的偏移"，系数必须先提出来，这是图像变换题的第一刀

前置依赖：4.3对数（法则层+换底公式+定义域纪律——本节把"问次数"正式装成函数）·4.2指数函数（两族图像与恒过定点的经验——本节全部镜像复用）·3.2函数的基本性质（单调性定义+复合"同增异减"）·3.1函数的概念（定义域值域对应关系）

速览卡

问	答
这节是什么	y=log_a x——把4.3的"问次数"（底a自乘几次得x）正式装成函数：自变量x当真数用。指数函数管"乘下去变多大"，对数函数管"进度走到了哪个指数"，两者互为镜像，图像关于直线y=x对折
为什么重要	4.3把对数运算的工具配齐（定义/法则/换底/验真数），本节它升级为函数：定义域(0,+∞)与值域R就此定型，两族图像、恒过(1,0)、渐近线、单调性由底定全部落位。它是"增长进度的仪表盘"——pH、分贝、震级这些跨越数量级的刻度，背后都是对数函数在压缩读数。下游4.5建模与二分法步数公式直接取用
怎么考	考频：中｜与4.3合并考，图象平移【讲解归纳·经验判断】。考位：①定义域（送分题·每个真数位置>0）②图像过定点与平移（恒过(1,0)及其平移形态）③比较大小三策略（同底/同真/换底）④反函数关系选填（关于y=x对称）⑤对数不等式四步+含参底数讨论（大题常与指数函数复合：单调区间+定义域双讨论）

正文

对数函数是什么：把"问次数"装成函数

4.3里"log_a N"是一个具体的数——"底a自乘几次得N"的答案。现在让真数动起来：令x任取正实数，每一个x都对应一个唯一的log_a x——这就装成了一个新函数：

定义：y=log_a x（a>0且a≠1）叫对数函数，自变量x是真数，定义域(0,+∞)。

定义域为什么是(0,+∞)？这不是新规定，是4.3的旧账：真数恒正（正数自乘永为正，负数和零没有对应的指数）——x是"将要被a乘出结果的那个数"，x≤0时"乘几次得x"这个问题本身非法。值域为什么是R？指数函数y=a^x的值域是(0,+∞)（4.2），它的镜像问法"乘几次得N"对每一个正数N都有答案，而答案（指数）可以是任意实数——值域R。一个定义域一个值域，全是4.2值域表反向照出来的，不用新记。

读法升级：log_a x整体是"以a为底取对数"作用在x上得到的函数值，log_a本身是动作不是数（4.3读法钉死的迁移）。

【到此记住】y=log_a x（a>0且a≠1），定义域(0,+∞)——真数恒正是4.3禁令的直接延续；值域R——指数函数定义域的镜像。

反函数结构：与指数函数互为镜像

y=a^x回答"乘x次是多大"；y=log_a x回答"乘几次得x"——同一个装置（底a的乘法）正反两面，输入输出互换。这样的两个函数互为**反函数**，图像关于直线y=x对称：把指数函数图像沿y=x翻折，对数函数图像就出来了。

互逆验证（往返无残差）：log_a(a^x)=x（先乘下去再问几次，绕回起点）；a^(log_a x)=x（先问次数再乘那么多次，装置还原）。两条恒等式4.3立过，这里看到它们的函数意义：互逆的两个函数复合起来，互相"抵消"回自变量。

镜像给的好处是白拿的：指数函数的一切性质，对数函数都有镜像版——定义域换值域、恒过(0,1)换恒过(1,0)、底a与1/a的y轴对称换成x轴对称。记一族，送一族。

【到此记住】y=a^x与y=log_a x互为反函数，图像关于y=x对称；互逆验证log_a(a^x)=x与a^(log_a x)=x往返无残差；指数的性质对数全有镜像版。

两族图像：恒过(1,0)与y轴渐近线

底分两族，形状各一支：

族	走势	图像过	记号锚
a>1	递增（增速越来越慢）	(1,0)与(a,1)	log_a a=1
0<a<1	递减	(1,0)与(a,1)	同上

三条共同特征：**恒过(1,0)**（log_a 1=0，底是啥都一样）；**无限靠近y轴但不触碰**（x→0⁺时真数趋零，问题趋非法，y轴是渐近线）；**增减由底与1的关系定**（a>1增、0<a<1减——和指数函数"同底同增减"完全一致，互为反函数保单调方向）。

第二个定点(a,1)很实用：log_a a=1，所以图像必过(a,1)——两个定点够定位一支草图。底在a和1/a之间换，图像翻面：$\log_{1/a}x=-\log_a x$（换底公式一步出：$\log_{1/a}x=\lg x/\lg(1/a)=\lg x/(-\lg a)=-\log_a x$）——两支关于x轴对称。

【到此记住】恒过(1,0)、(a,1)双定点；y轴渐近线永不相交；a>1增、0<a<1减；$\log_{1/a}x=-\log_a x$（x轴镜像）。

增长节奏与对数刻度：越跑越慢的仪表盘

指数函数越跑越快（每过一个单位翻a倍），对数函数越跑越慢：log_a x每加1，x要乘a倍——从$\log_2 x=3$到4，x从8到16（翻一倍）；从4到5，x从16到32（再翻一倍）。函数值匀速走一格，真数就要翻一倍番——这就是"仪表盘指针几乎不动"的体感。对数函数是最慢的常见增长（比任何正幂次都慢）。像$1.02^x=1.5$（年增2%，

几年翻1.5倍）这样的指数方程，解$x=\log_{1.02}1.5\approx20.5$——指数方程的解天然是对数值，仪表盘读数本身就是答案。

换个读法：以log计量的进度条上，**每格是等比的**——真数每翻a倍，指针才走一格。这条性质造就了一切**对数刻度**：跨越许多个数量级的量，直接读数字毫无感觉，取对数后变成舒服的加法刻度——pH把氢离子浓度压进0~14（浓度每翻10倍指针走1格）、分贝把声强压进0~120（每加10格声强翻10倍）、震级把能量压进1~9（每加1级能量翻约32倍，4.3例2）。刻度走一步，真值翻几番——对数刻度专管"数量级悬殊、大小关系要保真"的读数场景。

为什么必须是对数来压？**保序**：log_a x单调（a>1时增），压缩再狠，大小关系完整保留——不翻转、不并列。取模会折叠（大小混乱），截断会丢尾（大小并列），只有单调的非线性压缩既压得动又保得住序。"可读性"与"正确性"在这里才同时成立。

【到此记住】log_a x每加1，x乘a倍——最慢增长；对数刻度每格等比、保序压缩；pH/分贝/震级全是对数刻度。

图像变换与复合单调：定义域永远第一笔

图像变换只认括号内偏移：$y=\log_2(x-2)$由$y=\log_2x$右移2得到（恒过点(1,0)跟着走到(3,0)）；$y=\log_2x+2$是上移2（定点走到(1,2)）。真数含系数先提出来：$\log_2(2x-4)=\log_2[2(x-2)]=\log_2(x-2)+1$（$\log_22=1$拆出去），化完再看平移——"右移2再上移2"，不是右移4。判断口令：系数先拆净，平移看(x−m)。

复合单调两层校验：形如y=log_a(2x+1)的函数，外层y=log_a u增减由底定，内层u=2x+1是增函数——复合后要增，外内必须同向（同增异减，3.2上岗），还要校验真数在讨论范围内恒正。两层缺一不可：只查同向不查真数，定义域可能碎；只查真数不讨论底，方向可能反。

定义域永远第一笔：对数题动笔先写"真数>0"，把每个真数位置的约束列全（log_a(x−2)前置约束x>2，不是解完再查）；解对数不等式四步顺序固定——①定真数范围②同底化③查底定向（a>1同向/0<a<1反向）④解集与定义域取交。第①步跳过，非法根必混入（4.3"无中生有"案的函数版）。

【到此记住】平移只认括号内偏移（系数先提净）；复合单调=同向+真数恒正两层校验；对数题第一笔写定义域，四步法顺序永不调换。

经典例题

例1【教材·保底】求定义域组题

【题干】 求下列函数的定义域：(1) $y=\log_3x^2$；(2) y=log_a(4−x)（a>0且a≠1）。（人教A版必修第一册·教材例1）

【解答】 (1) 真数$x^2>0$，即$x\neq0$。定义域$\{x|x\neq0\}$。
(2) 真数4−x>0，即x<4。定义域{x|x<4}。

【怎么想到的】触发信号是"求定义域"——对数型定义域唯一动作：让每个真数位置>0，逐条解不等式再取交。第(1)问卡壳点是$x^2>0$想当然写成x>0——平方会把负数翻正，真数x^2对一切$x\neq0$都正，约束是$x\neq0$而不是x>0（别把指数函数定义域的肌肉记忆带进来）。第(2)问岔路是把它当"分母型"做（4−x≥0）——真数约束是严格大于，x=4时真数为0非法，等号取不到。外行连接一句：真数位就像"电机只吃正电"——喂0或负数整个装置停转，定义域就是装置的供电范围。一句话带走：**每个真数位置>0，逐条列、取交，严格不等号不带等号。**

【定级】 教材·保底｜考点=真数约束列写+x^2型不等价陷阱（$x^2>0\Longleftrightarrow x\neq0$）

【同类一题自测】（先试后看，做完再对）：求$y=\log_2(x^2-1)$的定义域。（答：$x^2-1>0\Leftrightarrow x^2>1\Leftrightarrow x<-1$或$x>1$，定义域$(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$——平方翻面，两侧都要）

例2【教材·标准】比大小组题：同底两向+含参讨论

【题干】 比较下列各组中两个值的大小：(1) $\log_2 3.4$，$\log_2 8.5$；(2) $\log_{0.3}1.8$，$\log_{0.3}2.7$；(3) $\log_a 5.1$，$\log_a 5.9$（$a>0$且$a\neq1$）。（人教A版必修第一册·教材例3）

【解答】 (1) 同底$2>1$，$y=\log_2 x$是增函数，$3.4<8.5\Longrightarrow\log_2 3.4<\log_2 8.5$。
(2) 同底$0.3<1$，$y=\log_{0.3}x$是减函数，$1.8<2.7\Longrightarrow\log_{0.3}1.8>\log_{0.3}2.7$。
(3) 底a含参，单调性分两支：当$a>1$，增函数，$5.1<5.9\Longrightarrow\log_a 5.1<\log_a 5.9$；当$0<a<1$，减函数，$5.1<5.9\Longrightarrow\log_a 5.1>\log_a 5.9$。

【怎么想到的】触发信号是"比大小"——三板斧第一斧：看能不能同底。第(1)(2)问同底不同真，直接上单调性，全部动作浓缩成一句"底与1比、真数与真数比"。卡壳点是第(2)问底$0.3<1$时方向念不准——减函数"真数大值小"，0.3这支图像从左上往右下走（和$y=(1/3)^x$同款），方向自然出来。第(3)问看到"$a>0$且$a\neq1$"这个参数记号，条件反射分两支讨论——讨论漏支是这类题的整题崩点，两支答案都要写落款（当$a>1$时…；当$0<a<1$时…）。外行连接一句：底数是"刻度方向的出厂设置"——底>1出厂向右，底<1出厂向左，参数题就是"方向未知先别开车"。一句话带走：**同底比真数（方向查底），含参必分两支，落款写全**。

【定级】 教材·标准｜考点=单调性比大小+底含参两支讨论（增减由底定的标准应用）

【同类一题自测】（先试后看，做完再对）：比较$\log_2 5$与$\log_3 5$。（答：真数同、底不同——底越小同真数对数值越大（真数$5>1$时），$\log_2 5>\log_3 5$；也可换底算：$\log_2 5=\lg5/\lg2\approx0.699/0.301\approx2.32$，$\log_3 5\approx0.699/0.477\approx1.47$，$2.32>1.47$✔——口算砖直接上岗）

例3【标准·精进】对数不等式：四步法定义域交集

【题干】 解不等式$\log_2(x-1)+\log_2(x-3)\leqslant3$。

【解答】 ①定义域：$x-1>0$且$x-3>0$，即$x>3$。
②同底合并：$\log_2[(x-1)(x-3)]\leqslant3=\log_2 8\Longrightarrow(x-1)(x-3)\leqslant8\Longrightarrow x^2-4x+3\leqslant8\Longrightarrow x^2-4x-5\leqslant0\Longrightarrow(x-5)(x+1)\leqslant0\Longrightarrow-1\leqslant x\leqslant5$。
③④取交：与定义域$x>3$相交，得解集$\{x|3<x\leqslant5\}$。

【怎么想到的】触发信号是"对数不等式"——四步法起手，第①步永远是定义域。卡壳点在合并这步：$\log_2(x-1)+\log_2(x-3)$用乘变加合成$\log_2[(x-1)(x-3)]$，这是4.3法则一正向用；右边的3要"同底化"成$\log_2 8$（$3=\log_2 2^3$——把常数也翻译成同底对数，两边才能"去对数"）。最诱人的岔路在最后一步：解出$-1\leqslant x\leqslant5$就收工——但$x=-1$时真数$x-1=-2<0$，非法！③的解集不与①相交就会混进负根，这一交正是"无中生有"案的防线（4.3例题同款结构，不等式版）。外行连接一句：四步法像过安检——先验身份（定义域）再过机器（求解集），两个章都要盖。一句话带走：**先定真数后合并，常数同底化，解集与定义域取交，缺一步就翻车**。

【定级】 标准·精进｜考点=四步法全流程+乘变加合并+解集与定义域取交（防非法根）

【同类一题自测】（先试后看，做完再对）：$f(x)=\log_a(2x+1)$在$(0,+\infty)$上递增，求a的取值范围。（答：内层$u=2x+1$在$(0,+\infty)$递增，复合后要增需外内同向$\Longrightarrow a>1$；再校验真数：$x>0$时$2x+1>1>0$恒成立，无额外限制。综上$a>1$——两层校验缺一不可）

例4【自造·标准】图像平移与定点追踪

【题干】 将$y=\log_2 x$的图像经过怎样的变换可得到$y=\log_2(2x-4)+1$的图像？后者恒过哪个定点？

【解答】 先整理：$\log_2(2x-4)=\log_2[2(x-2)]=\log_2(x-2)+\log_2 2=\log_2(x-2)+1$。
故$y=\log_2(2x-4)+1=\log_2(x-2)+2$。
变换路径：$y=\log_2 x$右移2个单位得$y=\log_2(x-2)$，再上移2个单位得$y=\log_2(x-2)+2$。
定点追踪：$y=\log_2 x$恒过(1,0)——右移2到(3,0)，上移2到(3,2)。验证：x=3时真数$2\times3-4=2$，$\log_2 2+1=1+1=2$√，图像恒过(3,2)。

【怎么想到的】触发信号是"图像变换+定点"——两套动作：平移看括号、定点跟着走。最容易走的岔路是把$2x-4$的"−4"当平移量报"右移4"——死因是真数含系数：平移只认括号内相对自变量的偏移$(x-2)$，系数2必须先用$\log_2 2=1$拆出去（这条拆解同时把"+1"外头的常数也"制造"出来了，一举两得）。卡壳点是定点追踪后不放心——代回去验证（x=3代入原式=2）一步闭环，变换题的定点题全部可以这么自检。外行连接一句：定点(1,0)是对数图像的"出厂铆钉"，平移是把整块钢板搬动——铆钉跟着钢板走，搬动量只看坐标差。一句话带走：**真数含系数先拆净，平移看(x−m)，定点代回验证**。

【定级】 自造·标准｜考点=真数含系数整理+平移分解+定点追踪与代回验证（考频行"图象平移"直接对应）

【同类一题自测】（先试后看，做完再对）：$y=\log_3(x+2)-1$的图像由$y=\log_3 x$经过怎样的变换得到？恒过哪个定点？（答：$y=\log_3 x$左移2个单位得$y=\log_3(x+2)$，再下移1个单位得$y=\log_3(x+2)-1$。定点追踪：(1,0)左移2到(−1,0)，下移1到(−1,−1)。验证：x=−1时真数−1+2=1，$\log_3 1-1=0-1=-1$√，恒过(−1,−1)）

易错卡

症状	错因	维持机制	钉死
认为对数函数图像过原点(0,0)	定义域意识缺失——x=0根本不在场	指数函数图像"贴着x轴"的视觉残留迁移过来；画草图不标渐近线	恒过(1,0)（log_a 1=0），原点不在定义域。自检动作：画完问"真数能取0吗"
$\log_{1/2}x<2$去对数得$x<1/4$	底<1是减函数——去对数没反向	乘变加口诀念太熟，"去对数"当自动动作；增减由底定没过手	四步法第③步永不跳：查底定向。底1/2<1反向$\Longrightarrow x>1/4$（且写定义域x>0，本次被覆盖是侥幸）
解log_a(x−2)型题不写x>2	定义域当前置约束的意识没立住	"先解方程/不等式再代回检查"的旧习惯；没意识到代回会伪装通过（真数为负时对数式根本无意义）	对数题第一笔写定义域：真数>0逐条列全，解集最后取交——约束是"入场券"不是"检票口"
把对数增长当"很快"	与指数增长形象捆绑（同为"2^n/$\log_2 x$"家族）	"对数=指数的反面"只记了运算面，没记增长面；从没算过"加1要翻倍"	$\log_2 x$从3到4，x从8到16——函数加1、真数翻倍；对数是最慢的常见增长，"仪表盘指针几乎不动"
$\log_2(2x-4)$平移报"右移4"	系数没拆净就找平移量	只看括号里"−4"的数字面；没有"平移只认(x−m)偏移"的规程	先提系数：$2x-4=2(x-2)$，$\log_2[2(x-2)]=\log_2(x-2)+1$——右移2（拆出的常数归"上下移"管）
y=log_a x与y=a^x单调性记混成"相反"	"互为反函数"误读成"单调性相反"	"反"字带偏——反函数反的是输入输出对应，不是增减方向；两族底号没对齐	同底同增减（a>1都增、0<a<1都减——互逆保单调方向）；图像关于y=x对折，不改变上下坡走向

应试打法

1. **定义域送分题**：每个真数位置>0逐条列（x^2型记得$x\neq0$不是x>0），取交落款——一分钟一问，零容错
2. **图像定点题**：恒过(1,0)为原装铆钉；平移与含参变换追踪定点后一**律代回验证**（例4流程）；真数含系数先拆净再追踪平移量（例4流程）

3. **比较大小三策略**：同底→单调性直接比（方向查底）；同真数异底→底小值大（真数>1时）或换底统一；含参底→a>1与0<a<1两支讨论、落款写全（例2全套）
4. **对数不等式四步**：定真数→同底化（常数也化成$\log_2 8$形态）→查底定向→取交。第①步跳过必混非法根——这是大题第一问的常规采分/扣分点
5. **复合单调两层校验**：外层底定方向+内层增减+同增异减合成，再校验讨论范围内真数恒正——两层结论分开写，缺一不可（f(x)=log_a(2x+1)型a范围的标答结构）；大题与指数复合时单调区间+定义域双讨论，先写定义域

深读区

> 以下为不考察的深挖内容，供想学透的读者扩展。
> 不读不影响做题，想深究再看。

追问一：对数轴上"一格"到底是什么？——线性轴上每格等差（+1、+2…），对数轴上每格等比（×2、×2…）。这不是视觉习惯，是编码方式的选择：人耳听声强（跨12个数量级）、舌尝酸碱（浓度跨10个数量级以上），感知系统天然按比例而非按差值工作——对数刻度把"比例感知"编码成"线性读数"，一屏装下十几个数量级还保序。深一层的统一性：同样的比例变化，在任何数量级上指针走的格数相同——对数刻度是"比例平权"的刻度。

追问二：为什么减半与翻倍在对数世界"一样重"？——100元打五折剩50元，想回到100元要涨100%；反过来先翻倍再打五折也回原价。算术刻度上"减半"（−50%）与"翻倍"（+100%）不对称，但对数刻度上$\lg 0.5=-\lg 2$（≈−0.301对+0.301），两者对称地站在0两侧——"乘0.5再乘2"在对数世界里是(−0.301)+(+0.301)=0干净归位，"回到原价"就是"对数归零"。这就是对称性本体：对数把乘除变成加减后，"翻倍/减半"这类互逆乘法操作变成互逆加法操作——加减天然对称，乘除的不对称感（50%对100%）只是线性记数的错觉。

升维工具一：视角反演思维。正问题（指数：乘下去变多大）与逆问题（对数：乘几次到这）是同一现象的两面，选哪个视角取决于哪个方向的信息密度高。可迁移的读图规则：数据跨多个数量级→换对数轴（菌群数、星等、声强）；压缩过度看不清细节→换回线性轴。读任何图表先问一句"这是什么轴"——刻度本身就是信息的一半。

升维工具二：镜像家族统一记。a>1与0<a<1不是两个家族，是同一支曲线的正反读法——$\log_{1/a} x=-\log_a x$，底取倒数=函数值变号=图像关于x轴翻面。这与4.2的"a^x与a^(−x)关于y轴对称"完全平行：指数镜像走y轴，对数镜像走x轴，因为反函数把对称轴y=x一换，x轴y轴角色互换。记一支，白拿一支。

趣味件·对数刻度三兄弟：pH（0~14，氢离子浓度，每差1浓度差10倍）、分贝（0~120，声强，每差10声强差10倍）、震级（1~9，能量，每差1能量差约32倍）——三个刻度都是对数造的，都干同一件事：把数量级悬殊的量压进"人类可以一眼读完"的窄带，同时保住大小序。下次读到"酸雨pH4.2""噪音80分贝""6.8级地震"，你已经在心里换算它们的"格数"了——这就是对数函数的日常体感。

费曼检验（学完立即做 · 2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）。你以为你懂了——讲一遍才知道缺口在哪。

仪式：先口述录音60秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白——$y=\log_2 x$与$y=2^x$的图象是什么关系？解对数不等式为什么第①步永远是定义域？

第一步·先说结论（两图象关于直线y=x对称——对数函数=指数函数的"回程票"）→第二步·再说为什么（$\log_2 8=3$与$2^3=8$是同一件事的两种问法——把指数式当x求y、把y当输入问x，图象即翻转；解对数不等式先定真数>0=回程票的检票口）→第三步·举个例子（$\log_2(x-1)+\log_2(x-3)$合并后必须验$(x-1)(x-3)>0$——合法域收紧会让"表面解"混进负根；⚠简化边界：反函数的正式名分在后续课程，本册到对称关系为止）

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"对数函数是指数函数的反运算所以随便互化"（漏了定义域先行）或"log不等式两边直接去log"（底数升降向没查）。正确讲法必须守住**定义域先行＋底数定升降**。两处错误分别可溯易错卡卡②与卡④。

卡壳路由：卡在"对称关系"→回正文图象节；卡在"对数不等式四步法"→回正文解法节＋例题；卡在"合并验根"→回正文法则节/易错卡卡④；卡在"底数讨论"→回正文单调性节。

本节串联图

上游：4.3对数（法则层+换底+定义域纪律——本节把"问次数"装成函数）＋4.2指数函数（两族图像+恒过定点的镜像母版）＋3.2函数的基本性质（单调性+复合"同增异减"）＋3.1函数的概念（定义域值域对应关系）

本节：4.4 对数函数 = 定义y=log_a x（定义域$(0,+\infty)$真数锁死/值域R镜像）＋反函数结构（与y=a^x关于y=x互为镜像·互逆验证无残差）＋两族图像（恒过(1,0)与(a,1)·y轴渐近线·增减由底定·$\log_{1/a}x=-\log_a x$）＋增长节奏（每加1真数乘a倍·最慢增长·对数刻度保序压缩）＋图像变换（系数拆净看$(x-m)$·定点追踪代回验证）＋复合单调（同向+真数恒正两层校验）＋不等式四步（定义域第一笔）

平行：4.2（同构镜像——指数两族/对数两族；(0,1)与(1,0)定点互倒；y轴对称与x轴对称互换）

下游：4.5函数的应用（二）（指数对数模型的方程求解器+二分法步数$\log_2((b-a)/\varepsilon)$）＋第5章三角（"限单调区间才谈反函数"的收网——本节反函数思想的一线预警）＋大学微积分（ln的增长速度与x成反比——唯一"导数自洽"的对数，高等视角预告）

边界：真数恒正（负与零非法——定义域是入场券）；对数轴非万能刻度（放大近0细节/压扁大数差异，读图先认轴）；单调方向由底定（底<1反向）；增长最慢勿与指数记混

4.5 函数的应用（二）

课时开篇页

本节知识点清单：零点定义（使$f(x_0)=0$的实数x_0·零点是数不是点）·方程的根⟺函数零点（一一转化）·零点存在定理（连续+两端异号⟹至少一个）·唯一性补充（再+单调⟹恰有一个）·定理的三不管（同号区间可藏零点/不连续失效/只管实根）·二分法三步循环（取中点→算值定半区→重复）·区间砍半律（n轮后长$(b-a)/2^n$）·步数公式（$2^n>(b-a)/\varepsilon$，$n>\log_2((b-a)/\varepsilon)$）·精度-成本账（多3.3步精度×10——$\log_2 10\approx 3.32$）·算法化求解思维（从"套公式"到"构造收敛流程"·假设越少越通用）

学完这节你能做到（4条，全部可自查）：

1. 会把"方程有没有解、有几个解"翻译成"函数有没有零点、有几个零点"，并说出零点是数不是点
2. 会用零点存在定理判定零点存在（连续+异号两条件逐条验），并知道它只保"有"不保"有几个"
3. 会跑二分法全流程：取中点→算中点函数值→按符号定半区，会用步数公式$2^n>(b-a)/\varepsilon$提前算需要几次
4. 会做"零点个数与参数范围"题：把方程变形为f(x)=g(x)画图像数交点，边界值（相切/过顶点）单独验证

难点预警（3条，说话式）：

- **零点是数不是点**：f(x)的零点是使$f(x_0)=0$的**数x_0**，不是图像上的点(2,0)。教材定义如此，高考判卷也这么判——选择填空里"$(x_0,0)$"就是钓这条的。自检动作：说零点前先默念"它是x轴上的一个数"
- **异号只保"有"，不保"有几个"**：$f(a)\cdot f(b)<0$且连续，只保证区间内**至少**一个零点——x^2-1在$[-2,2]$两端同号却藏着±1两个零点（漏检），$f(x)=x^3$在$[-1,1]$异号也只有一个（不增不多）。"有几个"要另请单调性出场，两笔账分开算
- **二分法不是上来就能跑**：跑算法前先验两件事——函数在这段**连续**吗、两端**异号**吗。1/x在$[-1,2]$两端异号，但x=0处断裂，强行二分会撞到未定义值：算法崩，定理救不了你没验假设

速览卡

为什么重要：你将来会遇到的大多数方程**没有公式解**——$x^3+x=1$这种三次方程公式就帮不上忙，$\ln x+2x-6=0$更是任何公式都无从套起。公式解是奢侈品，数值解是日用品。二分法就是数值求解的第一站：不聪明，但**保证收敛**，而且它是理解一切数值方法的地基。步数公式$\log_2((b-a)/\varepsilon)$是4.4对数函数直接上岗的算法应用——"反解年限等4.3到位"之后，"算步数等4.4到位"，链条在这里收口。

怎么考：考频：高｜零点存在定理+二分法为解答题小问常客【讲解归纳·经验判断】

前置依赖：3.2函数的基本性质（单调性管"有几个"）·2.3二次函数与一元二次方程（判别式数根的旧账）·4.3对数运算（步数计算）

去向：第5章三角函数（"限单调区间才谈反函数"的收网——本节"存在与唯一分开证"的一线预警）＋大学数值分析（牛顿法、梯度下降——二分法是它们的地基）

正文

从"解方程"到"找零点"：一个视角搬家

2.3里解方程靠因式分解和求根公式，之后几节你解过的方程也都有"套路"。但$x^3+x=1$呢？三次求根公式存在却繁琐到没有实用价值；$\ln x+2x-6=0$连套路都找不到。方程解不动的时候，把视角搬个家：设$f(x)=x^3+x-1$，"方程有没有解"就变成"函数有没有零点"。

定义：使$f(x_0)=0$的实数x_0，叫函数f(x)的**零点**。

到此记住：零点是**数**，不是点——它不是图像上的坐标$(x_0,0)$，是x轴上的一个值。方程$f(x)=0$的根与函数f(x)的零点是同一批数的两种叫法（对方程说是根，对函数说是零点）。

搬家的好处立刻显现：方程的根问"解是哪个数"，零点问"图像在哪里穿过x轴"——后者可以**画出来、看出来、一步步逼近**。公式走不通的路，图像和算法接手。

零点存在定理：什么时候一定有解

零点存在定理：若f(x)在区间[a,b]上的图象**连续不断**，且$f(a)\cdot f(b)<0$（两端异号），则存在$x_0\in(a,b)$，使$f(x_0)=0$。

为什么必然成立：连续的图象相当于一笔画成——笔尖从x轴**下方**（$f(a)<0$）画到x轴**上方**（$f(b)>0$），中间不可能不穿过x轴，穿过x轴的那个位置就是零点。定理条件里"异号"比"变号"精确：异号保证两端一个在x轴上方一个在下方，穿越不可避免。

唯一性补充：再叠加f(x)在[a,b]上**单调**，则零点**恰好一个**——单调函数图像要么一直升要么一直降，穿过x轴只有一次。3.2的单调性在这里上岗：**存在定理管"有没有"，单调性管"有几个"**，两笔账分开算，谁也替不了谁。

定理的三个"不管"：边界先认清

用定理之前，先认清它不管什么——高考的错误选项全从这三条里出：

- **不管"有几个"**：存在定理只说"至少一个"。区间里有3个零点它也照保不误。
- **同号≠没有零点**：$f(a)\cdot f(b)>0$**不能**推出无零点。反例：$f(x)=x^2-1$在$[-2,2]$，$f(-2)=f(2)=3$同号，但零点±1都躲在区间里——两端同号时零点可能成对藏在区间内，二**分法对这种区间会漏检**。想不漏？把大区间切开分段验。
- **不连续=定理失效**：$f(x)=1/x$在$[-1,2]$，$f(-1)=-1<0$，$f(2)=0.5>0$，异号！但$x=0$处图象断裂（无定义），函数根本没有零点——"连续"是生命线，断裂函数直接反例。此外定理只管**实根**：复数根、区间外的根，定理一律看不见。

还有一个更隐蔽的边界：如果函数在这段区间里**几乎不变**（图象近平台），中点函数值与端点的同异号判定会失灵——砍半方向乱指。所以跑二分前的自检是两句问：函数在这段里**真的在变**吗？两端**真的异号**吗？两句都"是"，算法才开跑。

二分法：对半砍的通用算法

零点在区间里，怎么把它抓出来？二**分法**——对半砍：

1. 取中点$x_1=(a+b)/2$，算$f(x_1)$：若$f(x_1)=0$，收工（运气好直接命中）；
2. 若$f(x_1)$与$f(a)$异号，零点在(a,x_1)，令$b\leftarrow x_1$；若$f(x_1)$与$f(b)$异号，零点在(x_1,b)，令$a\leftarrow x_1$；
3. 区间已砍半，回到第1步重复。

每循环一轮，区间长度砍半：n轮后区间长$(b-a)/2^n$。要误差$<\varepsilon$，需要$2^n>(b-a)/\varepsilon$，两边取对数得**步数公式**：

$$\mathbf{n > \log_2((b-a)/\varepsilon)}$$

——4.4的对数函数在这里变成**步数计算器**（4.4速览卡预告过："4.5函数的应用（二）（指数对数模型的方程求解器+二分法步数$\log_2((b-a)/\varepsilon)$）"，现在兑现）。

精度-成本账：误差要再小10倍，只需多花约3.3步（$\log_2 10\approx3.32$）——每3.3步精度×10，多10步精度×1024。二分法收敛不快（每步只砍一半），但**每一步都稳**：它对函数的唯一要求是"连续+异号"，不需要导数、不需要凸性、不需要任何公式。这个游戏的日常版你早就会玩：心里想一个1~1000的数，让你用"大了/小了"来猜——对半猜最多10次必中（$2^{10}=1024>1000$）。二分法就是这个猜数游戏的数学本体。

算法思维三件套：解方程的升维

"解方程"从"套公式"升级为"构造收敛流程"，这个过程沉淀出三个可迁移件：

- **存在性证明先行**：先证明目标存在（区间里真的有零点），再谈找法——存在定理是二分法的合法性证明，算法每一步砍半都合法，是因为零点始终留在区间内。
- **不变量收缩**：每一步操作都保住"零点仍在区间内"这个事实（保解不变），同时让区间（误差）递减——保住该保的，缩小该缩的。
- **精度-成本账**：每多一分精度都有明码标价（3.3步换×10），成本可事先算清，不靠感觉。

这三件套是二分查找、数值求根、"撒豆子估π"（往正方形里撒豆子数比例估圆周率——豆子够多估计就够准）这类方法共享的骨架。还要看一个根本权衡：**假设越少越通用，收敛越慢；假设越多越快，崩得越惨**——二分法只要连续+异号（假设最少，最稳但慢），牛顿法要多一档"可导"（快得多，但碰上病态函数会发散）。这是数值方法的根本权衡，也是工程系统的根本权衡：稳健与速度，总要有一方让步。

经典例题

例1【教材·标准】求方程lnx+2x−6=0的实数解的个数

【题干】求方程lnx+2x−6=0的实数解的个数。

【解答】设f(x)=lnx+2x−6，用计算工具列出对应值表：

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9
y	−4	−1.3069	1.0986	3.3863	5.6094	7.7918	9.9459	12.0794	14.1972

画出图象（图可由对应值表描点画出——每个x一行，点够了曲线形状自然现形）。由表可知f(2)<0，f(3)>0，则f(2)·f(3)<0。由零点存在定理，函数f(x)=lnx+2x−6在区间(2,3)内至少有一个零点。容易证明，函数f(x)=lnx+2x−6，x∈(0,+∞)是增函数（lnx增+2x增=增，增+增=增），所以它只有一个零点，即相应方程lnx+2x−6=0只有一个实数解。

（教材边栏两问：为什么由f(2)·f(3)<0还不能说明函数f(x)只有一个零点？你能证明函数y=f(x)是增函数吗？——前者：存在定理只保"至少一个"，x^3在[−1,1]异号也只有一个，但x^2-1在[−2,2]同号藏两个的反面提醒我们"有几个"必须另证；后者：lnx在(0,+∞)递增（4.4同底增减），2x递增，和函数增+增=增。）

【怎么想到的】信号词是"实数解的**个数**"——个数问题先搬家：方程解的个数=零点个数=图象与x轴交点个数。先锁存在（找异号区间），再锁唯一（验单调），两步收网。

【容易错在哪】只写"f(2)f(3)<0所以有一个解"就收笔——漏了"至少"与"恰有一个"的差距，唯一性必须用单调性单独补证；对应值表只验f(2)、f(3)两端，忘了图像在(0,+∞)上还有没有别的穿越（增函数一句话封死）。

【同类一题自测】（先试后看，做完再对）：判断方程$2^x+x=4$的实数解个数。（答：设$f(x)=2^x+x-4$，f(1)=2+1−4=−1<0，f(2)=4+2−4=2>0，异号且连续⟹(1,2)内至少一个零点；2^x增+x增⟹f增⟹恰一个——方程恰一解）

例2【自造·标准】二分法求√5：步数公式上岗

【题干】（自造·直系零·显式标注）用二分法求√5的近似值（即求方程$x^2-5=0$的正根），初始区间[2,3]，精确到0.1。至少需要二分几次？写出最后一次的区间。

【解答】设$f(x)=x^2-5$，f(2)=−1<0，f(3)=4>0，异号且连续，零点√5在(2,3)内。精确到0.1即误差<0.05，由步数公式$2^n>(3-2)/0.05=20$，$n>\log_2 20\approx 4.32$，取n=5（$2^5=32>20$，$2^4=16$不够）。逐轮验证：f(2.5)=1.25>0→[2,2.5]；f(2.25)=0.0625>0→[2,2.25]；f(2.125)=−0.484375<0→[2.125,2.25]；f(2.1875)=−0.21484375<0→[2.1875,2.25]；f(2.21875)=−0.0771484375<0→[2.21875,2.25]。5轮后区间长$(3-2)/2^5=0.03125<0.05$√，√5≈2.236落在[2.21875,2.25]内，端点距真解均<0.03——精确到0.1取√5≈2.2。

【怎么想到的】两问拆开：几步——不动手先算，步数公式$2^n>(b-a)/\varepsilon$一步出答案（4.4对数上岗）；区间——老老实实逐轮砍，每轮算中点函数值、看符号定半区，别跳步。

【容易错在哪】一是把"精确到0.1"当成误差<0.1（错：真解落在区间内，区间端点距真解最多是区间长的一半——实际用区间长<0.1或端点误差<0.05做判据，本题$2^n>20$按n=5走，5轮后区间长0.03125两头都达标）；二是中点符号判断跳步致砍错方向——f(2.25)=0.0625是**正**的，与f(3)同号，零点在左半[2,2.25]。

【同类一题自测】（先试后看，做完再对）：用二分法求√7的近似值，初始区间[2,3]，精确到0.1，至少二分几次？（答：f(2)=−3<0，f(3)=2>0；$2^n>(3-2)/0.05=20$同解n=5，√7≈2.6458，取2.6）

例3【自造·进阶】零点个数与参数范围：数形结合收网

【题干】（自造题·题型='零点个数与参数范围'——大题压轴常客：数形结合f(x)=g(x)交点数）已知函数$f(x)=|x^2-4x+3|-a$（a为实数）恰有4个零点，求a的取值范围。

【解答】f(x)的零点⟺方程$|x^2-4x+3|=a$有4个实数解。画$y=|x^2-4x+3|$：$y=x^2-4x+3=(x-1)(x-3)$，开口向上，顶点(2,−1)，在(1,3)段位于x轴下方——翻折后该段顶点(2,1)，整体呈"W"形，两谷在x轴上(x=1,3)，中峰高1。水平线y=a与W形曲线的交点个数随a变化：a<0无交点；a=0时交于x=1,3两谷（2个）；**0<a<1**时左侧上升段、两谷间左坡、右坡、右侧下降段各交1次（4个）；a=1时中峰顶点(2,1)相切+两外侧各1（3个）；a>1时仅两外侧各1（2个）。故恰有4个零点⟺**0<a<1**。

【怎么想到的】零点个数参数题的标准起手：把"含参方程解的个数"翻译成"动水平线与定曲线的交点个数"——一条定曲线+一条会动的水平线，图像画出W形后，a从−∞往+∞扫一遍，交点数在每个"关键高度"（谷0、峰1）处跳变，列清单收网。

【容易错在哪】两处：一是a=1的相切情形当成4个——切点算**1个**交点不是2个，边界值必须单独验证；二是a=0时漏数（W形与x轴交于x=1,3两点——翻折不产生新零点，因为$|x^2-4x+3|=0\Longleftrightarrow x^2-4x+3=0$）。

【同类一题自测】（先试后看，做完再对）：$f(x)=|x^2-4x+3|-a$恰有3个零点，求a。（答：a=1——水平线过中峰顶点(2,1)相切：x=2一解+$x^2-4x+2=0$两解$x=2\pm\sqrt{2}$，共3个）

例4【自造·标准】猜数游戏：二分法的日常本体

【题干】（自造·直系零·显式标注）甲心里想一个1~1000的整数，乙每猜一个数，甲只答"大了""小了"或"对了"。乙在最坏情况下**最少**猜几次必能猜中？若范围改成1~10000呢？

【解答】策略：每次都猜候选区间的**中点**——猜500，若"大了"则候选砍成1~499，若"小了"则砍成501~1000：每猜一次候选数**砍半**。n次后剩$1000/2^n$个候选，必中需$2^n>1000$，$n>\log_2 1000\approx 9.97$，取n=10（$2^{10}=1024>1000$，$2^9=512$不够）——**最多10次**。1~10000：$n>\log_2 10000\approx 13.29$，取n=14（$2^{14}=16384>10000$）。

【怎么想到的】"最坏情况最少几次"——先固定策略再数步数。顺序猜最坏要1000次；砍半猜每次把"候选集合"除以2，指数收缩。认出本体：候选区间=[a,b]，"大了/小了"=端点异号信息，猜中=找到零点——这就是二分法（例2流程的日常版）。

【容易错在哪】一是以为"1000个数平均猜500次"——那是顺序猜的账；砍半是指数衰减，10次就够1024个候选。二是$\log_2 1000$估错档：$2^9=512<1000$、$2^{10}=1024>1000$，进到10——2的幂要背到$2^{10}=1024$，估档全靠它。

【同类一题自测】（先试后看，做完再对）：1~100猜数，最坏几次必中？（答：$2^n>100$，$n>\log_2 100\approx 6.64$，取n=7——$2^7=128>100$）

易错卡

序号	翻车现场	错因结构	处置动作
1	"f(x)的零点是(2,0)"	零点≡f(x)=0的实数根≡**实数**；"点"字字面负迁移+图象上零点位置的视觉强化	口诀：**零点是数不是点，异号连续保一个**；反例训练：例1（个数两步收网）
2	由"f(a)f(b)<0且连续"直接写"恰有一个零点"	存在定理只给"至少一个"（充分条件），不回答个数不给位置	想x^2-1在[−2,2]的图（两端同号藏两个）；"有几个"另请单调性
3	由"f(a)f(b)>0"判定无零点	两端同号区间内仍可能成对藏零点	分段切区间逐段验；W形曲线（例3）就是同号区间藏两根的形状

4	不验连续直接跑二分法	存在定理的前提"连续"是算法合法性的生命线	跑前两句自检：这段连续吗？两端异号吗？1/x在[−1,2]是反例
5	步数凭感觉估（"差不多七八次吧"）	每步砍半是指数收缩，感觉对指数无感	步数公式$2^n>(b-a)/\varepsilon$一步算死；2的幂背到1024

应试打法

1. **零点存在定理判定（选填高频）**：连续+异号两条件逐条验，缺一不可——选项里"不连续"和"同号"各是半边陷阱；只问"存在"就收手，别顺手答"唯一"。
2. **二分法区间长度/步数（小问常客）**：长度=$(b-a)/2^n$、步数$2^n>(b-a)/\varepsilon$，两个公式互为反算；n要向上取整，2的幂背到1024估档快。
3. **零点个数与参数范围（大题压轴）**：含参方程解个数⟺动水平线与定曲线交点数——先画定曲线（W形/分式/含绝对值先翻折），再扫a列交点数清单，**边界高度（谷、峰、相切）单独验证**（例3套路）。
4. **二分法流程大题**：三步写全（取中点→算中点函数值→按符号定半区），判停条件写明（区间长<精度）；每轮区间长可列表呈现，5轮内收工的题考场上3分钟写完。
5. **交点数与单调性联用**：分段单调的曲线上，水平线与**每段**至多1个交点——先列单调区间再数交点，个数问题不漏不多。

深读区

趣味件·对折42次的月球往返：0.1毫米的纸对折42次，厚度0.1×2^{42}毫米$\approx4.4\times10^8$米=44万公里——超过地月距离38.4万公里。对折是砍半的逆操作，指数爆发力一眼见底：42次×翻倍就把一张纸送上月球。反过来，二分法每步把误差**除**2，42步就能把1000公里的搜索区间压到毫米以下——指数收缩与指数爆发是同一枚硬币的两面，二分法的"笨"里藏着这个宇宙中最快的压缩律。

升维工具一：算法化求解三件套。拿到"求一个满足某条件的对象"的问题，第一反应不再是"套公式"，而是三连问：目标**存在**吗（先证明再找——存在定理先行）？我的操作**保得住目标**吗（每步砍半零点不丢——不变量收缩）？再进一步要**付多少成本**（每3.3步精度×10——精度-成本明码标价）？三连问在二分查找、数值求根、"撒豆子估π"里通用——解方程的升维，本质是把"找答案"变成"造一台保证逼近答案的机器"。

追问一·为什么"笨"算法不可替代：二分法对函数的唯一要求是连续+两端异号——不要导数、不要凸性、不要公式。假设越少，适用面越广，代价是收敛慢（每步只砍半）；牛顿法要多一档"可导"假设，换来收敛飞快，但碰上病态函数会发散。设计层逻辑一句话：**算法的强度=假设的强度**——假设越少越通用，假设越多越快越脆。这也是一切工程系统的根本权衡：稳与快，永远在讨价还价。

追问二·本体换境：查断点。一串100节的彩灯整排不亮，已知断点只有一处——怎么最快找到？对半断开，测左半亮不亮：亮则断点在右半，不亮则在左半——每次排除一半，最多7次锁定（$2^7=128>100$）。修理工排障、翻字典找词、例4猜数，与二分法完全同构：**候选集合对半排除+每步拿到的信息都用足**。算法不在课本里，在你下次排查故障的手上。

费曼检验（学完立即做 · 2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）。你以为你懂了——讲一遍才知道缺口在哪。

仪式：先口述录音60秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白——零点存在定理为什么只要"端点函数值异号"就能断定区间内有零点?

第一步·先说结论（一条曲线从x轴下方走到上方，中间不"跳"的话必须穿过x轴——穿过点即零点）→第二步·再说为什么（定理两要件：端点异号＋图象在区间上连续不断——异号保证"上下必穿越"，连续保证"穿越必经过"；缺一不可）；⚠简化边界：函数在某点无定义或跳变时定理失效——定理自带连续性前提）

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"f(a)f(b)<0就一定有解"（漏了图象连续前提——分段断裂处异号可能无零点）或"零点是个点(0,0)"（零点=实数x_0不是坐标点）。正确讲法必须守住**两要件**（异号+不间断）＋**零点即实数**。两处错误分别可溯易错卡卡①与卡③。

卡壳路由：卡在"定理两要件"→回正文零点存在定理节；卡在"二分法"→回正文二分法节（精确度收口）；卡在"零点个数与参数"→回正文数形结合节＋例4；卡在"模型选型"→回正文模型节。

本节串联图

上游：2.3二次函数与一元二次方程（判别式数根——公式解不了的新方程由本节接管）＋3.2函数的基本性质（单调性管"有几个"）＋4.3对数运算＋4.4对数函数（步数公式$\log_2((b-a)/\varepsilon)$——"步数计算器"上岗，4.4下游预告兑现）

本节：4.5 函数的应用（二）＝零点定义（数不是点）＋存在定理（连续+异号$\Longrightarrow$至少一个）＋唯一性（+单调$\Longrightarrow$恰一个）＋三不管边界（同号可藏零点/不连续失效/只管实根）＋二分法三步（取中点→定半区→重复）＋砍半律与步数公式＋精度-成本账（3.3步换×10）

平行：3.4函数的应用（一）（分段计费/税率——应用一正向"给输入算输出"建模，应用二反向"给输出找输入"收网）

下游：第5章三角函数（"限单调区间才谈反函数"的收网——存在与唯一分开证的一线预警）＋大学数值分析（牛顿法/梯度下降——二分法是地基，假设-强度权衡的起点）

边界：定理只保存在不保唯一；同号区间会漏检（分段切）；不连续直接失效（1/x反例）；近平台段判定失灵（先验"函数在变"再跑）；只找实根

思维卡 · 互逆成对（指数对数章·章级汇总）

卡面导语：本章的骨架是"成对出现"——运算成对（幂与对数）、函数成对（指数与对数对称于y=x）。五条心法（源句出自本章正文，括注即节锚）：

互逆成对、域先行、底数定升降、真数必为正、零点两要件。

1. **互逆成对**——$\log_2 8=3\Longleftrightarrow 2^3=8$，问幂值与问次数是同一件事的两种问法（4.3定义节）
2. **域先行**——对数真数>0、指数函数值域$(0,+\infty)$、解不等式第①步永远是定义域（4.4四步法）
3. **底数定升降**——a>1升、0
4. **对称于y=x**——指数与对数函数图象互为回程票（4.4图象节）
5. **零点两要件**——端点异号＋图象连续，缺一不可（4.5零点存在定理）

本卡系章级汇总卡：卡面句句源自本包五节正文（括注即节锚），非新增知识。

自测三题（学完再答，答案在册内都能找到）

1. **对数**：$\log_2(-4)$为什么不成立？（源=4.3；答：2的任何实数次幂恒为正——负数没有对数，真数>0）
2. **对称**：$y=2^x$与$y=\log_2 x$的图象关于哪条线对称？（源=4.4；答：直线y=x——互为回程票）
3. **零点**：f(x)在[a,b]上f(a)·f(b)<0，能断定(a,b)内有零点吗？还差什么条件？（源=4.5；答：还差图象在[a,b]上连续不断——两要件缺一不可）

三题覆盖"真数域/对称/两要件"三个心法，先答后翻对应节对照。