数学2.1 等式性质与不等式性质

零基础首学版 v1.0 · 人教A版必修第一册 p37-43 · 第二章开门节：第一章的"话术"在这里正式上岗 · 出品：搜索规划师·队2席 · 1031

先看一块限速牌。路边立着"限速 40"。它没说你必须正好开 40——它说的是：你的车速 v 和 40 之间有一条线，不许越过去。

"不超过""至少""高于""低于""不少于"——生活里这类话到处都是。数学把它们统一叫不等关系，写成式子就是不等式。第一章你练的是"话术"（命题、若p则q、充要条件）；从这节起，数学的研究对象换成数与式的大小关系，而话术直接上岗：每条性质都要问一句"它是不是真命题、条件够不够"。

本节只做三件事：把现实翻译成不等式；学会作差比大小；把等式、不等式的家底性质一条条盘清——因为下一节的基本不等式、再下一节解一元二次不等式，全靠这些性质当工具。

读完这节你能做到

① 把"限速、不少于、不超过、不低于"等现实约束翻译成不等式或不等式组；

② 用作差法比较两个数或式的大小（作差→变形→与0比，三步走）；

③ 说出等式性质1-5、不等式性质1-7各管什么，尤其性质4乘负数要反向不踩坑；

④ 现场用 $(a-b)^2\geq 0$ 推出 $a^2+b^2\geq 2ab$，并解释"当且仅当"——为2.2埋好种子。

30秒立好地基（初中都见过，今天正式点名）

等式：你解了九年方程，"移项""两边同乘"背后靠的就是等式的性质（教材p40性质1-5）——它们一直默默工作，只是没上台领奖。

不等号：< > ≤ ≥ 你都认识。"限速40"记作 v≤40（v还得≥0）。

数轴：右边的数总比左边的大——这句大白话（教材p38）是本节一切性质的老家。

本节真正的新动作只有一个：作差。别慌，往下看就三步。

第①站 翻译——把现实问题写进不等式

教材p37问题1给了四个真实场景，先自己试着翻一遍，再看下面的对照：

（1）某路段限速 40 km/h；（2）某品牌酸奶质检规定：脂肪含量 f 不少于 2.5%，蛋白质含量 p 不少于 2.3%；（3）三角形两边之和大于第三边、两边之差小于第三边；（4）连接直线外一点与直线上各点的所有线段中，垂线段最短。

翻译对照：

（1）设车速为 v km/h。"限速40"=不超过40，而速度又是非负的——所以 $0<v\leq 40$。一个"且"字场景，两个不等号齐上。

（2）"不少于"就是≥：脂肪 $f\geq 2.5\%$，蛋白质 $p\geq 2.3\%$。两条要求同时生效，用大括号捆在一起——这就是不等式组。

（3）设△ABC三边为 a，b，c：$a+b>c$，$a-b<c$。注意"两边之差小于第三边"里没说哪两边减哪边——任意两边之差都小于第三边，教材这里取一组代表写式子。

（4）设C是直线AB外一点，CD⊥AB，垂足为D，E是直线AB上异于D的任一点，则 $CD<CE$（图2.1-1）。这是初中"垂线段最短"的符号化——几何事实也能翻译成不等式。

> 翻译三步固定动作：①设字母（把"车速""含量"变成v、f）→②抓关系词（不超过=≤、不少于=≥、高于=＞、低于=＜、"不低于"含等于）→③写式子。多条约束同时成立就捆成不等式组。翻译丢条件=丢解（"不低于20万"写成"＞20万"就把恰好20万的合法解踢出去了）。

教材p37-38问题2来一个"翻译完还暂时解不动"的例子——它在给后面两节埋钩子：

问题2：某杂志原价每本2.5元，可售出8万本。市场调查：单价每提高0.1元，销量就减少2000本。如何定价，才能使提价后的销售总收入不低于20万元？

设提价后每本定价 x 元。提价 $(x-2.5)$ 元，里面有 $(x-2.5)/0.1$ 个"0.1元"，每个"0.1元"少卖2000本=0.2万本——销量（万本）＝$8-(x-2.5)/0.1\times0.2$。于是"总收入不低于20万元"写成不等式（教材式①）：

$$(8-(x-2.5)/0.1\times0.2)\cdot x \geq 20$$

教材p38接着说："求出不等式①的解集，就能知道满足条件的杂志的定价范围。如何解不等式①呢？与解方程要用等式的性质一样，解不等式要用不等式的性质。为此，我们需要先研究不等式的性质。"——这就是本节的路线图：先备好性质工具箱，2.3节回来收拾式①。展开后它是 $13x-2x^2\geq20$（sympy expand 留痕），一个二次的家伙，硬碰硬要等2.3；但"检查一个x合不合法"现在就会：代进去验就完了。


验一验①（先答，再看答案）

x=2.5（不提价）合法吗？x=6.5呢？

答案：x=2.5：收入=8×2.5=20万，"不低于20"含等于——合法（式①左端 $=13\times2.5-2\times2.5^2=32.5-12.5=20\geq20$ ✓）。x=6.5：$13\times6.5-2\times6.5^2=84.5-84.5=0<20$，不合法——提太高没人买了。

易错变形（自编）："不少于2.3%"写成"p＞2.3%"错在哪？——"不少于"含等于（≥）；写成＞会把恰好2.3%的合格品判成不合格。关系词翻译差一个等号，答案就差一批解。

第②站 作差——比大小的通用尺



这张图在说什么：数轴上谁在右边谁就大——教材p38把这句大白话正规化成"基本事实"。

教材p38原文："由于数轴上的点与实数一一对应，所以可以利用数轴上点的位置关系来规定实数的大小关系。"关于实数a，b大小的比较，有以下基本事实：

> 如果 a−b 是正数，那么 a＞b；如果 a−b 等于0，那么 a=b；如果 a−b 是负数，那么 a＜b。反过来也对。

教材p38把它写成三行等价式（双向通行）：

$$a>b \Leftrightarrow a-b>0;\quad a=b \Leftrightarrow a-b=0;\quad a<b \Leftrightarrow a-b<0$$

教材侧栏点睛：0是正数与负数的分界点，它为实数比较大小提供了"标杆"。也就是说：要比较a，b的大小，可以转化为比较它们的差与0的大小——"比大小"变成了"定正负"，而减法、去括号、合并同类项你闭着眼都会。这个动作叫作差法。

例1（教材**p38**）：比较 $(x+2)(x+3)$ 和 $(x+1)(x+4)$ 的大小。

分析：考察两个多项式的差与0的大小关系。解：因为

$$(x+2)(x+3)-(x+1)(x+4)=(x^2+5x+6)-(x^2+5x+4)=2>0,$$

所以 $(x+2)(x+3)>(x+1)(x+4)$。教材p39点评："我们借助多项式减法运算，得出了一个明显大于0的数（式）。这是解决不等式问题的常用方法。"

> 作差三步固定动作：作差（谁减谁要想清楚：求"A大还是B大"就算A−B）→变形（展开合并/因式分解/配方/通分——目标是化成"一眼定号"的形状）→定号（与0比，正则A大，负则A小，零则相等）。变形变形，"明显"二字是终点站：常数、平方、平方和，都是一眼定号的形状。

验一验②（先答，再看答案·教材**p40**练习2、3）

（1）比较 $(x+3)(x+7)$ 和 $(x+4)(x+6)$。

答案：作差=$(x^2+10x+21)-(x^2+10x+24)=-3<0$，前者小于后者（对一切x恒成立·sympy expand 留痕）。跟例1同款套路，只差最后定号方向。


（2）已知 $a>b$，证明 $a>(a+b)/2>b$。

答案：两段作差：$a-(a+b)/2=(a-b)/2>0$（因为$a>b$），所以 $a>(a+b)/2$；$(a+b)/2-b=(a-b)/2>0$，所以 $(a+b)/2>b$。两个不等号都到手，证毕。$(a+b)/2$ 是a，b的算术平均数——它被夹在两数正中间，这条"中点夹逼"下节马上当主角。

易错变形（自编）：比较 x^2 与 $-x^2$。作差=$2x^2\geq 0$——所以 $x^2\geq -x^2$ 恒成立，且等号只在**x=0**。看见没：作差法连"要不要分情况讨论"都替你答了——不用分，差自己会说话。

第③站 弦图实验——$a^2+b^2\geq 2ab$ 诞生记

教材p39探究请出一位老演员：2002年北京第24届国际数学家大会的会标——按中国古代数学家赵爽的弦图设计，颜色明暗像风车（图2.1-3）。教材问：你能在这个图中找出一些相等关系和不等关系吗？



这张图在说什么：教材图2.1-4的抽象重绘——大正方形比4个三角形多出的部分，就是中间那个小正方形（边长a−b）。

教材**p39**推理（照原样走一遍）：将图2.1-3中的"风车"抽象成图2.1-4：正方形ABCD中有4个全等的直角三角形，设直角三角形两条直角边长为 a，b（a≠b），那么正方形ABCD的边长为 √(a²+b²)。4个直角三角形的面积和为 **2ab**，正方形ABCD的面积为 **a²+b²**。由于正方形ABCD的面积大于4个直角三角形的面积和，就得到不等式 **a²+b²＞2ab**。当直角三角形变为等腰直角三角形（即a=b）时，正方形EFGH缩为一个点，这时 **a²+b²=2ab**。于是就有 a²+b²≥2ab。

代数复核（教材**p39**底·一句话验明正身）：利用完全平方公式，a²+b²−2ab=(a−b)²。因为对一切实数，(a−b)²≥0，当且仅当a=b时等号成立，所以由基本事实立刻得到 a²+b²≥2ab。"当且仅当"=充要条件（1.4的话术上岗）：**a=b 是 a²+b²=2ab 的充要条件**——等号何时成立，说得明明白白，这就是充要条件的日常用法。

记住这个不等式：它是2.2基本不等式的种子。第④站讲完性质就回来收割。

> 验一验③（先答，再看答案）
>
> （1）代两组数进 a²+b²≥2ab 验一验。

> 答案：a=1,b=2：1+4=5＞2×1×2=4 ✓（严格大于，1≠2）；a=b=3：9+9=18=2×9 ✓（等号，a=b）。
>
> 易错变形（自编·提前踩2.2的坑）："由 $a^2+b^2\geq 2ab$ 可以推出 $a+b\geq 2\sqrt{ab}$ 吗？"——不行，负数立刻翻车：a=b=−1 时左边 a+b=−2，右边 $2\sqrt{1}=2$，$-2\geq 2$ 是假的。问题出在"开平方要求非负"。所以下节的基本不等式必须限定 **a**，**b** 都是正数——种子已经埋下，2.2见。

第④站 性质库——等式5条打底，不等式7条盖楼

教材p40思考框给的方法论："请你先梳理等式的基本性质，再观察它们的共性。你能归纳一下发现等式基本性质的方法吗？"——先把旧知识点名，再类比着猜新性质、最后证明。这条"类比+证明"的流水线，就是本站的发动机。

等式的基本性质（教材**p40**·旧知识点名）

性质1 如果 a=b，那么 b=a；　性质2 如果 a=b，b=c，那么 a=c；　性质3 如果 a=b，那么 a±c=b±c；　性质4 如果 a=b，那么 ac=bc；　性质5 如果 a=b，c≠0，那么 a/c=b/c。


教材点评："性质1，2反映了相等关系自身的特性，性质3，4，5是从运算的角度提出的，反映了等式在运算中保持的不变性。"侧栏一句话收魂：
运算中的不变性就是性质。

不等式的基本性质（教材**p41-42**·本节主菜）

性质1（对称） 如果 a＞b，那么 b＜a；如果 b＜a，那么 a＞b。即 $a>b \Leftrightarrow b<a$。

性质2（传递） 如果 a＞b，b＞c，那么 a＞c。即 $a>b,\ b>c \Rightarrow a>c$。教材原样证明：由基本事实，$a>b \Rightarrow a-b>0$；$b>c \Rightarrow b-c>0$。两式相加 $(a-b)+(b-c)=a-c>0 \Rightarrow a>c$。（"正数加正数还是正数"——全证明只用这一条常识。）

性质3（可加） 如果 $a>b$，那么 $a+c>b+c$。这就是说，不等式两边都加上同一个实数，所得不等式与原不等式同向。



A、B两点同时向右（或向左）移动相同距离，左右关系不变 —— a+c 与 b+c 依然 a＞b（教材图2.1-5）

这张图在说什么：平移不翻面——"加减不改变不等号方向"的画面版。

教材p41由性质3顺手推出移项：$a+b>c \Rightarrow a+b+(-b)>c+(-b) \Rightarrow \mathbf{a>c-b}$。"这表明，不等式中任何一项可以改变符号后移到不等号的另一边。"——跟解方程的移项手感一致，而且不等号方向永远不变（这是不等式比等式省心的地方：加减不翻向）。

> 性质4（乘法分岔·本节第一坑）：如果 $a>b$，$c>0$，那么 $ac>bc$；如果 $\mathbf{a>b}$，$\mathbf{c<0}$，那么 $\mathbf{ac<bc}$。乘正数同向，乘负数反向。为什么？-1 是镜像翻转：数轴所有点翻到另一侧，左右对调。c=0 呢？ac=bc——既不大于也不小于，所以性质4必须分 $c>0$ / $c<0$ 两支说，c=0 是"等号区"。

性质5（同向相加） 如果 $a>b$，$c>d$，那么 $a+c>b+d$。教材证明：由 $a>b$ 和性质3，得 $a+c>b+c$；由 $c>d$ 和性质3，得 $b+c>b+d$；根据性质2（传递），即得 $a+c>b+d$。注意：只能加，不能直接减——想减就先把减数变号（$c<d \Rightarrow -c>-d$，再用性质5）。

性质6（同向正乘） 如果 $a>b>0$，$c>d>0$，那么 $ac>bd$。前提两头都是正数——丢前提立刻翻车（下面验一验④现场演）。

性质7（正数乘方） 如果 $a>b>0$，那么 $a^n>b^n$（$n\in N$，$n\geq 2$）。就是反复用性质6：$a>b>0$ 与自身串乘得 $a^2>b^2$，再乘一轮得 $a^3>b^3$……

教材p42收束一句："实数大小关系的基本事实和不等式的性质是解决不等式问题的基本依据。"

例2（教材**p42**）：已知 $a>b>0$，$c<0$，求证 $c/a>c/b$。

教材证明（照原样走）：因为 $a>b>0$，所以 $ab>0$，$1/(ab)>0$。于是 $a\cdot 1/(ab)>b\cdot 1/(ab)$（性质4乘正数），即 **$1/b>1/a$**。由 $c<0$，得 $c/a>c/b$（性质4乘负数：两边同乘负数c，不等号反向）。

看清楚这个证明的节奏："倒数谁大"不在性质库里，是现场用性质4推出来的。教材没有一条"倒数反向"性质——需要时像例2这样现推，前提（谁正谁负）一个都不能少。

验一验④（先答，再看答案·教材**p42**练习2填空四连）

用">"或"<"填空：

（1）如果 $a>b$，$c<d$，那么 $a-c$ ___ $b-d$；

答案：>。$c<d \Rightarrow -c>-d$（乘-1反向），与 $a>b$ 同向相加（性质5）：$a+(-c)>b+(-d)$。

（2）如果 $a>b>0$，$c<d<0$，那么 ac ___ bd；

答案：<。$c<d<0 \Rightarrow -c>-d>0$（乘-1反向，还都是正数）；由 $a>b>0$ 与 $-c>-d>0$ 用性质6：$a(-c)>b(-d)$，即 $-ac>-bd$，两边再乘-1反向：**$ac<bd$**。负数也守"大乘大"——只是先要把它们集体翻正。

（3）如果 $a>b>0$，那么 $1/a^2$ ___ $1/b^2$；

答案：<。性质7得 $a^2>b^2>0$；作差或用例2同款现推：$1/a^2-1/b^2=(b^2-a^2)/(a^2b^2)$，分子<0分母>0，差<0。（"大正数的平方的倒数反而小"——倒数问题一律现推，别背。）

（4）如果 $a>b>c>0$，那么 c/a ___ c/b；

答案：<。由 $a>b>0$ 现推 $1/a<1/b$（例2前半段同款），分子 $c>0$ 同乘同向（性质4）：$c/a<c/b$。

易错变形（自编·性质6丢前提现场翻车）："$a>b$，$c>d$，就能 $ac>bd$ 吗？"——$a=2$，$b=-3$，$c=-1$，$d=-2$：$ac=-2$，$bd=6$，$-2<6$，反

向！救回来要加前提"都是正数"，或者像(2)那样先翻正。性质5-7的前提就是护栏，抄性质不抄前提=白学。

收口 三句话带走 + 自测四连

1. 比大小=作差与0比（基本事实三等价，0是标杆）——作差、变形、定号三步走，变形到"明显正负"收工。

2. 不等式性质1-3：对称、传递、加减同向（平移不翻面）；性质4分岔：乘正同向、乘负反向；性质5-7组合技：同向相加、同向正乘、正数乘方——每条性质的前提都是护栏。

3. $a^2+b^2\geq 2ab$（当且仅当a=b等号成立）——弦图+代数双证在手，2.2基本不等式从这里发芽。

自测四连（先自己答，再对答案；答案直接给你）：

①（教材p42练习2(1)）$a>b$，$c<d$，比较 $a-c$ 与 $b-d$。

答案：$-c>-d$，与 $a>b$ 同向相加：$a-c>b-d$。

②（教材p43习题3(3)改述）$x>1$ 时，比较 x^2 与 x^2-x+1。

答案：作差 $x^2-(x^2-x+1)=x-1>0$（$x>1$），所以 $x^2>x^2-x+1$。注意：没有 $x>1$ 时差 $=x-1$ 可正可负——作差定号要看前提范围。

③（教材p43习题3(2)同族）比较 $(x-3)^2$ 与 $(x-2)(x-4)$。

答案：作差$=(x^2-6x+9)-(x^2-6x+8)=1>0$ 恒成立，$(x-3)^2$ 恒大1。展开后一次项互相抵消、只剩常数——"明显定号"的漂亮样本（sympy expand 留痕）。

④（教材p43习题5）已知 $2<a<3$，$-2<b<-1$，求 $2a+b$ 的取值范围。

答案：$2a\in(4,6)$（同乘正数2同向），与 $b\in(-2,-1)$ 用性质5同向相加：**$2a+b\in(2,5)$**。范

围题的官方解法就是"性质5"。（易错警示：别把 a、b 各自平方或相乘——范围运算只许加减同向、乘除看符号。）

练什么题：教材p40练习1（翻译三连：h≤4 / a+b≥0 / L＞4W 且场地约束）、练习2-3（作差+中点夹逼）；p42练习1（证明性质1，3，4，6——拿性质练性质）、练习2（四填空）；p42-43习题2.1（复习巩固2的绿化两方案翻译〔教材原题含一次性投入与逐年投入对照·保留教材数值〕、3的四组比较、5的范围、6的传递证明；综合运用7的负数除法链、8的真命题四选、9的圆比方、10的糖水不等式；拓广探索11的√a＞√b、12的货运方案）。时间紧就先做：练习2全部＋习题3(1)(2)＋习题5＋习题10——翻译、作差、范围、性质应用四个考位一网打尽。

卡住了？（四个最容易卡的地方，就地给出路）

· 乘负数为什么反向？——数轴镜像：×(−1)把所有点翻到另一侧，左右对调。口诀"正同负反"，c=0相等。做题先盯乘数符号，再决定动不动方向。

· 性质5-7前提总忘？——背口诀"加要同向，乘要同正，方要正数"。每写一步性质，把前提抄在旁边（像例2那样"因为a＞b＞0，所以…"），前提护住，结论才站得住。

· 作差后定不了号？——变形工具箱按顺序试：展开合并→因式分解→配方→通分。目标是化成平方、平方和、常数这类"一眼正负"的形状（例1剩2、验②剩−3、验③剩$(a-b)^2$）。什么都化不出来，说明要按参数范围分情况讨论——那是练习题的高阶位，本节先见熟脸。

· "当且仅当"别扭？——就是1.4的"充要条件"换了口语马甲：等号成立⟺a=b。两个方向都验过才敢说这句。

高考怎么考（三行以内·真题锚候采）

· 性质判断题是选择题常客：给几条"由 a＞b 推出…"让数真命题个数——专考前提完整性（乘负反向、同向正乘、倒数现推）与"赋值排除法"（举一组特殊值推翻假命题）；

· 作差法是比较大小、后面恒成立与2.3解不等式的通法底盘；范围题（同向相

加）在选填高频复现；

· 真题锚：候采——v2.9池内暂无2.1对口卷源，不代拟（池外题宁缺毋编，沿标准v2.3纪律）。

下一站：2.2 基本不等式——把本节的 $a^2+b^2\geq 2ab$ 里换上 $\sqrt{a}$ 和 $\sqrt{b}$（限定 a，$b>0$），教材p44开篇就是这个动作：$\sqrt{ab}\leq(a+b)/2$，"算术平均数不小于几何平均数"。同时它还是问题2式①的收割人：$13x-2x^2\geq 20$ 那个"暂时解不动"的二次式，2.3节正式解决。



这张图在说什么：本节是第二章的工具间——性质备齐，后面两节才能开火。