Алгебра перед математическим анализом

для любимого котеночка

Числа, функции и первые идеи высшей математики



Оглавление

Справочник обозначений 3

Алфавиты в математике 15

Справочные таблицы 17

1 Числа и свойства арифметических действий 19

2 Делимость, простые числа, НОД и НОК 30

3 Обыкновенные дроби 36

4 Десятичные дроби и проценты 39

5 Отношения и пропорции 42

6 Степени с целым показателем 44

7 Корни и действительные числа 46

8 Модуль и числовые промежутки 52

9 Преобразование алгебраических выражений 54

10 Комбинаторика и бином Ньютона 57

11 Уравнения, системы и неравенства 64

12 Последовательности и прогрессии 70

13 Функции и графики 77

14 Степенные, показательные и логарифмические функции 82

15 Тригонометрия 92

16 Множества, логика и доказательства 102

17 Неравенства, оценки и методы доказательства 117

18 Векторы, матрицы и линейные системы 126

19 Предел функции и непрерывность 139

20 Производная и линейное приближение 149

21 Остатки, сравнения и целочисленные уравнения 160

22 Полугруппы, моноиды, группы, кольца и поля 166

23 Комплексные числа **174**

24 Кватернионы и повороты в пространстве **194**

25 Октонионы: когда важны скобки **199**

26 Векторные пространства, базисы и линейные отображения **204**

27 Собственные значения и квадратичные формы **211**

28 Полнота и метрические пространства **218**

29 Интеграл Римана и первообразная **226**

30 Числовые и степенные ряды **234**

Ответы и краткие решения **242**

Справочник обозначений

Начертания символов

Обозначение	Как читать	Значение
x	математический курсив	Обычное начертание переменных; смысл буквы задаётся в тексте.
x	прямое начертание	Так оформляют названия операторов и единицы измерения; начертание само по себе не задаёт значение.
$\mathbf{v} = \vec{v}$	полужирное начертание; стрелка	Две распространённые записи вектора.
$\mathbb{R}$	двойное начертание	Распространено для числовых множеств; здесь показан знак действительных чисел.
$\mathcal{A}$	каллиграфическое начертание	Часто обозначает семейство множеств или другой специально определённый объект.
$\mathfrak{g}$	фрактура	Используется в алгебре для отличия одних объектов от других; смысл устанавливает определение.

Числа и числовые множества

Обозначение	Как читать	Значение
0	ноль	Нейтральный элемент сложения: $a + 0 = a$.
1	единица	Нейтральный элемент умножения: $a \cdot 1 = a$.
$\mathbb{N}$	натуральные числа	$\{1, 2, 3, \ldots\}$.
$\mathbb{N}_0$	натуральные числа с нулём	$\{0, 1, 2, 3, \ldots\}$.

Обозначение	Как читать	Значение
$\mathbb{Z}$	целые числа	$\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$.
$\mathbb{Q}$	рациональные числа	Числа $\frac{p}{q}$, где $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{Z}$, $q \neq 0$.
$\mathbb{R}$	действительные числа	Числа числовой прямой, включая рациональные и иррациональные.
$\mathbb{C}$	комплексные числа	Числа вида $a + bi$, где $a, b \in \mathbb{R}$.
$\mathbb{H}$	кватернионы	Вещественная алгебра размерности 4 с некоммутативным ассоциативным умножением.
$\mathbb{O}$	октонионы	Вещественная алгебра размерности 8; умножение не ассоциативно.
$\mathbb{K}$	поле скаляров	В главах о векторных пространствах: $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$, по условию.
$\mathbb{R}^n$	эр в степени эн	Множество упорядоченных наборов из n действительных координат.

Действия и сравнения чисел

Обозначение	Как читать	Значение
$+$	плюс	Сложение: $2 + 3 = 5$.
$-$	минус	Вычитание или противоположное число: $5 - 2 = 3$, $-a$.
$\cdot$	умножить	Умножение: $ab = a \cdot b$.
$:$	разделить	Деление: $6 : 3 = 2$; делитель ненулевой.
$\frac{a}{b}$	дробь а на б	Частное; знаменатель $b \neq 0$.
$=$	равно	Равенство двух выражений.
$\neq$	не равно	Выражения имеют разные значения.
$<$	меньше	Строгое сравнение.
$>$	больше	Строгое сравнение.
$\leq$	меньше или равно	Нестрогое сравнение; равенство допускается.
$\geq$	больше или равно	Нестрогое сравнение; равенство допускается.

Обозначение	Как читать	Значение
$\approx$	приблизительно равно	Например, $\sqrt{2} \approx 1{,}414$.
$\pm$	плюс или минус	$x = \pm 2$ означает $x = -2$ или $x = 2$.
a^n	а в степени эн	Степень с натуральным показателем; $a^0 = 1$ при $a \neq 0$.
a^{-n}	а в степени минус эн	При $n \in \mathbb{N}$, $a \neq 0$: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.
$\sqrt{a}$	квадратный корень из а	Неотрицательное число с квадратом a; требуется $a \geq 0$.
$\sqrt[n]{a}$	корень энной степени	Для чётного n берётся неотрицательный корень и требуется $a \geq 0$.
$\lvert a \rvert$	модуль а	Расстояние от a до нуля.

Делимость и сравнения по модулю

Обозначение	Как читать	Значение
$a \vdots b$	а делится на б нацело	$a = bk$ для целого k; $b \neq 0$.
$a \mid b$	а делит б	$b = ak$ для целого k; порядок обратен записи с тремя точками.
$a \nmid b$	а не делит б	Число b не кратно a.
$\gcd(a, b)$	наибольший общий делитель	НОД; английское greatest common divisor.
$\operatorname{lcm}(a, b)$	наименьшее общее кратное	НОК; английское least common multiple.
$a \equiv b \pmod{m}$	а сравнимо с б по модулю эм	$m \mid (a - b)$, где m — положительное целое.
$[a]_m$	класс а по модулю эм	Все целые числа $a + mk$, $k \in \mathbb{Z}$.
$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$	целые по модулю эм	Множество классов вычетов по модулю m.

Множества и пары

Обозначение	Как читать	Значение
$x \in A$	икс принадлежит а	x — элемент множества A.
$x \notin A$	икс не принадлежит а	x не является элементом A.
$\{\dots\}$	множество перечисленных элементов	Фигурные скобки: $\{1, 2, 3\}$.
$\emptyset$	пустое множество	Множество без элементов.
$A \subseteq B$	а является подмножеством б	Каждый элемент A принадлежит B; равенство допускается.
$A \subset B$	а — собственное подмножество б	$A \subseteq B$, но $A \neq B$.
$A \cup B$	объединение а и б	Элементы хотя бы одного из множеств.
$A \cap B$	пересечение а и б	Элементы, принадлежащие обоим множествам.
$A \setminus B$	разность а и б	Элементы A, не принадлежащие B.
A^c	дополнение а	$U \setminus A$; зависит от выбранного универсума.
$A \triangle B$	симметрическая разность	Элементы ровно одного из двух множеств.
$A \times B$	декартово произведение	Все упорядоченные пары с первой координатой из A, второй из B.
(a, b)	упорядоченная пара	Порядок координат важен.
$\mathcal{P}(A) = 2^A$	множество всех подмножеств а	Все множества B, для которых $B \subseteq A$.
$\lvert A \rvert$	число элементов а	Для конечного множества; смысл отличается от модуля числа.

Промежутки числовой прямой

Обозначение	Как читать	Значение
$(a; b)$	открытый интервал	$a < x < b$; концы исключены.

Обозначение	Как читать	Значение
$[a;b]$	отрезок	$a \leq x \leq b$; оба конца включены.
$[a;b)$	полуинтервал	$a \leq x < b$; левый конец включён, правый исключён.
$(a;b]$	полуинтервал	$a < x \leq b$; левый конец исключён, правый включён.
∞	бесконечность	Не действительное число; у бесконечной границы промежутка ставят круглую скобку.

Логика и доказательства

Обозначение	Как читать	Значение
$\forall$	для любого	Квантор всеобщности.
$\exists$	существует	Квантор существования.
$\to,\ \Rightarrow$	импликация	Если P истинно, то Q истинно.
$\leftrightarrow,\ \Leftrightarrow$	тогда и только тогда	Каждое утверждение следует из другого.
$\neg P$	не пэ	Отрицание утверждения P.
$P \wedge Q$	пэ и ку	Оба утверждения истинны.
$P \vee Q$	пэ или ку	Хотя бы одно утверждение истинно.
■	конец доказательства	В конце доказательства; в отдельных заданиях пустой квадрат может обозначать неизвестную цифру.
$*$	звёздочка	Задача повышенной сложности.
$P \oplus Q$	исключающее или	Истинно, когда истинно ровно одно из двух утверждений.
$P \uparrow Q$	штрих Шеффера	Отрицание конъюнкции: $\neg(P \wedge Q)$.
$P \downarrow Q$	стрелка Пирса	Отрицание дизъюнкции: $\neg(P \vee Q)$.
$\top$	истина	Логическая константа истины.
$\bot$	ложь	Логическая константа лжи.
$\Gamma \vdash A$	из гаммы выводится а	Синтаксическая выводимость в указанной системе правил.

Обозначение	Как читать	Значение
$\Gamma \models A$	из гаммы семантически следует а	При каждой оценке, делающей все посылки истинными, заключение истинно.
$A \equiv B$	формулы а и б равносильны	Формулы имеют одно истинностное значение при каждой оценке.
$v \models A$	оценка вэ удовлетворяет а	Формула A истинна при оценке v.

Суммы, комбинаторика и последовательности

Обозначение	Как читать	Значение
$S(n)$	следующее за эн	Операция следования в аксиомах Пеано; $S(0) = 1$.
$\sum_{k=1}^{n} a_k$	сумма по ка от одного до эн	$a_1 + \cdots + a_n$.
$\prod_{k=1}^{n} a_k$	произведение по ка	$a_1 \cdots a_n$.
$n!$	эн факториал	$1 \cdot 2 \cdots n$ при $n \geq 1$; отдельно $0! = 1$.
P_n	число перестановок	Перестановки n различных элементов: $n!$.
A_n^k	число размещений	Выбор k из n различных объектов с учётом порядка.
$\binom{n}{k} = C_n^k$	число сочетаний из эн по ка	Выбор k из n без учёта порядка.
a_n	энный член последовательности	Значение последовательности с номером n.
S_n	энная частичная сумма	Сумма первых n членов последовательности.
$\lim_{n\to\infty} a_n$	предел последовательности	Число, к которому члены становятся сколь угодно близки при больших n.
$\sup A$	точная верхняя грань а	Наименьшая из верхних границ множества A, если она существует.
$\inf A$	точная нижняя грань а	Наибольшая из нижних границ непустого множества A, если она существует.

Функции, экспонента и логарифмы

Обозначение	Как читать	Значение
$f : X \to Y$	эф из икс в игрек	Отображение с областью определения X и множеством назначения Y.
$x \mapsto f(x)$	икс переходит в эф от икс	Правило, сопоставляющее аргументу значение функции.
$f(x)$	эф от икс	Значение функции при аргументе x.
$f \circ g$	композиция эф и жэ	$(f \circ g)(x) = f(g(x))$; сначала выполняется g.
f^{-1}	обратная функция	Обратное отображение; обычно это не $\frac{1}{f}$.
e	число е	Основание натурального логарифма; $e = \lim_{n\to\infty}(1 + \frac{1}{n})^n$.
$e^x = \exp x$	экспонента от икс	Показательная функция с основанием e.
$\ln x = \log_e x$	натуральный логарифм	Логарифм по основанию e; $x > 0$.
$\log_a x$	логарифм икс по основанию а	$a > 0$, $a \neq 1$, $x > 0$.

Тригонометрические и гиперболические функции

Обозначение	Как читать	Значение
π	число пи	Отношение длины окружности к её диаметру.
$\sin x$	синус икс	Вертикальная координата на единичной окружности.
$\cos x$	косинус икс	Горизонтальная координата на единичной окружности.
$\operatorname{tg} x$	тангенс икс	$\frac{\sin x}{\cos x}$ при $\cos x \neq 0$.
$\arcsin x$	арксинус икс	Обратная к синусу на $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$.

Обозначение	Как читать	Значение
$\arccos x$	арккосинус икс	Обратная к косинусу на $[0;\pi]$.
$\operatorname{arctg} x$	арктангенс икс	Обратная к тангенсу на $(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2})$.
$\operatorname{sh} x$	гиперболический синус	$\frac{e^x-e^{-x}}{2}$.
$\operatorname{ch} x$	гиперболический косинус	$\frac{e^x+e^{-x}}{2}$.
$\operatorname{ctg} x$	котангенс икс	$\frac{\cos x}{\sin x}$; $\sin x \neq 0$.
$\operatorname{th} x$	гиперболический тангенс	$\frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}$; определён при всех действительных x.
$\operatorname{cth} x$	гиперболический котангенс	$\frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x}$; $x \neq 0$.

Векторы и матрицы

Обозначение	Как читать	Значение
$\|v\|$	длина вектора вэ	Евклидова длина, например $\sqrt{x^2+y^2}$ для $v=(x,y)$.
a_{ij}	элемент а с индексами и, жэ	Элемент матрицы в строке i, столбце j.
AB	произведение матриц а и б	Определено, если число столбцов A равно числу строк B.
I_n	единичная матрица порядка эн	На главной диагонали стоят единицы, остальные элементы равны нулю.
$\det A$	определитель матрицы а	Для $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ равен $ad-bc$.
A^{-1}	обратная матрица	$AA^{-1}=A^{-1}A=I$; существует не у всякой квадратной матрицы.
$\mathbf{0}$	нулевой вектор	Вектор, все координаты которого равны нулю.
$\langle u,v\rangle = u\cdot v$	скалярное произведение векторов	Евклидово скалярное произведение в $\mathbb{R}^n$: $\sum_{k=1}^{n} u_k v_k$.

Обозначение	Как читать	Значение
rank A	ранг матрицы а	Число ведущих элементов в ступенчатом виде матрицы.
span S	линейная оболочка	Все конечные линейные комбинации векторов из указанного набора.
dim V	размерность вэ	Число векторов в базисе конечномерного пространства.
$[v]_B$	координаты вэ в базисе бэ	Столбец коэффициентов разложения вектора по указанному базису.
ker T	ядро тэ	Векторы v, для которых $T(v) = 0$.
im T	образ тэ	Все значения $T(v)$.
$\mathcal{P}_m$	пространство многочленов	Многочлены степени не выше m, включая нулевой многочлен.
A^{T}	транспонированная матрица	Строки и столбцы меняются местами.
diag$(\ldots)$	диагональная матрица	Указанные элементы на диагонали, нули вне диагонали.
$\chi_A(t)$	характеристический многочлен	В главе 27 используется соглашение $\det(tI - A)$; корни — собственные значения.
E_λ	собственное подпространство	$\ker(A - \lambda I)$; включает нулевой вектор.

Предел функции и производная

Обозначение	Как читать	Значение
$x \to a$	икс стремится к а	Аргумент приближается к точке a.
$x \to a-$	икс стремится к а слева	Рассматриваются значения $x < a$.
$x \to a+$	икс стремится к а справа	Рассматриваются значения $x > a$.
$\lim\limits_{x \to a} f(x)$	предел эф от икс при икс к а	Предел в точке; значение $f(a)$ может отсутствовать или отличаться от предела.
$f'(a)$	производная эф в точке а	Предел $\lim_{h \to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$, если он существует и конечен.

Обозначение	Как читать	Значение
$y - f(a) = f'(a)(x - a)$	уравнение касательной	Касательная к графику дифференцируемой функции в точке с абсциссой a.

Алгебраические структуры

Обозначение	Как читать	Значение
$a * b$	а звёздочка б	Результат заданной бинарной операции; это не обязательно обычное умножение.
e_G	нейтральный элемент группы жэ	Элемент, не меняющий другие элементы при операции.
a^{-1}	обратный к а	В группе: $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$.
id_X	тождественное отображение икс	Оставляет каждый элемент X на месте.
$\mathrm{Sym}(X)$	группа перестановок икс	Все биекции множества X в себя с операцией композиции.
S_n	симметрическая группа степени эн	Все перестановки $\{1, \dots, n\}$; число элементов этой группы равно $n!$.
$\mathrm{M}_2(\mathbb{R})$	матрицы два на два над эр	Кольцо действительных матриц размера 2×2.
$\mathbb{F}_p$	поле из пэ элементов	При простом p: поле вычетов $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Комплексные числа

Обозначение	Как читать	Значение
i	мнимая единица	Комплексное число, для которого $i^2 = -1$.
$a + bi$	а плюс бэ и	Алгебраическая форма комплексного числа.
$\mathrm{Re}\, z$	действительная часть зет	Число a в записи $z = a + bi$.

Обозначение	Как читать	Значение
$\operatorname{Im} z$	мнимая часть зет	Действительное число b в записи $z = a + bi$; множитель i в мнимую часть не входит.
$\overline{z}$	зет с чертой	Комплексное сопряжение: при $z = a + bi$ получаем $\overline{z} = a - bi$.
$\lvert z \rvert$	модуль комплексного числа	При $z = a + bi$: $\sqrt{a^2 + b^2}$. Расстояние до начала координат.
$\arg z$	аргументы зет	Все углы направления ненулевого z; различаются на $2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. У нуля аргумент не определён.
$\operatorname{Arg} z$	главный аргумент зет	Для $z \neq 0$: единственный аргумент из $(-\pi; \pi]$; это принятое в книге соглашение.
$r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$	тригонометрическая форма	Для $z \neq 0$ здесь $r = \lvert z \rvert > 0$, а φ — один из аргументов.
$e^{i\varphi}$	е в степени и фи	Экспоненциальная запись $\cos\varphi + i\sin\varphi$ для действительного φ.

Кватернионы и октонионы

Обозначение	Как читать	Значение
j	кватернионная единица жэ	$j^2 = -1$, $ij = k$, $ji = -k$.
k	кватернионная единица ка	$k = ij$, $k^2 = -1$.
$N(q) = \lvert q \rvert^2$	квадрат нормы	Сумма квадратов действительных координат кватерниона или октониона.
$e_0, \dots, e_7$	базис октонионов	Восемь базисных элементов в выбранном соглашении; $e_0 = 1$.
$[x, y, z]$	ассоциатор	Разность $(xy)z - x(yz)$; измеряет зависимость от расстановки скобок.

Метрики и окрестности

Обозначение	Как читать	Значение
$d(x, y)$	расстояние между икс и игрек	Значение выбранной метрики; её правило задаётся в условии.
$d_1(x, y)$	метрика суммы модулей	$\sum_j \lvert x_j - y_j\rvert$.
$d_2(x, y)$	евклидова метрика	$\sqrt{\sum_j (x_j - y_j)^2}$.
$d_\infty(x, y)$	метрика максимума	$\max_j \lvert x_j - y_j\rvert$.
$B_r(a)$	открытый шар	Точки x, для которых $d(x, a) < r$, где $r > 0$.
(x_{n_k})	подпоследовательность	Члены с номерами $n_1 < n_2 < \cdots$.

Интегралы и ряды

Обозначение	Как читать	Значение
$\int_a^b f(x)\,dx$	определённый интеграл	Интеграл от нижней границы до верхней.
$\int f(x)\,dx$	неопределённый интеграл	Семейство первообразных на указанном интервале.
$[F(x)]_a^b$	подстановка пределов	Разность $F(b) - F(a)$.
$\lVert P\rVert$	мелкость разбиения	Наибольшая длина его частей; смысл отличается от нормы вектора.
$L(f, P)$	нижняя сумма Дарбу	$\sum_i m_i(x_i - x_{i-1})$; используются инфимумы на частях.
$U(f, P)$	верхняя сумма Дарбу	$\sum_i M_i(x_i - x_{i-1})$; используются супремумы на частях.
$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$	числовой ряд	Предел конечных частичных сумм, если он существует и конечен.
$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$	степенной ряд	Для каждого фиксированного аргумента получается числовой ряд.

Алфавиты в математике

Буква сама по себе не задаёт объект: её смысл устанавливается в определении или условии. Например, i может быть индексом, а в главе о комплексных числах — мнимой единицей. Прописные и строчные буквы различаются.

Латинский алфавит

Названия приведены по английскому алфавиту. В русских лекциях математические буквы часто читаются иначе: например, «а», «бэ», «цэ», «икс», «игрек». Это не меняет их роли в формуле.

Прописная	Строчная	Название
A	a	эй
B	b	би
C	c	си
D	d	ди
E	e	и
F	f	эф
G	g	джи
H	h	эйч
I	i	ай
J	j	джей
K	k	кей
L	l	эл
M	m	эм
N	n	эн
O	o	оу
P	p	пи
Q	q	кью
R	r	ар
S	s	эс
T	t	ти
U	u	ю
V	v	ви
W	w	дабл-ю
X	x	экс
Y	y	уай
Z	z	зед

Греческий алфавит

Варианты начертания одной буквы: ϵ, ε; ϕ, φ; θ, ϑ; ρ, ϱ; π, ϖ; σ, ς. Смысл зависит от контекста; разные варианты могут обозначать разные объекты, если автор так договорился.

Прописная	Строчная	Название
A	α	альфа
B	β	бета
Γ	γ	гамма
Δ	δ	дельта
E	ε	эпсилон
Z	ζ	дзета
H	η	эта
Θ	θ	тета
I	ι	йота
K	κ	каппа
Λ	λ	лямбда
M	μ	мю
N	ν	ню
Ξ	ξ	кси
O	o	омикрон
Π	π	пи
P	ρ	ро
Σ	σ	сигма
T	τ	тау
Υ	υ	ипсилон
Φ	φ	фи
X	χ	хи
Ψ	ψ	пси
Ω	ω	омега

Справочные таблицы

Таблица умножения

$\times$	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81

Тригонометрические значения (радианы)

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} x$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0
$\operatorname{ctg} x$	—	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	—	0	—

Производные базовых функций

$f(x)$	$f'(x)$	Условия
c	0	c — постоянная; $x \in \mathbb{R}$.
x	1	$x \in \mathbb{R}$.
x^n	nx^{n-1}	$n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$; $x \in \mathbb{R}$.
x^α	$\alpha x^{\alpha-1}$	$\alpha \in \mathbb{R}$ постоянна; $x > 0$.
$\sqrt{x}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	$x > 0$.
$\dfrac{1}{x}$	$-\dfrac{1}{x^2}$	$x \neq 0$.
e^x	e^x	$x \in \mathbb{R}$.
a^x	$a^x \ln a$	$a > 0$ постоянно; $x \in \mathbb{R}$.
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$	$x > 0$.
$\log_a x$	$\dfrac{1}{x \ln a}$	$a > 0$, $a \neq 1$, $x > 0$.
$\sin x$	$\cos x$	$x \in \mathbb{R}$, радианы.
$\cos x$	$-\sin x$	$x \in \mathbb{R}$, радианы.
$\operatorname{tg} x$	$\dfrac{1}{\cos^2 x}$	$\cos x \neq 0$, радианы.
$\operatorname{ctg} x$	$-\dfrac{1}{\sin^2 x}$	$\sin x \neq 0$, радианы.
$\arcsin x$	$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$-1 < x < 1$.
$\arccos x$	$-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$-1 < x < 1$.
$\operatorname{arctg} x$	$\dfrac{1}{1+x^2}$	$x \in \mathbb{R}$.
$\operatorname{sh} x$	$\operatorname{ch} x$	$x \in \mathbb{R}$.
$\operatorname{ch} x$	$\operatorname{sh} x$	$x \in \mathbb{R}$.
$\operatorname{th} x$	$\dfrac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$	$x \in \mathbb{R}$.
$\operatorname{cth} x$	$-\dfrac{1}{\operatorname{sh}^2 x}$	$x \neq 0$.

ГЛАВА 1

Числа и свойства арифметических действий

Натуральные числа: аксиомы Пеано

Вычисления с натуральными числами опираются на небольшое число исходных положений. Такое исходное положение называют аксиомой (axiom): в выбранной теории его принимают без доказательства, а дальнейшие утверждения из него выводят.

Определение 1.1. Натуральные числа с нулём (natural numbers including zero) образуют множество $\mathbb{N}_0$. Для его описания выделяют начальное число 0 и операцию S, где $S(n)$ означает число, следующее за n. Тройка $(\mathbb{N}_0, 0, S)$ удовлетворяет следующим аксиомам Пеано.

Запись $n \in \mathbb{N}_0$ означает, что n принадлежит множеству $\mathbb{N}_0$. Буквы m, n в аксиомах обозначают произвольные его элементы.

Аксиома 1.1 (Начальный элемент)**.** $0 \in \mathbb{N}_0$.

Аксиома 1.2 (Следующее число)**.** Для каждого $n \in \mathbb{N}_0$ определено единственное следующее число $S(n) \in \mathbb{N}_0$.

Аксиома 1.3 (У нуля нет предшественника)**.** Для любого $n \in \mathbb{N}_0$ выполнено $S(n) \neq 0$.

Аксиома 1.4 (Разные числа имеют разные следующие числа)**.** Если $S(m) = S(n)$, то $m = n$.

Последняя аксиома выражает инъективность (injectivity) операции S: равенство результатов возможно только при равенстве исходных чисел.

Аксиома 1.5 (Принцип математической индукции)**.** Пусть $P(n)$ — утверждение, сформулированное для $n \in \mathbb{N}_0$. Если

1. утверждение $P(0)$ истинно;
2. для любого $n \in \mathbb{N}_0$ из истинности $P(n)$ следует истинность $P(S(n))$,

то $P(n)$ истинно для всех $n \in \mathbb{N}_0$.



В доказательстве методом математической индукции (mathematical induction) первый пункт называют базой индукции (base case), а второй — индукционным переходом (inductive step). Внутри перехода истинность $P(n)$ временно принимают как индукционное предположение (induction hypothesis) и из неё выводят следующий случай. Проверка нескольких примеров не заменяет переход для произвольного n.

Определение 1.2. Единица (one) — число $1 = S(0)$. Далее обозначают $2 = S(1)$, $3 = S(2)$ и так далее.

По аксиоме об отсутствии предшественника нуля $1 \neq 0$. Таким образом, привычная запись множества имеет вид

$$\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}.$$

Определение 1.3. Натуральные числа (natural numbers) в этом сборнике — элементы множества

$$\mathbb{N} = \mathbb{N}_0 \setminus \{0\} = \{1, 2, 3, \ldots\}.$$

Знак $\setminus$ означает удаление указанных элементов: здесь из $\mathbb{N}_0$ удалён ноль.

Натуральные числа используют для счёта отдельных предметов. Ноль соответствует отсутствию предметов, единица — одному предмету. В литературе встречается и соглашение $0 \in \mathbb{N}$, поэтому принятая здесь договорённость указана явно.

Как из следования получаются сложение и умножение

Определение 1.4. Рекурсивное определение (recursive definition) задаёт начальное значение и правило получения следующего значения из уже определённого. Для $a, b \in \mathbb{N}_0$ сложение и умножение задают правилами

$$a + 0 = a, \quad a + S(b) = S(a + b),$$
$$a \cdot 0 = 0, \quad a \cdot S(b) = a \cdot b + a.$$

Например,

$$a + 1 = a + S(0) = S(a + 0) = S(a).$$

Поэтому после введения сложения вместо $S(n)$ можно писать $n + 1$. В индукционном переходе тогда доказывают $P(n + 1)$, предполагая $P(n)$. Если утверждение сформулировано только для $n \geq 1$, базой служит случай $n = 1$.

Метод математической индукции

Определение 1.5. Метод математической индукции (*method of mathematical induction*) — способ доказать утверждение $P(n)$ для каждого целого $n \geq n_0$, где $n_0 \in \mathbb{N}_0$, проверив начальный случай и доказав общий переход от одного случая к следующему. Правомерность этого способа следует из аксиомы индукции.

Доказательство строят по следующей схеме.

1. База индукции (*base case*): доказываем $P(n_0)$ непосредственно.
2. Индукционное предположение (*induction hypothesis*): фиксируем произвольное $k \geq n_0$ и временно предполагаем, что $P(k)$ верно.
3. Индукционный переход (*inductive step*): используя это предположение, доказываем $P(k+1)$. Поскольку k было произвольным, доказана импликация для любого допустимого k.

После базы и перехода заключаем: $P(n)$ верно для всех $n \geq n_0$. Для $n_0 > 0$ это следует из аксиомы для утверждения $Q(m) = P(n_0 + m)$, где $m \in \mathbb{N}_0$: база $Q(0)$ и переход $Q(m) \Rightarrow Q(m + 1)$ имеют именно нужный вид.



В переходе мы не предполагаем, что утверждение уже верно для всех чисел: мы доказываем условное утверждение «если верен случай k, то верен случай $k+1$». Без базы переход не запускает доказательство, а проверка нескольких чисел не заменяет общего перехода.

Первый пример применения метода

Следующие два доказательства показывают, как привычные свойства действий выводятся из определений.

Теорема 1.1 (Ноль слева при сложении). *Для любого* $n \in \mathbb{N}_0$ *выполнено* $0 + n = n$.

Доказательство. База: при $n = 0$ рекурсивное определение даёт $0 + 0 = 0$. Переход: предположим, что $0 + n = n$. Тогда

$$0 + S(n) = S(0 + n) = S(n).$$


Значит, утверждение верно и для следующего числа. По принципу индукции оно верно для всех $n \in \mathbb{N}_0$. ■

Теперь рекурсивное правило умножения даёт

$$a \cdot 1 = a \cdot S(0) = a \cdot 0 + a = 0 + a = a.$$

Теорема 1.2 (Ассоциативность сложения). *Для любых* $a, b, c \in \mathbb{N}_0$

$$(a + b) + c = a + (b + c).$$



Доказательство. Зафиксируем произвольные $a, b \in \mathbb{N}_0$ и проведём индукцию по c. База $c = 0$:

$$(a + b) + 0 = a + b = a + (b + 0).$$

Предположим, что $(a + b) + c = a + (b + c)$. По рекурсивному правилу сложения

$$\begin{aligned}(a + b) + S(c) &= S\big((a + b) + c\big) \\ &= S\big(a + (b + c)\big) \\ &= a + S(b + c) \\ &= a + \big(b + S(c)\big).\end{aligned}$$

Переход доказан. Принцип индукции завершает доказательство. ■

Определение 1.6. Целые числа (*integers*) — натуральные числа, противоположные им отрицательные числа и ноль:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

Определение 1.7. Противоположное число (*additive inverse*) к числу a — число $-a$, сумма которого с a равна нулю:

$$a + (-a) = 0.$$

Например, 5 и -5 противоположны; число, противоположное нулю, — сам ноль.

На числовой прямой число тем больше, чем правее находится его точка. Например, $-8 < -3 < 0 < 4$. Запись $a \in \mathbb{Z}$ читается: «a принадлежит множеству целых чисел».

Действия с целыми числами

Сумма, разность и произведение целых чисел всегда являются целыми числами. Деление может вывести за пределы целых чисел: например, $6 : 3 = 2$, но $1 : 2$ не является целым числом.

Вычитание означает прибавление противоположного числа:

$$a - b = a + (-b), \qquad a - (-b) = a + b.$$

При сложении двух отрицательных чисел складывают их расстояния до нуля и ставят минус:

$$(-7) + (-5) = -12.$$

При сложении чисел разных знаков из большего расстояния до нуля вычитают меньшее и берут знак числа, расположенного дальше от нуля:

$$-14 + 9 = -5, \qquad -9 + 14 = 5, \qquad -9 + 9 = 0.$$

При умножении или делении двух ненулевых чисел одинаковые знаки дают плюс, разные — минус:

$$(-6)(-4) = 24, \qquad (-6) \cdot 4 = -24, \qquad \frac{-24}{-6} = 4, \qquad \frac{24}{-6} = -4.$$

Деление на ноль не определено; в частности, запись $\frac{0}{0}$ также не имеет значения.

От целых чисел к рациональным

Определение 1.8. Рациональное число (*rational number*) — число, которое можно записать в виде

$$\frac{p}{q}, \qquad p \in \mathbb{Z}, \quad q \in \mathbb{Z}, \quad q \neq 0.$$

Множество рациональных чисел обозначают $\mathbb{Q}$.

Любое целое число рационально, поскольку $n = \frac{n}{1}$. Например, 3, -2, 0, $\frac{1}{2}$ и $-\frac{3}{4}$ — рациональные числа. Правила действий с дробями подробно разобраны в главе 3. Следующие свойства удобно сформулировать сразу для всех рациональных чисел: ими пользуются и при вычислениях, и при дальнейших преобразованиях выражений с буквами.

Основные свойства арифметических действий

Во всех формулах ниже a, b, c — произвольные рациональные числа.

Замкнутость сложения и умножения. Сумма и произведение рациональных чисел снова рациональны:

$$a + b \in \mathbb{Q}, \qquad ab \in \mathbb{Q}.$$

Разность также рациональна; частное рационально при ненулевом делителе.

Коммутативность (переместительный закон). Перестановка слагаемых или множителей не меняет результата:

$$a + b = b + a, \qquad ab = ba.$$



Ассоциативность (сочетательный закон). Группировка слагаемых или множителей не меняет результата:

$$(a + b) + c = a + (b + c), \qquad (ab)c = a(bc).$$

Нейтральные элементы. Прибавление нуля и умножение на единицу не меняют число:

$$a + 0 = 0 + a = a, \qquad a \cdot 1 = 1 \cdot a = a.$$

Поэтому 0 называют нейтральным элементом сложения, а 1 — нейтральным элементом умножения.

Противоположное число. У каждого числа есть противоположное:

$$a + (-a) = (-a) + a = 0.$$

Определение 1.9. Обратное число (*multiplicative inverse; reciprocal*) к ненулевому числу a — число $\frac{1}{a}$, произведение которого с a равно единице:

$$a \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{a} \cdot a = 1, \qquad a \neq 0.$$

Например, 2 и $\frac{1}{2}$ взаимно обратны. У нуля обратного числа нет. Деление заменяется умножением на обратное число:

$$\frac{a}{b} = a \cdot \frac{1}{b}, \qquad b \neq 0.$$

Дистрибутивность (распределительный закон). Умножение распределяется относительно сложения:

$$a(b + c) = ab + ac, \qquad (a + b)c = ac + bc.$$

Для разности соответственно $a(b - c) = ab - ac$.

Умножение на ноль и правила знаков. Из перечисленных свойств следуют равенства

$$a \cdot 0 = 0, \qquad (-a)b = -(ab), \qquad (-a)(-b) = ab.$$

Законы сокращения. Прибавление одного числа к обеим частям равенства можно отменить; умножение можно отменить, если общий множитель ненулевой:

$$a + c = b + c \implies a = b,$$

$$ac = bc, \quad c \neq 0 \implies a = b.$$

Знак $\implies$ означает «из этого следует».

Свойство нулевого произведения. Произведение равно нулю тогда и только тогда, когда хотя бы один множитель равен нулю:

$$ab = 0 \quad \iff \quad a = 0 \text{ или } b = 0.$$

Знак $\iff$ означает, что утверждения равносильны: каждое следует из другого.

Коммутативность и ассоциативность относятся к сложению и умножению. Переносить их на вычитание и деление нельзя:

$$7 - 2 \neq 2 - 7, \qquad (12 : 3) : 2 \neq 12 : (3 : 2).$$

Порядок действий

1. Действия в скобках, начиная с самых внутренних.
2. Возведение в степень. Например, $3^2 = 3 \cdot 3$.
3. Умножение и деление — слева направо.
4. Сложение и вычитание — слева направо.

Степень относится только к своему основанию:

$$(-3)^2 = 9, \qquad -3^2 = -(3^2) = -9.$$

Например,

$$-3 - (-5) \cdot 2 = -3 - (-10) = -3 + 10 = 7.$$

Порядок на числовой прямой

Для любых рациональных a, b выполняется ровно одно из условий: $a < b$, $a = b$, $a > b$. Если $a < b$ и $b < c$, то $a < c$ — это **транзитивность**. Из $a < b$ следует $a + c < b + c$. Если также $c > 0$, то $ac < bc$; если $c < 0$, то $ac > bc$. Эти правила объясняют преобразования неравенств в главе 11.

Разобранный пример: сумма первых натуральных чисел

Теорема 1.3 (Сумма первых натуральных чисел). *Для каждого $n \in \mathbb{N}$ выполнено*

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

При $n = 1$ слева находится единственное слагаемое 1.



Доказательство. Обозначим доказываемое равенство через $P(n)$.

1. База. При $n = 1$ левая часть равна 1, а правая — $\frac{1\cdot 2}{2} = 1$. Значит, $P(1)$ верно.

2. Предположение. Зафиксируем произвольное $k \geq 1$ и предположим

$$1 + 2 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2}.$$

Это временное предположение только для одного произвольного k.

3. Переход. Сумма первых $k+1$ чисел получается добавлением одного нового слагаемого $k+1$. Поэтому

$$\begin{aligned} 1 + 2 + \cdots + k + (k+1) &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) \\ &= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)}{2}. \end{aligned}$$

В первой строке использовано индукционное предположение; далее приведены к общему знаменателю два слагаемых и вынесен общий множитель $k+1$. Последняя строка — в точности формула $P(k+1)$, потому что $(k+1)+1 = k+2$. Общий переход доказан.

База и переход вместе дают по методу математической индукции требуемое равенство для каждого $n \geq 1$. ■

Индукция объясняет, почему формула верна для всех натуральных n. Подстановка, например, $n = 5$ даёт $1+2+3+4+5 = 15$, но сама по себе проверяет лишь один случай и не заменяет проведённого доказательства.

Задачи

1.1. Сравни: -8 и -3; 0 и -5; -4 и 4.

1.2. Вычисли: $-7 + (-5)$.

1.3. Вычисли: $-14 + 9 + 8$.

1.4. Вычисли: $6 - (-4) - 13$.

1.5. Вычисли: $(-6) \cdot (-4) : (-3)$.

1.6. Вычисли: $0 \cdot (-15) + 0 : (-3) + 7$. Можно ли вычислить $7 : 0$?

1.7. Вычисли: $18 - 4 \cdot 7 + 12 : (-3)$.

1.8. Вычисли: $48 : (-6) \cdot 2 - 9 + 5$.

1.9. Вычисли: $-3 \cdot [8 - (5 - 9)] + 10$.

1.10. Вычисли: $(-3)^2 - 3^2 + (-2)^3 - (-2^2)$.

1.11. Утром было $-6^\circ C$. К полудню потеплело на $9^\circ C$, а вечером похолодало на $5^\circ C$. Какая температура стала вечером?

1.12. Лифт находился на уровне -2 подземной парковки, поднялся на 7 уровней и опустился на 3. На каком уровне он оказался? Уровень земли обозначен 0, уровни идут подряд.

1.13. На игровом счёте было 120 очков. За каждую из трёх ошибок сняли 15 очков, затем начислили 40 очков. Сколько очков осталось?

1.14.* Вычисли: $-48 : [6 - 2 \cdot (-1)] + 3 \cdot [-4 - (-7)]$.

1.15.* Подставь скобки в $18 - 6 : 3 + 1$, сохранив порядок чисел и действий, чтобы получилось 3.

1.16.* В викторине за верный ответ дают 5 очков, за неверный снимают 3. Участник ответил на все 12 вопросов и набрал 28 очков. Сколько было верных ответов?

1.17. Докажи математической индукцией, что $\sum_{k=1}^{n} k = \dfrac{n(n+1)}{2}$ для всех $n \in \mathbb{N}_0$. Знак $\sum$ обозначает сумму слагаемых при указанных значениях индекса; при $n = 0$ сумма пуста и равна 0.

1.18. Докажи математической индукцией: $1 + 3 + \cdots + (2n - 1) = n^2$ для всех $n \in \mathbb{N}$.

1.19.* Докажи математической индукцией: $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ для всех $n \in \mathbb{N}_0$. Пустая сумма равна нулю.

1.20. Докажи математической индукцией: $\sum_{k=0}^{n} 2^k = 2^{n+1} - 1$ для всех $n \in \mathbb{N}_0$. Здесь $2^0 = 1$.

1.21. Докажи математической индукцией: $3^n \geq 2n + 1$ для всех $n \in \mathbb{N}_0$. Здесь $3^0 = 1$.

1.22. Докажи математической индукцией: $2^n \geq n^2$ для всех целых $n \geq 4$.

1.23.* Докажи математической индукцией: $\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\dfrac{n(n+1)}{2}\right)^2$ для всех $n \in \mathbb{N}_0$. Пустая сумма равна нулю.

1.24.* Докажи индукцией по натуральному n неравенство Бернулли: $(1 + x)^n \geq 1 + nx$ для любого рационального $x \geq -1$. Объясни, почему условие $1 + x \geq 0$ нужно в индукционном переходе.

1.25. Докажи единственность противоположного рационального числа: если $a + x = 0$ и $a + y = 0$, то $x = y$. Используй свойства сложения.

1.26. Докажи свойство нулевого произведения для рациональных чисел: $ab = 0$ тогда и только тогда, когда $a = 0$ или $b = 0$.

ГЛАВА 2

Делимость, простые числа, НОД и НОК

Делимость и кратность

Определение 2.1. Делимость нацело (*divisibility*): целое число b делится на целое число $a \neq 0$, если существует целое число k, для которого

$$b = ak.$$

При этом a называют делителем (*divisor*) числа b.

Запись с тремя вертикальными точками $b \vdots a$ читается: «b делится на a нацело». В университетских курсах также используют запись $a \mid b$: «a делит b». Порядок чисел в этих двух обозначениях противоположен:

$$12 \vdots 4 \quad \Longleftrightarrow \quad 4 \mid 12, \qquad 12 = 4 \cdot 3.$$

Здесь знак $\Longleftrightarrow$ означает, что записи выражают одно и то же утверждение.



Определение 2.2. Кратное (*multiple*) числа $a \neq 0$ — целое число b, которое можно представить как $b = ak$ с целым k. Иначе говоря, b кратно a, если $b \vdots a$.

Например, положительные кратные числа 4: $4, 8, 12, 16, \ldots$. Ноль также кратен любому ненулевому целому числу: $0 = a \cdot 0$. В задачах на НОК рассматриваются только *положительные* общие кратные.

Простые и составные числа

Определение 2.3. Простое число (*prime number*) — натуральное число, имеющее ровно два положительных делителя: 1 и само это число.

Определение 2.4. Составное число (*composite number*) — натуральное число больше 1, имеющее положительный делитель, отличный от 1 и от самого числа.

Число 7 простое: его положительные делители — 1 и 7. Число 9 составное: кроме 1 и 9, оно делится на 3. Число 1 не является ни простым, ни составным. Число 2 — единственное чётное простое число.

Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное

Определение 2.5. Наибольший общий делитель (*greatest common divisor, gcd*) положительных целых чисел a и b — наибольшее положительное целое число, на которое оба числа делятся нацело. Обозначения: НОД(a, b) и $\gcd(a, b)$. Английское название — *greatest common divisor*, сокращённо *gcd*.

Общие положительные делители чисел 12 и 18 — $1, 2, 3, 6$, поэтому

$$\text{НОД}(12, 18) = \gcd(12, 18) = 6.$$

Определение 2.6. Наименьшее общее кратное (*least common multiple, lcm*) положительных целых чисел a и b — наименьшее положительное целое число, которое делится нацело и на a, и на b. Обозначения: НОК(a, b) и $\operatorname{lcm}(a, b)$. Английское название — *least common multiple*, сокращённо *lcm*.

Положительные общие кратные чисел 12 и 18 — $36, 72, 108, \ldots$, поэтому

$$\text{НОК}(12, 18) = \operatorname{lcm}(12, 18) = 36.$$

Определение 2.7. Взаимно простые числа (*coprime integers*) — положительные целые числа, НОД которых равен 1.

Например, 8 и 15 взаимно просты, хотя оба числа составные.

Основная теорема арифметики (ОТА)

Теорема 2.1. *Каждое натуральное число больше* 1 *можно представить произведением простых чисел. Такое разложение единственно с точностью до перестановки множителей.*



Доказательство. Существование докажем индукцией по числу: простое число уже разложено; составное имеет вид ab, где $1 < a, b < n$, и к обоим множителям применяется предположение индукции. Для единственности используем следующий факт: если простое p делит ab, то оно делит a или b. Если $p \nmid a$, то $\gcd(p, a) = 1$; обратная подстановка в алгоритме Евклида даёт целые u, v с $up + va = 1$. Умножение на b показывает, что $p \mid b$. Теперь первый простой множитель одного разложения обязан совпасть с одним из множителей другого; сократим его и повторим. Все множители совпадут с точностью до порядка. ■

Например,

$$60 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5.$$

Множители $2, 3, 5$ простые; запись $60 = 4 \cdot 15$ ещё не является разложением на простые множители.

Вычисление НОД и НОК по разложению

Разложите каждое число на простые множители, объединив повторения в степени. Для НОД возьмите только общие простые множители в *меньших* степенях. Для НОК возьмите все встречающиеся простые множители в *больших* степенях. Если общих простых множителей нет, НОД равен 1.

Например,

$$12 = 2^2 \cdot 3, \qquad 18 = 2 \cdot 3^2,$$

$$\gcd(12, 18) = 2 \cdot 3 = 6, \qquad \operatorname{lcm}(12, 18) = 2^2 \cdot 3^2 = 36.$$

Для нескольких положительных чисел правило такое же: в НОД входят множители, общие *всем* числам, с наименьшими показателями; в НОК — все встретившиеся множители с наибольшими показателями.

Теорема 2.2. *Для любых положительных целых чисел* a, b

$$\gcd(a,b)\,\operatorname{lcm}(a,b) = ab.$$

Доказательство. Для каждого простого множителя обозначим его показатели в a, b через α, β, допуская показатель 0. В НОД его показатель $\min(\alpha,\beta)$, в НОК — $\max(\alpha,\beta)$. Их сумма равна $\alpha+\beta$, то есть показателю того же простого в ab. По единственности разложения произведения равны. ■

Это равенство относится к двум числам; напрямую переносить его на три числа нельзя.

Алгоритм Евклида

Для нахождения НОД можно последовательно делить с остатком, каждый раз заменяя пару «делимое, делитель» парой «делитель, остаток». Когда остаток стал нулём, НОД равен последнему ненулевому делителю. Например,

$$48 = 2\cdot 18 + 12, \qquad 18 = 1\cdot 12 + 6, \qquad 12 = 2\cdot 6 + 0,$$

поэтому $\gcd(48,18) = 6$.

Признаки делимости

В десятичной записи натурального числа действуют следующие признаки. Каждый из них даёт необходимое и достаточное условие: число делится на указанный делитель *тогда и только тогда*, когда выполнена соответствующая проверка.

- **На** 2**:** последняя цифра — $0, 2, 4, 6$ или 8.
- **На** 3**:** сумма цифр делится на 3.
- **На** 4**:** число, образованное двумя последними цифрами, делится на 4.
- **На** 5**:** последняя цифра — 0 или 5.
- **На** 6**:** число делится одновременно на 2 и на 3.
- **На** 8**:** число, образованное тремя последними цифрами, делится на 8.
- **На** 9**:** сумма цифр делится на 9.
- **На** 10**:** последняя цифра — 0.

Если число содержит меньше двух или трёх цифр, в признаках на 4 и 8 проверяют само число. Например, $123 \vdots 3$, поскольку $1+2+3=6$, но 123 не делится на 9, поскольку 6 не делится на 9.

Задачи

2.1. Выпиши все положительные делители 36.

2.2. Выпиши все положительные делители 48.

2.3. Найди общие положительные делители 20 и 30.

2.4. Выпиши кратные 7 между 20 и 60.

2.5. Найди наименьшее трёхзначное число, кратное 8.

2.6. Раздели на простые и составные: $17, 25, 31, 39, 49, 51, 53$.

2.7. Выпиши простые числа от 20 до 40.

2.8. Может ли простое число оканчиваться на 0? Объясни.

2.9. Любое ли нечётное число простое? Приведи контрпример.

2.10. Какие числа делятся на 3, а какие на 9: $126, 234, 405, 517, 702$?

2.11. Какие числа делятся на 2 и на 5 одновременно: $125, 230, 342, 480, 705$?

2.12. Какие цифры можно поставить вместо $\square$ в $43\square$, чтобы число делилось на 3?

2.13. Какая цифра вместо $\square$ в $7\square2$ даёт делимость на 9?

2.14. Какие цифры вместо $\square$ в $12\square$ дают делимость на 2 и на 3?

2.15. Разложи 72 на простые множители.



2.16. Разложи 150 на простые множители.

2.17. Разложи 252 на простые множители.

2.18. Заверши разложение $90 = 2 \cdot 5 \cdot 9$ на простые множители.

2.19. Найди НОД и НОК чисел 24 и 36.

2.20. Найди НОД и НОК чисел 18 и 45.

2.21. Найди НОД и НОК чисел 8 и 15.

2.22. Найди НОД и НОК чисел $12, 18$ и 30.

2.23. Из 24 карандашей и 36 ручек собери максимум одинаковых наборов, использовав всё. Сколько наборов и что в каждом?

2.24. Автобусы отправились вместе в 9:00. Интервалы отправления: 12 и 18 минут. Когда следующее совместное отправление?

2.25. Прямоугольник 60×84 см разрежь без остатка на одинаковые квадраты наибольшей стороны. Найди сторону и число квадратов.

2.26. Выпиши все положительные делители 24.

2.27. Выпиши первые пять положительных кратных 6.

2.28. Какие из чисел $1, 2, 9, 13, 21, 29$ простые?

2.29. На какие числа из списка $2, 3, 5, 9, 10$ делится 450?

2.30. Разложи 84 на простые множители.

2.31. Найди НОД и НОК чисел 12 и 18.

2.32. Для праздника есть 42 яблока и 56 мандаринов. Их нужно разложить без остатка в максимальное число одинаковых подарков. Сколько подарков получится и что будет в каждом?

2.33. Два индикатора загорелись одновременно. Один загорается каждые 8 секунд, другой каждые 12 секунд. Через сколько секунд они впервые снова загорятся вместе?

2.34. В коробке 97 деталей. Можно ли разложить их в одинаковые группы больше одной детали, получив больше одной группы, без остатка?

2.35.* Найди наименьшее натуральное число, которое при делении на $6, 8$ и 9 даёт остаток 1 и при этом больше 1.

2.36.* НОД двух положительных целых чисел равен 6, НОК равен 180. Одно число 30. Найди второе.

2.37.* Найди все цифры a и b, чтобы четырёхзначное число $\overline{3a5b}$ делилось на 5 и на 9.

2.38. Пусть $a > b > 0$ — целые числа. Докажи равенство $\gcd(a, b) = \gcd(b, a-b)$, показав, что пары имеют одни и те же положительные общие делители.

2.39. Пусть p — простое число, a, b — положительные целые числа. Используя основную теорему арифметики, докажи: если $p \mid ab$, то $p \mid a$ или $p \mid b$.

ГЛАВА 3

Обыкновенные дроби

Определение 3.1. Обыкновенная дробь (*common fraction*) $\frac{a}{b}$ — запись частного $a : b$, где a и b — целые числа и $b \neq 0$.

Определение 3.2. Числитель (*numerator*) дроби $\frac{a}{b}$ — число a, записанное над дробной чертой.

Определение 3.3. Знаменатель (*denominator*) дроби $\frac{a}{b}$ — ненулевое число b, записанное под дробной чертой.

Определение 3.4. Правильная положительная дробь (*proper positive fraction*) — дробь с положительными числителем и знаменателем, у которой числитель меньше знаменателя.

Определение 3.5. Неправильная положительная дробь (*improper positive fraction*) — дробь с положительными числителем и знаменателем, у которой числитель не меньше знаменателя.

Определение 3.6. Смешанное число (*mixed number*) — сумма целой части и правильной дробной части; например, $2\frac{1}{3} = 2 + \frac{1}{3}$.

Основное свойство дроби

$\frac{a}{b} = \frac{ak}{bk}$ при $k \neq 0$. Числитель и знаменатель можно умножать или делить на одно и то же ненулевое число.

Действия с дробями

Сложение: $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$, где $b, d \neq 0$.

Вычитание: $\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad-bc}{bd}$, где $b, d \neq 0$.

Умножение: $(\frac{a}{b}) \cdot (\frac{c}{d}) = \frac{ac}{bd}$.

Деление: $(\frac{a}{b}) : (\frac{c}{d}) = \frac{ad}{bc}$; дополнительно $c \neq 0$.

Сравнение при $b, d > 0$: сравни $a \cdot d$ и $c \cdot b$.

Пример: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$. *Сокращение:* $\frac{18}{24} = \frac{3}{4}$.

Задачи

3.1. Сократи $\frac{18}{24}$.

3.2. Преврати $\frac{17}{5}$ в смешанное число.

3.3. Преврати $2\frac{3}{7}$ в неправильную дробь.

3.4. Сравни $\frac{5}{8}$ и $\frac{7}{12}$.

3.5. Вычисли $\frac{3}{4} - \frac{5}{6}$.

3.6. Вычисли $\frac{7}{15} + \frac{2}{9}$.



3.7. Вычисли $(-\frac{3}{7}) \cdot (\frac{14}{9})$.

3.8. Вычисли $(\frac{2}{3}) : (\frac{4}{9})$.

3.9. Вычисли $2\frac{1}{3} - 1\frac{5}{6}$.

3.10. Вычисли $(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}) : (\frac{5}{6})$.

3.11. Вычисли $\dfrac{\frac{3}{4}}{\frac{9}{8}}$.

3.12. Из 80 страниц прочитали $\frac{3}{5}$. Сколько страниц осталось?

3.13. На пирог ушло $\frac{3}{4}$ кг муки, а на блины $\frac{2}{3}$ кг. Сколько всего муки израсходовали?

3.14. В бутылке $\frac{3}{2}$ л сока. Его разливают по стаканам вместимостью $\frac{1}{4}$ л. Сколько полных стаканов получится?

3.15. Турист прошёл $\frac{2}{5}$ маршрута длиной 15 км. Сколько километров ему осталось?

3.16.* Вычисли: $(\frac{3}{4} - \frac{5}{6}) : (\frac{7}{9} - \frac{2}{3}) + \frac{1}{2}$.

3.17.* В первый день прочитали $\frac{1}{3}$ книги, во второй — $\frac{2}{5}$ оставшихся страниц. После этого осталось 72 страницы. Сколько страниц в книге?

3.18.* Бак был полон. Израсходовали $\frac{1}{4}$ воды, затем $\frac{1}{3}$ оставшейся. После долива 15 л бак снова стал полным. Какова вместимость бака?

3.19. Для целых a, b, c, d, где $b \neq 0$, $d \neq 0$, докажи критерий равенства дробей: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ тогда и только тогда, когда $ad = bc$.

3.20. Докажи, что для любого $n \in \mathbb{N}$ выполнено $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1}$.

ГЛАВА 4

Десятичные дроби и проценты

Определение 4.1. Десятичная дробь (*decimal*) — запись числа с разрядами десятых, сотых, тысячных и далее после запятой.

Определение 4.2. Процент (*percent*) — одна сотая часть: $1\% = \frac{1}{100} = 0{,}01$.

Определение 4.3. Периодическая десятичная дробь (*repeating decimal*) — бесконечная десятичная дробь с повторяющимся блоком цифр начиная с некоторого разряда.

Правила вычислений

При сложении и вычитании десятичных дробей записывай одинаковые разряды друг под другом.

При умножении сначала умножь без запятых, затем отдели справа столько цифр, сколько их было после запятых в обоих множителях вместе.

При делении перенеси запятую в делимом и делителе на одинаковое число разрядов, чтобы делитель стал целым.

Формулы для процентов

$p\%$ от A: $A \cdot \frac{p}{100}$. Если $p\%$ числа равны B и $p \neq 0$, то число равно $\frac{100B}{p}$.

Рост на $p\%$: $A\left(1 + \frac{p}{100}\right)$. Снижение на $p\%$: $A\left(1 - \frac{p}{100}\right)$.

Процентное изменение: $\frac{\text{новое значение} - \text{старое значение}}{\text{старое значение}} \cdot 100\%$, если старое значение не равно 0. В обычных задачах о цене исходная цена положительна.

Каждый следующий процент изменения относится к уже изменённой величине.

Округление и периодические дроби

Если следующая за оставляемым разрядом цифра $0-4$, разряд не меняют; если $5-9$, увеличивают на 1, при необходимости перенося единицу в старший разряд.

Любая периодическая десятичная дробь представляет рациональное число.

Пример: $\frac{1}{3}=0{,}(3)$. *Цена* 100 *рублей после двух скидок по* 10%*:* $100\cdot 0{,}9\cdot 0{,}9=81$ *рубль.*

Задачи

4.1. Вычисли $3{,}75+0{,}086$.

4.2. Вычисли $8-2{,}47$.

4.3. Вычисли $0{,}24\cdot 0{,}5$.

4.4. Вычисли $4{,}2:0{,}07$.

4.5. Запиши $\dfrac{7}{8}$ десятичной дробью.



4.6. Запиши $0{,}125$ несократимой обыкновенной дробью.

4.7. Запиши $\dfrac{2}{3}$ периодической десятичной дробью.

4.8. Округли $3{,}14159$ до сотых и до тысячных.

4.9. Найди 15% от 240.

4.10. 30% числа равны 54. Найди число.

4.11. Цена выросла с 800 до 920 рублей. На сколько процентов?

4.12. Цену 1000 рублей повысили на 20%, затем снизили на 20%. Найди итоговую цену и изменение в процентах от исходной.

4.13. Купили $1{,}8$ кг яблок по 125 рублей за килограмм. Сколько заплатили?

4.14. Куртка стоит 4800 рублей. Скидка составляет 15%. Какова цена со скидкой?

4.15. Велосипедист проехал $7{,}86$ км утром и $5{,}47$ км вечером. Найди общий путь и округли его до десятых километра.

4.16.* После скидки 20% и следующей скидки 10% товар стоит 2160 рублей. Найди исходную цену.

4.17.* Цена выросла на 25%. На сколько процентов нужно снизить новую цену, чтобы получить исходную?

4.18.* Смешали 200 г раствора с массовой долей соли 10% и 300 г раствора с долей соли 20%. Найди массовую долю соли в смеси.



4.19. Положительная цена сначала выросла на $p\%$, затем новая цена выросла на $q\%$, где $p, q \geq 0$. Докажи, что общее увеличение составляет $\left(p + q + \dfrac{pq}{100}\right)\%$ от исходной цены.

4.20.* Пусть $\dfrac{p}{q}$ — положительная несократимая дробь с целыми $p, q > 0$. Докажи, что она имеет конечную десятичную запись тогда и только тогда, когда $q = 2^{\alpha}5^{\beta}$ для некоторых $\alpha, \beta \in \mathbb{N}_0$. Можно пользоваться основной теоремой арифметики и свойствами делимости.

ГЛАВА 5

Отношения и пропорции

Определение 5.1. Отношение (*ratio*) a к b — частное $\frac{a}{b}$ при $b \neq 0$; обозначается $a : b$.

Определение 5.2. Пропорция (*proportion*) — равенство двух отношений: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, где $b, d \neq 0$.

Определение 5.3. Прямая пропорциональность (*direct proportion*) — зависимость $y = kx$ с постоянным ненулевым коэффициентом k.

Определение 5.4. Обратная пропорциональность (*inverse proportion*) — зависимость $y = \frac{k}{x}$ при $x \neq 0$ с постоянным ненулевым k.

Определение 5.5. Масштаб (*scale*) $1 : N$ — отношение длины на карте к длине на местности в одинаковых единицах.

Основное свойство пропорции

При $b, d \neq 0$ равенство $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ равносильно $a \cdot d = b \cdot c$.

Правила применения

При прямой пропорциональности увеличение x в несколько раз увеличивает y во столько же раз.

При обратной пропорциональности положительных величин увеличение x в несколько раз уменьшает y во столько же раз.

Деление S в отношении $m : n$ при $m, n > 0$: части равны $S \cdot \frac{m}{m+n}$ и $S \cdot \frac{n}{m+n}$.

Пример: 60 *разделить в отношении* $2 : 3$ *— это* 24 *и* 36*, поскольку одна часть равна* $\frac{60}{5} = 12$.

Задачи

5.1. Сократи отношение $18 : 24$.

5.2. Реши пропорцию $\dfrac{x}{15} = \dfrac{4}{5}$.

5.3. Реши пропорцию $\dfrac{7}{x} = \dfrac{21}{18}$.

5.4. Раздели 64 в отношении $3 : 5$.

5.5. Для 4 порций нужно 300 г крупы. Сколько нужно для 10 порций?

5.6. 5 одинаковых тетрадей стоят 180 рублей. Сколько стоят 8?



5.7. На карте масштаба $1 : 100000$ расстояние $3,5$ см. Найди расстояние на местности в километрах.

5.8. 6 рабочих выполняют работу за 10 дней. За сколько дней справятся 15 рабочих при той же производительности?

5.9. Поездка при скорости 60 км/ч занимает 3 часа. Сколько займёт при 90 км/ч на том же пути?

5.10. Смешивают сок и воду в отношении $2 : 3$. Сколько каждого компонента нужно для $1{,}5$ л смеси?

5.11. При $y = 3x$ найди y для $x = 4$. Как изменится y при удвоении x?

5.12. При $y = \dfrac{24}{x}$ найди y для $x = 6$. Как изменится y при удвоении положительного x?

5.13. Для 6 порций супа нужно 450 г картофеля. Сколько нужно для 10 таких же порций?

5.14. 4 одинаковых насоса заполняют бассейн за 9 часов. За сколько часов его заполнят 6 таких насосов, работающих одновременно?

5.15. Для напитка сироп смешивают с водой в отношении $1 : 7$. Сколько сиропа и воды нужно для 2 л напитка?

5.16.* Рабочие одинаковой производительности: 6 человек выполняют работу за 8 дней по 5 часов. За сколько дней справятся 4 человека по 6 часов?

5.17.* В смеси отношение сиропа к воде $2 : 5$. После добавления 3 л воды стало $1 : 4$. Сколько литров смеси было сначала?

5.18.* Автомобиль ехал одинаковое время со скоростями 60 и 90 км/ч. Найди среднюю скорость. А если одинаковыми были расстояния?

5.19. Пусть $b, d > 0$ и $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} = k$. Докажи, что $\dfrac{a + c}{b + d} = k$.

5.20.* Пусть $a, b, c, d > 0$ и $\dfrac{a}{b} < \dfrac{c}{d}$. Докажи, что $\dfrac{a}{b} < \dfrac{a + c}{b + d} < \dfrac{c}{d}$.

ГЛАВА 6

Степени с целым показателем

Определение 6.1. Степень (*power*) a^n при натуральном n — произведение n одинаковых множителей a.

Определение 6.2. Основание степени (*base*) a^n — число a, которое возводят в степень.

Определение 6.3. Показатель степени (*exponent*) a^n — число n; при натуральном n оно указывает количество одинаковых множителей a.

Определение 6.4. Нулевая степень (*zeroth power*) ненулевого числа определяется равенством $a^0 = 1$.

Определение 6.5. Отрицательная целая степень (*negative integer power*) определяется равенством $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ при $a \neq 0$ и натуральном n.

Определение 6.6. Стандартный вид положительного числа (*scientific notation*) — $c \cdot 10^n$, где $1 \leq c < 10$ и n — целое число.

Свойства степеней

При умножении степеней одного основания показатели складывают: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$.

При делении показатели вычитают: $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, a \neq 0$.

При возведении степени в степень показатели перемножают: $(a^m)^n = a^{mn}$.

Степень произведения: $(ab)^n = a^n b^n$. Степень дроби: $(\frac{a}{b})^n = \frac{a^n}{b^n}, b \neq 0$.

Эти правила для целых показателей применяют только там, где все выражения определены; отрицательные степени требуют ненулевых оснований.

Пример: $(-2)^4 = 16$, *но* $-2^4 = -16$. *Число* $0,0032$ *в стандартном виде:* $3{,}2 \cdot 10^{-3}$.

Задачи

6.1. Вычисли 2^5.

6.2. Вычисли $(-3)^4$ и -3^4.

6.3. Вычисли $7^0 + 2^{-3}$.

6.4. Представь одной степенью: $5^3 \cdot 5^4$.

6.5. Представь одной степенью: $2^9 : 2^4$.

6.6. Представь одной степенью: $(3^2)^4$.



6.7. Вычисли $(\frac{2}{3})^{-2}$.

6.8. Вычисли $10^{-3} \cdot 10^5$.

6.9. Запиши $0{,}00056$ в стандартном виде.

6.10. Запиши $7{,}2 \cdot 10^5$ обычным числом.

6.11. Упрости $a^5 \cdot a^{-2}$ при $a \neq 0$.

6.12. Вычисли $(-2)^3 \cdot 2^{-2} + 3^0$.

6.13. В модели опыта каждая бактерия делится на две раз в час. Вначале была одна бактерия. Сколько их станет через 8 часов?

6.14. Квадратный участок имеет сторону 10^3 м. Запиши его площадь степенью десяти и обычным числом в м^2.

6.15. В одном файле $4 \cdot 10^6$ байт. Сколько байт в $3 \cdot 10^2$ таких файлах?

6.16.* Вычисли: $\dfrac{2^{-3} \cdot 4^2}{8^{-1}}$.

6.17.* Вычисли: $\dfrac{3^5 - 3^4}{3^3 + 3^2}$.

6.18.* В модели файл каждый день увеличивается втрое. Через 4 дня его размер 162 МБ. Каков был размер сначала и каким станет через 6 дней от начала?

6.19. Докажите, что $a^m a^n = a^{m+n}$ для действительного a и натуральных m, n, непосредственно используя определение натуральной степени.

6.20. Пусть $a \neq 0$, m, n — натуральные числа. Докажите $a^{-m} a^{-n} = a^{-(m+n)}$, используя определение отрицательной степени.

ГЛАВА 7

Корни и действительные числа

Определение 7.1. Арифметический квадратный корень (*principal square root*) $\sqrt{a}$ — неотрицательное число, квадрат которого равен a. В действительных числах определён при $a \geq 0$. При $a > 0$ уравнение $z^2 = a$ имеет два корня: $z = \sqrt{a}$ и $z = -\sqrt{a}$.

Определение 7.2. Кубический корень (*cube root*) $\sqrt[3]{a}$ — число, куб которого равен a; существует для любого действительного a.

Определение 7.3. Рациональное число (*rational number*) — число вида $\frac{p}{q}$, где p, q — целые и $q \neq 0$.

Определение 7.4. Иррациональное число (*irrational number*) — действительное число, которое нельзя представить в виде $\frac{p}{q}$ с целыми p, q и $q \neq 0$.

Свойства корней

При $a, b \geq 0$: $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$.

При $a \geq 0, b > 0$: $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.

Для любого действительного x: $\sqrt{x^2} = |x|$.

Для $a, b \geq 0$ из $a < b$ следует $\sqrt{a} < \sqrt{b}$.

Примеры: $\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}$; $\sqrt{(-5)^2} = 5$; $\sqrt[3]{-8} = -2$.

Теорема Пифагора

Теорема 7.1 (Пифагор; Pythagorean theorem). *В прямоугольном треугольнике с катетами a, b и гипотенузой c выполнено $a^2 + b^2 = c^2$.*

Доказательство. Расположим четыре таких треугольника внутри квадрата со стороной $a + b$ так, чтобы их гипотенузы ограничивали внутренний

квадрат со стороной c. Сравнение площадей даёт $(a+b)^2 = 4\frac{ab}{2} + c^2$. После раскрытия скобок получаем требуемое равенство. ■

Корень произвольной натуральной степени

Определение 7.5. Корень нечётной степени (odd-index root) $n \geq 3$ из действительного числа a — единственное действительное число x, для которого $x^n = a$. Обозначение: $x = \sqrt[n]{a}$.

Определение 7.6. Арифметический корень чётной степени (principal even-index root) $n \geq 2$ из числа $a \geq 0$ — единственное *неотрицательное* число x, для которого $x^n = a$. Обозначение: $x = \sqrt[n]{a}$. При $a < 0$ такой действительный корень не определён.

В общей записи $\sqrt[n]{a}$ термин корень n-й степени (nth root) относится к одному из этих двух случаев. Здесь n — натуральное число, $n \geq 2$. Квадратный корень $\sqrt{a}$ — это $\sqrt[2]{a}$.

Не путайте значение корня с решениями уравнения: $\sqrt[4]{16} = 2$, а уравнение $x^4 = 16$ имеет два действительных решения $x = 2$ и $x = -2$. При нечётном n знак $\sqrt[n]{a}$ совпадает со знаком a.

Теорема 7.2 (Корень из степени). *Для любого действительного x и натурального $n \geq 2$*

$$\sqrt[n]{x^n} = \begin{cases} x, & n \text{ нечётно}, \\ |x|, & n \text{ чётно}. \end{cases}$$

Доказательство. При нечётном n число x само является действительным корнем уравнения $y^n = x^n$. При чётном n число $|x|$ неотрицательно и $|x|^n = x^n$, поэтому оно и является арифметическим корнем. Единственность в определении даёт оба равенства. ■

Теорема 7.3 (Произведение и частное корней). *Если $n \geq 2$ нечётно, то для любых действительных a, b*

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a}\,\sqrt[n]{b}.$$

Если n чётно, это равенство верно при $a \geq 0$ и $b \geq 0$. Для частного дополнительно требуется $b \neq 0$:

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}.$$

Таким образом, при чётном n условия для частного: $a \geq 0$, $b > 0$; при нечётном: $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Доказательство. Пусть $u = \sqrt[n]{a}$, $v = \sqrt[n]{b}$. Тогда $(uv)^n = u^n v^n = ab$. При чётном n дополнительно $uv \geq 0$, поэтому uv — именно арифметический корень. Для частного $v \neq 0$ и $(\frac{u}{v})^n = \frac{a}{b}$; при чётном n имеем $\frac{u}{v} \geq 0$. Снова применяем единственность корня. ■



Теорема 7.4 (Корень из корня). *Для натуральных $m, n \geq 2$ и $a \geq 0$*

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}.$$

Если m и n оба нечётны, равенство справедливо также при $a < 0$.

Доказательство. Обозначим левую часть через u. Тогда $u^m = \sqrt[n]{a}$, откуда $u^{mn} = a$. При $a \geq 0$ число u неотрицательно; при отрицательном a и нечётных m, n степень mn нечётна. В каждом из указанных случаев u является корнем, определённым в правой части. ■

Пример. $\sqrt[4]{80} = \sqrt[4]{16 \cdot 5} = 2\sqrt[4]{5}$, $\sqrt[3]{-81} = -3\sqrt[3]{3}$, $\sqrt[6]{(-2)^6} = 2$, $\sqrt[5]{(-2)^5} = -2$.

Рациональный показатель степени

Определение 7.7. Пусть $a > 0$, $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$. Степень с рациональным показателем (rational exponent) определяется равенством

$$a^{\frac{m}{n}} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m.$$

При $n = 1$ здесь имеется в виду обычная целая степень, а не новый корень. Отрицательный показатель означает обратную величину: $a^{-\frac{m}{n}} = \frac{1}{a^{\frac{m}{n}}}$.

Теорема 7.5 (Независимость от записи дроби). *Для $a > 0$ значение $a^{\frac{m}{n}}$ зависит только от рационального числа $\frac{m}{n}$, а не от выбранных числителя и знаменателя.*

Доказательство. Если $\frac{m}{n} = \frac{p}{q}$, где $n, q > 0$, то $mq = pn$. Оба числа $(\sqrt[n]{a})^m$ и $(\sqrt[q]{a})^p$ положительны. После возведения в натуральную степень nq они да-

ют соответственно a^{mq} и a^{pn}, то есть одинаковые числа. Два положительных числа с одинаковыми натуральными степенями равны. Последний факт следует из строгого возрастания натуральной степени на положительной полуоси: при $0 < u < v$ имеем $u^N < v^N$. ■

Теорема 7.6 (Свойства рациональных степеней). *Пусть* $a, b > 0$, $r, s \in \mathbb{Q}$. *Тогда*

$$a^r a^s = a^{r+s}, \qquad \frac{a^r}{a^s} = a^{r-s},$$
$$(a^r)^s = a^{rs}, \qquad (ab)^r = a^r b^r,$$
$$\left(\frac{a}{b}\right)^r = \frac{a^r}{b^r}.$$

Доказательство. Приведём $r = \frac{m}{n}$, $s = \frac{p}{n}$ к общему положительному знаменателю и положим $u = \sqrt[n]{a} > 0$. Тогда $a^r a^s = u^m u^p = u^{m+p}$; для частного рассуждение такое же. Для правила степени степени пусть $r = \frac{m}{n}$, $s = \frac{p}{q}$. Числа $(a^r)^s$ и a^{rs} положительны; их степени nq обе равны a^{mp}, поэтому эти числа равны. Наконец, из свойства корня произведения получаем $(ab)^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{a}\,\sqrt[n]{b})^m = a^{\frac{m}{n}} b^{\frac{m}{n}}$; для частного аналогично. Целые отрицательные показатели допускаются, поскольку все основания и корни ненулевые. ■

Нулевое и отрицательное основания

Для $r > 0$ принимают $0^r = 0$. Записи 0^0 и 0^r при $r < 0$ в этом сборнике не определены.

Для $a < 0$ используем следующую договорённость: сначала записываем рациональное число $r = \frac{m}{n}$ как несократимую дробь (reduced fraction), где $n > 0$. Действительную степень $a^{\frac{m}{n}}$ определяем только при нечётном n:

$$a^{\frac{m}{n}} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m.$$

При чётном знаменателе несократимой дроби такая действительная степень не определена. Например,


$$(-243)^{\frac{2}{5}} = 9, \qquad (-27)^{-\frac{1}{3}} = -\frac{1}{3}, \qquad (-4)^{\frac{1}{2}} \text{ не определена в } \mathbb{R}.$$

Общими правилами степеней для отрицательных оснований пользоваться без проверки нельзя. Например,

$$\left((-1)^2\right)^{\frac{1}{2}} = 1, \qquad (-1)^{2\cdot(\frac{1}{2})} = -1.$$

Также $(-8)^{\frac{2}{6}} = (-8)^{\frac{1}{3}} = -2$, тогда как $\sqrt[6]{(-8)^2} = 2$. Условие $a > 0$ в теореме о свойствах рациональных степеней существенно.

Графики



Корни нечётной и чётной степени

Задачи

7.1. Вычисли $\sqrt{81}$ и $\sqrt[3]{-27}$.

7.2. Вычисли $\sqrt{\dfrac{49}{100}}$.

7.3. Упрости $\sqrt{72}$.

7.4. Упрости $\sqrt{200} - \sqrt{50}$.

7.5. Внеси множитель под корень: $3\sqrt{5}$.

7.6. Вычисли $\sqrt{12} \cdot \sqrt{3}$.

7.7. Вычисли $\dfrac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}}$.

7.8. Вычисли $\sqrt{(-7)^2}$.

7.9. Между какими соседними целыми числами находится $\sqrt{30}$?




7.10. Сравни $\sqrt{7}$ и $2{,}7$.

7.11. Какие числа рациональные: $\sqrt{16}, \sqrt{2}, -\dfrac{3}{7}, 0{,}(3), \pi$?

7.12. Существуют ли $\sqrt{-9}$ и $\sqrt[3]{-8}$ в действительных числах?

7.13. Квадратная комната имеет площадь 49 м^2. Найди длину её стороны.

7.14. Лестница стоит у стены: её основание в 3 м от стены, верх на высоте 4 м. Найди длину лестницы. Считай стену и землю перпендикулярными.



7.15. У кубического контейнера объём $0{,}125$ м^3. Найди длину ребра в метрах и сантиметрах.

7.16.* Упрости: $\sqrt{48}+\sqrt{75}-\sqrt{147}$.

7.17.* Проверь без десятичных приближений утверждение $\sqrt{2}+\sqrt{3}>\sqrt{10}$. Докажи его или опровергни.

7.18.* У прямоугольника площадь 48 м^2, одна сторона втрое длиннее другой. Найди обе стороны и диагональ.

7.19. Докажите равенство $\sqrt[n]{x^n}=|x|$ для любого действительного x и любого чётного натурального $n\geq 2$.

7.20. Докажите, что для нечётного натурального $n\geq 3$ и любого действительного a выполнено $\sqrt[n]{-a}=-\sqrt[n]{a}$.

7.21. Вычислите $\sqrt[4]{81}$, $\sqrt[5]{-32}$ и $\sqrt[6]{64}$.



7.22. Какие из выражений $\sqrt[4]{-16}$, $\sqrt[3]{-64}$, $\sqrt[6]{0}$ определены в действительных числах? Вычислите определённые.

7.23. Упростите $\sqrt[6]{x^6}$ и $\sqrt[5]{x^5}$ для действительного x.

7.24. Упростите $\sqrt[4]{48}$ и вычислите $\dfrac{\sqrt[3]{54}}{\sqrt[3]{2}}$.

7.25. Вычислите $(-32)^{\frac{2}{5}}$, $(-8)^{-\frac{1}{3}}$ и $16^{-\frac{3}{4}}$.

7.26. Решите в действительных числах $\sqrt[4]{x+7}=2$ и $\sqrt[3]{2x-1}=-3$.

7.27.* Найдите область определения $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt[4]{x-2}}+\sqrt[3]{x+1}$.

7.28.* Решите $\sqrt[4]{(x-1)^4}=2-x$ в действительных числах.

ГЛАВА 8

Модуль и числовые промежутки

Определение 8.1. Модуль (*absolute value*) $|x|$ — расстояние от числа x до нуля на числовой прямой: $|x| = x$ при $x \geq 0$ и $|x| = -x$ при $x < 0$.

Определение 8.2. Числовой промежуток (*interval*) — множество всех чисел между заданными границами с указанным включением или исключением концов.

Определение 8.3. Пересечение (*intersection*) множеств A и B, обозначаемое $A \cap B$, — множество элементов, принадлежащих одновременно обоим множествам.

Определение 8.4. Объединение (*union*) множеств A и B, обозначаемое $A \cup B$, — множество элементов, принадлежащих хотя бы одному из этих множеств.

Свойства модуля

$|x| \geq 0$; $|x| = 0$ только при $x = 0$. Также $|-x| = |x|$ и $|ab| = |a||b|$.

Расстояние между числами a и b равно $|a - b|$.

Неравенство треугольника: $|a + b| \leq |a| + |b|$.

При $r > 0$ условие $|x - a| < r$ означает $a - r < x < a + r$. При $r > 0$ условие $|x - a| \leq r$ равносильно $a - r \leq x \leq a + r$.

Запись промежутков

$(a; b)$: $a < x < b$. $[a; b]$: $a \leq x \leq b$. $[a; b)$ и $(a; b]$ включают только один из концов.

Бесконечные границы всегда записывают с круглой скобкой: например, $(-\infty; 3]$.

Пример: $|x - 2| \leq 3$ *равносильно* $-1 \leq x \leq 5$, *то есть* $x \in [-1; 5]$.

Задачи

8.1. Вычисли $|-8|+|3|$.

8.2. Вычисли $|-5+2|$.

8.3. Найди расстояние между -7 и 4.

8.4. Сравни $|-6|$ и $|5|$.

8.5. Запиши $-2 < x \le 3$ промежутком.

8.6. Запиши $[-4;1)$ двойным неравенством.



8.7. Выпиши целые числа из $(-3;2]$.

8.8. Найди пересечение $[-2;4]$ и $(1;7)$.

8.9. Найди объединение $(-\infty;2]$ и $(1;5)$.

8.10. Реши $|x|=5$.

8.11. Реши $|x-2|<3$.

8.12. Упрости $\sqrt{x^2}$ и вычисли при $x=-4$.

8.13. Температура в морозилке $-18^\circ C$, а в комнате $+22^\circ C$. На сколько градусов отличаются температуры?

8.14. Длина детали должна отличаться от 50 мм не более чем на $0{,}2$ мм. Запиши допустимые длины x через модуль и промежутком.

8.15. Аттракцион доступен при росте от 120 см включительно до 190 см не включительно. Запиши условие для роста h неравенством и промежутком. Можно ли войти при росте 190 см?

8.16.* Реши $|x-3|+|x+1|=6$.

8.17.* Найди все целые x, для которых $|2x-1|\le 5$ и $x \notin [0;2)$.

8.18.* Два датчика допускают температуру: первый $|t-20|\le 3$, второй $|t-24|<4$. Найди общий допустимый диапазон.

8.19. Докажите обратное неравенство треугольника $\big||a|-|b|\big| \le |a-b|$ для действительных a, b.

8.20. Докажите, что при $r>0$ неравенство $|x-a|\le r$ равносильно $a-r \le x \le a+r$.

ГЛАВА 9

Преобразование алгебраических выражений

Определение 9.1. Подобные слагаемые (*like terms*) — слагаемые с одинаковой буквенной частью, включая показатели степеней.

Определение 9.2. Разложение на множители (*factorization*) — представление выражения в виде произведения.

Определение 9.3. Тождество (*identity*) — равенство, верное при всех допустимых значениях переменных.

Определение 9.4. Область допустимых значений (ОДЗ) (*admissible values; domain of an expression*) — значения переменных, при которых исходное выражение имеет смысл.

Формулы сокращённого умножения

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.

$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$.

Правила преобразований

Общий множитель: $ab + ac = a(b+c)$. Подобные слагаемые складывают по коэффициентам: $2x + 3x = 5x$.

В дроби сокращают общие множители числителя и знаменателя, а не отдельные слагаемые.

После сокращения сохраняют запреты исходного выражения. Знаменатель не равен 0; под квадратным корнем стоит неотрицательное число.

Чтобы убрать корень из знаменателя вида $\sqrt{a} - b$, можно умножить числитель и знаменатель на $\sqrt{a} + b$, если преобразование допустимо.

Пример: $\frac{x^2-1}{x-1} = x + 1$, *но только при* $x \neq 1$.

Задачи

9.1. Раскрой скобки: $3(2x - 5) - 2(x + 1)$.

9.2. Приведи подобные: $4a - 3b + 2a + 5b$.

9.3. Раскрой скобки: $(x + 3)^2$.

9.4. Раскрой скобки: $(2x - 1)(2x + 1)$.

9.5. Разложи на множители: $6x^2 - 9x$.

9.6. Разложи на множители: $x^2 - 16$.

9.7. Разложи на множители: $x^2 + 5x + 6$.



9.8. Сократи $\dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$. Укажи ограничения исходной дроби.

9.9. Упрости $\dfrac{2}{x} + \dfrac{3}{2x}$. Укажи ограничения.

9.10. Упрости $\dfrac{a^2 b}{ab^2}$. Укажи ограничения.


9.11. Упрости $\dfrac{x^2 - 4}{x^2 + 4x + 4}$. Укажи ограничения.

9.12. Упрости $\dfrac{1}{\sqrt{5} - 2}$, избавившись от корня в знаменателе.

9.13. Билет стоит x рублей. Заказали 3 взрослых билета по полной цене и 2 детских по цене $x - 100$ рублей. Составь и упрости выражение общей стоимости, если $x > 100$.

9.14. У прямоугольной клумбы стороны $x+2$ и $x+5$ метров, где $x > 0$. Вырази площадь многочленом.

9.15. Квадратную площадку со стороной $x > 0$ метров расширили на 3 м в каждом измерении. На сколько выросла её площадь?



9.16.* Упрости $\dfrac{x^2-9}{x^2-x-6}$ и укажи ОДЗ исходного выражения.

9.17.* Упрости: $\left(\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{1}{x+1}\right):\left(\dfrac{2}{x^2-1}\right)$.

9.18.* Докажи тождество $(a+b)^2-(a-b)^2=4ab$ и проверь его при $a=103$, $b=97$, не вычисляя квадраты больших чисел.

9.19. Докажите тождество $(a+b)^2+(a-b)^2=2a^2+2b^2$ для любых действительных a, b.

9.20. Докажите, что при $x \neq -1$ и $x \neq 1$ выполнено $\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{2}{x^2-1}$. Объясните, зачем нужны оба исключения.

ГЛАВА 10

Комбинаторика и бином Ньютона

Сначала определите, какие результаты считаются разными

Определение 10.1. Комбинаторика (combinatorics) изучает способы выбора и расположения элементов, а также число таких способов. При подсчёте нужно явно установить, различаются ли элементы, важен ли порядок и разрешены ли повторения.

Например, выбор капитана и его заместителя из Анны и Бориса имеет два результата: капитан Анна и заместитель Борис либо наоборот. Выбор команды из этих же двух человек имеет один результат. В первом случае порядок ролей важен, во втором — нет. Если из букв A, B, C составляют двухбуквенную последовательность с повторениями, то AA допустима; без повторений — нет.

Правила суммы и произведения

Теорема 10.1 (Правило суммы (sum rule)). *Если первая группа содержит m различных результатов, вторая — n, и эти группы не пересекаются, то выбрать один результат из их объединения можно $m + n$ способами.*

Доказательство. Перечислим сначала m результатов первой группы, затем n результатов второй. Группы не пересекаются, поэтому все перечисленные результаты различны и их ровно $m + n$. ■

Например, если на полке 5 разных романов и 3 разных учебника, одну книгу можно выбрать $5 + 3 = 8$ способами. Условие непересечения существенно: один результат нельзя посчитать дважды.

Теорема 10.2 (Правило произведения (product rule)). *Пусть выбор выполняется в несколько последовательных шагов. Если на первом шаге есть n_1 возможностей, после любого первого выбора на втором есть ровно n_2*

возможностей, и так далее, то полных последовательностей выборов ровно $n_1 n_2 \cdots n_r$.



Доказательство. Для каждого результата первого шага имеется n_2 продолжений. Получаются n_1 непересекающихся групп по n_2 исходов, всего $n_1 n_2$. Для большего числа шагов повторяем рассуждение, то есть применяем индукцию по числу шагов. ■

Например, к каждой из 3 рубашек можно надеть любые из 2 брюк: получается $3 \cdot 2 = 6$ комплектов. Если число продолжений зависит от сделанного выбора, ветви сначала считают отдельно, а затем складывают.

Факториал и перестановки

Определение 10.2. Факториал (factorial) натурального числа n — произведение всех натуральных чисел от 1 до n:

$$n! = 1 \cdot 2 \cdots n.$$

Дополнительно полагают $0! = 1$. Поэтому для $n \in \mathbb{N}_0$

$$(n+1)! = (n+1)n!.$$

Значение $0! = 1$ соответствует одному способу расположить ноль элементов: получить пустую последовательность. Например, $4! = 24$.

Определение 10.3. Перестановка без повторений (permutation without repetition) — расположение всех n различных элементов в определённом порядке.

На первое место есть n вариантов, на второе — $n-1$, и так далее. По правилу произведения число перестановок равно

$$P_n = n!.$$

Определение 10.4. Перестановка с повторениями (multiset permutation) — расположение n элементов, среди которых есть одинаковые: n_1 элементов первого вида, n_2 второго и так далее, где $n_1 + \cdots + n_r = n$.

Число таких перестановок равно

$$P(n_1, \dots, n_r) = \frac{n!}{n_1! \cdots n_r!}.$$

Действительно, если временно различить все одинаковые элементы, каждое конечное расположение будет учтено $n_1! \cdots n_r!$ раз. Например, из букв слова «МАМА» получается $\frac{4!}{2!2!} = 6$ разных последовательностей.

Размещения: порядок важен

Определение 10.5. Размещение без повторений (ordered selection without repetition) — упорядоченный выбор k различных элементов из n различных элементов.

Для $0 \le k \le n$ число размещений равно

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

При $k \ge 1$ это произведение k множителей: $n(n-1)\cdots(n-k+1)$; при $k = 0$ имеется один пустой выбор. Например, капитана и заместителя из 5 человек выбирают $A_5^2 = 5 \cdot 4 = 20$ способами.

Определение 10.6. Размещение с повторениями (ordered selection with repetition) — последовательность длины k, каждый элемент которой выбирают из n видов; один и тот же вид можно выбирать несколько раз.

При $n \ge 1$, $k \in \mathbb{N}_0$ число таких последовательностей равно

$$\overline{A}_n^k = n^k.$$

Например, двухсимвольных кодов из букв A, B, C ровно $3^2 = 9$: $AA, AB, AC, BA, BB, BC, CA, CB, CC$.

Сочетания: порядок не важен

Определение 10.7. Сочетание без повторений (combination without repetition) — выбор k элементов из n различных элементов, при котором порядок не учитывается и каждый элемент выбирают не более одного раза.

Каждый такой выбор порождает $k!$ размещений, поэтому

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \qquad 0 \le k \le n.$$

Например, пару участников из 5 человек выбирают $\binom{5}{2} = 10$ способами. Здесь обмен участников местами не создаёт новую пару.

Определение 10.8. Сочетание с повторениями (combination with repetition) — выбор k элементов из n видов, при котором порядок не учитывается, а элементы каждого вида можно брать в любом количестве.

При $n \ge 1$, $k \in \mathbb{N}_0$ число таких выборов равно

$$\overline{C}_n^k = \binom{n+k-1}{k} = \binom{n+k-1}{n-1}.$$

Выбор задаётся количествами $x_1, \dots, x_n$ элементов каждого вида: $x_i \in \mathbb{N}_0$, $x_1 + \dots + x_n = k$. Чтобы увидеть формулу, расположим в строку k одинаковых звёздочек и $n-1$ перегородок. Количество звёздочек до первой перегородки задаёт x_1, между первой и второй — x_2, и так далее. Перегородки могут стоять рядом и по краям: это соответствует нулевым количествам. Нужно выбрать позиции $n-1$ перегородок среди $n+k-1$ позиций. Например, для 3 видов и 4 элементов получается $\binom{6}{2} = 15$ выборов.

Биномиальные коэффициенты

Определение 10.9. Биномиальный коэффициент (binomial coefficient) $\binom{n}{k}$ — число сочетаний без повторений из n элементов по k.

Непосредственно из смысла выбора следуют равенства

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \qquad \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

Последнее равенство выражает соответствие между выбранными k элементами и $n-k$ оставшимися.

Теорема 10.3 (Тождество Паскаля (Pascal's identity)). *Для целых* $n \ge 1$, $1 \le k \le n$

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}.$$

Доказательство. Выделим один элемент из $n+1$ различных элементов. Если он входит в выбранную группу из k элементов, остальных участников

выбирают $\binom{n}{k-1}$ способами. Если не входит, всю группу выбирают $\binom{n}{k}$ способами. Эти случаи не пересекаются и охватывают все группы; применяем правило суммы. ■

Бином Ньютона

Теорема 10.4 (Бином Ньютона (binomial theorem)). *Для любых рациональных чисел a, b и любого натурального n*

$$(a+b)^n = a^n + \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k + b^n.$$

Знак $\sum$ означает сложение слагаемых при всех указанных значениях индекса k. При $n = 1$ внутренняя сумма пуста и равна нулю, так что формула даёт $a + b = a + b$.

Доказательство. Раскроем произведение n одинаковых скобок $(a + b)$. В каждом слагаемом из каждой скобки выбран либо a, либо b. Если при $1 \le k \le n-1$ число b выбрано ровно из k скобок, а a — из остальных, получается $a^{n-k}b^k$. Нужные k скобок можно выбрать $\binom{n}{k}$ способами. Выбор только a даёт a^n, выбор только b — b^n. Собирая одинаковые слагаемые, получаем формулу. ■



Например,

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.$$

Запись с отдельно выписанными крайними слагаемыми позволяет применять формулу и при $a = 0$ или $b = 0$, не вводя выражение 0^0.

Задачи

10.1. На полке стоят 5 разных романов и 3 разных учебника. Сколько есть способов выбрать одну книгу?

10.2. Есть 4 рубашки, 3 пары брюк и 2 пары обуви. Любые вещи можно сочетать. Сколько комплектов из одной рубашки, одной пары брюк и одной пары обуви можно составить?

10.3. Для каждого выбора укажи, важен ли порядок и разрешены ли повторения: а) распределить три призовых места между 10 участниками без ничьих; б) выбрать команду из 3 человек среди 10; в) составить код длины 3 из цифр $0, \dots, 9$, допуская одинаковые цифры; г) выбрать 3 элемента из 4 видов, допуская один вид несколько раз и не учитывая порядок.

10.4. Вычисли $5!$, $0!$ и $\dfrac{7!}{5!}$.

10.5. Сколькими способами можно расположить в ряд 6 различных книг, используя каждую ровно один раз?

10.6. Сколько разных последовательностей можно получить, переставляя все буквы слова «ТОПОТ»? Осмысленность полученных слов не требуется.

10.7. В забеге участвуют 8 человек. Сколько существует вариантов распределения первого, второго и третьего мест, если ничьи невозможны?

10.8. Из 8 различных элементов выбирают 3, не учитывая порядок. Сколько существует выборов?

10.9. Электронный замок принимает код из 4 цифр от 0 до 9. Повторения разрешены, первая цифра может быть нулём. Сколько разных кодов возможно?

10.10. Сколько существует четырёхзначных натуральных чисел с попарно различными цифрами?

10.11. Из 4 видов элементов выбирают 3 элемента. Каждый вид можно использовать сколько угодно раз, порядок не учитывается. Сколько существует выборов?

10.12. Сколькими способами можно разложить 7 одинаковых шаров по 3 различным ящикам? Пустые ящики допускаются.

10.13. Из множества, состоящего из $n \geq 2$ элементов, можно выбрать ровно 45 различных неупорядоченных пар. Найди n.



10.14. Пользуясь тождеством Паскаля и значениями $\binom{7}{2} = 21$, $\binom{7}{3} = 35$, вычисли $\binom{8}{3}$.

10.15. Раскрой скобки в $(x+2)^4$ с помощью бинома Ньютона.

10.16. Найди коэффициент при x^3 после раскрытия скобок в $(2+x)^7$.

10.17. Докажи, что для любого $n \in \mathbb{N}_0$ выполняется $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$.

10.18.* Из 4 девушек и 6 юношей выбирают группу из 5 человек. Сколько существует групп, в которых не меньше двух девушек?

10.19.* Сколько кодов длины 5 из цифр $0, \ldots, 9$ содержат хотя бы один ноль и хотя бы одну единицу? Начальный ноль разрешён, повторения разрешены.

10.20.* Докажи подсчётом одного и того же множества двумя способами тождество Вандермонда: $\sum_{k=0}^{r} \binom{m}{k}\binom{n}{r-k} = \binom{m+n}{r}$, где $m, n \in \mathbb{N}_0$, $0 \le r \le m+n$. В этой задаче $\binom{u}{v} = 0$, если целое $v < 0$ или $v > u$. Рассматривай целое $r \in \mathbb{N}_0$.

ГЛАВА 11

Уравнения, системы и неравенства

Определение 11.1. Корень уравнения (*root; solution of an equation*) — допустимое значение неизвестного, при котором равенство верно.

Определение 11.2. Решение неравенства (*solution of an inequality*) — значение неизвестного, при котором указанное сравнение верно.

Определение 11.3. Решение системы (*solution of a system*) — значения неизвестных, которые удовлетворяют всем её условиям одновременно.

Линейные и квадратные уравнения

$ax + b = 0$ при $a \neq 0$ имеет корень $x = -\frac{b}{a}$. При $a = 0, b = 0$ подходят все x; при $a = 0, b \neq 0$ решений нет.

Определение 11.4. Дискриминант (*discriminant*) квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$ при $a \neq 0$ — число $D = b^2 - 4ac$.

При $D > 0$ два корня: $x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$. При $D = 0$ один корень: $-\frac{b}{2a}$. При $D < 0$ действительных корней нет.

Правила и проверка

К обеим частям равенства или неравенства можно прибавить одно и то же выражение при сохранении ОДЗ.

При умножении или делении неравенства на отрицательное число знак меняется; на положительное — сохраняется.

Метод интервалов: отметь нули и запрещённые точки, определи знак на каждом участке и отдельно проверь включение границ.

При возведении уравнения в квадрат могут появиться посторонние корни: проверь найденные значения в исходном условии.

Пример: $-2x > 6$ даёт $x < -3$. Уравнение $\sqrt{x+2} = x$ требует $x \geq 0$ ещё до возведения в квадрат.

Многочлены и уравнения третьей степени

Определение 11.5. Многочлен (polynomial) от x — выражение

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0.$$

Если $a_n \neq 0$, число n называют степенью многочлена (degree). Корень многочлена (polynomial root) — число r, для которого $P(r) = 0$.

Определение 11.6. Корень r имеет кратность (multiplicity) k, если $P(x) = (x-r)^k Q(x)$, где $Q(r) \neq 0$. При $k = 1$ корень называют простым, при $k > 1$ — кратным.

Теорема 11.1 (Сумма и разность кубов). *Для любых действительных a, b*

$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2), \qquad a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2).$$

Доказательство. При раскрытии скобок в первом произведении получаем $a^3 + a^2 b + ab^2 - a^2 b - ab^2 - b^3 = a^3 - b^3$. Во втором произведении средние слагаемые также сокращаются: $a^3 - a^2 b + ab^2 + a^2 b - ab^2 + b^3 = a^3 + b^3$. ■

Теорема 11.2 (Теорема Безу). *Теорема Безу (factor theorem): для любого действительного r существует многочлен $Q(x)$, для которого*

$$P(x) = (x-r)Q(x) + P(r).$$

Следовательно, r — корень P тогда и только тогда, когда $P(x)$ делится на $x - r$ без остатка.

Доказательство. Для натурального k

$$x^k - r^k = (x-r)(x^{k-1} + x^{k-2} r + \cdots + r^{k-1}).$$

Равенство проверяется умножением: все промежуточные слагаемые сокращаются. Поэтому каждое слагаемое суммы $P(x) - P(r) = \sum_{k=1}^{n} a_k (x^k - r^k)$ делится на $x - r$. Это даёт нужный Q. Если $P(r) = 0$, остаток равен нулю. Обратно, подставив $x = r$ в $P(x) = (x-r)Q(x)$, получаем $P(r) = 0$. ■

Теорема 11.3 (Рациональный корень). *Пусть коэффициенты $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$ целые, $a_n \neq 0$, $a_0 \neq 0$. Если $\frac{p}{q}$ — рациональный корень (rational root), причём p, q взаимно просты и $q > 0$, то p делит a_0, а q делит a_n.*

Доказательство. Подстановка $\frac{p}{q}$ и умножение на q^n дают

$$a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \cdots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n = 0.$$



Все слагаемые, кроме последнего, делятся на p, поэтому p делит $a_0 q^n$. Поскольку p и q^n взаимно просты, p делит a_0. Аналогично q делит $a_n p^n$, а значит, делит a_n. Использованное свойство взаимной простоты следует из разложения на простые множители: множители делителя, отсутствующие в одном сомножителе, должны целиком входить в другой. ■

Если старший коэффициент равен 1, рациональный корень может быть только целым делителем свободного члена. Проверяем кандидатов подстановкой, а найденный множитель $x - r$ отделяем по теореме Безу. Если свободный член нулевой, сначала выносим x. Отсутствие рациональных корней не означает отсутствия действительных: например, $x^3 - 2 = 0$ имеет корень $\sqrt[3]{2}$.

Пример. Для $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$ проверка даёт $P(2) = 0$. Поэтому

$$P(x) = (x-2)(x^2 - 2x - 3) = (x-2)(x-3)(x+1).$$

Уравнение $P(x) = 0$ имеет корни $-1, 2, 3$.

Теорема 11.4 (Устранение квадратного слагаемого). *В кубическом уравнении (cubic equation) $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$, где $a \neq 0$, замена $x = t - \frac{b}{3a}$ даёт неполное кубическое уравнение (depressed cubic)*

$$t^3 + pt + q = 0, \qquad p = \frac{3ac - b^2}{3a^2}, \qquad q = \frac{2b^3 - 9abc + 27a^2 d}{27a^3}.$$

Доказательство. После деления на a обозначим коэффициенты через $B = \frac{b}{a}$, $C = \frac{c}{a}$, $D = \frac{d}{a}$. Подставим $x = t - \frac{B}{3}$ и раскроем скобки:

$$\left(t - \frac{B}{3}\right)^3 + B\left(t - \frac{B}{3}\right)^2 + C\left(t - \frac{B}{3}\right) + D$$
$$= t^3 + \left(C - \frac{B^2}{3}\right) t + \frac{2B^3}{27} - \frac{BC}{3} + D.$$

Коэффициент при t^2 равен нулю. Подстановка B, C, D даёт указанные p, q. ■

Такая замена упрощает форму уравнения; сама по себе она не даёт готовой формулы корней. В задачах этого раздела после замены достаточно разложения на множители или выделения куба.

Два вида уравнений четвёртой степени

Определение 11.7. Биквадратное уравнение (biquadratic equation) имеет вид $ax^4 + bx^2 + c = 0$, где $a \neq 0$. Замена $u = x^2$ приводит к квадратному уравнению $au^2 + bu + c = 0$ с обязательным условием $u \geq 0$.

Каждое $u > 0$ даёт два корня $x = \pm\sqrt{u}$, значение $u = 0$ — один корень $x = 0$, а отрицательное u действительных корней не даёт.

Пример. $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$ после замены $u = x^2$ даёт $(u-1)(u-9) = 0$. Поэтому $x = -3, -1, 1, 3$.

Определение 11.8. Возвратное уравнение четвёртой степени (reciprocal quartic equation) в этом разделе — уравнение

$$ax^4 + bx^3 + cx^2 + bx + a = 0, \qquad a \neq 0,$$

у которого коэффициенты симметричны относительно середины.

Теорема 11.5 (Замена для возвратного уравнения). *Корни указанного возвратного уравнения ненулевые. Замена $t = x + \frac{1}{x}$ сводит поиск действительных корней к*

$$at^2 + bt + c - 2a = 0, \qquad |t| \geq 2.$$

Для каждого допустимого t решают $x^2 - tx + 1 = 0$.



Доказательство. При $x = 0$ левая часть исходного уравнения равна $a \neq 0$, поэтому деление на x^2 допустимо. Получаем

$$a\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + b\left(x + \frac{1}{x}\right) + c = 0.$$

Из $t = x + \frac{1}{x}$ следует $x^2 + \frac{1}{x^2} = t^2 - 2$, что даёт квадратное уравнение для t. Обратная подстановка равносильна $x^2 - tx + 1 = 0$. Его дискриминант $t^2 - 4$ неотрицателен ровно при $|t| \geq 2$; свободный член 1 исключает нулевой корень. Значит, указанное условие необходимо и достаточно. ■

Пример. Для $x^4 - 3x^3 + 2x^2 - 3x + 1 = 0$ получаем $t^2 - 3t = 0$, то есть $t = 0$ или $t = 3$. Значение $t = 0$ не удовлетворяет $|t| \geq 2$. При $t = 3$ имеем $x^2 - 3x + 1 = 0$, откуда

$$x = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \quad \text{или} \quad x = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}.$$

Задачи

11.1. Реши $3x - 7 = 11$.

11.2. Реши $2(x - 3) = 5x + 9$.

11.3. Реши $x^2 - 5x + 6 = 0$.

11.4. Реши $2x^2 - 8 = 0$.

11.5. Реши $\dfrac{x + 1}{x - 2} = 2$.

11.6. Реши систему: $x + y = 7; x - y = 1$.

11.7. Реши $-3x > 12$.

11.8. Реши $x^2 - 9 \leq 0$.

11.9. Реши $(x - 1)(x + 2) > 0$.

11.10. Реши $\dfrac{x - 3}{x + 1} \leq 0$.

11.11. Реши $|2x - 1| = 5$.

11.12. Реши $\sqrt{x + 2} = x$.



11.13. Поездка на такси стоит 150 рублей за подачу и 30 рублей за километр. Счёт составил 510 рублей. Какое расстояние проехали?

11.14. За 3 одинаковых блокнота и ручку стоимостью 80 рублей заплатили 440 рублей. Сколько стоит блокнот?

11.15. Для покупки билетов по 350 рублей выделено 2000 рублей. Какое максимальное целое число билетов можно купить?

11.16.* Реши $\sqrt{2x+3} = x$.

11.17.* Реши $\dfrac{x-2}{x+3} \geq 1$.

11.18.* У прямоугольного участка периметр 34 м, площадь 60 м^2. Найди стороны.

11.19. Докажите формулы Виета: если x_1, x_2 — действительные корни $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$, с учётом кратности, то $x_1 + x_2 = -\dfrac{b}{a}$, $x_1 x_2 = \dfrac{c}{a}$.

11.20. Докажите, что квадратное уравнение $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$, имеет действительный корень тогда и только тогда, когда $D = b^2 - 4ac \geq 0$. Используйте выделение полного квадрата.

11.21. Решите в действительных числах $x^3 - 8 = 0$, разложив разность кубов на множители.

11.22. Решите в действительных числах $x^3 + 27 = 0$, разложив сумму кубов на множители.

11.23. Решите $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$. Найдите целый корень, затем выделите соответствующий линейный множитель.

11.24. Решите $2x^3 - 3x^2 - 8x + 12 = 0$ в действительных числах.

11.25.* В уравнении $x^3 - 6x^2 + 9x - 4 = 0$ сделайте замену $x = t + 2$. Решите полученное уравнение и вернитесь к x.

11.26. Решите биквадратное уравнение $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$.

11.27. Решите в действительных числах $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$, проверив допустимость найденных значений x^2.

11.28.* Решите возвратное уравнение $x^4 - 5x^3 + 6x^2 - 5x + 1 = 0$. Для каждого корня уравнения относительно $t = x + \dfrac{1}{x}$ проверьте условие $|t| \geq 2$.

ГЛАВА 12

Последовательности и прогрессии

Определение 12.1. Числовая последовательность (real sequence) — отображение $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, где $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$. Числу n соответствует член последовательности (term) a_n; n — его номер. Последовательность записывают как $(a_n)_{n \geq 1}$.

Определение 12.2. Формула общего члена (explicit formula) непосредственно выражает a_n через n. Рекуррентная, или индуктивная, запись (recursive definition) задаёт начальное значение и правило получения следующих членов из предыдущих. Например, $a_1 = 2$, $a_{n+1} = a_n + 3$ при $n \geq 1$.

Определение 12.3. Арифметическая прогрессия (arithmetic progression) — последовательность, для которой $a_{n+1} = a_n + d$ при всех $n \geq 1$. Постоянное число d называют разностью прогрессии (common difference).

Теорема 12.1 (Общий член арифметической прогрессии)**.** *Для арифметической прогрессии*

$$a_n = a_1 + (n-1)d, \qquad n \geq 1.$$

Доказательство. При $n = 1$ равенство верно. Если $a_k = a_1 + (k-1)d$, то $a_{k+1} = a_k + d = a_1 + kd$. По математической индукции формула верна для всех $n \geq 1$. ■

Определение 12.4. Частичная сумма (partial sum) последовательности — сумма первых N членов: $S_N = a_1 + \cdots + a_N$.

Теорема 12.2 (Сумма арифметической прогрессии)**.**

$$S_N = \frac{N(a_1 + a_N)}{2} = \frac{N}{2}\bigl(2a_1 + (N-1)d\bigr).$$



Доказательство. Запишем одну и ту же сумму в прямом и обратном порядке. При сложении получим $2S_N = (a_1+a_N)+(a_2+a_{N-1})+\dots+(a_N+a_1)$. В каждой из N скобок сумма равна $2a_1+(N-1)d = a_1+a_N$. Деление на 2 даёт первую формулу, а подстановка общего члена — вторую. Рассуждение не зависит от чётности N. ■

Определение 12.5. Геометрическая прогрессия (geometric progression) в этом сборнике — последовательность, для которой $a_{n+1} = qa_n$ при всех $n \geq 1$. Постоянное число q называют знаменателем прогрессии (common ratio). Такое определение включает $q = 0$: тогда последовательность имеет вид $a_1, 0, 0, \dots$.

Теорема 12.3 (Общий член геометрической прогрессии). *При $q \neq 0$*

$$a_n = a_1 q^{n-1}, \qquad n \geq 1.$$

При $q = 0$ отдельно имеем $a_n = 0$ для $n \geq 2$; значение a_1 задано начальным условием.

Доказательство. При $q \neq 0$ база $n = 1$ даёт $a_1 q^0 = a_1$. Из формулы для k следует $a_{k+1} = qa_k = qa_1 q^{k-1} = a_1 q^k$. При $q = 0$ сначала $a_2 = 0$, затем каждый следующий член равен $0 \cdot 0 = 0$. Такое отдельное рассмотрение позволяет не использовать неопределённую запись 0^0. ■

Теорема 12.4 (Сумма геометрической прогрессии). *При $q \neq 1$*

$$S_N = \frac{a_1(1-q^N)}{1-q}.$$

При $q = 1$ имеем $S_N = Na_1$. Формула для $q \neq 1$ верна также при $q = 0$.

Доказательство. Из рекуррентного правила $qS_N = a_2 + a_3 + \dots + a_{N+1}$. Вычитая это равенство из $S_N = a_1 + a_2 + \dots + a_N$, получаем $(1-q)S_N = a_1 - a_{N+1} = a_1(1-q^N)$. При $q \neq 1$ делим на $1-q$. При $q = 1$ все члены равны a_1, поэтому сумма равна Na_1. ■

Предел, монотонность и ограниченность

Определение 12.6. Число L — предел последовательности (limit of a sequence) (b_N), если для любого $\varepsilon > 0$ существует натуральное N_0, такое что при всех $N \geq N_0$ выполнено $|b_N - L| < \varepsilon$. Запись: $\lim_{N\to\infty} b_N = L$. Иными словами, все достаточно поздние члены попадают в любой заранее выбранный интервал вокруг L.

Определение 12.7. Последовательность (a_n) не убывает (is nondecreasing), если $a_{n+1} \geq a_n$ для всех n, и не возрастает (is nonincreasing), если $a_{n+1} \leq a_n$. В обоих случаях её называют монотонной (monotone). Если неравенства строгие, говорят о строго возрастающей или строго убывающей последовательности.

Определение 12.8. Последовательность ограничена сверху (bounded above), если существует число M, такое что $a_n \leq M$ при всех n. Она ограничена снизу (bounded below), если существует m с $m \leq a_n$ при всех n. Если выполнены оба условия, последовательность ограничена (bounded).

Определение 12.9. Число L называют супремумом, или точной верхней гранью (supremum, least upper bound) непустого множества $A \subseteq \mathbb{R}$, если $a \leq L$ для всех $a \in A$, но никакое меньшее число не обладает этим свойством. Обозначение: $L = \sup A$.

Определение 12.10. Число m — нижняя грань (lower bound) множества $A \subseteq \mathbb{R}$, если $m \leq a$ для каждого $a \in A$.

Определение 12.11. Инфимум, или точная нижняя грань (infimum; greatest lower bound) непустого множества — наибольшая его нижняя грань. Обозначение: $\inf A$. Инфимум не обязан принадлежать самому множеству.

Для $A = (0; 1]$ имеем $\inf A = 0$, $\sup A = 1$. Наименьшего элемента нет, а наибольший равен 1. Нельзя путать нижнюю грань с наименьшим элементом: граница описывает всё множество и может лежать вне него.

Аксиома 12.1 (Полнота действительных чисел). Аксиома полноты (completeness axiom): каждое непустое множество действительных чисел, ограниченное сверху, имеет действительный супремум.

Теорема 12.5 (Существование инфимума). *Всякое непустое ограниченное снизу множество $A \subseteq \mathbb{R}$ имеет инфимум. Если $-A = \{-a : a \in A\}$, то* $\inf A = -\sup(-A)$.

Доказательство. Множество $-A$ непусто и ограничено сверху. Пусть $L = \sup(-A)$, существующий по полноте. Из $-a \le L$ получаем $-L \le a$, так что $-L$ — нижняя грань A. Если b — любая нижняя грань, то $-b$ — верхняя грань $-A$, откуда $L \le -b$, то есть $b \le -L$. Следовательно, $-L$ — наибольшая нижняя грань. ■

Теорема 12.6 (Сходимость монотонной ограниченной последовательности)**.** *Всякая неубывающая и ограниченная сверху последовательность сходится. Её предел равен $L = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. Всякая невозрастающая и ограниченная снизу последовательность также сходится. Следовательно, любая монотонная ограниченная последовательность имеет конечный предел.*

Доказательство. Для неубывающей последовательности супремум L существует по аксиоме полноты. Выберем любое $\varepsilon > 0$. Число $L - \varepsilon$ не является верхней гранью, поэтому существует номер N, для которого $a_N > L - \varepsilon$. При всех $n \ge N$ по монотонности $a_n \ge a_N$, а по свойству верхней грани $a_n \le L$. Значит, $L - \varepsilon < a_n \le L$, то есть $|a_n - L| < \varepsilon$. Это и означает $a_n \to L$.



Для невозрастающей и ограниченной снизу последовательности (a_n) последовательность $(-a_n)$ не убывает и ограничена сверху. Уже доказанный случай даёт $-a_n \to B$, откуда $a_n \to -B$, поскольку $|a_n - (-B)| = |-a_n - B|$. ■

Условие с ε придаёт словам «сколь угодно близко» точный смысл: сначала выбирается любая положительная точность ε, и только после этого подбирается номер N, начиная с которого *все* члены удовлетворяют $|a_n - L| < \varepsilon$. Единого заранее фиксированного N для всех точностей не требуется.

Бесконечная сумма

Определение 12.12. Бесконечный ряд (infinite series) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится (converges) к числу S, если его частичные суммы S_N имеют предел S. Число S называют суммой ряда (sum of a series). Если такого конечного предела нет, ряд расходится (diverges).

Теорема 12.7 (Бесконечная геометрическая сумма). *Пусть* $a_{n+1} = qa_n$. *При* $|q| < 1$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{a_1}{1-q}.$$

Если $a_1 \neq 0$, *условие* $|q| < 1$ *также необходимо для сходимости. В частности, при* $q = 1$ *и при* $q = -1$ *такой ряд расходится.*

Доказательство. Сначала покажем $q^N \to 0$ при $|q| < 1$. Случай $q = 0$ непосредственен. Если $0 < r = |q| < 1$, то $r = \frac{1}{1+h}$ с $h > 0$. Неравенство $(1+h)^N \geq 1+Nh$ доказывается индукцией: после умножения $1+Nh$ на $1+h$ получаем $1 + (N+1)h + Nh^2 \geq 1 + (N+1)h$. Значит, $|q^N| = r^N \leq \frac{1}{1+Nh}$, а эта верхняя граница становится меньше любого $\varepsilon > 0$ при достаточно большом N.

По формуле конечной суммы

$$\left| S_N - \frac{a_1}{1-q} \right| = \frac{|a_1|\,|q|^N}{|1-q|} \longrightarrow 0.$$

При $a_1 = 0$ все суммы уже равны нулю. Если $a_1 \neq 0$ и $|q| \geq 1$, то $|a_n| = |a_1||q|^{n-1} \geq |a_1|$, поэтому a_n не стремится к нулю. Но из сходимости $S_N \to S$ обязательно следует $a_N = S_N - S_{N-1} \to 0$: разность ограничена сверху величиной $|S_N - S| + |S_{N-1} - S|$, и оба слагаемых стремятся к нулю. Получили противоречие.

Наглядно, при $q = 1$ суммы $S_N = Na_1$ неограниченно растут по модулю. При $q = -1$ они чередуются: $S_{2k} = 0$, $S_{2k-1} = a_1$; при $a_1 \neq 0$ единого предела нет. ■

Пример. $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots = 2$. При этом первые N слагаемых дают $S_N = 2(1 - 2^{-N})$, а недостающая до 2 величина равна 2^{1-N} и стремится к нулю.

Задачи

12.1. Последовательность задана формулой $a_n = 3n - 2$, $n \geq 1$. Выпишите первые пять членов и найдите a_{10}.

12.2. Для $a_n = \dfrac{(-1)^n}{n}$ выпишите первые четыре члена. Укажите знак a_{25} и знак a_{26}.

12.3. Дано $a_1 = 2$, $a_{n+1} = 2a_n - 1$. Выпишите первые пять членов последовательности.

12.4. Последовательность $3, 7, 11, 15, \ldots$ — арифметическая прогрессия. Найдите её разность и формулу общего члена.

12.5. В арифметической прогрессии $a_1 = 7$, $d = -3$. Найдите a_8.

12.6. В арифметической прогрессии $a_3 = 11$, $a_9 = 35$. Найдите d и a_1.

12.7. Найдите сумму первых двадцати членов арифметической прогрессии с $a_1 = 5$ и $d = 2$.

12.8. Последовательность $3, -6, 12, -24, \ldots$ — геометрическая прогрессия. Найдите q, формулу a_n и a_6.

12.9. В геометрической прогрессии $a_1 = 81$, $q = \dfrac{1}{3}$. Найдите a_5.

12.10. В действительной геометрической прогрессии $a_2 = 6$, $a_5 = 48$. Найдите q и a_1.

12.11. Вычислите сумму $1 + 2 + 4 + \cdots + 128$. Сначала определите число слагаемых.

12.12. Найдите сумму бесконечного ряда $18 - 6 + 2 - \dfrac{2}{3} + \cdots$. Объясните, почему геометрическая сумма здесь существует.

12.13. В первую неделю в копилку положили 100 рублей, а в каждую следующую — на 50 рублей больше, чем в предыдущую. Сколько рублей положили за 12 недель?

12.14. В первом ряду зала 12 мест, а в каждом следующем на 2 места больше. Всего 20 рядов. Найдите число мест в последнем ряду и во всём зале.

12.15. В игре за первый день дают 2 монеты, а каждый следующий день награду удваивают. Найдите награду за седьмой день и общее число монет за первые семь дней.



12.16. Докажите с помощью формулы суммы арифметической прогрессии, что $1+3+5+\cdots+(2N-1)=N^2$ для любого натурального N.

12.17. Докажите, что ряд $a-a+a-a+\cdots$ не имеет суммы в смысле предела частичных сумм, если $a \neq 0$.

12.18.* Дано $a_1=3$, $a_{n+1}=2a_n+1$. Найдите формулу общего члена и сумму первых десяти членов.

12.19.* В арифметической прогрессии $d>0$, $a_2+a_5=34$, $a_3a_4=280$. Найдите a_1, d и S_{10}.

12.20.* Суммируют числа $64, 16, 4, 1, \ldots$. Найдите бесконечную сумму S, формулу остатка $R_N = S-S_N$ и наименьшее натуральное N, при котором $R_N < \dfrac{1}{10}$.

12.21. Для множества $(-2;5]$ найди супремум, инфимум, наибольший и наименьший элементы, если они существуют.

12.22. Найди точные грани множества $A=\{1+\dfrac{1}{n} : n\in\mathbb{N}\}$. Принадлежат ли они A? Обоснуй ответ.

12.23. Для $A=\{-3,2,7\}$ перечисли все нижние и верхние грани. Укажи точные грани.

12.24. Пусть непустое $A\subseteq\mathbb{R}$ ограничено снизу, $c\in\mathbb{R}$. Докажи $\inf\{c+a : a\in A\} = c+\inf A$.

ГЛАВА 13

Функции и графики

Определение 13.1. Функция (*function*) — соответствие, которое каждому x из области определения ставит в соответствие ровно одно значение $f(x)$.

Определение 13.2. Область определения (*domain*) функции — множество всех допустимых значений аргумента x.

Определение 13.3. Область значений (*range; image*) функции — множество всех значений $f(x)$, которые она принимает.

Определение 13.4. График функции (*graph of a function*) f — множество точек $(x; f(x))$ при всех x из её области определения.

Определение 13.5. Нули функции (*zeros of a function*) — значения x из области определения, для которых $f(x) = 0$.

Определение 13.6. Строгое возрастание (*strict increase*) функции f на промежутке I означает: для любых $x_1, x_2 \in I$ из $x_1 < x_2$ следует $f(x_1) < f(x_2)$.

Определение 13.7. Строгое убывание (*strict decrease*) функции f на промежутке I означает: для любых $x_1, x_2 \in I$ из $x_1 < x_2$ следует $f(x_1) > f(x_2)$.

В этом сборнике слова «возрастает» и «убывает» означают строгую монотонность.

Определение 13.8. Неубывающая функция (*nondecreasing function*) на промежутке I — функция, для которой при любых $x_1, x_2 \in I$ из $x_1 < x_2$ следует $f(x_1) \le f(x_2)$. Это более слабое условие, чем строгое возрастание.

Определение 13.9. Чётная функция (*even function*) — функция с симметричной относительно нуля областью определения, для которой $f(-x) = f(x)$ при всех допустимых x. Симметричность области означает, что вместе с x она содержит $-x$.

Определение 13.10. Нечётная функция (*odd function*) — функция с симметричной относительно нуля областью определения, для которой $f(-x) = -f(x)$ при всех допустимых x.

Графики и преобразования

$y = f(x - a)$ при $a > 0$ сдвигает график вправо на a. $y = f(x) + b$ при $b > 0$ сдвигает его вверх на b.

$y = -f(x)$ отражает график относительно горизонтальной оси. $y = f(-x)$ отражает его относительно вертикальной оси.

Чтобы найти пересечения двух графиков, реши $f(x) = g(x)$, затем вычисли y для каждого найденного x.

Определение 13.11. Композиция (*composition*) функций f и g, обозначаемая $f(g(x))$, — функция, для вычисления которой сначала находят $g(x)$, затем подставляют результат в f. Аргумент x должен принадлежать области определения g, а значение $g(x)$ — области определения f.

Пример: $y = (x-2)^2 + 1$ *имеет вершину* $(2; 1)$ *и область значений* $[1; +\infty)$.

Отображения и обратные функции

Определение 13.12. Отображение (mapping) $f : X \to Y$ — правило, которое каждому элементу x множества X сопоставляет ровно один элемент $f(x)$ множества Y. Для числовых множеств это привычная числовая функция.

Определение 13.13. Множество назначения (codomain) отображения $f : X \to Y$ — указанное множество Y, в котором лежат результаты отображения. Оно может быть больше области значений.

Определение 13.14. Образ множества (image) X при отображении f — множество всех полученных значений: $f(X) = \{f(x) : x \in X\}$. Поэтому $f(X) \subseteq Y$.

Определение 13.15. Инъекция (injection) — отображение $f : X \to Y$, для которого из $f(x_1) = f(x_2)$ следует $x_1 = x_2$. Различные аргументы имеют различные образы.

Определение 13.16. Сюръекция (surjection) — отображение $f : X \to Y$, для которого каждый $y \in Y$ равен $f(x)$ хотя бы при одном $x \in X$. Иначе говоря, $f(X) = Y$.

Определение 13.17. Биекция (bijection) — отображение, являющееся одновременно инъекцией и сюръекцией. Каждый элемент множества назначения имеет ровно один прообраз.

Определение 13.18. Обратное отображение (inverse mapping) к биекции $f : X \to Y$ — отображение $f^{-1} : Y \to X$, которое каждому y сопоставляет единственный x, для которого $f(x) = y$. Запись f^{-1} здесь не означает $\frac{1}{f}$.

Теорема 13.1 (Существование обратного отображения). *Отображение $f : X \to Y$ имеет обратное отображение $g : Y \to X$, удовлетворяющее $g(f(x)) = x$ для всех $x \in X$ и $f(g(y)) = y$ для всех $y \in Y$, тогда и только тогда, когда f — биекция.*

Доказательство. Если f — биекция, сюръективность обеспечивает существование прообраза каждого y, а инъективность — его единственность. Выбирая этот прообраз, получаем $g = f^{-1}$ и оба равенства. Обратно, пусть оба равенства выполнены. Из $f(x_1) = f(x_2)$ после применения g следует $x_1 = x_2$, поэтому f инъективно. Для каждого $y \in Y$ равенство $f(g(y)) = y$ даёт прообраз, поэтому f сюръективно. ■



Важен выбор множества назначения: $x \mapsto x^2$ из $\mathbb{R}$ в $\mathbb{R}$ не является сюръекцией, а из $\mathbb{R}$ в $[0; +\infty)$ является. Оба отображения неинъективны. Ограничив аргументы множеством $[0; +\infty)$, получаем биекцию $x \mapsto x^2$ на $[0; +\infty)$, обратную функции $y \mapsto \sqrt{y}$.


Пример. Функция $f(x) = 3x + 2$ задаёт биекцию $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Из $y = 3x + 2$ находим $x = \frac{y-2}{3}$, поэтому $f^{-1}(y) = \frac{y-2}{3}$. Проверка: $f^{-1}(f(x)) = x$ и $f(f^{-1}(y)) = y$. Графики обратных числовых функций симметричны относительно прямой $y = x$: точке $(x; y)$ первого графика соответствует точка $(y; x)$ второго.

Определение 13.19. Композиция отображений (composition) $g : X \to Y$ и $f : Y \to Z$ — отображение $f \circ g : X \to Z$, заданное правилом $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. Сначала применяют g, затем f.

Если формулы заданы на своих естественных областях, область определения $f \circ g$ состоит из тех x из области определения g, для которых $g(x)$ входит

в область определения f. Например, при $f(u) = \sqrt{u}$, $g(x) = 2x - 1$ композиция $f(g(x)) = \sqrt{2x - 1}$ определена при $x \geq \frac{1}{2}$, а $g(f(x)) = 2\sqrt{x} - 1$ — при $x \geq 0$.

Графики



Базовые алгебраические функции

Задачи

13.1. Для $f(x) = 2x - 3$ найди $f(-2), f(0), f(3)$.

13.2. Найди область определения $f(x) = \dfrac{1}{x - 4}$.

13.3. Найди область определения $f(x) = \sqrt{x+3}$.

13.4. Найди нули $f(x) = x^2 - 4$.



13.5. Где $f(x) = 3x - 6$ положительна?

13.6. Построй $y = 2x + 1$ и найди пересечения с осями.

13.7. Построй $y = (x-2)^2 - 1$. Укажи вершину.

13.8. Укажи промежутки убывания и возрастания $y = x^2$.

13.9. Определи чётность $f(x) = x^3$ и $g(x) = x^2 + 1$.

13.10. При $f(x) = x^2$ и $g(x) = x + 1$ найди $f(g(x))$ и $g(f(x))$.

13.11. Найди область значений $y = (x-1)^2 + 2$.

13.12. Найди точки пересечения $y = x^2$ и $y = x + 2$.

13.13. Стоимость аренды велосипеда описана формулой $C(t) = 200 + 150t$ рублей, где $t \geq 0$ — время в часах. Найди стоимость для 0, 2 и 4 часов и построй график.

13.14. В баке 60 л воды. Её расходуют со скоростью 5 л в минуту, не доливая. Запиши объём $V(t)$, укажи допустимое время и момент опустошения.

13.15. Два тарифа доставки: $A(x) = 100 + 20x$ и $B(x) = 40x$ рублей, где $x \geq 0$ — расстояние в километрах. При каком расстоянии цены равны? Какой тариф дешевле при 2 км и при 8 км?

13.16.* Найди область определения $f(x) = \dfrac{\sqrt{x-1}}{x-3}$.

13.17.* Построй $y = |x-2| + 1$ и найди все x, для которых $y \leq 4$.

13.18.* Из куска проволоки длиной 20 м делают прямоугольник. Вырази площадь через сторону x и найди наибольшую площадь.

13.19.* Докажи, что при любых действительных $a \neq 0$ и b функция $f(x) = ax + b$ задаёт биекцию $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Найди обратную функцию и проверь обе композиции.

13.20.* Пусть $g : X \to Y$ и $f : Y \to Z$ — инъекции. Докажи, что композиция $f \circ g$ тоже инъективна. Затем докажи аналогичное утверждение для двух сюръекций.

13.21. Построй график $f(x) = |x| - 2$. Найди область значений. Является ли отображение $f : \mathbb{R} \to [-2; +\infty)$ инъекцией, сюръекцией, биекцией? Существует ли обратное отображение на всей указанной области?

13.22.* Для $f(x) = \sqrt{x+1} + 2$ найди область определения и область значений. Найди обратную функцию, указав её область определения. Построй оба графика в одной системе координат и проверь их симметрию относительно $y = x$.

ГЛАВА 14

Степенные, показательные и логарифмические функции

Определение 14.1. Степенная функция (*power function*) — функция $y = x^r$ с фиксированным показателем r; допустимые x зависят от показателя.

Определение 14.2. Показательная функция (*exponential function*) — $y = a^x$ при $a > 0$ и $a \neq 1$; x может быть любым действительным числом.

Определение 14.3. Логарифм (*logarithm*) $\log_a b$ — показатель степени, в которую нужно возвести a, чтобы получить b: $a^c = b$ означает $\log_a b = c$.

Условия логарифма: $a > 0, a \neq 1, b > 0$.

Свойства показательной и логарифмической функций

a^x всегда положительно. При $a > 1$ функция возрастает, при $0 < a < 1$ убывает. Логарифм с тем же основанием меняется в том же направлении.

$\log_a 1 = 0; \log_a a = 1$. При допустимых значениях $\log_a(a^x) = x$ и $a^{\log_a b} = b$.

При $u, v > 0$: $\log_a(uv) = \log_a u + \log_a v; \log_a(\frac{u}{v}) = \log_a u - \log_a v$.

При $u > 0$: $\log_a(u^r) = r \log_a u$. Формула смены основания: $\log_a u = \frac{\log_c u}{\log_c a}$ при $c > 0, c \neq 1$.

Графики $y = a^x$ и $y = \log_a x$ симметричны относительно прямой $y = x$.

Две важные степенные функции

$y = \frac{1}{x}$: $x \neq 0$, значения $y \neq 0$. $y = \sqrt{x}$: $x \geq 0$, значения $y \geq 0$.

Пример: $\log_2 8 = 3$, *потому что* $2^3 = 8$. *Неравенство* $(\frac{1}{2})^x > (\frac{1}{2})^3$ *даёт* $x < 3$.

Число e, натуральный логарифм и экспонента

Рассмотрим учебную модель: на счёте 1 условная денежная единица, годовая ставка равна 100%. Если проценты начисляют один раз в конце года, получается 2. Если год делят на n равных частей и каждый раз прибавляют $\frac{1}{n}$ текущей суммы, через год получается $a_n = (1+\frac{1}{n})^n$. Например, $a_1 = 2$, $a_2 = 2{,}25$, $a_4 = 2{,}44140625$. Чем чаще начисление, тем ближе итог к определённому числу; он не растёт без границ.

Определение 14.4. Предел последовательности (limit of a sequence) a_n — число L, к которому члены последовательности становятся сколь угодно близки: для каждого $\varepsilon > 0$ существует натуральное N, такое что при всех $n \geq N$ выполнено $|a_n - L| < \varepsilon$. Обозначение: $\lim_{n\to\infty} a_n = L$.

Определение 14.5. Факториал (factorial) натурального числа k — произведение $k! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot k$; дополнительно полагают $0! = 1$.

Теорема 14.1 (Сходимость последовательности сложных процентов). *Последовательность $a_n = (1+\frac{1}{n})^n$ строго возрастает, ограничена сверху и имеет предел, лежащий между 2 и 3.*



Доказательство. По биному Ньютона $a_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1}(1-\frac{j}{n})$. Знак $\sum$ означает сложение слагаемых, $\prod$ — перемножение множителей; при $k = 0$ произведение принимается равным 1. При замене n на $n+1$ все множители уже имеющихся слагаемых не уменьшаются и добавляется новое положительное слагаемое. Поэтому $a_{n+1} > a_n$. Для $k \geq 2$ имеем $k! \geq 2 \cdot 3^{k-2}$, поскольку все множители от 3 до k не меньше 3. Множители под знаком $\prod$ лежат в $(0;1]$, поэтому при $n \geq 2$ получаем $a_n \leq 2 + \frac{1}{2}\sum_{j=0}^{n-2}(\frac{1}{3})^j < 2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{3}} = \frac{11}{4}$; также $a_1 = 2 < \frac{11}{4}$. По теореме о монотонной ограниченной последовательности предел существует. Он не меньше $a_2 = \frac{9}{4} > 2$ и не больше $\frac{11}{4} < 3$. ■

Определение 14.6. Число e (Euler's number) — предел $e = \lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n$, существование которого доказано выше. Приближённо $e \approx 2{,}718281828$.

Предельный результат для начальной суммы S в описанной модели равен Se; это объясняет появление числа e при непрерывном накоплении.

Определение 14.7. Экспонента (exponential function) — функция $\exp x = e^x$, определённая для всех $x \in \mathbb{R}$. Её значения положительны, и она строго возрастает.

Определение 14.8. Натуральный логарифм (natural logarithm) — логарифм по основанию e: $\ln x = \log_e x$ при $x > 0$. Он является обратной функцией к экспоненте.

По определениям $\ln 1 = 0$, $\ln e = 1$, $\ln(e^x) = x$ для всех действительных x, а $e^{\ln x} = x$ для $x > 0$. Сохраняются правила $e^{x+y} = e^x e^y$ и $\ln(uv) = \ln u + \ln v$ при $u, v > 0$.

Теорема 14.2 (Переход к натуральному основанию). *При $a > 0$, $a \neq 1$, $u > 0$ выполнено $\log_a u = \frac{\ln u}{\ln a}$. Для $a > 0$ и $x \in \mathbb{R}$ выполнено $a^x = e^{x \ln a}$.*

Доказательство. Положим $r = \log_a u$; тогда $u = a^r$. По правилу логарифма степени $\ln u = r \ln a$. Поскольку $a \neq 1$, число $\ln a \neq 0$, и деление даёт первую формулу. Далее $\ln(a^x) = x \ln a$; применив экспоненту к обеим частям, получаем вторую формулу. ■

Гиперболические функции

Определение 14.9. Гиперболический синус (hyperbolic sine) — функция $\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, определённая для всех действительных x.

Определение 14.10. Гиперболический косинус (hyperbolic cosine) — функция $\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$, определённая для всех действительных x.

Теорема 14.3 (Основное тождество и чётность). *Для любого действительного x выполнено $\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$, $\operatorname{sh}(-x) = -\operatorname{sh} x$, $\operatorname{ch}(-x) = \operatorname{ch} x$.*

Доказательство. Вычитаем квадраты по определениям: $\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = \frac{(e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2}{4} = e^x e^{-x} = 1$. При замене x на $-x$ два слагаемых в числителях меняются местами: разность меняет знак, а сумма сохраняется. Это доказывает обе формулы чётности. ■

Гиперболические тангенс и котангенс

Определение 14.11. Гиперболический тангенс (*hyperbolic tangent*) — функция $\operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}$, $x \in \mathbb{R}$. Знаменатель всегда положителен. В англоязычной литературе обычно пишут $\tanh x$.

Определение 14.12. Гиперболический котангенс (*hyperbolic cotangent*) — функция $\operatorname{cth} x = \frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x}$, $x \neq 0$. В англоязычной литературе обычно пишут $\coth x$.

Теорема 14.4 (Рациональные выражения через экспоненту). *При $t = e^{2x} > 0$ имеем*

$$\operatorname{th} x = \frac{t-1}{t+1}, \qquad \operatorname{cth} x = \frac{t+1}{t-1} \quad (x \neq 0).$$

Обе функции нечётны. Множество значений th *равно* $(-1;1)$, *а* cth — $(-\infty;-1)\cup(1;+\infty)$.

Доказательство. Подставим определения sh, ch и умножим числитель и знаменатель на e^{x}. Нечётность следует из нечётности sh и чётности ch. При $t>0$ выполнено $|t-1|<t+1$, что даёт указанные строгие границы. Обратно, для $-1<y<1$ число $t=\frac{1+y}{1-y}>0$ даёт $\operatorname{th}(\frac12\ln t)=y$. При $|y|>1$ число $t=\frac{y+1}{y-1}>0$ отлично от 1 и даёт $\operatorname{cth}(\frac12\ln t)=y$. Поэтому все указанные значения достигаются. ■



Гиперболический тангенс ограничен, хотя его аргумент может расти без границ. Например, заданная модель сигнала $s(t)=2\operatorname{th} t$ всегда даёт $-2<s(t)<2$. Значения приближаются к границам, но не достигают их при конечном t. В отличие от обычного тангенса, у th на действительной прямой нет полюсов и нет ненулевого периода. У cth область определения разрывается в нуле; это нужно учитывать до сокращения выражений и решения уравнений. Периодические ветви обычного котангенса и две ветви гиперболического котангенса имеют разное происхождение.

Теорема 14.5 (Тождества и монотонность). *Для действительного x выполнено $1-\operatorname{th}^2 x=\frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$; при $x\neq0$ — $\operatorname{cth}^2 x-1=\frac{1}{\operatorname{sh}^2 x}$. Функция* th *строго возрастает на $\mathbb{R}$, а* cth *строго убывает на каждом из промежутков $(-\infty;0)$, $(0;+\infty)$.*

Доказательство. Разделим равенство $\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$ соответственно на $\operatorname{ch}^2 x$ и $\operatorname{sh}^2 x$. Для монотонности пусть $0 < t_1 < t_2$. Разность значений $\frac{t-1}{t+1}$ равна $\frac{2(t_2-t_1)}{(t_2+1)(t_1+1)} > 0$. Разность значений $\frac{t+1}{t-1}$ равна $-\frac{2(t_2-t_1)}{(t_2-1)(t_1-1)} < 0$, если t_1, t_2 лежат по одну сторону от 1. Экспонента e^{2x} строго возрастает, что даёт все утверждения. Неограниченность аргумента и строгая монотонность также исключают ненулевой период th. ■

Зачем нужны гиперболические функции

В геометрии параметризация $X = \operatorname{ch} t$, $Y = \operatorname{sh} t$ даёт точки правой ветви гиперболы $X^2 - Y^2 = 1$, поскольку $\operatorname{ch} t > 0$. Это аналог связи косинуса и синуса с окружностью, но с разностью квадратов вместо суммы.



Другая модель — цепная линия (*catenary*). Идеальная гибкая однородная нерастяжимая цепь в равновесии под собственным весом в однородном поле тяжести, подвешенная за концы на одинаковой высоте, при подходящем выборе координат имеет профиль

$$y = a\left(\operatorname{ch}\frac{x}{a} - 1\right), \qquad a > 0.$$

Оси x, y и параметр a измеряются в единицах длины, поэтому аргумент $\frac{x}{a}$ безразмерен. Начало координат расположено в нижней точке цепи. Например, при $a = 2$ м и $x = 2\ln 2$ м получаем $y = 2(\frac{2+\frac{1}{2}}{2} - 1) = \frac{1}{2}$ м. Вывод физической модели требует механики; здесь мы исследуем заданную функцию.

У модели минимум $y = 0$ при $x = 0$: для $u = e^t > 0$ неравенство $u + \frac{1}{u} \geq 2$ следует из $\frac{(u-1)^2}{u} \geq 0$. Значит, $\operatorname{ch} t \geq 1$, причём равенство возможно только при $t = 0$. График симметричен относительно вертикальной оси по чётности ch.

График $\operatorname{sh} x$ нечётен, строго возрастает и проходит через $(0; 0)$. Возрастание видно без производных: при $y > x$ одновременно $e^y > e^x$ и $-e^{-y} > -e^{-x}$. График $\operatorname{ch} x$ чётен и проходит через $(0; 1)$; его наименьшее значение равно 1. Для $0 \leq x < y$ равенство $\operatorname{ch} y - \operatorname{ch} x = 2\operatorname{sh}\frac{y+x}{2}\operatorname{sh}\frac{y-x}{2} > 0$, получаемое раскрытием определений, показывает возрастание на $[0; +\infty)$; из чётности следует убывание на $(-\infty; 0]$. Таким образом, график имеет плавную форму цепи с минимумом в $(0; 1)$, но не совпадает с параболой.

Правила степеней и логарифмов с условиями

Для $a, b > 0$ и действительных r, s действуют


$$a^{r+s} = a^r a^s, \qquad (a^r)^s = a^{rs}, \qquad (ab)^r = a^r b^r.$$

Ограничение на основания существенно: для отрицательного основания произвольная действительная степень может не определяться. При $a > 0$, $a \neq 1$, $u, v > 0$

$$\log_a(uv) = \log_a u + \log_a v, \quad \log_a \frac{u}{v} = \log_a u - \log_a v,$$
$$\log_a(u^r) = r \log_a u.$$


Например, если $s = \log_a u$, $t = \log_a v$, то $uv = a^s a^t = a^{s+t}$, поэтому логарифм произведения равен $s + t$. Для частного используется $u\,v^{-1}$, а для степени — $(a^s)^r = a^{sr}$. Равенство $\log_a(u+v) = \log_a u + \log_a v$ отсюда не следует и в общем случае неверно: при $a = 2, u = v = 1$ слева 1, справа 0.

Графики



Показательные, логарифмические и гиперболические функции

Гиперболические тангенс и котангенс



Горизонтальные пунктирные прямые — асимптоты $y = 1$ и $y = -1$. Функция $\operatorname{th} x$ определена на всей прямой; у $\operatorname{cth} x$ есть разрыв при $x = 0$.

Задачи

14.1. Построй $y = \dfrac{1}{x}$. Укажи область определения и область значений.

14.2. Построй $y = \sqrt{x}$. Укажи область определения и область значений.

14.3. Реши $x^3 = -27$.

14.4. Реши $2^x = 32$.

14.5. Реши $3^{x-1} = 9$.



14.6. Реши $(\dfrac{1}{2})^x > \dfrac{1}{8}$.

14.7. Вычисли $\log_2 8 + \log_3 1$.

14.8. Вычисли $\log_5(\dfrac{1}{25})$.

14.9. Реши $\log_2(x - 1) = 3$.

14.10. Найди область определения $y = \log_3(5 - x)$.

14.11. При $a > 0$ упрости $\log_2(8a) - \log_2 a$.

14.12. Сравни $2^{0{,}3}$ и $2^{0{,}7}$; затем $(\dfrac{1}{3})^{0{,}3}$ и $(\dfrac{1}{3})^{0{,}7}$.

14.13. В учебной модели стоимость оборудования каждый год уменьшается вдвое: $S(t) = 80000 \cdot (\dfrac{1}{2})^t$ рублей. Найди стоимость через 3 года.

14.14. Модель роста культуры: $N(t) = 500 \cdot 2^t$, где t — число часов. Через сколько часов станет 8000 клеток?

14.15. Для двоичного поиска в массиве из 2^k элементов используют модель из k шагов. Сколько шагов даёт эта модель для 1024 элементов?

14.16.* Реши $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$.

14.17.* Реши $\log_2(x-1) + \log_2(x+1) = 3$.

14.18.* Вклад в учебной модели ежегодно увеличивается на 10% без пополнений и снятий. Найди наименьшее целое число лет, через которое 10000 рублей станут не меньше 13310 рублей.

14.19.* Докажи, что для $a, b > 0$, $a \neq 1$, $b \neq 1$ выполнено $\log_a b \cdot \log_b a = 1$. Объясни, почему нужны ограничения $a \neq 1$ и $b \neq 1$.

14.20.* Докажи, что $\operatorname{ch} x \geq 1$ для всех действительных x. При каком x достигается равенство? Используй квадрат разности $e^{x/2} - e^{-x/2}$.

14.21. Вычисли $\exp 0$, $\ln 1$, $\ln(e^3)$, $\exp(\ln 5)$.

14.22. Реши уравнение $\ln(x-1) = 2$, начав с области допустимых значений.

14.23. Без десятичного приближения найди $\dfrac{\ln 8}{\ln 2}$ и $e^{2\ln 3 - \ln 9}$.

14.24. В учебной модели начальная сумма 1000 рублей увеличивается за год в $(1 + \dfrac{1}{n})^n$ раза. Найди сумму при $n = 2$ и $n = 4$, округлив до копеек. К какому значению приближаются суммы при неограниченном увеличении n? Используй $e \approx 2{,}718281828$.

14.25. Вычисли в точном виде $\operatorname{sh}(\ln 2)$ и $\operatorname{ch}(\ln 2)$. Проверь для этих значений основное гиперболическое тождество.

14.26.* Реши $\operatorname{sh} x = \dfrac{3}{4}$, сделав замену $t = e^x$. Укажи допустимые значения t.

14.27.* Реши $\operatorname{ch} x = \dfrac{5}{4}$, используя определения гиперболических функций.

14.28. Построй эскизы графиков $y = \operatorname{sh} x$ и $y = \operatorname{ch} x$ в одной системе координат. Используй точки с аргументами $-\ln 2$, 0, $\ln 2$; отметь чётность и положение графиков относительно оси абсцисс.

14.29. В модели цепи $y = 4(\operatorname{ch}\dfrac{x}{4} - 1)$ все длины даны в метрах. Найди высоту при $x = 4\ln 2$, а также высоту в симметричной точке.

14.30.* Докажи, что профиль $y = a(\operatorname{ch}\dfrac{x}{a} - 1)$, $a > 0$, достигает единственного минимума в нуле. Используй определения, без производной.

14.31. На гиперболе задана точка $(X, Y) = (\operatorname{ch} t, \operatorname{sh} t)$, где $t = \ln 3$. Найди координаты и проверь $X^2 - Y^2 = 1$.

14.32. Найди $\operatorname{th} 0$, $\operatorname{th}(\ln 2)$, $\operatorname{cth}(\ln 2)$.

14.33. Вычисли $\operatorname{th}(-\ln 3)$ и $\operatorname{cth}(-\ln 3)$.

14.34. Реши $\operatorname{th} x = \dfrac{1}{2}$ на действительной прямой.

14.35. Реши $\operatorname{cth} x = 2$, проверив область определения.



14.36. Какие из уравнений $\operatorname{th} x = 1$, $\operatorname{th} x = -\dfrac{3}{2}$, $\operatorname{cth} x = \dfrac{1}{2}$ имеют действительные решения?

14.37. Построй эскизы $y = \operatorname{th} x$ и $y = \operatorname{cth} x$. Отметь область определения, нечётность и горизонтальные асимптоты.

14.38. В заданной модели $s(t) = 2\operatorname{th} t$ найди момент $t \geq 0$, когда $s(t) = 1$, и объясни, достигается ли уровень 2.

14.39. Докажи $\operatorname{cth} x \operatorname{th} x = 1$. Укажи все допустимые x.

14.40.* Докажи формулу $\operatorname{th}(x + y) = \dfrac{\operatorname{th} x + \operatorname{th} y}{1 + \operatorname{th} x \operatorname{th} y}$. Почему знаменатель ненулевой?

14.41.* При $a > 0$ реши неравенство $|\operatorname{th} x| \leq \operatorname{th} a$.

ГЛАВА 15

Тригонометрия

Определение 15.1. Радиан (*radian*) — единица измерения угла. Угол в 1 радиан — центральный угол, которому соответствует дуга длины, равной радиусу окружности. Радианная мера центрального угла равна $\alpha = \frac{l}{r}$, где l — длина дуги, $r > 0$ — радиус. Полный оборот: 2π радиан, то есть 360°.

Положительные углы отсчитывают от точки $(1;0)$ единичной окружности против часовой стрелки, отрицательные — по часовой.

Определение 15.2. Косинус (*cosine*) $\cos\alpha$ — горизонтальная координата точки единичной окружности, полученной поворотом точки $(1;0)$ на угол α.

Определение 15.3. Синус (*sine*) $\sin\alpha$ — вертикальная координата точки единичной окружности, полученной поворотом точки $(1;0)$ на угол α.

Определение 15.4. Тангенс (*tangent*): $\operatorname{tg}\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ при $\cos\alpha \neq 0$.

Определение 15.5. Период функции (*period of a function*) — ненулевое число T, при сдвиге аргумента на которое область определения сохраняется и $f(x+T) = f(x)$.

Основные тождества и свойств

$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$. Значения синуса и косинуса лежат в $[-1;1]$.

$\sin(-\alpha) = -\sin\alpha; \cos(-\alpha) = \cos\alpha$.

$\sin(\pi - \alpha) = \sin\alpha; \cos(\pi - \alpha) = -\cos\alpha$.

Наименьший положительный период синуса и косинуса равен 2π. Для $\sin(kx)$ и $\cos(kx)$ при $k \neq 0$ он равен $\frac{2\pi}{|k|}$.



Прямоугольный треугольник

Для острого угла прямоугольного треугольника:

$$\sin\alpha = \frac{\text{противолежащий катет}}{\text{гипотенуза}},$$
$$\cos\alpha = \frac{\text{прилежащий катет}}{\text{гипотенуза}},$$
$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{\text{противолежащий катет}}{\text{прилежащий катет}}.$$

Значения, которые стоит знать

$\sin 0 = 0; \sin(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}; \sin(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}; \sin(\frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2}; \sin(\frac{\pi}{2}) = 1.$

$\cos 0 = 1; \cos(\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2}; \cos(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}; \cos(\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}; \cos(\frac{\pi}{2}) = 0.$

Пример: $60^\circ = \frac{\pi}{3}$ *радиан, потому что* $60 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{3}$.

Обратные тригонометрические функции

На всей числовой прямой синус и косинус принимают одни и те же значения много раз. Чтобы получить обратную функцию, нужно выбрать промежуток, на котором каждому значению соответствует ровно один аргумент.

Определение 15.6. Арксинус (arcsine) $\arcsin t$ — единственный угол $\alpha \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$, для которого $\sin\alpha = t$. Область определения: $t \in [-1; 1]$; область значений: $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$.

Определение 15.7. Арккосинус (arccosine) $\arccos t$ — единственный угол $\alpha \in [0; \pi]$, для которого $\cos\alpha = t$. Область определения: $t \in [-1; 1]$; область значений: $[0; \pi]$.

Определение 15.8. Арктангенс (arctangent) $\operatorname{arctg} t$ — единственный угол $\alpha \in (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$, для которого $\operatorname{tg}\alpha = t$. Область определения: $t \in \mathbb{R}$; область значений: $(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$.

Синус на $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ и тангенс на $(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$ строго возрастают, а косинус на $[0; \pi]$ строго убывает. Именно эти ограничения позволяют определить обратные функции. Их графики получают отражением соответствующих ограниченных графиков относительно $y = x$. По определениям $\sin(\arcsin t) = t$, $\cos(\arccos t) = t$ при $t \in [-1; 1]$, а $\operatorname{tg}(\operatorname{arctg} t) = t$ при всех действительных t. Обратный порядок требует ограничения аргумента: $\arcsin(\sin x) = x$ только при $x \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$; $\arccos(\cos x) = x$ только при $x \in [0; \pi]$; $\operatorname{arctg}(\operatorname{tg} x) = x$ только при $x \in (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$. Вне этих промежутков результат нужно привести к области значений обратной функции. В частности, $\arcsin(\sin\frac{5\pi}{6}) = \arcsin\frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$, а не $\frac{5\pi}{6}$. При $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, сама запись $\operatorname{arctg}(\operatorname{tg} x)$ не определена.

Теорема 15.1 (Связь арксинуса и арккосинуса). *Для любого* $t \in [-1; 1]$ *выполнено* $\arcsin t + \arccos t = \frac{\pi}{2}$.

Доказательство. Пусть $\alpha = \arcsin t$; тогда $\alpha \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ и $\sin\alpha = t$. Угол $\beta = \frac{\pi}{2} - \alpha$ принадлежит $[0; \pi]$, а $\cos\beta = \sin\alpha = t$. По единственности угла в определении арккосинуса $\beta = \arccos t$, откуда следует нужное равенство. ■



В некоторых источниках обозначения $\sin^{-1} t$, $\cos^{-1} t$, $\operatorname{tg}^{-1} t$ означают обратные функции. Чтобы не путать их с обратными числами $\frac{1}{\sin t}$, $\frac{1}{\cos t}$, $\frac{1}{\operatorname{tg} t}$, здесь используем только записи arcsin, arccos, arctg.

Котангенс и формулы сложения

Определение 15.9. Котангенс (*cotangent*) — функция $\operatorname{ctg} x = \frac{\cos x}{\sin x}$, определённая при $x \neq \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. В англоязычной литературе обычно пишут $\cot x$.



Котангенс удобно рассматривать по отдельным промежуткам между соседними точками πk. На каждом таком промежутке имеется одна непрерывная ветвь. Сдвиг на π меняет знаки и синуса, и косинуса, поэтому их отношение сохраняется. В прямоугольном треугольнике котангенс острого угла равен отношению прилежащего катета к противолежащему. Запись $\operatorname{ctg} x = \frac{1}{\operatorname{tg} x}$ допустима только тогда, когда оба выражения определены: например, при $x = \frac{\pi}{2}$ котангенс равен нулю, а тангенс вообще не определён.

Теорема 15.2 (Основные свойства котангенса). *Функция* ctg *нечётна и имеет период* π. *Её нули равны* $\frac{\pi}{2} + \pi k$. *При* $\sin x \neq 0$ *выполнено* $1 + \operatorname{ctg}^2 x = \frac{1}{\sin^2 x}$. *На* $(0; \pi)$ *функция строго убывает.*

Доказательство. Первые свойства следуют из знаков, периодичности и нулей синуса и косинуса; тождество получается делением $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ на $\sin^2 x$. Для $0 < x < y < \pi$ имеем

$$\operatorname{ctg} x - \operatorname{ctg} y = \frac{\sin(y - x)}{\sin x \sin y} > 0.$$

Здесь использована формула синуса разности, доказанная ниже; все три синуса положительны. ■

Теорема 15.3 (Формулы сложения и двойного угла). *Для любых действительных* x, y

$$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y,$$
$$\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y.$$

Замена y *на* $-y$ *даёт формулы разности; при* $y = x$ *получаем* $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$, $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$.



Доказательство. При повороте плоскости вокруг нуля на угол x вектор $(1,0)$ переходит в $(\cos x, \sin x)$, а перпендикулярный ему вектор $(0,1)$ — в $(-\sin x, \cos x)$. Поворот сохраняет сложение векторов и умножение на действительное число: это видно по повороту параллелограмма и направленных отрезков на одной прямой. Поэтому образ $(\cos y, \sin y)$ равен

$$(\cos x \cos y - \sin x \sin y,\ \ \sin x \cos y + \cos x \sin y).$$


Но последовательные повороты на y и x дают поворот на $x+y$. Сравнение координат доказывает обе формулы. Нечётность синуса и чётность косинуса дают разность; подстановка $y = x$ — двойной угол. ■

Теорема 15.4 (Сложение тангенсов). *Если* $\cos x \neq 0$, $\cos y \neq 0$, $\cos(x+y) \neq 0$, *то*

$$\operatorname{tg}(x+y) = \frac{\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} y}{1 - \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y}.$$


Доказательство. Разделим формулы сложения синуса и косинуса друг на друга, а затем числитель и знаменатель на $\cos x \cos y$. Последний знаменатель равен $\frac{\cos(x+y)}{\cos x \cos y} \neq 0$. ■

Графики




Тригонометрические и обратные функции

Тангенс на большом промежутке



Пунктиром отмечены прямые $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, где тангенс не определён. Соседние ветви повторяются с периодом π; через разрывы график не соединяется.

Котангенс на большом промежутке



Пунктирные прямые $x = \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, не входят в область определения. Каждая ветвь строго убывает; период равен π.

Задачи

15.1. Переведи $30°, 90°$ и $150°$ в радианы.

15.2. Переведи $\frac{\pi}{4}$ и $\frac{7\pi}{6}$ в градусы.

15.3. Вычисли $\sin(\frac{\pi}{6}), \cos(\frac{\pi}{3}), \operatorname{tg}(\frac{\pi}{4})$.

15.4. Определи знаки sin и cos для угла $\frac{5\pi}{6}$.

15.5. Найди $\sin(-\frac{\pi}{6})$ и $\cos(-\frac{\pi}{3})$.



15.6. Упрости $\sin^2 x + \cos^2 x + 2$.

15.7. Если $\sin x = \frac{3}{5}$ и $0 < x < \frac{\pi}{2}$, найди $\cos x$ и $\operatorname{tg} x$.

15.8. Найди $\sin(\pi - x)$ и $\cos(\pi - x)$ через функции x.

15.9. Реши $\sin x = 0$ при $x \in [0; 2\pi]$.

15.10. Реши $\cos x = \frac{1}{2}$ при $x \in [0; 2\pi]$.

15.11. Построй $y = \sin x$ на $[0; 2\pi]$. Укажи нули, максимум и минимум.

15.12. Найди наименьший положительный период $y = \sin(2x)$.

15.13. Солнечный луч образует с землёй угол $45°$. Тень вертикального столба равна 6 м. Найди высоту столба.


15.14. Лестница длиной 10 м образует с горизонтальной землёй угол $30°$. На какой высоте находится её верх?

15.15. Колесо обозрения радиусом 10 м имеет центр на высоте 12 м. Высота кабинки $h = 12 + 10\sin\alpha$. Найди высоту при $\alpha = 0, \frac{\pi}{2}$ и $\frac{3\pi}{2}$.

15.16.* Реши $2\sin^2 x - 3\sin x + 1 = 0$ при $x \in [0; 2\pi]$.

15.17.* Луч образует с землёй угол $30°$. Длина тени вертикального дерева 12 м. Найди высоту дерева в точном виде.

15.18.* Высота кабинки задана $h(t) = 15 - 12\cos(\frac{\pi t}{20})$ метров, где t — секунды от начала движения. Найди минимальную и максимальную высоты и время первого достижения максимума при $t \geq 0$.



15.19.* Докажи нечётность арксинуса: $\arcsin(-t) = -\arcsin t$ для $t \in [-1;1]$. В доказательстве проверь область значений угла, а не только равенство синусов.

15.20.* Докажи тождество $\arccos(-t) = \pi - \arccos t$ при $t \in [-1;1]$.

15.21. Вычисли $\arcsin 0$, $\arcsin \frac{1}{2}$, $\arcsin(-\frac{\sqrt{3}}{2})$.

15.22. Вычисли $\arccos(-\frac{1}{2})$, $\arccos 1$, $\arccos 0$.

15.23. Вычисли $\operatorname{arctg}(-1)$, $\operatorname{arctg}\sqrt{3}$, $\operatorname{arctg} 0$.

15.24.* Вычисли $\arcsin(\sin\frac{5\pi}{6})$, $\arccos(\cos\frac{5\pi}{3})$, $\operatorname{arctg}(\operatorname{tg}\frac{3\pi}{4})$. Для каждого ответа проверь диапазон обратной функции.

15.25. Найди $\cos(\arcsin\frac{3}{5})$ и $\sin(\arccos(-\frac{3}{5}))$. Обоснуй выбор знака квадратного корня.

15.26. Реши $\arcsin(2x-1) = \frac{\pi}{6}$. Сначала найди область допустимых значений.

15.27. Реши $\operatorname{arctg}(x-2) = -\frac{\pi}{4}$.

15.28. Построй эскиз $y = \operatorname{arctg} x$, отметив точки с аргументами -1, 0, 1. Укажи область определения, область значений и чётность. Может ли значение функции быть равным $\frac{\pi}{2}$?

15.29. Найди $\operatorname{ctg}\frac{\pi}{6}$, $\operatorname{ctg}\frac{\pi}{4}$, $\operatorname{ctg}\frac{\pi}{3}$, $\operatorname{ctg}\frac{\pi}{2}$.

15.30. Укажи область определения и нули $f(x) = \operatorname{ctg}(2x)$.

15.31. Реши $\operatorname{ctg} x = \sqrt{3}$.



15.32. В прямоугольном треугольнике катет, прилежащий к острому углу α, равен 6 см, противолежащий — 8 см. Найди $\operatorname{ctg}\alpha$ и гипотенузу.

15.33. Построй графики $y = \operatorname{ctg} x$ и $y = \operatorname{ctg}(x - \frac{\pi}{4})$ на нескольких периодах.

15.34. Докажи $\operatorname{tg} x \operatorname{ctg} x = 1$. Почему равенство нельзя подставлять при $x = \frac{\pi}{2}$?

15.35.* Вычисли точно $\sin\frac{5\pi}{12}$ и $\cos\frac{5\pi}{12}$, используя $\frac{5\pi}{12} = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}$.

15.36.* Докажи $\operatorname{ctg}(x+y) = \dfrac{\operatorname{ctg} x \operatorname{ctg} y - 1}{\operatorname{ctg} x + \operatorname{ctg} y}$, явно указав условия.

ГЛАВА 16

Множества, логика и доказательства

Определение 16.1. Множество (*set*) — совокупность элементов. Запись $x \in A$ означает, что x принадлежит множеству A.

Определение 16.2. Пересечение (*intersection*) $A \cap B$ — множество элементов, принадлежащих одновременно A и B.

Определение 16.3. Объединение (*union*) $A \cup B$ — множество элементов, принадлежащих хотя бы одному из множеств A и B.

Определение 16.4. Утверждение (*statement; proposition*) — высказывание, для которого можно определить истинность или ложность в заданных условиях.

Определение 16.5. Импликация (*implication*) $P \Rightarrow Q$ — высказывание «если P, то Q».

Определение 16.6. Достаточное условие (*sufficient condition*) для Q — условие P, из которого следует Q, то есть импликация $P \Rightarrow Q$ истинна.

Определение 16.7. Необходимое условие (*necessary condition*) для P — условие Q, которое обязательно выполняется при выполнении P, то есть импликация $P \Rightarrow Q$ истинна.

Кванторы и отрицание

$\forall$ означает «для любого», $\exists$ — «существует». $\mathbb{Z}$ обозначает целые числа, $\mathbb{R}$ — действительные.

Отрицание «для всех x верно $P(x)$» — «существует x, для которого $P(x)$ неверно».

Чтобы опровергнуть всеобщее утверждение, достаточно одного контрпримера. Чтобы доказать его, проверки нескольких примеров недостаточно.



Свойства и способы доказательства

Для конечных множеств: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$. Здесь $|A|$ означает число элементов множества, а не модуль числа.

Определение 16.8. Контрапозиция (*contrapositive*) импликации $P \Rightarrow Q$ — импликация $\neg Q \Rightarrow \neg P$, равносильная исходной:

$$(P \Rightarrow Q) \iff (\neg Q \Rightarrow \neg P).$$

Здесь $\neg$ означает отрицание.

Обратное утверждение $Q \Rightarrow P$ в общем случае из $P \Rightarrow Q$ не следует.

Принцип математической индукции: проверь утверждение для $n = 1$; затем для любого $k \geq 1$ докажи переход от его истинности при $n = k$ к истинности при $n = k + 1$. Тогда оно верно для всех натуральных $n \geq 1$.

Пример прямого доказательства: сумма чётных чисел $2m$ и $2n$ равна $2(m + n)$, поэтому она чётна.

Подмножества и операции над множествами

Определение 16.9. Подмножество (subset) A множества B — множество, каждый элемент которого принадлежит B. Обозначение $A \subseteq B$ допускает равенство $A = B$.

Определение 16.10. Собственное подмножество (proper subset) — подмножество $A \subseteq B$, не равное B. Обозначение: $A \subset B$. Здесь знак $\subset$ всегда означает строгое включение; в литературе соглашения об этом знаке различаются.

Определение 16.11. Пустое множество (empty set) $\emptyset$ — множество, не содержащее ни одного элемента. Оно является подмножеством любого множества; $\{\emptyset\}$ содержит один элемент и не равно $\emptyset$.

Определение 16.12. Универсальное множество (universal set) U — заранее выбранное множество всех объектов, рассматриваемых в данной задаче. Если говорится о дополнениях, все обсуждаемые множества считаются подмножествами U.

Определение 16.13. Разность множеств (set difference) $A \setminus B$ — множество элементов, которые принадлежат A, но не принадлежат B.

Определение 16.14. Дополнение множества (complement) $A \subseteq U$ относительно U — множество $U \setminus A$. Без указания U дополнение может быть неоднозначным.

Определение 16.15. Симметрическая разность (symmetric difference) $A \triangle B$ — множество элементов, принадлежащих ровно одному из множеств A, B: $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

Определение 16.16. Множество всех подмножеств (power set) множества A — множество $\mathcal{P}(A) = \{B : B \subseteq A\}$. Например, $\mathcal{P}(\{a\}) = \{\emptyset, \{a\}\}$.

Определение 16.17. Упорядоченная пара (ordered pair) (a, b) — пара с выделенными первой и второй координатами: $(a, b) = (c, d)$ тогда и только тогда, когда $a = c$ и $b = d$.

Определение 16.18. Декартово произведение (Cartesian product) $A \times B$ — множество всех упорядоченных пар (a, b), где $a \in A$, $b \in B$. Например, $\{1, 2\} \times \{3\} = \{(1, 3), (2, 3)\}$.

Определение 16.19. Диаграмма Венна (Venn diagram) — рисунок, на котором универсальное множество изображают областью, обычно прямоугольником, а его подмножества — областями внутри неё. Закрашивание выделяет элементы, удовлетворяющие нужному условию. Диаграмма помогает понять равенство множеств, но общее доказательство удобно проводить через принадлежность произвольного элемента.

Теорема 16.1 (Законы де Моргана). *Если* $A, B \subseteq U$, *то* $U \setminus (A \cup B) = (U \setminus A) \cap (U \setminus B)$ *и* $U \setminus (A \cap B) = (U \setminus A) \cup (U \setminus B)$.

Доказательство. Возьмём произвольный $x \in U$. Условие $x \notin A \cup B$ означает, что $x \notin A$ и $x \notin B$, то есть $x \in (U \setminus A) \cap (U \setminus B)$. Все переходы обратимы, поэтому доказано первое равенство. Условие $x \notin A \cap B$ означает, что хотя бы одно из условий $x \in A$, $x \in B$ не выполнено. Это равносильно $x \notin A$ или $x \notin B$, то есть $x \in (U \setminus A) \cup (U \setminus B)$. Обратимость переходов даёт второе равенство. ■

Теорема 16.2 (Число подмножеств). *Если конечное множество* A *содержит* n *элементов, где* $n \geq 0$ *— целое число, то* $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.



Доказательство. Проведём индукцию по n. При $n = 0$ множество A пусто и имеет ровно одно подмножество — $\emptyset$; это $1 = 2^0$. Пусть у множества из k элементов 2^k подмножеств. При добавлении нового элемента каждое старое подмножество даёт два различных варианта: без нового элемента и с ним. Эти варианты исчерпывают все подмножества нового множества, поэтому их число равно $2 \cdot 2^k = 2^{k+1}$. ■

Логические связки и формулы

Дальше изучаем двухзначную логику высказываний: каждое высказывание при заданных условиях имеет одно из двух истинностных значений. Обозначим истину числом 1, ложь числом 0. Это логические значения; арифметические действия с ними здесь не подразумеваются.

Определение 16.20. Пропозициональная переменная (*propositional variable*) — буква, обозначающая высказывание. Для переменных используем $p, q, r, \ldots$, а для произвольных формул — $A, B, C, \ldots$.

Определение 16.21. Логическая связка (*logical connective*) — операция, которая определяет истинностное значение составного высказывания по истинностным значениям его частей.

Определение 16.22. Константа истины (*truth constant*) $\top$ имеет значение 1 при любых значениях переменных.

Определение 16.23. Константа лжи (*falsity constant*) $\bot$ имеет значение 0 при любых значениях переменных.

Определение 16.24. Отрицание (*negation; NOT*) $\neg A$ истинно ровно тогда, когда A ложно.

Определение 16.25. Конъюнкция (*conjunction; AND*) $A \wedge B$ истинна ровно тогда, когда истинны обе части: и A, и B.

Определение 16.26. Дизъюнкция (*disjunction; OR*) $A \vee B$ истинна, когда истинна хотя бы одна из частей, в том числе когда истинны обе.

Определение 16.27. Исключающее или (*exclusive OR; XOR*) $A \oplus B$ истинно, когда истинна ровно одна из частей.

Определение 16.28. Материальная импликация (*material implication*) $A \to B$ ложна только в случае, когда A истинно, а B ложно. Во всех остальных случаях она истинна.

Для импликации внутри формул этого раздела используем $\to$; ранее в записях «если P, то Q» использовалось обозначение $\Rightarrow$. Истинность импликации сама по себе не утверждает причинной связи. Если условие A ложно, импликация $A \to B$ истинна при любом значении B; это не означает, что B истинно.

Определение 16.29. Бикондиционал (*biconditional; if and only if, iff*) $A \leftrightarrow B$ истинен ровно тогда, когда A и B имеют одинаковые истинностные значения. Его читают «A тогда и только тогда, когда B».

Определение 16.30. Штрих Шеффера (*Sheffer stroke; NAND*) $A \uparrow B$ — отрицание конъюнкции: $\neg(A \wedge B)$.

Определение 16.31. Стрелка Пирса (*Peirce arrow; NOR*) $A \downarrow B$ — отрицание дизъюнкции: $\neg(A \vee B)$.

Определение 16.32. Пропозициональная формула (*propositional formula*) — конечная запись, построенная по следующим правилам. Каждая переменная, а также $\top, \bot$ — формулы. Если A, B — формулы, то $\neg A$ и $(A \circ B)$ — формулы для любой из связок $\circ \in \{\wedge, \vee, \oplus, \to, \leftrightarrow, \uparrow, \downarrow\}$. Других способов построения формул нет.

Скобки указывают порядок применения связок. Внешние скобки можно опускать; $\neg$ относится к ближайшей следующей формуле. При возможной неоднозначности скобки сохраняем: $\neg(p \vee q)$ и $(\neg p) \vee q$ — разные формулы.

Определение 16.33. Оценка истинности (*truth assignment; valuation*) v приписывает каждой переменной значение 0 или 1. Значение $v(A)$ составной формулы получают из значений её частей по определениям связок. Запись $v \models A$ означает $v(A) = 1$.

Определение 16.34. Таблица истинности (*truth table*) — таблица, которая перечисляет все наборы значений входных переменных и соответствующие значения формул. Для n различных переменных существует 2^n строк с входными наборами.

A	$\neg A$
0	1
1	0

Следующая таблица задаёт все семь бинарных связок. В первых двух колонках находятся входные значения, в остальных — результаты операций.

A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \oplus B$	$A \to B$	$A \leftrightarrow B$	$A \uparrow B$	$A \downarrow B$
0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	1	1	0	0



Логический переключатель хранит только одно из двух состояний. Даже когда буквы обозначают сложные события, связка видит лишь их истинностные значения. Поэтому одна таблица подходит и для математических утверждений, и для условий доступа, и для модели электрической схемы. При переводе обычной фразы сначала выясни смысл слова «или»: допускаются оба события или требуется ровно одно. Затем назначь буквы простым утверждениям и расставь скобки. Полученная формула позволяет проверять конкретные ситуации, но её соответствие исходной фразе всё равно нужно обосновать словами.

Равносильность и семантическое следование

Определение 16.35. Тавтология (*tautology*) — формула, истинная при каждой оценке её переменных. Например, $p \vee \neg p$.

Определение 16.36. Противоречие (*contradiction*) — формула, ложная при каждой оценке её переменных. Например, $p \wedge \neg p$.

Формула может не быть ни тавтологией, ни противоречием: $p \wedge q$ принимает оба истинностных значения при разных оценках.

Определение 16.37. Логическая равносильность (*logical equivalence*) формул A, B означает, что $v(A) = v(B)$ при каждой оценке v. В этом разделе обозначаем её $A \equiv B$.

Запись $A \leftrightarrow B$ является формулой, которой можно приписать значение при одной оценке. Запись $A \equiv B$ — утверждение о двух формулах и *всех* оценках. Например, при $v(p) = v(q) = 1$ бикондиционал $p \leftrightarrow q$ истинен, но $p \not\equiv q$: оценка $v(p) = 1, v(q) = 0$ различает их.

Теорема 16.3 (Основные логические равносильности). *Для любых формул A, B справедливы*

$$\begin{aligned} \neg\neg A &\equiv A, \\ \neg(A \wedge B) &\equiv (\neg A) \vee (\neg B), \\ \neg(A \vee B) &\equiv (\neg A) \wedge (\neg B), \\ A \to B &\equiv (\neg A) \vee B, \\ A \leftrightarrow B &\equiv (A \to B) \wedge (B \to A). \end{aligned}$$

Вторую и третью равносильности называют законами де Моргана для высказываний.

Доказательство. Двойное отрицание дважды меняет значение и возвращает исходное. Отрицание конъюнкции истинно, когда хотя бы одна часть ложна; отрицание дизъюнкции — когда ложны обе. Формулы $A \to B$ и $(\neg A) \vee B$ обе ложны только при значениях $A = 1, B = 0$. Две встречные импликации одновременно истинны ровно при одинаковых значениях частей. Все рассуждения применимы к каждой оценке, что и доказывает равносильности. ■

Теорема 16.4 (Законы исключающего или). *Для любых формул* A, B, C

$$\begin{aligned} A \oplus B &\equiv (A \vee B) \wedge \neg(A \wedge B), \\ A \oplus B &\equiv B \oplus A, \\ (A \oplus B) \oplus C &\equiv A \oplus (B \oplus C), \\ A \oplus A &\equiv \bot, \qquad A \oplus \bot \equiv A, \\ A \oplus \top &\equiv \neg A. \end{aligned}$$

Доказательство. В первой строке требуется хотя бы одна истинная часть и запрещены две истинные части: остаётся ровно одна. Перестановка частей этого условия не меняет. Для трёх частей обе расстановки скобок дают 1, когда истинна ровно одна из трёх частей или все три, и дают 0 в остальных случаях. Наконец, две одинаковые части не могут иметь разные значения, сравнение с 0 сохраняет значение, а сравнение с 1 меняет его. Это доказывает все строки. ■

Определение 16.38. Семантическое следование (*semantic entailment*) $\Gamma \models A$, где Γ — конечное множество формул, означает: при каждой оценке, делающей истинными *все* формулы из Γ, формула A тоже истинна.

Формулы из Γ называют посылками (*premises*), а A — заключением (*conclusion*). Запись $v \models \Gamma$ сокращает условие $v(B) = 1$ для всех $B \in \Gamma$. Для пустого множества посылок пишут $\models A$; это означает, что A — тавтология. По определению $A \equiv B$ равносильно тому, что $\models (A \leftrightarrow B)$.

Чтобы опровергнуть следование, достаточно контроценки (*countervaluation; countermodel*) — оценки, при которой все посылки истинны, а заключение ложно. Например, $\{p \vee q\} \not\models p$: подойдут $v(p) = 0, v(q) = 1$. Если ни одна оценка не делает все посылки истинными, условие $\Gamma \models A$ выполнено для любой формулы A: оценки с истинными посылками и ложным заключением нет.

Секвенции и конечные деревья вывода

Определение 16.39. Секвенция (*sequent*) — запись вида $\Gamma \vdash A$, где слева находится конечное множество формул-посылок, а справа одна формула-заключение. Такая запись задаёт цель: получить A из посылок Γ по выбранным правилам вывода.

Пишем Γ, A вместо $\Gamma \cup \{A\}$; порядок посылок и их повторения здесь не имеют значения. Если посылок нет, $\emptyset \vdash A$ сокращаем до $\vdash A$. Секвенцию можно

предложить как цель; доказанной она становится после построения допустимого вывода.

Определение 16.40. Конечное дерево доказательства (*finite proof tree; derivation tree*) — конечное дерево с секвенциями в вершинах. В листьях стоят разрешённые начальные секвенции, а каждый переход от верхних вершин к нижней является применением одного из объявленных правил. Нижняя вершина, или корень, содержит доказываемую секвенцию.

Определение 16.41. Выводимость (*derivability*) A из Γ означает существование такого конечного дерева с корнем $\Gamma \vdash A$. Когда утверждаем выводимость, запись $\Gamma \vdash A$ означает именно существование дерева, а не результат проверки таблицы истинности.



Дерево вывода удобно читать от цели к основаниям. Нижняя строка показывает, что требуется получить, а правило подсказывает, какие более простые выводы нужно построить выше. При проверке движутся в обратную сторону: начинают с разрешённых предположений и проверяют каждый переход вниз. Временные предположения требуют отдельного внимания. Они помогают построить ветвь рассуждения, но их нельзя незаметно оставить среди безусловных фактов. Снятие предположения видно в изменении левой части секвенции; после этого заключение выражает, что удалось установить при данном условии.

Выбранные правила натурального вывода

Натуральный вывод (*natural deduction*) — способ строить доказательства введением и устранением логических связок. Здесь $\vdash$ относится к следующему явно выбранному учебному набору правил для $\wedge, \vee, \to$. В схемах A, B, C могут быть любыми формулами, а Γ — любым конечным множеством посылок. Доказательства табличных равносильностей выше являются семантическими.

Правило предположения (*assumption rule*, Ax):

$$\frac{}{\Gamma \vdash A}\ (\text{Ax}), \qquad A \in \Gamma.$$

Любая объявленная посылка доступна без дополнительных шагов. Это начальная секвенция — лист дерева.

Введение конъюнкции (*conjunction introduction*, $\wedge I$):

$$\frac{\Gamma \vdash A \qquad \Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \wedge B}\ (\wedge I).$$

Устранение конъюнкции (*conjunction elimination*):

$$\frac{\Gamma \vdash A \wedge B}{\Gamma \vdash A}\ (\wedge E_1), \qquad \frac{\Gamma \vdash A \wedge B}{\Gamma \vdash B}\ (\wedge E_2).$$

Устранение импликации (*implication elimination; modus ponens*):

$$\frac{\Gamma \vdash A \to B \qquad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B}\ (\to E).$$

Для этого правила нужны и импликация, и её условие; одного заключения B недостаточно, чтобы восстановить A.

Введение импликации (*implication introduction*):

$$\frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash A \to B}\ (\to I).$$

На верхнем этапе A добавлено как временное предположение. Внизу получена условная формула $A \to B$, и добавленное предположение снято (*discharged*). Исходные посылки из Γ сохраняются; если A уже входило в Γ, оно остаётся исходной посылкой и после этого шага. Использовать временное предположение в верхней ветви необязательно.

Введение дизъюнкции (*disjunction introduction*):

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash A \vee B}\ (\vee I_1), \qquad \frac{\Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \vee B}\ (\vee I_2).$$

Устранение дизъюнкции (*disjunction elimination; proof by cases*):

$$\frac{\Gamma \vdash A \vee B \qquad \Gamma, A \vdash C \qquad \Gamma, B \vdash C}{\Gamma \vdash C}\ (\vee E).$$

Нужно получить одно и то же C в обоих случаях. Добавленное A снимают в первой ветви, добавленное B — во второй; исходные посылки Γ остаются.

Теорема 16.5 (Выбранные правила сохраняют истину). *Если $\Gamma \vdash A$ имеет вывод по перечисленным правилам, то $\Gamma \models A$.*

Доказательство. Проведём индукцию по высоте конечного дерева. В листе правило Ax выбирает одну из посылок, поэтому она истинна при каждой оценке, делающей истинным всё Γ. Предположим, что утверждение уже верно для верхних поддеревьев.

Введение и устранение конъюнкции сохраняют истину по определению «и». Введение дизъюнкции сохраняет истину по определению «или». Для

modus ponens истинность A и $A \to B$ исключает единственный ложный случай импликации, поэтому B истинно.

При введении импликации возьмём оценку с истинными исходными посылками Γ. Если A ложно, $A \to B$ истинно. Если A истинно, верхнее поддерево с посылками Γ, A по индукционному предположению даёт истинность B, и импликация снова истинна.

При разборе случаев истинная дизъюнкция делает истинной хотя бы одну из частей. Соответствующее верхнее поддерево с добавленным A или B даёт истинность C. Таким образом, каждый допустимый последний шаг сохраняет истину, и индукция завершена. ■

Следование $\models$ говорит обо всех оценках, выводимость $\vdash$ — о существовании конечного дерева в выбранной системе правил. Теорема устанавливает переход от построенного вывода к семантическому следованию. Таблица истинности подтверждает семантическое утверждение; чтобы предъявить формальный вывод, нужно указать дерево или последовательность шагов с их правилами.

Теорема 16.6 (Перестановка двух условий)**.** *В выбранной системе выводима формула*

$$\vdash (p \wedge q) \to (q \wedge p).$$

Доказательство. Временно предположим $p \wedge q$ и обозначим $\Delta = \{p \wedge q\}$. Правило предположения даёт $\Delta \vdash p \wedge q$. Устранение конъюнкции даёт отдельно q и p; введение конъюнкции соединяет их в обратном порядке:

$$\dfrac{\dfrac{\Delta \vdash p \wedge q}{\Delta \vdash q}\,(\wedge E_2) \qquad \dfrac{\Delta \vdash p \wedge q}{\Delta \vdash p}\,(\wedge E_1)}{\Delta \vdash q \wedge p}\,(\wedge I).$$

Две верхние секвенции — листья Ax с одной и той же посылкой. Теперь снимаем временное предположение введением импликации:

$$\dfrac{\{p \wedge q\} \vdash q \wedge p}{\emptyset \vdash (p \wedge q) \to (q \wedge p)}\,(\to I).$$

После этого открытых посылок не осталось. Каждый шаг указан явно; по предыдущей теореме полученная формула является также тавтологией. ■

Задачи

16.1. При $A = \{1, 2, 3\}$ и $B = \{3, 4\}$ найди $A \cap B$ и $A \cup B$.

16.2. Запиши символами: для любого действительного x число x^2 неотрицательно.

16.3. Переведи: $\exists x \in \mathbb{Z} : x^2 = 9$. Верно ли это?

16.4. Верно ли: для любого действительного x выполнено $x^2 > 0$?

16.5. Запиши отрицание фразы «все числа в наборе положительны».



16.6. Верна ли импликация: если число делится на 4, то оно чётное? Верно ли обратное?

16.7. Для делимости на 6 чётность — необходимое или достаточное условие?

16.8. Докажи, что сумма двух чётных целых чисел чётна.

16.9. Докажи, что квадрат нечётного целого числа нечётный.

16.10. Опровергни: если $a^2 = b^2$, то $a = b$ для любых действительных a, b.

16.11. Докажи по индукции: $1 + 2 + \ldots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$ для натуральных $n \geq 1$.


16.12. Докажи: если целое n нечётно, то n^2 нечётно. Сформулируй равносильное утверждение через противоположное условие.

16.13. В кафе все комплексные обеды включают напиток. Покупатель получил напиток. Обязательно ли он заказал комплексный обед?

16.14. В группе 20 человек. Чай любят 12, кофе любят 9, оба напитка любят 5. Сколько любят хотя бы один из напитков и сколько не любят ни один?

16.15. Объявление гласит: «Все автобусы на этом маршруте низкопольные». Какое наблюдение опровергнет утверждение? Сформулируй его отрицание.

16.16.* Из 30 учеников 18 изучают английский, 16 немецкий, каждый изучает хотя бы один из этих языков. Сколько изучают оба и сколько только английский?



16.17.* Докажи: если квадрат целого числа делится на 3, то само число делится на 3.

16.18.* Докажи по индукции: $1 + 3 + 5 + \ldots + (2n - 1) = n^2$ для $n \geq 1$.

16.19.* Для $A, B \subseteq U$ докажи равенство $A \setminus B = A \cap (U \setminus B)$ через принадлежность произвольного элемента.

16.20.* Докажи распределительный закон $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ через принадлежность элемента. Объясни, что нужно закрасить на диаграмме Венна для каждой стороны.

16.21. Пусть $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, $C = \{2, 4\}$. Определи истинность записей $A \subseteq B$, $A \subset B$, $C \subseteq B$, $\emptyset \subseteq A$.

16.22. Выпиши все элементы $\mathcal{P}(\{a, b\})$, где $a \neq b$. Сколько подмножеств имеет множество из четырёх элементов?

16.23. Даны $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $A = \{2, 4, 6, 8\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$. Найди $A \setminus B$, $B \setminus A$, $A \triangle B$, $U \setminus A$, $U \setminus B$.

16.24. При $A = \{1, 2\}$, $B = \{3\}$ выпиши $A \times B$ и $B \times A$. Равны ли эти множества? Сколько элементов в каждом?

16.25. В группе пять человек: Аня, Боря, Вера, Глеб и Даша. Английским занимаются Аня, Вера и Даша, музыкой — Боря и Вера. Кто посещает ровно одно из двух занятий? Кто не посещает ни одно? Запиши ответы как симметрическую разность и дополнение объединения.

16.26.* Команду выбирают из шести человек: Ани, Бори, Веры, Глеба, Даши и Егора. Аня и Боря обязательно входят в команду, Вера не входит, а остальных можно включать или не включать. Сколько разных команд возможно? Объясни связь с множеством всех подмножеств.



16.27. При $v(p) = 1, v(q) = 0, v(r) = 1$ вычисли значения $(p \vee q) \wedge \neg r$, $(p \uparrow q) \to r$ и $(p \oplus r) \downarrow q$.

16.28. Построй таблицу истинности формулы $(p \to q) \leftrightarrow (\neg q \to \neg p)$. Является ли она тавтологией?

16.29. Для каждой формулы $p \vee \neg p$, $p \wedge \neg p$, $p \oplus q$ определи: тавтология, противоречие или ни то ни другое. Для последнего случая предъяви оценки с разными результатами.

16.30. Запиши формулу $(p \to q) \wedge (q \to p)$, используя только $\neg, \wedge, \vee$. Объясни её связь с $p \leftrightarrow q$.

16.31. Проверь два семантических следования: $\{p \vee q\} \models p$ и $\{p \wedge q\} \models p \vee r$. Неверное опровергни контроценкой, верное обоснуй для произвольной оценки с истинной посылкой.

16.32. Преобразуй отрицание $\neg((p \vee q) \wedge r)$ в равносильную формулу, где отрицания стоят только перед переменными. Обоснуй каждое применение закона де Моргана.

16.33. В упрощённой модели дверь открыта тогда и только тогда, когда действителен пропуск p, введён верный PIN-код q и не включена аварийная блокировка r. Обозначь открытое состояние через o, запиши правило формулой и найди o при тройках $(p, q, r) = (1, 1, 0), (1, 0, 0), (1, 1, 1)$. Доказывает ли закрытая дверь, что блокировка включена?

16.34. Лампа горит ровно тогда, когда два переключателя находятся в разных положениях. Их положения обозначены p, q, состояние лампы — l. Запиши правило. Докажи по двум возможным случаям, что изменение положения ровно одного переключателя всегда меняет состояние лампы.

16.35. Построй формальный вывод $\Gamma \vdash q \wedge r$, где $\Gamma = \{p \wedge q, p \to r\}$. Укажи правило каждого шага.

16.36. Докажи формально $\vdash p \to (q \to p)$. Объясни, какие предположения снимаются и почему предположение q можно снять, даже если оно не понадобилось.

16.37. При $\Gamma = \{p \to q, q \to r\}$ выведи $\Gamma \vdash p \to r$. Временно добавь p и укажи оба применения modus ponens.

16.38.* При $\Gamma = \{p \vee q, p \to r, q \to r\}$ построй вывод $\Gamma \vdash r$ разбором случаев. Почему нельзя просто выбрать одну часть дизъюнкции?

16.39.* Построй формальный вывод $\vdash (p \wedge (q \vee r)) \to ((p \wedge q) \vee (p \wedge r))$. Используй устранение конъюнкции, разбор случаев и снятие временных предположений.

16.40. Ученик предлагает вывод: «Даны $p \to q$ и q; значит, по modus ponens получаем p». Найди ошибку и с помощью контроценки и теоремы о сохранении истины докажи, что $\{p \to q, q\} \vdash p$ вообще не имеет вывода по выбранным правилам.

16.41.* Используя только связку NAND, построй формулы, равносильные $\neg p$, $p \wedge q$ и $p \vee q$. Для каждой формулы объясни равносильность через определение $\uparrow$.

16.42.* Построй формулу для $p \oplus q$, используя только NOR. Можно ввести промежуточные формулы. Проверь результат таблицей с четырьмя входными наборами.

ГЛАВА 17

Неравенства, оценки и методы доказательства

Что значит оценить величину

Ранее неравенства чаще появлялись как условия для неизвестного. Теперь цель меняется: не обязательно найти точное значение выражения, иногда достаточно доказать, что оно не выходит за нужные границы. Все числовые переменные этой главы действительные, если отдельно не сказано, что они целые или натуральные.

Определение 17.1. Верхняя оценка (upper bound) величины F — число или выражение M, для которого при всех оговорённых условиях выполнено $F \le M$. Нижняя оценка (lower bound) задаётся неравенством $m \le F$. Вместе они дают $m \le F \le M$.

Определение 17.2. Случай равенства (equality case) в неравенстве — допустимые значения переменных, при которых обе его стороны равны. Оценку $F \le M$ называют достижимой (attainable), если хотя бы при одном допустимом выборе получается $F = M$.

Для $0 \le x \le 10$ равенство

$$x(10 - x) = 25 - (x - 5)^2$$

даёт $x(10 - x) \le 25$. Граница достигается при $x = 5$, поэтому это наибольшее значение выражения. Число 30 тоже является верхней оценкой, но не наибольшим значением. Нельзя доказывать оптимальность границы только тем, что она подходит: нужен также допустимый пример, на котором она достигается.



Работа с оценками начинается с внимательного чтения условий. Нужно понять, какие значения могут принимать переменные, какие из них зависят друг от друга и какие действия допустимы. Затем полезно заранее представить случай равенства: он подсказывает, какую разность превращать в квадрат или какие два неотрицательных выражения сравнивать. После получения границы надо вернуться к исходным условиям и проверить, существует ли указанный случай равенства. Например, в задаче о длинах нельзя использовать отрицательную сторону, а в задаче о количестве предметов нельзя выбирать дробное число предметов. Такая проверка связывает вычисление с его смыслом и предотвращает ситуацию, когда формально найденная граница недостижима. Оценка остаётся полезной и тогда, когда точное значение неизвестно: она может гарантировать достаточный запас материала, ограничить ошибку измерения или показать, что нужный результат вообще невозможен.

Знаки, квадраты и цепочки оценок

Прибавлять одно и то же число к обеим частям неравенства можно без изменения его направления. Умножение на положительное число сохраняет направление, на отрицательное — меняет его, а умножение на ноль уничтожает информацию о строгом порядке. Поэтому перед делением на выражение нужно установить, что оно ненулевое, и определить его знак.

Например, из $x^2 \geq x$ нельзя безусловно получить $x \geq 1$ делением на x. При $x < 0$ знак изменится, а при $x = 0$ деление невозможно. Разложение $x(x-1) \geq 0$ сразу даёт все решения: $x \leq 0$ или $x \geq 1$.

Из $A \leq B$ и $B \leq C$ следует $A \leq C$. Если требуется $A = C$, должны одновременно выполняться равенства во всех звеньях этой цепочки. Для положительных $0 < a \leq b$ также $\frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$: это получается делением $a \leq b$ на положительное ab.

Теорема 17.1 (Базовая оценка через квадрат). *Для любых действительных a, b*

$$2ab \leq a^2 + b^2.$$

Равенство выполняется тогда и только тогда, когда $a = b$.

Доказательство. Разность правой и левой частей равна $a^2 + b^2 - 2ab = (a-b)^2$. Квадрат неотрицателен и равен нулю ровно при $a - b = 0$. ■

Например, $x^2 + 9 \geq 6x$ для любого x; равенство возможно только при $x = 3$. Чтобы сравнивать квадраты с самими числами, нужно учитывать знак: из $A^2 \leq B^2$ следует $|A| \leq |B|$, а вывод $A \leq B$ без дополнительных условий может быть неверен.

Два средних и задачи на оптимальное значение

Определение 17.3. Среднее арифметическое (arithmetic mean) чисел a, b равно $\frac{a+b}{2}$. Для $a, b \geq 0$ их среднее геометрическое (geometric mean) равно $\sqrt{ab}$.

Теорема 17.2 (Неравенство средних для двух чисел; AM–GM). *Если $a, b \geq 0$, то*

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}.$$

Равенство выполняется тогда и только тогда, когда $a = b$.

Доказательство. Квадрат $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2$ неотрицателен. Раскрывая его, получаем $a + b - 2\sqrt{ab} \geq 0$. Деление на 2 даёт оценку. Равенство эквивалентно $\sqrt{a} = \sqrt{b}$, то есть $a = b$. ■

При фиксированной сумме $a + b = s$, где $a, b \geq 0$, отсюда

$$ab \leq \frac{s^2}{4}.$$

Обе стороны перед возведением в квадрат неотрицательны. Граница достигается при $a = b = \frac{s}{2}$. Так, среди прямоугольников заданного положительного периметра наибольшую площадь имеет квадрат: сумма двух соседних сторон фиксирована, а площадь равна их произведению.

Другой пример: для $x > 0$ числа x и $\frac{9}{x}$ положительны, а их произведение равно 9. Поэтому $x + \frac{9}{x} \geq 6$. Равенство требует $x = \frac{9}{x}$, откуда с учётом $x > 0$ получаем $x = 3$. Здесь неравенство даёт нижнюю границу, а допустимый выбор показывает, что она является минимумом.

Неравенство Коши–Буняковского в двух координатах

Теорема 17.3 (Коши–Буняковский; Cauchy–Schwarz inequality). *Для любых действительных* a, b, c, d

$$|ac + bd| \le \sqrt{a^2 + b^2}\,\sqrt{c^2 + d^2}.$$

Равенство выполняется тогда и только тогда, когда $ad = bc$.

Доказательство. Раскрытие скобок даёт тождество

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) - (ac + bd)^2 = (ad - bc)^2 \ge 0.$$

Значит, квадрат левой стороны исходного неравенства не больше квадрата правой. Обе стороны неотрицательны, поэтому можно извлечь квадратный корень. Равенство соответствует нулю $(ad - bc)^2$, то есть условию $ad = bc$, в том числе когда одна пара координат нулевая. ■



Например, для любых x, y

$$|2x - 3y| \le \sqrt{13}\,\sqrt{x^2 + y^2}.$$

Если $x^2 + y^2 = 1$, выражение $2x - 3y$ лежит между $-\sqrt{13}$ и $\sqrt{13}$. Верхняя граница достигается при $(x; y) = (\frac{2}{\sqrt{13}}; -\frac{3}{\sqrt{13}})$, нижняя — при противоположной паре. Эта оценка станет геометрической после введения векторов.

Бернулли: общая оценка вместо длинного вычисления

Теорема 17.4 (Неравенство Бернулли; Bernoulli's inequality). *Для действительного* $t \ge -1$ *и натурального* n

$$(1 + t)^n \ge 1 + nt.$$

При $n = 1$ *всегда получается равенство. При* $n \ge 2$ *равенство выполняется ровно при* $t = 0$.

Доказательство. База $n = 1$ — равенство. Предположим оценку для n. Поскольку $1 + t \geq 0$, умножение сохраняет направление:

$$(1+t)^{n+1} \geq (1+nt)(1+t) = 1 + (n+1)t + nt^2 \geq 1 + (n+1)t.$$

Индукция доказывает утверждение. При $t = 0$ обе части равны единице. Если $t \neq 0$, то $nt^2 > 0$, поэтому каждый переход к показателю $n + 1 \geq 2$ даёт строгое неравенство. Это доказывает и описание равенства. ■

Например, $(1 + \frac{1}{50})^5 \geq 1 + \frac{5}{50} = \frac{11}{10}$. Это нижняя оценка, а не точный результат. Для $t > 0$ и $n \geq 2$ она строгая: сложные проценты дают больше, чем прибавление одного и того же процента только от начальной суммы.

Контрпример и принцип Дирихле

Определение 17.4. Контрпример (counterexample) к утверждению «для всех допустимых значений верно P» — один допустимый выбор, при котором P ложно. Контрпример должен удовлетворять всем условиям проверяемого утверждения.

Чтобы опровергнуть $\sqrt{a+b} \geq \sqrt{a}+\sqrt{b}$ при $a, b \geq 0$, достаточно взять $a = b = 1$: тогда $\sqrt{2} < 2$. Проверка ещё ста случаев для доказательства всеобщего утверждения, напротив, не годится. Полезно сначала проверить нули, отрицательные значения, границы области и возможные нулевые знаменатели: это помогает обнаружить неверную формулировку до попытки её доказать.

Теорема 17.5 (Принцип Дирихле; pigeonhole principle). *Пусть k — натуральное число, $m \in \mathbb{N}_0$. Если не менее $km + 1$ предметов распределены по k группам, хотя бы в одной группе не менее $m + 1$ предметов.*

Доказательство. Если бы в каждой группе находилось не более m предметов, общее число не превосходило бы km. Это противоречит наличию как минимум $km + 1$ предметов. Значит, группа с требуемым количеством существует. ■

Группы не обязательно являются физическими коробками. Это могут быть месяцы рождения, варианты ответа, дни недели или классы чётных и нечётных чисел. Каждый предмет должен попасть ровно в одну из указанных групп. Например, среди 13 человек найдутся двое с одним месяцем рождения, потому что месяцев 12. Принцип гарантирует существование совпадения, но не указывает, какой именно месяц встретится дважды.

Инварианты, убывающая величина и конечный экстремум

Определение 17.5. Инвариант (invariant) процесса — величина или свойство, сохраняющееся после каждого разрешённого шага. Полуинвариант (monovariant) — величина, которая на каждом шаге изменяется только в одном направлении: не возрастает либо не убывает. Для доказательства завершения обычно нужна более сильная проверка, чем одна монотонность.

Если пару целых чисел заменяют по правилу $(a;b)\mapsto(a+1;b-1)$, сумма остаётся равной $a+b$. Поэтому из $(8;5)$ невозможно получить $(7;7)$: суммы различаются. Если целое число изменяют на 2, сохраняется его чётность. Для невозможности достаточно одного различающего инварианта; совпадение найденного инварианта ещё не доказывает достижимость.



Выбор инварианта начинается с разбора одного разрешённого действия. Нужно проследить, что происходит с суммой, разностью, чётностью или числом объектов, а затем проверить сохранение для каждого допустимого вида шага. После этого утверждение распространяется на любое конечное число шагов: после первого шага свойство сохраняется, после второго сохраняется снова, и так далее. Если начальное и желаемое состояния различаются по найденному признаку, никакая последовательность действий не поможет. Обратный вывод требует осторожности: одинаковая сумма двух состояний лишь снимает одно препятствие, но не строит путь между ними. При поиске завершающего алгоритма, напротив, полезно искать величину, которая не сохраняется, а обязательно уменьшается. Чтобы исключить бесконечный процесс, надо дополнительно понять, насколько она уменьшается и где её нижняя граница.

Теорема 17.6 (Завершение по целочисленному полуинварианту)**.** *Если на каждом разрешённом шаге неотрицательная целочисленная величина M уменьшается хотя бы на 1, процесс содержит не более M_0 шагов, где M_0 — её начальное значение.*

Доказательство. После s шагов имеем $M \le M_0 - s$; это доказывается индукцией по числу шагов. Но $M \ge 0$, значит, $s \le M_0$. Большее число шагов невозможно. ■

Одного строгого убывания действительных чисел недостаточно: последовательность $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \dots$ убывает бесконечно. Здесь нет уменьшения хотя бы на фиксированную положительную величину.

Определение 17.6. Наибольший элемент (maximum) непустого множества $A \subseteq \mathbb{R}$ — принадлежащее ему число M, для которого $a \le M$ при всех $a \in A$. Наименьший элемент (minimum) определяется неравенствами $m \le a$. Принадлежность множеству обязательна.

Теорема 17.7 (Экстремальные элементы конечного множества). *Любое конечное непустое множество действительных чисел имеет наибольший и наименьший элементы.*

Доказательство. Для одного элемента утверждение очевидно. Предположим, что для n элементов наибольшее число M найдено. После добавления числа b наибольшим станет M, если $b \le M$, и b, если $b > M$. Индукция доказывает существование максимума. Аналогично при добавлении числа сравнивают его с уже найденным минимумом. ■

Метод экстремального элемента (extremal principle) состоит в выборе наибольшего или наименьшего объекта конечного набора и использовании его отличительного свойства. Для бесконечного множества вывод требует новых условий: интервал $(0;1)$ ограничен, но не имеет максимума, поскольку вместе с x содержит большее число $\frac{x+1}{2}$. Его супремум равен 1, однако 1 интервалу не принадлежит. Именно различие между достижимым максимумом и точной верхней гранью важно при дальнейшем изучении анализа.

Задачи

17.1. Пусть $-2 \le x \le 3$. Найди наименьшее и наибольшее значения $2x - 1$ и укажи, при каких x они достигаются.

17.2. Для $x \in [-2;3]$ найди точные нижнюю и верхнюю границы x^2, которые достигаются на этом отрезке.

17.3. Докажи без десятичных приближений, что $6 < 3\sqrt{5} < 7$.

17.4. Найди наименьшее значение $x + \dfrac{16}{x}$ при $x > 0$ и случай равенства.

17.5. Неотрицательные a, b удовлетворяют $a + b = 10$. Каково наибольшее значение ab?

17.6. Примени неравенство Коши–Буняковского к парам $(3;4)$ и $(5;12)$. Сравни точное значение левой стороны с полученной верхней границей. Есть ли равенство?

17.7. Докажи для любых действительных a, b, что $a^2 + b^2 \geq 2ab$, и найди все случаи равенства.

17.8. Докажи, что $(x+1)^2 \geq 4x$ для всех действительных x. При каком x получается равенство?



17.9. Опровергни утверждение: для всех $a, b \geq 0$ выполнено $\sqrt{a+b} \geq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

17.10. Из $x^2 \geq x$ ученик делением на x получил $x \geq 1$. Найди все решения исходного неравенства и объясни ошибку.

17.11. В учебной модели вклад 10000 рублей ежегодно увеличивается на 2%. С помощью Бернулли дай гарантированную нижнюю оценку суммы через пять лет. Будет ли она точной?

17.12. Для ограды прямоугольного участка есть 40 м материала. Вся ограда идёт на четыре стороны. Найди наибольшую площадь и размеры участка.

17.13. Сторона квадратной плитки измерена как $3{,}0$ м с гарантированной погрешностью не более $0{,}1$ м. Укажи точный допустимый отрезок для площади.

17.14. Нужно купить 2 кг яблок и 3 кг груш. Цена яблок лежит между 100 и 110 рублями за килограмм, груш — между 140 и 150. Найди гарантированный отрезок стоимости покупки; цены можно выбирать независимо.

17.15. Два последовательных перемещения идут на восток и на север, их длины $a, b \geq 0$, а общий пройденный путь равен 14 м. Найди наименьшее расстояние от начала до конца пути.

17.16. В группе 25 человек. Докажи, что как минимум трое родились в одном и том же месяце; год рождения учитывать не нужно.

17.17. 23 одинаковых предмета распределяют по пяти коробкам. Какое наименьшее число предметов в самой заполненной коробке возможно? Покажи, что граница достигается.

17.18. Начав с целого числа 7, разрешается на каждом шаге прибавить либо вычесть 2. Можно ли получить 20? Назови инвариант.

17.19. Над парой целых чисел разрешены переходы $(a;b) \mapsto (a+1;b-1)$ и обратные к ним. Можно ли из $(4;9)$ получить $(6;8)$?

17.20. Имеется 9 фишек. На каждом шаге убирают одну или две, не получая отрицательного количества, пока фишек не останется. Объясни завершение и найди наименьшее и наибольшее числа шагов.

17.21. Для множества $A = \{-4, 0, 3, 7\}$ найди наименьший и наибольший элементы. Приведи верхнюю оценку, которая не является наибольшим элементом.

17.22. Объясни, почему у ограниченного интервала $(0; 1)$ нет наибольшего элемента. Назови его супремум.

17.23. Докажи: среди любых пяти целых чисел найдутся три одинаковой чётности.

17.24. В строке записаны пять нулей. За ход разрешается выбрать ровно две разные позиции и в каждой заменить 0 на 1, а 1 на 0. Можно ли получить строку ровно с одной единицей?

17.25.* При $a, b > 0$ и $a + b = 6$ найди наименьшее значение $\dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b}$. Укажи все случаи равенства.

17.26.* При $x^2 + y^2 = 4$ найди наибольшее и наименьшее значения $3x - 4y$ и пары, в которых они достигаются.

17.27.* Над тройкой целых чисел разрешён ход: из одной координаты вычесть 2, к каждой из двух остальных прибавить 1. Можно ли из $(1; 2; 3)$ получить $(0; 0; 6)$? Одна лишь сумма не решает задачу; исследуй разность первых двух координат.

17.28.* На кольце расположены $n \geq 3$ действительных чисел. Каждое равно среднему арифметическому двух соседних. Докажи, что все числа равны, начав с наибольшего.

ГЛАВА 18

Векторы, матрицы и линейные системы

Координаты точки и координаты перемещения

Пара чисел может описывать точку плоскости, а может описывать перемещение. Точка отвечает на вопрос «где?», вектор — на вопрос «на сколько и в каком направлении?». Все координаты и коэффициенты в этой главе действительные. Основные модели — $\mathbb{R}^2$ и $\mathbb{R}^3$; абстрактные векторные пространства пока не понадобятся.



Определение 18.1. Координатный вектор (coordinate vector) плоскости — упорядоченная пара $\mathbf{u} = (u_1; u_2) \in \mathbb{R}^2$. В пространстве это тройка $\mathbf{u} = (u_1; u_2; u_3) \in \mathbb{R}^3$. Два вектора равны, если совпадают все соответствующие координаты.

Вектор перемещения из $A = (a_1; a_2)$ в $B = (b_1; b_2)$ имеет координаты $\overrightarrow{AB} = (b_1 - a_1; b_2 - a_2)$. Например, из $(2; -1)$ в $(-1; 3)$ нужно сместиться на $(-3; 4)$. Одинаковые перемещения можно начинать в разных точках; их координаты от этого не меняются.

Определение 18.2. Сумма векторов (vector sum) и умножение вектора на число (scalar multiplication) выполняются по координатам:

$$(u_1; u_2) + (v_1; v_2) = (u_1 + v_1; u_2 + v_2),$$
$$\lambda(u_1; u_2) = (\lambda u_1; \lambda u_2).$$

В $\mathbb{R}^3$ то же правило применяется и к третьей координате. Нулевой вектор (zero vector) $\mathbf{0}$ имеет все координаты нулевыми. Противоположный вектор (additive inverse) равен $-\mathbf{u}$.

Сумма описывает два последовательных перемещения. По правилу треугольника начало второго перемещения помещают в конец первого. Например, $(3; 0) + (0; 4) = (3; 4)$. Умножение на положительное число растягивает или сжимает перемещение, отрицательный множитель дополнительно меняет направление; множитель 0 даёт нулевой вектор. Переместительное и сочетательное свойства сложения, а также распределительные свойства следуют из соответствующих равенств для каждой координаты.

Определение 18.3. Длина вектора, или евклидова норма (Euclidean norm) определяется формулами

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2} \quad \text{в } \mathbb{R}^2, \qquad \|\mathbf{u}\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2} \quad \text{в } \mathbb{R}^3.$$

Скалярное произведение (dot product) векторов одинаковой размерности равно сумме произведений соответствующих координат. Например, в $\mathbb{R}^2$ это $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2$. Векторы называют ортогональными (orthogonal), если их скалярное произведение равно нулю.

Формулы длины следуют из теоремы Пифагора; для трёх координат её применяют сначала в горизонтальной плоскости, затем с учётом высоты. Расстояние между точками равно длине вектора их разности. Векторы $(3; 4)$ и $(4; -3)$ ортогональны, поскольку $3 \cdot 4 + 4 \cdot (-3) = 0$. Неравенство Коши–Буняковского из предыдущей главы теперь читается как $|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \le \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|$ для векторов плоскости.

Линейная комбинация и зависимость

Определение 18.4. Линейная комбинация (linear combination) векторов $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ одинаковой размерности — вектор вида $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k$, где коэффициенты λ_i действительные.

Определение 18.5. Векторы $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ линейно зависимы (linearly dependent), если существуют коэффициенты, не все равные нулю, для которых

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}.$$

Они линейно независимы (linearly independent), если нулевая комбинация получается только при $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$.

Два ненулевых вектора зависимы ровно тогда, когда один является числовым множителем другого. Действительно, из $\alpha\mathbf{u}+\beta\mathbf{v} = \mathbf{0}$ при $\beta \neq 0$ получаем $\mathbf{v} = -\frac{\alpha}{\beta}\mathbf{u}$; если $\beta = 0$, то для нетривиальной зависимости $\alpha \neq 0$, что дало бы запрещённое $\mathbf{u} = \mathbf{0}$. Обратно, равенство $\mathbf{v} = t\mathbf{u}$ даёт нетривиальную комбинацию $t\mathbf{u}-\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Наличие нулевого вектора всегда делает набор зависимым: достаточно поставить при нём коэффициент 1, а при остальных 0.

Определение 18.6. Базис (basis) в $\mathbb{R}^2$ или $\mathbb{R}^3$ — упорядоченный набор векторов, через который любой вектор соответствующей модели представляется единственной линейной комбинацией. Стандартный базис (standard basis) плоскости состоит из $\mathbf{e}_1 = (1;0)$, $\mathbf{e}_2 = (0;1)$; в пространстве добавляют третью координату и $\mathbf{e}_3 = (0;0;1)$.

Например, $(x;y) = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2$, и коэффициенты единственны, потому что равенство векторов означает равенство каждой координаты. В $\mathbb{R}^3$ аналогично $(x;y;z) = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + z\mathbf{e}_3$. Базис позволяет задавать вектор списком коэффициентов. В другом базисе этот список может измениться, хотя само геометрическое перемещение останется прежним.

Матрица: несколько линейных формул в одной записи

Определение 18.7. Матрица (matrix) размера $m \times n$ — прямоугольная таблица чисел с m строками и n столбцами. Элемент a_{ij} расположен в строке i, столбце j. Матрица квадратная (square), если $m = n$.

Матрицы одинакового размера складывают поэлементно и умножают на число поэлементно. Для матриц разных размеров сумма не определена. Например,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Определение 18.8. Произведение матрицы на вектор (matrix–vector product) получают, умножая каждую строку на столбец координат:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}.$$

Для матрицы $m \times n$ входной столбец должен содержать n координат, выходной содержит m.

Если A имеет столбцы $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$, то $A\mathbf{x} = x_1\mathbf{a}_1 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n$: это одна и та же формула, прочитанная по столбцам вместо строк. Поэтому задача $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ спрашивает, можно ли получить $\mathbf{b}$ как комбинацию столбцов A и единственны ли коэффициенты.



Матричная запись помогает одновременно видеть несколько связей между величинами. Строка описывает, как вычисляется один результат, а столбец показывает вклад одной входной величины во все результаты. Например, в таблице расхода продуктов столбцы могут соответствовать двум видам наборов, а строки — разным ингредиентам. Умножение на столбец количеств наборов сразу даёт общий расход каждого ингредиента. В геометрии те же числа описывают изменение координат: один столбец задаёт образ первого стандартного базисного вектора, другой — второго. Поэтому смысл произведения полезно проверять до вычислений: сколько величин подаётся на вход, сколько должно получиться на выходе и в каких единицах они измеряются. Такая проверка часто обнаруживает перепутанный порядок матриц или строк раньше, чем появляется ошибочный численный ответ.

Определение 18.9. Произведение матриц (matrix product) $C = AB$ определено, если число столбцов A равно числу строк B. При размерах $m \times n$ и $n \times p$ результат имеет размер $m \times p$, причём

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}.$$

То есть берут скалярное произведение строки первой матрицы и столбца второй.

Например, для

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

получаем

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Значит, умножение матриц в общем случае некоммутативно. Иногда одно из произведений AB, BA даже не определено из-за размеров.

Матрица как линейное отображение

Определение 18.10. Линейное отображение (linear map) в координатных моделях — отображение T, сохраняющее линейные комбинации двух векторов:

$$T(\alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v}) = \alpha T(\mathbf{u}) + \beta T(\mathbf{v})$$

для любых допустимых векторов и действительных α, β.

При $\alpha = \beta = 0$ определение даёт $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$. Поэтому несохранение нулевого вектора сразу опровергает линейность.

Теорема 18.1 (Линейность матричного действия и композиция)**.** *Отображение $T_A(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ линейно. Для согласованных размеров последовательное применение T_B, затем T_A задаётся матрицей AB:*

$$A(B\mathbf{x}) = (AB)\mathbf{x}.$$

Доказательство. В каждой строке распределительный закон даёт $\sum_j a_{ij}(\alpha u_j + \beta v_j) = \alpha \sum_j a_{ij} u_j + \beta \sum_j a_{ij} v_j$, что доказывает линейность. Для композиции i-я координата левой части равна

$$\sum_k a_{ik} \left(\sum_j b_{kj} x_j \right) = \sum_j \left(\sum_k a_{ik} b_{kj} \right) x_j.$$

Все суммы конечные; перестановка слагаемых и раскрытие скобок допустимы. Внутренняя сумма — элемент $(AB)_{ij}$, поэтому получена i-я координата правой части. ■

Так, $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ действует по правилу $T_A(x; y) = (2x + y; y)$. Вершины единичного квадрата $(0;0), (1;0), (1;1), (0;1)$ переходят в $(0;0), (2;0), (3;1), (1;1)$. Матрица $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ задаёт поворот плоскости на 90° против часовой стрелки: $(x; y) \mapsto (-y; x)$. На единичной окружности это следует из формул для $\cos(\alpha + \frac{\pi}{2})$ и $\sin(\alpha + \frac{\pi}{2})$, а умножение на радиус даёт то же для любой точки. Напротив, перенос $(x; y) \mapsto (x + 1; y)$ нелинеен: он не сохраняет нулевой вектор.

Метод Гаусса и смысл преобразования строк

Определение 18.11. Линейная система (linear system) — система уравнений первой степени по неизвестным с постоянными коэффициентами; её матричная запись — $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Расширенная матрица (augmented matrix) $(A \mid \mathbf{b})$ содержит также столбец правых частей.

Например, $x+y=3, x-y=1$ записываются как $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{array}\right)$. Вертикальная черта отделяет правые части и не является коэффициентом.

Теорема 18.2 (Равносильные преобразования строк). *Множество решений системы сохраняется при перестановке двух уравнений, умножении уравнения на ненулевое число и прибавлении к одному уравнению другого, умноженного на любое число. При преобразовании строки меняют также её правую часть.*

Доказательство. Перестановка меняет только порядок условий и обращается той же перестановкой. Умножение на $\lambda \neq 0$ обращается умножением на $\frac{1}{\lambda}$, поэтому обе записи требуют одного и того же. Если к уравнению i прибавили λ раз уравнение j, всякое старое решение удовлетворяет новому уравнению. Обратно, уравнение j осталось неизменным: вычитая его с множителем λ, восстанавливаем старое уравнение i. Значит, каждое новое решение является старым. ■

Определение 18.12. Ступенчатый вид (row echelon form) матрицы означает: нулевые строки стоят ниже ненулевых, а первый ненулевой элемент каждой следующей ненулевой строки расположен правее такого элемента предыдущей. Эти первые элементы называют ведущими элементами (pivots), их позиции — ведущими позициями.

Метод Гаусса (Gaussian elimination) последовательно выбирает ненулевой ведущий коэффициент, при необходимости переставляет строки и вычитанием кратных обнуляет элементы под ним. Далее тот же процесс продолжают в меньшем прямоугольнике справа и снизу. Число строк и столбцов конечно, поэтому получится ступенчатая форма. Затем неизвестные находят в обратном порядке — от нижнего ненулевого уравнения к верхнему.

Например, система

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x + y + z = 7, \\ x + 2y + 3z = 14 \end{cases}$$

после вычитания удвоенного первого уравнения из второго и первого из третьего превращается в

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ -y - z = -5, \\ y + 2z = 8. \end{cases}$$

Сложив два последних уравнения, получаем $z = 3$. Затем $y = 2$ и $x = 1$. Проверка во всех исходных уравнениях даёт 6, 7, 14, как требуется.

Определение 18.13. Система совместна (consistent), если имеет хотя бы одно решение, и несовместна (inconsistent), если решений нет. В ступенчатой форме ведущие переменные (pivot variables) соответствуют ведущим позициям матрицы коэффициентов; остальные свободные переменные (free variables) можно выбирать как параметры, если система совместна. Ранг матрицы (matrix rank), обозначаемый $\operatorname{rank} A$, — наибольшее число её линейно независимых столбцов. Для нулевой матрицы ранг равен 0. Ниже доказано, как прочитать это число по ступенчатой форме.

Теорема 18.3 (Чтение решений из ступенчатой формы). *Если преобразованная система содержит строку $0 = \gamma$ с $\gamma \neq 0$, она несовместна. Если таких строк нет, система совместна: свободным переменным можно независимо присвоить любые действительные значения, после чего ведущие переменные единственным образом находятся обратной подстановкой. В частности, при отсутствии свободных переменных решение единственно.*



Доказательство. Строку $0 = \gamma \neq 0$ не удовлетворяет ни один набор неизвестных. Если её нет, нулевые строки дают только $0 = 0$ и не накладывают условий. В последнем ненулевом уравнении все переменные правее ведущей свободны; после их выбора деление на ненулевой ведущий коэффициент даёт единственное значение ведущей переменной. Поднимаясь выше, используем уже найденные значения и каждый раз так же определяем следующую ведущую переменную. Полученный набор удовлетворяет всем строкам. Любое решение при том же выборе свободных переменных должно давать те же значения на каждом шаге обратной подстановки. ■

Теорема 18.4 (Ранг и ведущие позиции). *Ранг матрицы равен числу ненулевых строк в её ступенчатой форме, то есть числу ведущих позиций.*

Поэтому результат не зависит от выбора допустимых преобразований строк. Для совместной системы с n неизвестными число свободных переменных равно $n - \operatorname{rank} A$.

Доказательство. Преобразования строк сохраняют решения однородной системы $A\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}$, а значит, сохраняют все линейные зависимости между её столбцами. Ранг до и после преобразований одинаков.

Пусть в ступенчатой матрице R ровно r ненулевых строк. При $r = 0$ матрица нулевая, её ранг равен нулю. При $r > 0$ выберем r столбцов с ведущими позициями. В первых r строках они образуют верхнюю треугольную матрицу с ненулевыми диагональными элементами. Обратная подстановка в её однородной системе даёт только нулевые коэффициенты, поэтому выбранные столбцы независимы. Если в R взять любые $r + 1$ столбцов, условие их нулевой комбинации содержит только r ненулевых уравнений для $r + 1$ коэффициентов. При приведении такой системы к ступенчатому виду будет хотя бы одна свободная переменная. Выбрав её равной 1, получим нетривиальную зависимость. Если всего столбцов r, брать $r + 1$ уже невозможно. Итак, наибольшее число независимых столбцов равно r. В совместной системе остальные $n - r$ переменных свободны по предыдущей теореме. ■

Например, строки $x + y = 3$ и $2x + 2y = 6$ после вычитания дают $x + y = 3$, $0 = 0$. Все решения: $(x; y) = (t; 3 - t)$, $t \in \mathbb{R}$. Если во второй правой части стояло бы 7, появилась бы строка $0 = 1$, то есть решений не было бы.

После приведения системы к ступенчатому виду важно прочитать полученные условия, а не пытаться любой ценой вывести по одному числу для каждого неизвестного. Нулевая строка без противоречия означает, что одно из исходных уравнений не добавило нового ограничения. Свободная переменная описывает реальный выбор внутри множества решений: она не является ошибкой вычисления и не должна произвольно приравниваться нулю, если требуется найти все решения. При наличии противоречивой строки, наоборот, никакие дальнейшие подстановки не создадут решения. Проверять полезно и размеры ответа: для трёх неизвестных одна пара чисел не может быть полным решением. Если найдено семейство с параметрами, подстановка должна работать для любого допустимого значения параметров, а обратное рассуждение должно объяснять, почему других решений нет. Такой подход отделяет описание множества решений от поиска одного удобного примера.

Единичная матрица, обратимость и определитель второго порядка

Определение 18.14. Единичная матрица (identity matrix) I_n имеет единицы на главной диагонали и нули вне неё. При подходящих размерах $I_m A = A$ и $A I_n = A$: в каждой строке или столбце остаётся ровно одно слагаемое. Обратная матрица (inverse matrix) к квадратной A — матрица A^{-1}, для которой $A A^{-1} = A^{-1} A = I_n$.

Если обратная существует, она единственна: для двух обратных B, C равенства дают $B = B(AC) = (BA)C = C$. Здесь ассоциативность произведения следует из той же перестановки конечных сумм, что в доказательстве формулы композиции.

Определение 18.15. Определитель второго порядка (determinant of order two) матрицы $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ — число

$$\det A = ad - bc.$$

Это число отличается от самой матрицы и помогает распознать обратимость.

Теорема 18.5 (Определитель и единственность решения в двух неизвестных). *Матрица $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ обратима тогда и только тогда, когда $\Delta = ad - bc \neq 0$. При этом*

$$A^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix},$$

а система $ax + by = u$, $cx + dy = v$ имеет единственное решение при любых u, v:

$$x = \frac{du - bv}{\Delta}, \qquad y = \frac{av - cu}{\Delta}.$$

При $\Delta = 0$ система либо несовместна, либо имеет бесконечно много решений; единственного решения нет.



Доказательство. Если $\Delta \neq 0$, прямое перемножение в обоих порядках даёт


$$A\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} A = \Delta I_2.$$

Значит, указанная обратная существует. Умножение $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ слева на A^{-1} даёт единственно возможное $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$. Оно действительно является решением, так как $AA^{-1}\mathbf{b} = \mathbf{b}$.

Пусть $\Delta = 0$. Если первая строка ненулевая, ненулевой вектор $\mathbf{w} = (-b; a)$ удовлетворяет $A\mathbf{w} = \mathbf{0}$. Если первая строка нулевая, но вторая ненулевая, подойдёт $\mathbf{w} = (-d; c)$. Для нулевой матрицы можно взять $\mathbf{w} = (1; 0)$. Обратной быть не может: иначе $\mathbf{w} = A^{-1}A\mathbf{w} = \mathbf{0}$, что противоречит выбору. Если же некоторое решение $\mathbf{x}_0$ системы существует, все различные векторы $\mathbf{x}_0 + t\mathbf{w}$, $t \in \mathbb{R}$, тоже решения. Поэтому их бесконечно много. Если исходного решения нет, система несовместна. ■

Например, $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Два столбца матрицы 2×2 образуют базис плоскости ровно при ненулевом определителе: для любого целевого вектора единственность коэффициентов линейной комбинации — это уже доказанная единственность решения системы. Для больших размеров метод Гаусса остаётся рабочим способом решения, но формулы определителей высших порядков и общая теория базисов требуют отдельного курса.

Графики



Сумма векторов и образ единичного квадрата

Задачи

18.1. Для $\mathbf{u} = (1; -1)$, $\mathbf{v} = (3; 2)$ найди $2\mathbf{u} + \mathbf{v}$.

18.2. В $\mathbb{R}^3$ даны $\mathbf{u} = (2; -1; 3)$, $\mathbf{v} = (-1; 4; 0)$. Найди $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ и $-2\mathbf{v}$.

18.3. Точки имеют координаты $A = (2; -1)$, $B = (-1; 3)$. Найди $\overrightarrow{AB}$ и расстояние AB.

18.4. Найди длины и скалярное произведение $\mathbf{u} = (3; 4)$, $\mathbf{v} = (4; -3)$. Ортогональны ли векторы?

18.5. Представь $(5; 1)$ как $\alpha(1; 1) + \beta(1; -1)$. Найди все возможные коэффициенты.

18.6. Линейно зависимы ли $(2; -3)$ и $(-4; 6)$? Запиши нетривиальную комбинацию, равную нулю.

18.7. Докажи непосредственно по определению, что $(1; 2)$ и $(2; 1)$ линейно независимы.

18.8. Для $\mathbf{u} = (1; 0; 1)$, $\mathbf{v} = (0; 1; 1)$, $\mathbf{w} = (1; 1; 2)$ найди нетривиальную линейную зависимость.

18.9. Турист прошёл 3 км на восток, 4 км на север, затем 1 км на запад и 2 км на юг. Найди вектор итогового перемещения, его длину и общий пройденный путь.

18.10. На тело действуют две силы с координатами $(6; 2)$ Н и $(-1; 3)$ Н в перпендикулярных осях. Найди равнодействующую и её величину.

18.11. Найди размер матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ и вычисли $A \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

18.12. Для $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ найди AB и BA. Равны ли они?

18.13. Для одного набора первого вида нужны 2 единицы ингредиента А и 1 единица В, для набора второго — 1 единица А и 3 единицы В. Составь матрицу расхода: строки соответствуют ингредиентам, столбцы — видам наборов. Найди расход для 4 наборов первого вида и 5 второго.

18.14. Для $T(x; y) = (2x + y; y)$ найди $T(1; 2)$ и все векторы, переходящие в $(7; 3)$.

18.15. Какие отображения $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ линейны: $T(x; y) = (2x - y; x + 3y)$, $G(x; y) = (x + 1; y)$? Обоснуй.

18.16. Докажи из определения линейности, что $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$.



18.17. Для произвольной матрицы $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ докажи вычислением, что $I_2 A = A I_2 = A$.

18.18. Реши методом исключения $\begin{cases} 2x + y = 7, \\ x - y = 2. \end{cases}$ Укажи преобразование уравнений и проверь ответ.

18.19. Опиши все решения системы $\begin{cases} x + 2y = 5, \\ 2x + 4y = 10. \end{cases}$ Сколько свободных параметров?

18.20. Исследуй совместность системы $\begin{cases} 2x - y = 4, \\ 4x - 2y = 9. \end{cases}$

18.21. Реши методом Гаусса $\begin{cases} x + y + z = 4, \\ 2x + y + z = 6, \\ x + 2y + 3z = 9. \end{cases}$

18.22. Опиши все решения $\begin{cases} x + y + z = 4, \\ 2x + 2y + 2z = 8. \end{cases}$ Сколько свободных параметров?

18.23. Для $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ найди определитель и обратную матрицу. С их помощью реши $A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$.

18.24. Две булочки и один сок стоят 170 рублей, одна булочка и два сока — 160. Цены одинаковых товаров равны. Составь линейную систему, найди цены и проверь, единственны ли они.

18.25.* При всех действительных t исследуй систему $\begin{cases} tx + y = 1, \\ x + ty = 1. \end{cases}$ Когда решение единственно, когда решений нет, когда их бесконечно много?

18.26.* Приведи к ступенчатому виду систему $\begin{cases} x + 2y - z = 1, \\ 2x + 4y - 2z = 2, \\ y + z = 2. \end{cases}$ Найди ранг матрицы коэффициентов и все решения.

18.27.* Пусть $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Определим $A^0 = I_2$, а A^n при натуральном n — как произведение n экземпляров A. Докажи индукцией, что $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ для всех $n \in \mathbb{N}_0$. Найди обратную к A^n.

18.28.* Для $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ найди все векторы, удовлетворяющие $P\mathbf{u} = \mathbf{u}$, и все векторы, удовлетворяющие $P\mathbf{u} = \mathbf{0}$. Проверь $P^2 = P$ и объясни, почему обратной матрицы нет.

ГЛАВА 19

Предел функции и непрерывность

Приближаться к точке и попадать в неё



Предел описывает не отдельное измерение, а поведение значений при всё более точном приближении аргумента к выбранной точке. Представьте, что прибор позволяет подходить к нужному моменту времени, но ровно в этот момент показание потеряно. Иногда соседние показания однозначно подсказывают, какое число ожидалось. Иногда слева и справа получаются разные ответы. Чтобы различать эти ситуации, нужно договориться, что значит «достаточно близко»: заранее выбрать допустимую ошибку результата и затем обеспечить её подходящей точностью аргумента. Такое рассуждение не требует, чтобы аргумент когда-либо достиг самой точки.

На графике близость аргументов измеряется по горизонтали, а близость значений — по вертикали. Чем уже допустимая вертикальная полоса около предполагаемого предела, тем точнее иногда приходится выбирать аргумент. Однако нас интересует возможность такого выбора для каждого допуска, а не фиксированная точность конкретного прибора.

Определение 19.1. Окрестность (neighborhood) точки a радиуса $\delta > 0$ — интервал $(a - \delta; a + \delta)$. Проколотая окрестность (punctured neighborhood) получается, если удалить саму точку a: её условие $0 < |x - a| < \delta$.

Пусть функция f определена на множестве D. Рассматриваем точку a, к которой можно приближаться по точкам D, отличным от a: в любой проколотой окрестности есть такая точка. Это точка накопления (accumulation point) множества D. Условие исключает ситуацию, когда возле a вообще нет аргументов для проверки. В обычных примерах D содержит интервал около a, возможно, без самой точки.

Определение 19.2. Число L называется пределом функции (limit of a function) f при $x \to a$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in D: \quad 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Пишут $\lim_{x \to a} f(x) = L$.

Буква ε обозначает любую заранее назначенную положительную погрешность результата. После её выбора разрешено подобрать δ, то есть точность аргумента. Одно найденное δ должно подходить сразу для всех допустимых аргументов в указанной окрестности. Оно может зависеть от погрешности, функции и точки, но не от отдельного проверяемого аргумента. Нельзя сначала выбрать удобный аргумент, а затем объявить подходящей только его погрешность. Для существования предела нужно справиться с каждым положительным допуском, каким бы маленьким он ни был. В этом и состоит порядок кванторов «для любого», «существует», «для всех».

Модуль в определении измеряет расстояние между числами, поэтому одна запись учитывает обе возможные стороны ошибки: результат может оказаться чуть выше ожидаемого или чуть ниже него. Допуск результата и радиус для аргумента — разные числа. Их равенство не требуется; нужную связь между ними устанавливает оценка конкретной функции.

Пример. Для $f(x) = 3x - 2$ при $x \to 2$ ожидается $L = 4$. Действительно,

$$|f(x) - 4| = 3|x - 2|.$$

Для заданного $\varepsilon > 0$ достаточно взять $\delta = \frac{\varepsilon}{3}$. Тогда требуемая ошибка результата строго меньше ε. При допуске $0{,}03$ годится точность аргумента $0{,}01$.

Теорема 19.1 (Единственность предела). *В рассматриваемой точке накопления функция имеет не более одного конечного предела.*

Доказательство. Пусть пределы $L \neq M$ существуют. Возьмём $\varepsilon = \frac{|L-M|}{3}$ и окрестность, в которой выполняются оба предельных условия. В ней есть допустимый аргумент, отличный от a. Для него неравенство треугольника даёт $|L - M| \le |L - f(x)| + |f(x) - M| < 2\varepsilon$. Но выбранное значение погрешности делает правую часть меньше расстояния между предполагаемыми пределами. Получено противоречие. ■

Значение в точке и подход с разных сторон

При вычислении предела точка $x = a$ исключена. Поэтому изменение только $f(a)$ не меняет предела; значение в точке может отсутствовать. Например, при $x \neq 2$

$$\frac{x^2-4}{x-2} = x+2, \qquad \lim_{x\to 2}\frac{x^2-4}{x-2} = 4.$$

Сокращение допустимо именно при $x \neq 2$. Исходная дробь в точке 2 не определена, хотя предел существует.

Определение 19.3. Левый предел (left-hand limit) $\lim_{x\to a-} f(x) = L$ определяется тем же условием, но проверяются только $a-\delta < x < a$. Для правого предела (right-hand limit) $\lim_{x\to a+} f(x) = L$ проверяются $a < x < a+\delta$. С соответствующей стороны должны существовать аргументы, сколь угодно близкие к a.

Теорема 19.2 (Согласование односторонних пределов). *Если область определения подходит к a с обеих сторон, конечный двусторонний предел существует тогда и только тогда, когда оба односторонних предела существуют и равны. Тогда все три предела равны.*

Доказательство. Двустороннее условие остаётся верным при ограничении на любую сторону. Обратно, для общего значения и заданной погрешности выберем по одному радиусу с каждой стороны и возьмём меньший. Каждый допустимый аргумент в проколотой окрестности лежит либо слева, либо справа, поэтому выполняется нужная оценка. ■

У функции $\frac{|x|}{x}$ левый предел в нуле равен -1, правый — 1; двустороннего предела нет.

Определение 19.4. Запись $\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$ означает: для любого $M > 0$ существует $\delta > 0$, при котором из $x \in D$, $0 < |x-a| < \delta$ следует $f(x) > M$. Это бесконечный предел (infinite limit), а не равенство некоторому действительному числу. Для $-\infty$ требуется $f(x) < -M$.

Например, $\frac{1}{x^2} \to +\infty$ при $x \to 0$: годится $\delta = \frac{1}{\sqrt{M}}$. У $\frac{1}{x}$ предел справа равен $+\infty$, слева — $-\infty$, поэтому общего бесконечного предела в нуле нет.

Определение 19.5. Запись $\lim_{x\to+\infty} f(x) = L$ означает: для каждого $\varepsilon > 0$ найдётся A, такое что при всех $x \in D$, $x > A$, выполнено $|f(x) - L| < \varepsilon$. Область D предполагается неограниченной сверху. Для $x \to -\infty$ проверяют достаточно большие по модулю отрицательные аргументы.

Например, $\frac{1}{x} \to 0$ при $x \to +\infty$, поскольку достаточно $A = \frac{1}{\varepsilon}$. При вычислениях с бесконечностью нельзя обращаться с символом ∞ как с числом: запись $\infty - \infty$ сама по себе не определяет результата.

Как преобразовывать пределы

Теорема 19.3 (Арифметика конечных пределов). *Пусть f и g рассматриваются на общей области, для которой предельная точка остаётся точкой накопления. При одном и том же стремлении аргумента пусть $f(x) \to L$, $g(x) \to M$, где L, M конечны. Тогда для действительных постоянных α, β*

$$\alpha f + \beta g \to \alpha L + \beta M, \qquad fg \to LM.$$

Если дополнительно $M \neq 0$, то g не обращается в ноль достаточно близко к предельной точке и $\frac{f}{g} \to \frac{L}{M}$. Те же утверждения верны при $x \to \pm\infty$.



Доказательство. Для суммы достаточно обеспечить ошибку каждого слагаемого меньше половины требуемой; умножение на постоянную учитывает модуль этой постоянной. Для произведения используем

$$|fg - LM| \le |g|\,|f - L| + |L|\,|g - M|.$$

В достаточно малой окрестности $|g| \le |M| + 1$. Ошибки $|f - L| < \frac{\varepsilon}{2(|M|+1)}$ и $|g - M| < \frac{\varepsilon}{2(|L|+1)}$, вместе с $|g - M| < 1$, делают сумму меньше ε. Если $M \neq 0$, потребуем также $|g - M| < \frac{|M|}{2}$. Тогда $|g| > \frac{|M|}{2}$ и

$$\left|\frac{1}{g} - \frac{1}{M}\right| \le \frac{2|g - M|}{M^2} \to 0.$$

Остаётся применить правило произведения к f и $\frac{1}{g}$. Для бесконечного аргумента вместо меньшей окрестности выбирают больший порог. ■

Теорема 19.4 (Две ограничивающие функции). *Если достаточно близко к точке $u(x) \le f(x) \le v(x)$ и $u(x) \to L$, $v(x) \to L$, то $f(x) \to L$.*

Доказательство. Для любой погрешности обе ограничивающие функции в некоторой общей окрестности лежат между $L - \varepsilon$ и $L + \varepsilon$. Между теми же границами лежит и f, что и требуется по определению. ■

Например, если $|b(x)| \le 1$, то $-x^2 \le x^2 b(x) \le x^2$, поэтому $x^2 b(x) \to 0$ при $x \to 0$. Для рациональной функции при бесконечном аргументе удобно делить числитель и знаменатель на старшую степень аргумента:

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{3x^2 - x + 2}{2x^2 + 1} = \lim_{x \to +\infty} \frac{3 - \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}}{2 + \frac{1}{x^2}} = \frac{3}{2}.$$

Здесь предельный знаменатель ненулевой. Подстановка в исходную запись, когда получается $\frac{0}{0}$, ещё не вычисляет предел.

Теорема 19.5 (Два полезных предельных преобразования). *Для $n \ge 2$ и действительного a*

$$\lim_{x \to a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = n a^{n-1}.$$

При $a > 0$

$$\lim_{x \to a} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{x - a} = \frac{1}{2\sqrt{a}}.$$

Доказательство. В первом случае при $x \ne a$ частное равно $x^{n-1} + x^{n-2}a + \dots + a^{n-1}$: умножение на $x - a$ сокращает соседние слагаемые. Предел каждого из n слагаемых равен a^{n-1} по арифметике пределов и непосредственному пределу $x \to a$. Во втором случае домножение на сопряжённое даёт $\frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{a}}$. Для $u, v \ge 0$ имеем $|u - v| \le u + v$, поэтому $|u - v|^2 \le |u - v|(u + v) = |u^2 - v^2|$. При $u = \sqrt{x}$, $v = \sqrt{a}$ получаем $|\sqrt{x} - \sqrt{a}|^2 \le |x - a|$; значит, $\sqrt{x} \to \sqrt{a}$. Предельный знаменатель равен $2\sqrt{a} > 0$, поэтому применимо правило частного. Производные для этих доказательств не использовались. ■

Непрерывность

Определение 19.6. Функция $f : D \to \mathbb{R}$ непрерывна в точке (continuous at a point) $a \in D$, если для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$, такое что при $x \in D$, $|x - a| < \delta$, выполнено $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$. В точке накопления это равносильно $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$. На конце промежутка проверяют подход внутри области определения.

Устранимый разрыв (removable discontinuity) возникает, когда конечный предел есть, но значение отсутствует или отличается от него. В примере $\frac{x^2 - 4}{x - 2}$ разрыв устраняется назначением значения 4 в точке 2. Если конечные односторонние пределы различны, получают скачок (jump discontinuity); одним новым значением его не устранить.

Теорема 19.6 (Непрерывные преобразования). *Сумма и произведение непрерывных в точке функций непрерывны в ней; частное непрерывно, ес-*

ли знаменатель в точке ненулевой. Если g непрерывна в a, а f непрерывна в $g(a)$, то определённая в окрестности a композиция $f \circ g$ непрерывна в a.

Доказательство. Первые утверждения следуют из арифметики пределов. Для композиции сначала по допустимой ошибке значений f выбираем нужную близость её аргумента к $g(a)$. Затем непрерывность g обеспечивает эту близость при достаточно близком к a аргументе. Последовательное выполнение двух условий даёт определение непрерывности композиции. ■

Многочлены непрерывны на всей прямой; рациональные функции — там, где знаменатель ненулевой. Квадратный корень непрерывен на $[0;+\infty)$ по доказанной оценке. Отсюда можно подставлять аргумент в непрерывные выражения и обосновывать преобразования их пределов. Если f непрерывна в a и $x_n \to a$, где $x_n \in D$, то $f(x_n) \to f(a)$: для данного допуска сначала выбирают радиус из непрерывности, а затем номер, начиная с которого все x_n попадают в этот радиус.

Как проверять точность и обнаруживать разрыв

Докажем, например, что $x^2 \to 1$ при $x \to 1$. Разложение $|x^2-1| = |x-1||x+1|$ оставляет дополнительный множитель. Сначала ограничим аргумент условием $|x-1| < 1$; тогда $0 < x < 2$ и $|x+1| < 3$. Теперь годится



$$\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{3}\right).$$

Первое ограничение удерживает множитель под контролем, второе обеспечивает нужную погрешность. Радиус не обязан быть наибольшим возможным: достаточно обоснованного положительного значения.

Теорема 19.7 (Порядок и предельный переход). *Если достаточно близко к предельной точке выполнено $f(x) \le g(x)$, а конечные пределы равны L и M, то $L \le M$.*

Доказательство. Предположим $L > M$ и возьмём $\varepsilon = \frac{L-M}{3}$. Достаточно близко к точке одновременно выполнено $f(x) > L - \varepsilon$ и $g(x) < M + \varepsilon$. Но $L - \varepsilon > M + \varepsilon$, поэтому получилось бы $f(x) > g(x)$, вопреки условию. ■

Строгое неравенство при предельном переходе может стать нестрогим: при $x \neq 0$ имеем $x^2 > 0$, но предел равен нулю. Аналогично, из положительности функции около точки не следует положительность её предела.


Чтобы опровергнуть предполагаемый предел L, нужно найти один положительный допуск, для которого никакой радиус не работает. Точное отрицание определения имеет вид

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \quad \forall \delta > 0 \quad \exists x \in D : \quad 0 < |x - a| < \delta, \qquad |f(x) - L| \geq \varepsilon_0.$$

Для скачка удобно сначала вычислить два односторонних предела: их различие уже опровергает существование любого двустороннего конечного предела. Несколько точек таблицы или рисунка помогают предположить ответ, но определение требует контроля всех аргументов, достаточно близких к точке.

Перед подстановкой полезно проверить три вещи: определено ли выражение возле нужной точки, не обращается ли предельный знаменатель в ноль и действует ли используемое правило на рассматриваемой стороне области определения. В точке склейки двух формул левый и правый пределы считают отдельно, а затем сравнивают с назначенным значением функции. Такой порядок позволяет отличить устранимый пропуск от скачка и от неограниченного роста.

Графики



Пределы, значение в точке и непрерывность

Задачи

19.1. Расшифруй условие $\lim_{x\to a} f(x) = L$: что выбирают сначала — ε или δ? Может ли δ зависеть от отдельного проверяемого x?

19.2. Найди $\lim_{x\to 2}(3x - 2)$ и укажи подходящее δ для допуска $\varepsilon = 0{,}06$.

19.3. Вычисли $\lim_{x\to -1}(x^2 - 2x)$. Объясни, какое свойство разрешает подстановку.

19.4. Вычисли $\lim_{x\to 3} \dfrac{x^2 - 9}{x - 3}$. Укажи, почему сокращение законно при вычислении предела.

19.5. Вычисли $\lim_{x\to 4} \dfrac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$.

19.6. Пусть $f(0) = 8$, а при $x \neq 0$ задано $f(x) = 2x + 1$. Найди $f(0)$, $\lim_{x \to 0} f(x)$ и реши, непрерывна ли функция в нуле.

19.7. Найди левый и правый пределы $\dfrac{|x|}{x}$ при $x \to 0$. Существует ли двусторонний предел?

19.8. При $x < 1$ функция равна $x + 2$, а при $x \geq 1$ равна $2x + 1$. Проверь непрерывность в точке 1.

19.9. Опиши пределы $\dfrac{1}{x^2}$ и $\dfrac{1}{x}$ при приближении к нулю с каждой стороны.

19.10. Вычисли $\lim_{x \to +\infty} \dfrac{3x^2 - x + 2}{2x^2 + 1}$.

19.11. Функция b задана при $x \neq 0$ и удовлетворяет $|b(x)| \leq 1$. Найди $\lim_{x \to 0} x^2 b(x)$, не предполагая существования предела у самой b.

19.12. Найди область определения $f(x) = \dfrac{\sqrt{x + 2}}{x - 1}$. На какой части этой области функция непрерывна?



19.13. При $x \neq 2$ задано $f(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$. Как назначить $f(2)$, чтобы функция стала непрерывной?

19.14. Датчик в учебной модели показывает $T(t) = 18 + 4t$ градусов, время измеряется в минутах. Найди показание при приближении к $t = 2$. Какой допуск $|t - 2| < \delta$ гарантирует ошибку меньше $0{,}2$ градуса?

19.15. Изготовление n изделий в модели стоит $1500 + 30n$ рублей, $n \in \mathbb{N}$. К чему стремится средняя стоимость одного изделия при $n \to \infty$?

19.16. Объём воды в баке описан моделью $V(t) = \max(0, 20 - 2t)$ литров, $t \geq 0$ минут. Найди пределы при $t \to 10-$ и $t \to 10+$. Непрерывен ли объём в момент опустошения?

19.17. В учебном тарифе сеанс продолжительностью $0 < t \leq 10$ минут стоит 100 рублей, а при $t > 10$ — 150 рублей. Найди односторонние пределы цены при $t \to 10$ и опиши разрыв.

19.18. В модели охлаждения $T(t) = 20 + \dfrac{60}{t + 1}$, $t \geq 0$ минут. Найди предельную температуру. Через сколько целых минут ошибка относительно неё впервые станет меньше $0{,}1$ градуса?

19.19. Докажи непосредственно по определению, что $\lim_{x \to 3} 2x = 6$, предложив δ для любого $\varepsilon > 0$.

19.20. Докажи: если $f(x) \to L$, то $|f(x)| \to |L|$.

19.21. Докажи: если $f(x) \to L > 0$ при $x \to a$, то $f(x) > 0$ для всех допустимых $x \neq a$, достаточно близких к a.

19.22.* При $x \neq 1$ задано $f(x) = \dfrac{x^2 + ax + b}{x - 1}$, а $f(1) = c$. Найди все a, b, c, при которых функция непрерывна в 1 и $f(1) = 4$.

19.23.* Вычисли $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sqrt{1 + 3x} - \sqrt{1 + x}}{x}$, указав, почему выражения под корнями допустимы около нуля.

19.24.* Вычисли $\lim_{x \to +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x)$.

19.25.* Докажи по определению, что $\lim_{x \to 3} x^2 = 9$. Обоснуй выбор $\delta = \min(1, \dfrac{\varepsilon}{7})$.

19.26.* Покажи, что из $f(x) \to 0$ и $g(x) \to 0$ нельзя определить предел $\dfrac{f(x)}{g(x)}$. Приведи три пары при $x \to 0$, для которых пределы частного равны соответственно 0, 1, $+\infty$.

ГЛАВА 20

Производная и линейное приближение

От средней скорости к мгновенной



Если известны два показания координаты движущегося тела, можно найти среднюю скорость изменения координаты: разделить её изменение на прошедшее время. При длинном промежутке времени такая средняя скрывает подробности движения. Для описания отдельного момента рассматривают всё более короткие промежутки около него и выясняют, к какому числу приближаются средние скорости. Это та же идея предела, теперь применённая к специально составленному отношению. Она пригодна не только для движения: так можно описывать изменение площади при изменении стороны и изменение затрат при небольшом увеличении объёма производства.

Геометрически два значения функции задают две точки графика. Проходящая через них прямая показывает средний наклон между этими точками. Когда вторая точка приближается к первой, такой наклон иногда имеет конечный предел. Тогда появляется прямая, передающая поведение графика вблизи одной точки. При этом приближается именно отношение изменений: малость числителя и знаменателя по отдельности ещё не определяет результат деления.

Определение 20.1. Приращение аргумента (increment of the argument) в точке a — число h, задающее новый аргумент $a + h$. Соответствующее приращение функции (increment of the function) равно $f(a + h) - f(a)$.

Определение 20.2. Секущая (secant line) через различные точки графика с аргументами a и $a + h$, где $h \neq 0$, имеет угловой коэффициент

$$\frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

Определение 20.3. Производная в точке (derivative at a point) a — конечный предел

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$

если он существует. Здесь функция определена в некотором открытом промежутке около a. Тогда функцию называют дифференцируемой (differentiable) в a. Проверка только одного знака приращения даёт одностороннюю производную, а не полную проверку этого определения.

Определение 20.4. Если $f'(a)$ существует, касательная (tangent line) к графику в точке $(a; f(a))$ задаётся формулой

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

Пример. При $f(x) = x^2$ разностное отношение равно

$$\frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = 2a + h \quad (h \neq 0).$$

Следовательно, $f'(a) = 2a$. В точке $a = 1$ касательная имеет уравнение $y = 1 + 2(x-1) = 2x - 1$. Приращение h бывает и отрицательным: предел с обеих сторон один и тот же.

Когда производная существует

Теорема 20.1 (Дифференцируемость и непрерывность). *Если функция дифференцируема в a, то она непрерывна в a.*

Доказательство. При $h \neq 0$ имеем

$$f(a+h) - f(a) = h \cdot \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Первый множитель стремится к нулю, второй — к конечному $f'(a)$. По правилу произведения приращение функции стремится к нулю, что и означает непрерывность. ■

Обратное утверждение неверно. Для $f(x) = |x|$ в нуле разностное отношение равно $\frac{|h|}{h}$: справа оно равно 1, слева -1. Функция непрерывна, но производной в нуле нет. Для корня в начале его области определения правое отношение $\frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}}$ при $h > 0$ неограниченно растёт. Оно также не даёт конечной производной.

Первые формулы из определения

Теорема 20.2 (Простейшие производные). *Производная постоянной функции равна нулю, а производная $f(x) = x$ равна единице. Для натурального $n \geq 2$*

$$(x^n)' = nx^{n-1}.$$

При $x > 0$ выполнено $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Доказательство. У постоянной числитель разностного отношения нулевой. Для $f(x) = x$ отношение равно 1. Для степени применим доказанный в предыдущей главе предел $\frac{x^n - a^n}{x - a}$ при $x \to a$: замена $x = a + h$ даёт определение производной в a. Для корня при $a > 0$ домножение на сопряжённое даёт

$$\frac{\sqrt{a+h} - \sqrt{a}}{h} = \frac{1}{\sqrt{a+h} + \sqrt{a}} \to \frac{1}{2\sqrt{a}}.$$

Оба последних вычисления опираются на арифметику пределов, а не на готовую таблицу. ■

Например, $(x^3)' = 3x^2$, $(x^5)' = 5x^4$. В обозначении $f'(x)$ аргумент x пробегает точки, в которых производная существует; так получается новая функция. Запись $f'(a)$ обозначает её значение в выбранной точке.

Алгебра производных

Теорема 20.3 (Сумма, произведение и частное). *Пусть f и g дифференцируемы в a, а α, β — действительные постоянные. Тогда*

$$(\alpha f + \beta g)'(a) = \alpha f'(a) + \beta g'(a),$$

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a).$$

Если $g(a) \neq 0$, то в некоторой окрестности частное определено и

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}.$$



Доказательство. Для линейной комбинации разностное отношение распадается на линейную комбинацию двух разностных отношений; используем правило суммы пределов. Для произведения прибавим и вычтем $f(a)g(a+h)$. После деления на $h \neq 0$ получаем

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h}\,g(a+h) + f(a)\,\frac{g(a+h)-g(a)}{h}.$$

Непрерывность g, следующая из её дифференцируемости, разрешает предельный переход и даёт формулу произведения. Если $g(a) \neq 0$, её непрерывность обеспечивает ненулевой знаменатель возле a. Для функции $\frac{1}{g}$ отношение приращений равно

$$-\frac{g(a+h)-g(a)}{h\,g(a+h)g(a)} \to -\frac{g'(a)}{g(a)^2}.$$

Применив правило произведения к f и $\frac{1}{g}$, получаем правило частного. ■

Умножение функций отличается от умножения их производных. Например, производная $x \cdot x$ равна $2x$, хотя произведение двух производных равно 1. Для частного важно проверять знаменатель до преобразований: в исключённой точке исходная функция не становится определённой оттого, что её запись удалось сократить.

Пример. Для $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$, $x \neq 2$,

$$f'(x) = \frac{(x-2)-(x+1)}{(x-2)^2} = -\frac{3}{(x-2)^2}.$$

Здесь обе исходные производные равны единице, но производная частного вовсе не равна их частному.

Сложная функция



Правило цепочки позволяет вычислять производную композиции, не раскрывая её в длинное выражение. Внешнюю и внутреннюю функции нужно определить до вычислений. Например, в $(3x^2-1)^4$ внешняя функция возводит число в четвёртую степень, а внутренняя даёт $3x^2-1$. Производная внутреннего выражения остаётся отдельным множителем. Правило работает и тогда, когда внутреннее приращение равно нулю для некоторых малых шагов: это специально учтено в следующем доказательстве.

Теорема 20.4 (Правило цепочки; chain rule). *Пусть g дифференцируема в a, $b=g(a)$, а f дифференцируема в b. Предполагается, что композиция определена в окрестности a. Тогда*

$$(f\circ g)'(a)=f'(g(a))g'(a).$$

Доказательство. Обозначим $A=g'(a)$, $B=f'(b)$. Определение производной позволяет записать

$$g(a+h)-b=h(A+\alpha(h)),\qquad \alpha(h)\to 0,$$

$$f(b+k)-f(b)=k(B+\beta(k)),\qquad \beta(k)\to 0.$$

При ненулевых приращениях функции α и β равны ошибкам соответствующих разностных отношений. Положим $\beta(0)=0$, тогда второе равенство верно и при $k=0$, а β непрерывна в нуле. Подставим $k=g(a+h)-b$. Непрерывность g даёт $k\to 0$, а непрерывность β — $\beta(k)\to 0$. Отношение приращения композиции к h равно $(A+\alpha(h))(B+\beta(k))$ и стремится к AB. Это рассуждение включает случай, когда внутреннее приращение иногда равно нулю; делить на него не требуется. ■

Например,

$$\bigl((3x^2-1)^4\bigr)'=4(3x^2-1)^3\cdot 6x=24x(3x^2-1)^3.$$

Сначала дифференцируется внешняя четвёртая степень, затем результат умножается на производную внутреннего выражения. Для $\sqrt{2x+3}$ получаем $\frac{1}{\sqrt{2x+3}}$ при $x>-\frac{3}{2}$; на границе этого промежутка приведённое вычисление не применяется.

Следующая короткая таблица содержит только уже обоснованные случаи. В строках с n число n натуральное.

Функция	Производная	Условие
c	0	$x \in \mathbb{R}$
x	1	$x \in \mathbb{R}$
x^n	nx^{n-1}	$n \geq 2,\ x \in \mathbb{R}$
$\frac{1}{x^n}$	$-\frac{n}{x^{n+1}}$	$x \neq 0$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$x > 0$

Для отрицательных целых степеней строка получается из правила частного. Производная любого многочлена теперь вычисляется по слагаемым, рациональной функции — по правилу частного, а композиции этих выражений — по правилу цепочки с проверкой области определения.

Линейное приближение и его ошибка

Касательная полезна не только как линия на рисунке. Её формула заменяет сложную зависимость простой линейной зависимостью вблизи выбранной точки. Сначала нужно выбрать точку, где значение функции и производную легко вычислить. Затем находят небольшое приращение аргумента и умножают его на производную. Полученная поправка прибавляется к известному значению функции. Чем именно оправдано такое вычисление, показывает определение производной: после вычитания линейной поправки остаётся ошибка, которая при уменьшении приращения становится малой даже по сравнению с самим приращением.

Это локальное утверждение: оно относится к достаточно близким аргументам около фиксированной точки. Само определение не выдаёт готового численного допуска для любого выбранного шага. Для гарантированной оценки ошибки нужно дополнительно оценить остаток у конкретной функции. Полезно также сохранять единицы измерения: производная показывает изменение результата на единицу изменения аргумента, поэтому произведение производной на приращение имеет те же единицы, что и значение функции.

Определение 20.5. Линейное приближение (linear approximation) дифференцируемой функции возле a — выражение $f(a) + f'(a)h$ для оценки $f(a+h)$, где h мало по модулю. Запись $f(a+h) \approx f(a) + f'(a)h$ обозначает приближение, а не точное равенство.

Теорема 20.5 (Точный смысл линейного приближения). *Если f дифференцируема в a, то*

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + r(h), \qquad \lim_{h\to 0} \frac{r(h)}{h} = 0.$$

Доказательство. Положим $r(h) = f(a+h) - f(a) - f'(a)h$. При $h \neq 0$ частное $\frac{r(h)}{h}$ равно разностному отношению функции минус его предел $f'(a)$, поэтому стремится к нулю. Это также означает $\frac{|r(h)|}{|h|} \to 0$. ■

У корня удобно взять $a = 4$: значение равно 2, производная — $\frac{1}{4}$. Поэтому

$$\sqrt{4+h} \approx 2 + \frac{h}{4}, \qquad \sqrt{4{,}04} \approx 2{,}01.$$

Для квадрата точный остаток особенно прост: $(a+h)^2 = a^2 + 2ah + h^2$. Ошибка линейного приближения равна h^2, а её отношение к $|h|$ равно $|h|$ и стремится к нулю.

Скорость, затраты и проверка экстремума

Если $s(t)$ — координата в метрах, а t измеряется в секундах, то $s'(t)$ — мгновенная скорость изменения координаты (instantaneous velocity) в метрах в секунду. Знак показывает направление движения вдоль выбранной оси; модуль даёт величину скорости. Если $C(q)$ — затраты в рублях при непрерывно изменяемом объёме q, то $C'(q)$ описывает малое изменение затрат на единицу изменения объёма. Для целого числа изделий такое использование производной даёт оценку модели, которую можно сравнить с точной разностью $C(q+1) - C(q)$.

Определение 20.6. Точка a является точкой локального минимума (local minimum), если в некоторой её окрестности все допустимые значения $f(x)$ не меньше $f(a)$. Для локального максимума (local maximum) они не больше $f(a)$. Оба случая называют локальным экстремумом (local extremum).

Теорема 20.6 (Ферма; Fermat's theorem). *Если a — внутренняя точка области определения, функция дифференцируема в a и имеет в ней локальный экстремум, то $f'(a) = 0$.*



Доказательство. В случае минимума при малых $h > 0$ отношение $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ неотрицательно, а при малых $h < 0$ неположительно. По предельному переходу в неравенствах общий предел одновременно неотрицателен и неположителен, значит, равен нулю. Для максимума знаки меняются местами, а вывод остаётся тем же. ■

Стационарная точка (stationary point) — внутренняя точка, в которой производная существует и равна нулю. К критическим точкам (critical points) здесь относят стационарные точки и внутренние точки области определения, в которых производной нет. Теорема Ферма задаёт необходимое условие для дифференцируемого экстремума, но не достаточное: у x^3 в нуле производная нулевая, а значения слева отрицательны, справа положительны, поэтому экстремума нет.

В этой главе монотонность конкретной функции проверяем сравнением значений, а экстремум — прямой оценкой. Например, если $0 \le x < y$, то $y^2 - x^2 = (y-x)(y+x) > 0$; значит, квадрат строго возрастает на $[0;+\infty)$. При $x < y \le 0$ та же разность отрицательна, поэтому квадрат строго убывает на $(-\infty;0]$. Для функции $P(q) = 300 - (q-20)^2$ сразу получаем $P(q) \le 300$ с равенством только при $q = 20$. Так проверяется максимум, предложенный уравнением $P'(q) = 0$.

При поиске наибольшего значения на заданном отрезке нужно учитывать и концы: у $f(x) = x$ на $[0;1]$ наибольшее значение равно 1, хотя производная нигде не нулевая. В точке 0 функция $|x|$ имеет минимум без производной. Поэтому вывод о конкретном экстремуме должен сопровождаться проверкой значений или оценкой, действительной в нужной области.

Применение правил к новым функциям


Пользуясь табличными производными синуса, косинуса и экспоненты вместе с доказанным правилом частного, получаем

$$(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x} \quad (\sin x \neq 0),$$

$$(\operatorname{th} x)' = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}, \qquad (\operatorname{cth} x)' = -\frac{1}{\operatorname{sh}^2 x} \quad (x \neq 0).$$

Например, числитель производной $\frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}$ равен $\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$. Для гиперболического котангенса порядок меняется, и числитель равен -1. Полная таблица находится в начале книги; правила получения новых производных изучаются здесь.

Графики



Производная как предел наклонов и линейное приближение

Задачи

20.1. Для $f(x) = x^2$ вычисли $f'(3)$ непосредственно по определению производной.

20.2. Для $f(x) = x^3$ вычисли $f'(-2)$, раскрыв куб в разностном отношении.

20.3. Найди производную $5x^4 - 3x^2 + 7$.

20.4. Найди производную $(2x+1)(x^2-3)$ по правилу произведения и проверь раскрытием скобок.

20.5. Найди производную $f(x) = \dfrac{x+1}{x-2}$ и укажи её область определения.

20.6. Найди производную $\sqrt{x}$ в точке 9 по определению, используя сопряжённое выражение.

20.7. Найди производную $(3x^2-1)^4$. Укажи внешнюю и внутреннюю функции.

20.8. Найди производную $\sqrt{2x+3}$ во внутренних точках области определения.

20.9. Запиши уравнение касательной к графику $y = x^3$ в точке с аргументом 1.

20.10. Проверь существование производной $f(x) = |x|$ в точке 0, вычислив разностное отношение с двух сторон.

20.11. Найди стационарные точки $f(x) = x^3 - 3x$. Проверь наличие локальных экстремумов прямой факторизацией $f(x) - f(a)$ в каждой найденной точке.

20.12. Докажи прямым сравнением значений, что x^3 строго возрастает на всей прямой. Объясни, почему $f'(0) = 0$ этому не мешает.



20.13. Координата тела задана $s(t) = t^3 - 6t^2 + 12t$ метров при $t \geq 0$ секунд. Найди мгновенную скорость изменения координаты при $t = 1$ и $t = 2$.

20.14. В непрерывной модели затраты равны $C(q) = 100 + 5q + 0{,}02q^2$ рублей. При $q = 50$ оцени приращение затрат на одно дополнительное изделие через производную и сравни с точной разностью.

20.15. Сторону квадратной площадки увеличивают с 10 до $10{,}02$ метра. Оцени прирост площади линейным приближением и найди его точное значение.

20.16. Длина натянутого троса в модели равна $L(x) = \sqrt{x^2 + 9}$ метров. При $x = 4$ метра оцени изменение длины, если горизонтальный отступ увеличится на $0{,}1$ метра.

20.17. Модель прибыли $P(q) = -q^2 + 40q - 100$ задана при $0 \leq q \leq 30$. Найди точку, предлагаемую уравнением $P'(q) = 0$, и докажи, что в ней прибыль наибольшая, выделив полный квадрат.

20.18. Оцени $\sqrt{16{,}08}$ линейным приближением функции $\sqrt{x}$ возле 16.

20.19. Докажи непосредственно по определению, что производная постоянной функции $f(x) = c$ равна нулю.

20.20. Докажи: если в точке a существует конечная производная, то $f(a+h) - f(a) \to 0$ при $h \to 0$.

20.21. Пусть функция чётная на открытом промежутке около 0 и дифференцируема в 0. Докажи, что $f'(0) = 0$.

20.22.* Функция равна x^2 при $x \geq 0$ и $ax + b$ при $x < 0$. Найди все a, b, при которых она дифференцируема в нуле.

20.23.* Пусть $f(x) = x|x|$. Найди производную во всех точках, включая 0. Является ли ноль локальным экстремумом?

20.24.* Для $f(x) = x + \dfrac{16}{x}$, $x > 0$, найди стационарную точку. Докажи прямой оценкой, что она даёт наименьшее значение на всей области определения.

20.25.* Докажи точную формулу $2 + \dfrac{h}{4} - \sqrt{4+h} = \dfrac{h^2}{4(\sqrt{4+h}+2)^2}$ при $h > -4$. Получи при $0 \leq h \leq 1$ оценку ошибки между 0 и $\dfrac{h^2}{64}$.

20.26.* Найди многочлен $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, касательная к которому при $x = 0$ равна $y = 1 - 2x$, а при $x = 1$ равна $y = 4x - 1$.

20.27. Найди производную $(2x^2 + 1)^5$.

20.28. Найди производную $\operatorname{ctg}(3x)$ и укажи область определения.

20.29. Найди производную $\operatorname{th}(x^2)$.

20.30. Найди производную $\operatorname{cth}(2x + 1)$.

20.31. Для $f(x) = \dfrac{x^2 + 1}{x - 1}$ найди $f'(x)$ двумя способами: правилом частного и после деления многочленов.

20.32.* Докажи формулу $(f(g(h(x))))' = f'(g(h(x)))g'(h(x))h'(x)$ при дифференцируемости всех трёх функций в нужных точках.

ГЛАВА 21

Остатки, сравнения и целочисленные уравнения

Что сохраняется, когда полные обороты отброшены

На часах после двенадцати снова появляется один, а дни недели повторяются через семь дней. Вместо огромного числа удобно хранить его остаток. Это не приближённое вычисление: при фиксированном модуле остаток точно описывает, какие числа отличаются на целое число полных циклов.

Определение 21.1. Деление с остатком (division with remainder) целого a на натуральное $m > 0$ — представление $a = mq + r$, где $q \in \mathbb{Z}$ — неполное частное (quotient), а $r \in \mathbb{Z}$, $0 \le r < m$, — остаток (remainder).

Например, $47 = 5 \cdot 9 + 2$, а $-47 = 5 \cdot (-10) + 3$. Остаток по принятому определению не бывает отрицательным. Поэтому $-47 = 5 \cdot (-9) - 2$ не является делением с остатком.

Теорема 21.1 (Существование и единственность остатка)**.** *При любом целом a и натуральном $m > 0$ существуют единственные целые q, r, для которых $a = mq + r$ и $0 \le r < m$.*



Доказательство. Среди чисел $a - mq$, где $q \in \mathbb{Z}$, есть неотрицательные: достаточно взять $q = -|a|$. Выберем среди них наименьшее r. Здесь используется принцип наименьшего элемента: непустое подмножество $\mathbb{N}_0$ имеет наименьший элемент. Он следует из индукции: если бы множество не имело наименьшего элемента, последовательно доказывалось бы, что в нём нет ни 0, ни 1, ни любого следующего числа. Если $r \geq m$, то $r - m = a - m(q+1)$ — меньший неотрицательный кандидат, противоречие. Значит, $r < m$. Если также $a = mq' + r'$, то $m(q - q') = r' - r$. Правая часть по модулю меньше m; единственное кратное m с таким свойством — ноль. Поэтому $r = r'$ и $q = q'$. ■

Сравнения по модулю

Определение 21.2. Целые a, b сравнимы по модулю (congruent modulo) натурального $m > 0$, если $m \mid (a - b)$. Запись: $a \equiv b \pmod{m}$. Число m называют модулем сравнения (modulus).

Сравнимость означает совпадение остатков. Например, $22 \equiv 4 \pmod{6}$, $-2 \equiv 4 \pmod{6}$. Запись $22 \equiv 4 \pmod{6}$ не утверждает обычное равенство $22 = 4$. Модуль должен быть указан: 22 и 4 сравнимы по модулю 6, но не по модулю 5.

Теорема 21.2 (Арифметика сравнений). *Если* $a \equiv b \pmod{m}$ *и* $c \equiv d \pmod{m}$, *то*

$$a + c \equiv b + d \pmod{m}, \qquad a - c \equiv b - d \pmod{m}, \qquad ac \equiv bd \pmod{m}.$$

В частности, $a^n \equiv b^n \pmod{m}$ *для любого* $n \in \mathbb{N}$.

Доказательство. Пусть $a - b = mu$, $c - d = mv$ с целыми u, v. Разность сумм равна $m(u + v)$, разность разностей — $m(u - v)$. Для произведения

$$ac - bd = (a - b)c + b(c - d) = m(uc + bv).$$

Все разности делятся на m. Утверждение о натуральных степенях следует последовательным применением правила произведения, то есть индукцией по n. ■

Пример: $10 \equiv 1 \pmod 9$, поэтому $10^{100} + 2 \equiv 3 \pmod 9$. Для вычисления последней цифры выбирают модуль 10; для дня недели — 7. До возведения в большую степень полезно выписать несколько первых остатков и заметить цикл, затем обосновать его повторение умножением на одно и то же число.

Определение 21.3. Класс вычетов (residue class) числа a по модулю m — множество $[a]_m = \{a + mk : k \in \mathbb{Z}\}$. Множество всех классов обозначают $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. При $m \geq 2$ оно состоит ровно из m классов $[0]_m, \dots, [m-1]_m$.

Числа a и $a + m$ различны, но задают один класс. По предыдущей теореме правила $[a]_m + [b]_m = [a+b]_m$ и $[a]_m[b]_m = [ab]_m$ не зависят от выбора представителей. Это первый пример нового множества, на котором можно определить знакомые действия. В следующей главе мы сравним его свойства со свойствами целых и рациональных чисел.

Тождество Безу и обратный проход алгоритма Евклида

Определение 21.4. Целочисленная линейная комбинация (integer linear combination) целых a, b — число вида $au + bv$, где $u, v \in \mathbb{Z}$. Равенство $\gcd(a,b) = au + bv$ называют тождеством Безу (Bézout's identity). Это другое утверждение, чем теорема Безу о корне многочлена из главы 11.

Теорема 21.3 (Безу для целых чисел). *Если a, b — целые, не равные нулю одновременно, то существуют целые u, v с $au + bv = \gcd(|a|, |b|)$. Здесь $\gcd(n, 0) = n$ при $n > 0$.*



Доказательство. Для положительных $|a|, |b|$ алгоритм Евклида последовательно делит с остатком. Каждый новый остаток равен предыдущему делимому минус целое кратное делителя. Поэтому первый остаток выражается через $|a|, |b|$, следующий — тоже, и по индукции каждый остаток является их целочисленной линейной комбинацией. Последний ненулевой остаток — НОД, поскольку при замене пары (A, B) на $(B, A - qB)$ множество общих делителей не меняется. Знаки исходных a, b учитываются изменением знаков коэффициентов. Если одно число равно нулю, достаточно взять коэффициент при другом равным 1 или -1. ■

Пример обратной подстановки:

$$252 = 198 + 54, \quad 198 = 3 \cdot 54 + 36, \quad 54 = 36 + 18, \quad 36 = 2 \cdot 18.$$

Отсюда $18 = 54 - 36 = 54 - (198 - 3 \cdot 54) = 4 \cdot 54 - 198 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198$. Деления находят НОД; обратная подстановка одновременно находит коэффициенты Безу. Такой способ называют расширенным алгоритмом Евклида (extended Euclidean algorithm).

Когда по модулю можно делить

Определение 21.5. Целое u — обратное к a по модулю m (modular multiplicative inverse), если $au \equiv 1 \pmod{m}$, где $m \geq 2$. Обратный класс, если он существует, единственен; разные целые представители отличаются на кратное m.

Теорема 21.4 (Критерий обратимости). *При $m \geq 2$ число a имеет обратное по модулю m тогда и только тогда, когда* $\gcd(|a|, m) = 1$.

Доказательство. Если $au \equiv 1 \pmod{m}$, то $au - mv = 1$ для некоторого целого v. Любой общий делитель a, m делит левую часть, а значит, и 1; НОД равен 1. Обратно, при НОД 1 тождество Безу даёт $au + mv = 1$, откуда $au \equiv 1 \pmod{m}$. Если u и w оба обратны, то $u \equiv u(aw) = (ua)w \equiv w \pmod{m}$. Здесь применены только умножение и правила сравнений. ■

Например, $3 \cdot 5 = 15 \equiv 1 \pmod{7}$. Поэтому $3x \equiv 4 \pmod{7}$ можно умножить на 5, получив $x \equiv 6 \pmod{7}$. У числа 6 нет обратного по модулю 9, поскольку НОД равен 3.

Теорема 21.5 (Сокращение сравнения). *Если $ac \equiv bc \pmod{m}$ и* $\gcd(|c|, m) = 1$, *то $a \equiv b \pmod{m}$.*

Доказательство. При $m = 1$ все целые числа сравнимы, и вывод очевиден. Пусть далее $m \geq 2$. Умножим сравнение на обратное к c по модулю m, существующее по критерию. Получим $a(cu) \equiv b(cu)$, а $cu \equiv 1$; значит, $a \equiv b$. ■

Без условия на НОД сокращение может изменить множество решений. Из $2x \equiv 2 \pmod{6}$ следует $x \equiv 1 \pmod{3}$; в классах по модулю 6 это два ответа, $x \equiv 1$ и $x \equiv 4$. Оставить только $x \equiv 1 \pmod{6}$ означало бы потерять половину решений.

Уравнения в целых числах

Определение 21.6. Линейное диофантово уравнение (linear Diophantine equation) с двумя неизвестными имеет вид $ax+by=c$, где коэффициенты целые и требуется найти все целочисленные пары (x,y).

Теорема 21.6 (Решения линейного диофантова уравнения). *Пусть a,b не равны нулю одновременно и $d=\gcd(|a|,|b|)$. Уравнение $ax+by=c$ разрешимо в целых числах тогда и только тогда, когда $d\mid c$. Если (x_0,y_0) — одно решение, то все решения задаются формулами*

$$x=x_0+\frac{b}{d}\,t,\qquad y=y_0-\frac{a}{d}\,t,\qquad t\in\mathbb{Z}.$$



Доказательство. Любая комбинация $ax+by$ делится на d, поэтому условие необходимо. Если $c=dk$, умножение тождества Безу на k даёт решение. Для описания всех решений сначала пусть $a,b\neq 0$. Вычитание двух уравнений даёт $(a/d)(x-x_0)=-(b/d)(y-y_0)$. Выполнено $\gcd(|a|/d,|b|/d)=1$. Из тождества Безу следует: если $v\neq 0$, $\gcd(|u|,|v|)=1$ и $v\mid uz$, то $v\mid z$. Поэтому $x-x_0=(b/d)t$, а подстановка даёт $y-y_0=-(a/d)t$. Обратная подстановка проверяет все такие пары. Если один коэффициент нулевой, неизвестная при нём свободна, а другая фиксирована; те же формулы перечисляют все решения, поскольку ненулевое отношение коэффициента к d равно 1 или -1. ■

Например, $14\cdot 2+21\cdot(-1)=7$. Все целые решения $14x+21y=7$ имеют вид $x=2+3t$, $y=-1-2t$. Если по смыслу задачи нужны неотрицательные количества, ограничения $x\ge 0$, $y\ge 0$ накладывают *после* нахождения общих целочисленных решений.

Задачи

21.1. Раздели 47 на 5 с остатком; укажи q,r.

21.2. Раздели -47 на 5 с неотрицательным остатком.

21.3. Найди остаток -3 при делении на 7.

21.4. Проверь сравнения $22\equiv 4 \pmod 6$ и $22\equiv 5 \pmod 6$.

21.5. Найди остаток $137+284$ по модулю 9, сначала заменив слагаемые их остатками.

21.6. Найди остаток 10^{20} по модулю 9.

21.7. Найди остаток 2^{10} по модулю 7, используя $2^3 \equiv 1 \pmod 7$.

21.8. Определи последнюю десятичную цифру числа 7^{100}.

21.9. На 24-часовых часах сейчас $23{:}00$. Какое время будет через 8 часов?



21.10. Узор повторяет цвета «синий, кремовый, охра, бирюзовый». Первый элемент синий. Какого цвета 31-й элемент?

21.11. Сегодня понедельник. Какой день недели будет через 100 дней?

21.12. Найди наименьшее положительное x, для которого $x \equiv 2 \pmod 3$ и $x \equiv 3 \pmod 5$.

21.13. Алгоритмом Евклида найди $\gcd(252, 198)$ и вырази его целочисленной линейной комбинацией исходных чисел.

21.14. Найди обратный класс к 3 по модулю 7.

21.15. Существует ли обратный к 6 по модулю 9? Обоснуй.

21.16. Реши $3x \equiv 4 \pmod 7$ во всех целых числах.

21.17. Перечисли все классы решений $2x \equiv 2 \pmod 6$ по модулю 6.

21.18. Реши $2x \equiv 1 \pmod 6$.

21.19.* Найди все целочисленные решения $14x + 21y = 7$.

21.20. Имеет ли целочисленные решения уравнение $6x + 10y = 7$?

21.21.* Наборы стоят 12 и 18 условных единиц. Нужно набрать ровно 120, покупая целые неотрицательные количества x, y. Найди все пары количеств.

21.22. Докажи признак делимости на 3 через сравнение $10 \equiv 1 \pmod 3$.

21.23. Докажи, что квадрат целого числа имеет по модулю 4 только остаток 0 или 1.

21.24. Существуют ли целые x, для которых $x^2 \equiv 2 \pmod 4$?

21.25. Докажи, что из $ac \equiv bc \pmod m$ можно сократить c, если $\gcd(|c|, m) = 1$. Дай пример потери решения без этого условия.

21.26.* Найди все классы решений $x^2 \equiv 1 \pmod 8$, обосновав ответ без перебора больших чисел.

21.27.* Найди все неотрицательные целочисленные решения $3x + 5y = 31$.

21.28.* Для любых целых a, b докажи, что система $x \equiv a \pmod 3$, $x \equiv b \pmod 5$ имеет ровно один класс решений по модулю 15. Подсказка: проверь $x = 10a + 6b$.

ГЛАВА 22

Полугруппы, моноиды, группы, кольца и поля

Одинаковые правила в разных множествах

В главе 1 мы перечислили свойства действий с рациональными числами. Теперь можно дать названия наборам этих свойств. Например, сложение целых чисел, сложение векторов и последовательное выполнение сдвигов устроены во многом одинаково: есть нейтральное действие, каждое действие можно отменить, а скобки можно переставлять. Такой общий язык позволяет однажды доказать правило и затем применять его в разных примерах.



Определение 22.1. Бинарная операция (binary operation) на непустом множестве S — отображение $* : S \times S \to S$, сопоставляющее каждой упорядоченной паре элементов единственный элемент $a * b$ того же множества. Требование результата в S называют замкнутостью (closure).

Сложение — операция на $\mathbb{N}_0$, а вычитание — нет: $1 - 2 \notin \mathbb{N}_0$. На $\mathbb{Z}$ вычитание уже замкнуто. Поэтому свойство действия всегда проверяют вместе с множеством, на котором оно задано. Обозначение $*$ не обязательно означает обычное умножение.

Определение 22.2. Операция ассоциативна (associative), если $(a * b) * c = a * (b * c)$ для любых $a, b, c \in S$. Она коммутативна (commutative), если $a * b = b * a$ для любых $a, b \in S$. Элемент $e \in S$ — нейтральный элемент (identity element), если $e * a = a * e = a$ для любого $a \in S$.

Ассоциативность разрешает опускать скобки в произведении нескольких элементов. Коммутативность разрешает переставлять сами элементы; это

другое свойство. При композиции функций порядок обычно важен, даже когда скобки можно менять.

Полугруппа, моноид и группа

Определение 22.3. Полугруппа (semigroup) — непустое множество с ассоциативной бинарной операцией. Моноид (monoid) — полугруппа с нейтральным элементом.

Положительные натуральные числа со сложением образуют полугруппу, но не моноид: нужного нейтрального числа 0 в $\mathbb{N}$ нет. Множество $\mathbb{N}_0$ со сложением — моноид. Все конечные слова над заданным алфавитом с операцией приписывания одного слова к другому тоже образуют моноид; его нейтральный элемент — пустое слово. Приписывание некоммутативно: слова «кот» и «ток» после приписывания дадут разные результаты в разном порядке.

Определение 22.4. В моноиде элемент b — обратный элемент (inverse element) к a, если $a*b = b*a = e$. Группа (group) — моноид, в котором у каждого элемента есть обратный. Абелева группа (abelian group) — группа с коммутативной операцией.

Для сложения нейтральный элемент обычно обозначают 0, обратный к a — $-a$. Для умножения используют 1 и a^{-1}. Это выбор записи: в абстрактной группе знак a^{-1} не обязан означать привычную дробь.

Примеры абелевых групп: $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}^2, +)$; также $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$. Моноид $(\mathbb{N}_0, +)$ не является группой: у 1 нет противоположного внутри $\mathbb{N}_0$. Все рациональные числа с умножением тоже не группа: у нуля нет обратного. По модулю $m \geq 2$ все классы образуют абелеву группу по сложению, причём противоположный к $[a]_m$ равен $[-a]_m$.

Теорема 22.1 (Единственность нейтрального и обратного). *Нейтральный элемент моноида единственен. Обратный элемент к заданному элементу, если он существует, также единственен.*

Доказательство. Если e, f оба нейтральны, то $e * f = f$ по свойству e, но $e * f = e$ по свойству f. Значит, $e = f$. Если b, c обратны к a, то

$$b = b * e = b * (a * c) = (b * a) * c = e * c = c.$$

Равенство посередине использует ассоциативность, а не перестановку элементов. Это важно для некоммутативных групп. ■

Теорема 22.2 (Сокращение и решение уравнения в группе). *В группе из $a * b = a * c$ следует $b = c$, а из $b * a = c * a$ также следует $b = c$. Уравнения $a * x = b$ и $y * a = b$ имеют единственные решения*

$$x = a^{-1} * b, \qquad y = b * a^{-1}.$$

Доказательство. Первое равенство умножим слева на a^{-1}, затем перегруппируем скобки: $(a^{-1} * a) * b = (a^{-1} * a) * c$, то есть $b = c$. Во втором случае умножим справа. Эти же преобразования показывают необходимость формул для x, y, а обратная подстановка подтверждает, что они дают решения. В некоммутативной группе место множителя a^{-1} менять нельзя. ■

Композиции и симметрии

Определение 22.5. Тождественное отображение (identity map) множества X — отображение $\mathrm{id}_X(x) = x$. Перестановка множества (permutation of a set) — биекция $X \to X$. Все перестановки X образуют множество $\mathrm{Sym}(X)$; для $X = \{1, \dots, n\}$ пишут также S_n.

Теорема 22.3 (Группа перестановок). *Множество $\mathrm{Sym}(X)$ является группой относительно композиции. Нейтральный элемент — id_X, обратный к f — обратная биекция f^{-1}.*



Доказательство. Композиция двух биекций — биекция: обратным к $f \circ g$ служит $g^{-1} \circ f^{-1}$, что проверяется подстановкой. Для любых f, g, h и $x \in X$

$$((f \circ g) \circ h)(x) = f(g(h(x))) = (f \circ (g \circ h))(x).$$

Значит, композиция ассоциативна. Тождественное отображение не меняет аргумент, а равенства $f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_X = f \circ f^{-1}$ дают обратные элементы. ■

В записи $f \circ g$ сначала выполняется g, затем f. Для трёх элементов перестановки уже могут не коммутировать. Пусть s меняет местами $1, 2$, а t — $2, 3$. Тогда $(s \circ t)(1) = 2$, но $(t \circ s)(1) = 3$.

Четыре поворота квадрата на углы $0, 90, 180, 270$ градусов образуют группу по последовательному выполнению; сложение углов понимается по моду-

лю 360. Обратный к повороту на 90 градусов — поворот на 270. Если добавить отражения, получится другая группа симметрий, в которой порядок действий уже может менять результат.

Два действия: кольцо

Определение 22.6. Кольцо с единицей (ring with identity; unital ring) в этой главе — множество R с двумя бинарными операциями $+$ и $\cdot$, для которого:

1. $(R, +)$ — абелева группа с нулём 0;
2. умножение ассоциативно и имеет единицу 1;
3. выполнены оба распределительных закона $a(b+c) = ab+ac$, $(a+b)c = ac + bc$;
4. $0 \neq 1$.

Если умножение коммутативно, кольцо называют коммутативным (commutative ring).

Мы явно приняли условие $0 \neq 1$. В литературе словом «кольцо» могут называть также структуры без единицы или допускать кольцо из одного элемента; при чтении всегда уточняй соглашение автора. Обратный по сложению нужен для каждого элемента; обратный по умножению на этом этапе не требуется.

Целые, рациональные и действительные числа с обычными действиями — коммутативные кольца с единицей. Классы $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, $m \geq 2$, тоже образуют такое кольцо: действия над представителями заданы в главе 21, а ассоциативность и распределительность наследуются из целых чисел. В нём $[m]_m = [0]_m$, поэтому привычное число после перехода к классам может стать нулём.

Все матрицы 2×2 с действительными элементами образуют кольцо $\mathrm{M}_2(\mathbb{R})$. Ноль — нулевая матрица, единица — $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Умножение матриц ассоциативно и распределительно, что видно из формулы сумм произведений их элементов: обе расстановки скобок дают сумму $\sum_{k,l} a_{ik} b_{kl} c_{lj}$ в позиции (i, j). При перестановке матриц произведение может измениться: соответствующий пример разбирается в задачах.

Теорема 22.4 (Следствия распределительности). *В любом кольце этой главы выполнены* $a0 = 0a = 0$, $(-a)b = -(ab)$ *и* $(-a)(-b) = ab$.

Доказательство. Из $a(0+0) = a0 + a0$ и $0+0=0$ получаем $a0 = a0 + a0$. Сокращение в аддитивной группе даёт $a0 = 0$. Аналогично $0a = 0$. Далее $ab + (-a)b = (a + (-a))b = 0b = 0$, поэтому $(-a)b$ — противоположный к ab. Аналогично $a(-b) = -(ab)$. Двукратное применение этих равенств даёт $(-a)(-b) = -(-(ab)) = ab$. ■

Определение 22.7. Обратимый элемент кольца (unit; invertible element) — элемент с двусторонним обратным по умножению. Ненулевой a — делитель нуля (zero divisor), если для некоторого ненулевого b выполнено $ab = 0$ или $ba = 0$. Область целостности (integral domain) — коммутативное кольцо с единицей $1 \neq 0$ без делителей нуля.

В $\mathbb{Z}$ обратимы только $1, -1$, но делителей нуля нет. В $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ ненулевые классы $[2]_6$, $[3]_6$ дают нулевое произведение. Поэтому из $[2]_6 x = [2]_6 y$ нельзя всегда заключить $x = y$.

Поле и возможность деления

Определение 22.8. Поле (field) — коммутативное кольцо с единицей $1 \neq 0$, в котором каждый ненулевой элемент обратим по умножению. Иначе говоря, ненулевые элементы поля образуют абелеву группу по умножению.

Числа $\mathbb{Q}$ и $\mathbb{R}$ образуют поля. Целые $\mathbb{Z}$ поля не образуют: у 2 нет целого обратного. Свойства рациональной арифметики из главы 1 теперь получили короткое общее название. Аксиомы поля сами по себе не говорят о порядке или полноте: например, $\mathbb{Q}$ — поле, но в нём нет числа с квадратом 2.

Теорема 22.5 (Нулевое произведение и сокращение в поле). *Если $ab = 0$ в поле, то $a = 0$ или $b = 0$. Если $ac = bc$ и $c \neq 0$, то $a = b$. В частности, каждое поле является областью целостности.*

Доказательство. При $a \neq 0$ умножение $ab = 0$ на a^{-1} даёт $b = 0$. При $a = 0$ первое утверждение уже выполнено. Для сокращения умножим $ac = bc$ на c^{-1} и воспользуемся ассоциативностью. Коммутативность умножения входит в определение поля, поэтому оба свойства применимы ко всем элементам. ■

Теорема 22.6 (Поля вычетов). *Кольцо $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, $m \geq 2$, является полем тогда и только тогда, когда m — простое число. При простом p это поле обозначают $\mathbb{F}_p$.*



Доказательство. Если p простое, каждый ненулевой класс имеет представителя a с $1 \le a < p$. Тогда $\gcd(a, p) = 1$, и по критерию главы 21 существует обратный к a по модулю p. Все остальные аксиомы коммутативного кольца уже выполнены. Если $m = uv$ составное, где $1 < u, v < m$, классы $[u]_m, [v]_m$ ненулевые, а их произведение $[m]_m$ нулевое. В поле это невозможно по предыдущей теореме. Значит, составной модуль поля не даёт. ■

В $\mathbb{F}_5$ можно делить на $[2]_5$, умножая на $[3]_5$. В $\mathbb{F}_2$ выполнено $[1]_2 + [1]_2 = [0]_2$. Это не ошибка обычной арифметики, а арифметика другого множества. Упорядочить это поле так, чтобы одновременно сохранились обычные свойства порядка чисел, невозможно: из положительности 1 следовала бы положительность $1 + 1 = 0$.

Когда две группы устроены одинаково

Определение 22.9. Гомоморфизм групп (group homomorphism) из $(G, *)$ в $(H, \circ)$ — отображение $\varphi : G \to H$, сохраняющее операцию: $\varphi(a * b) = \varphi(a) \circ \varphi(b)$. Биективный гомоморфизм называют изоморфизмом (isomorphism); группы тогда изоморфны (isomorphic).

Теорема 22.7 (Образ нейтрального и обратного). *Гомоморфизм групп переводит нейтральный элемент в нейтральный и обратный элемент в обратный.*

Доказательство. Пусть e_G, e_H — нейтральные элементы. Из $e_G * e_G = e_G$ следует $\varphi(e_G) \circ \varphi(e_G) = \varphi(e_G)$. Сократим $\varphi(e_G)$ в группе H; получим $\varphi(e_G) = e_H$. Далее $\varphi(a) \circ \varphi(a^{-1}) = \varphi(e_G) = e_H$, и аналогичное равенство получается в обратном порядке. Поэтому $\varphi(a^{-1})$ — обратный к $\varphi(a)$. ■

Пример гомоморфизма: отправить каждое целое число в его класс по модулю 5. Сложение сохраняется, но числа 0 и 5 имеют один образ, поэтому изоморфизма нет. А отображение $x \mapsto e^x$ задаёт изоморфизм между $(\mathbb{R}, +)$ и положительными действительными числами с умножением: оно биективно и $e^{x+y} = e^x e^y$. Формулы экспоненты из главы 14 описывают тем самым соответствие двух групп.

Задачи

22.1. Является ли вычитание бинарной операцией на $\mathbb{N}_0$? А на $\mathbb{Z}$?

22.2. Определи, является ли $(\mathbb{N}_0, +)$ полугруппой, моноидом и группой.

22.3. Образуют ли положительные натуральные числа группу по сложению? Есть ли нейтральный элемент в этом множестве?

22.4. Проверь аксиомы группы для ненулевых рациональных чисел с обычным умножением.

22.5. Почему $(\mathbb{Q}, \cdot)$ является моноидом, но не группой?

22.6.* На $\mathbb{Z}$ задано $a * b = a + b + 1$. Найди нейтральный элемент, обратный к a и проверь, получается ли группа.

22.7. Дай конкретный контрпример ассоциативности операции $a * b = a - b$ на $\mathbb{Z}$.

22.8. Вычисли UV и VU для $U = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $V = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Сделай вывод о коммутативности умножения матриц.

22.9. Перестановка c переводит 1 в 2, 2 в 3, 3 в 1. Найди c^2, c^3, c^{-1}, где степень означает композицию.



22.10. Квадратную карточку три раза повернули на 90° против часовой стрелки. Какой один поворот даёт тот же результат? Какой поворот отменяет один поворот на 90°?

22.11. Робот перемещается по целочисленной прямой. Сдвиг T_k задаётся $T_k(x) = x + k$. Найди композицию $T_8 \circ T_{-3}$, нейтральный сдвиг и обратный к T_8.

22.12. В недельном расписании действие сдвигает день на 3 вперёд. Какое действие его отменяет? На сколько дней вперёд сдвинут три последовательных применения?

22.13. Найди все обратимые элементы кольца $\mathbb{Z}$. Докажи полноту ответа.

22.14. Покажи, что в $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ есть ненулевые делители нуля.

22.15. В поле $\mathbb{F}_5$ найди обратные ко всем четырём ненулевым классам.

22.16. Почему $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ не поле? Покажи препятствие на одном классе.

22.17. Реши $2x = 1$ в $\mathbb{Z}$, в $\mathbb{Q}$ и в $\mathbb{F}_5$.

22.18. Используя только аксиомы поля, докажи: из $ab = 0$ и $a \neq 0$ следует $b = 0$.

22.19. Проверь, является ли $\varphi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, $\varphi(n) = [n]_5$, гомоморфизмом по сложению. Инъективен ли он? Сюръективен ли?

22.20. Проверь, задаёт ли $\varphi(n) = 2n$ гомоморфизм $(\mathbb{Z}, +) \to (\mathbb{Z}, +)$. Является ли он изоморфизмом?

22.21. Обоснуй, что $x \mapsto e^x$ — изоморфизм между сложением на $\mathbb{R}$ и умножением на положительных действительных числах.

22.22. Докажи единственность нейтрального элемента, не используя числовых примеров.

22.23. Пусть b, c — двусторонние обратные к a в моноиде. Докажи $b = c$, не меняя порядок множителей.

22.24. Редактор сначала удваивает числовую настройку, затем прибавляет 3. Сравни это с обратным порядком. Запиши соответствующие композиции $f(x) = 2x$, $g(x) = x + 3$.

22.25.* На $S = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ задано $a * b = a + b + ab$. Докажи, что это абелева группа. Найди нейтральный и обратные, используя $1 + (a * b) = (1 + a)(1 + b)$.

22.26.* Реши $x^2 = x$ в произвольном поле и в кольце $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$. Почему ответы могут различаться?

22.27.* Выведи формулу $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ в коммутативном кольце. Здесь $2ab = ab + ab$. Какую формулу нужно оставить без коммутативности?

22.28.* В S_3 перестановка s меняет $1, 2$, а t меняет $2, 3$. Найди $(s \circ t)(1)$ и $(t \circ s)(1)$, затем докажи некоммутативность S_3.

ГЛАВА 23

Комплексные числа

От пары координат к новому числу

Уравнение $x^2 + 1 = 0$ не имеет действительных решений. Вместо изменения правил действительной арифметики построим большее множество, в котором такое уравнение разрешимо. Начнём с конкретных пар действительных чисел и зададим действия над ними; затем проверим, что эти действия действительно обладают нужными свойствами.



Определение 23.1. Комплексное число (complex number) — упорядоченная пара $(a; b)$ действительных чисел. Множество всех таких пар обозначают $\mathbb{C}$. Сложение и умножение задаются формулами

$$(a; b) + (c; d) = (a + c; b + d),$$

$$(a; b)(c; d) = (ac - bd; ad + bc).$$

Действительное число a отождествляют с парой $(a; 0)$. Мнимая единица (imaginary unit) — число $i = (0; 1)$.

По определению $i^2 = (0; 1)(0; 1) = (-1; 0) = -1$. Для действительных чисел новые действия сохраняют старые значения: $(a; 0) + (c; 0) = (a + c; 0)$, $(a; 0)(c; 0) = (ac; 0)$. Поэтому действительные числа входят в комплексные с привычными сложением и умножением.

Определение 23.2. Алгебраическая форма (Cartesian form; algebraic form) комплексного числа — запись $z = a + bi$, где $a, b \in \mathbb{R}$. Здесь $a + bi = (a; 0) + (b; 0)i = (a; b)$. Числа $a = \operatorname{Re} z$ и $b = \operatorname{Im} z$ называют соответственно действительной частью (real part) и мнимой частью (imaginary part).

Мнимая часть — действительное число b, а не произведение bi. Равенство комплексных чисел означает равенство обеих частей:

$$a + bi = c + di \quad \Longleftrightarrow \quad a = c, \quad b = d.$$

Число действительно ровно тогда, когда его мнимая часть равна нулю. При вычислении произведения можно раскрывать скобки и заменять i^2 на -1; именно так получится уже заданная формула умножения пар. Например,

$$(2 + 3i)^2 = 4 + 12i + 9i^2 = -5 + 12i.$$

Теорема 23.1 (Поле комплексных чисел). *Заданные действия превращают $\mathbb{C}$ в поле. Ноль равен $(0;0)$, единица — $(1;0)$. Противоположное к $(a;b)$ равно $(-a;-b)$, а обратное к ненулевому $(a;b)$ равно*

$$\left(\frac{a}{a^2+b^2}; -\frac{b}{a^2+b^2}\right).$$

Доказательство. Результаты действий снова являются парами действительных чисел, то есть замкнутость выполнена. Сложение ассоциативно и коммутативно по каждой координате; указанные ноль и противоположный дают абелеву группу по сложению. Для умножения перестановка двух пар не меняет ни $ac-bd$, ни $ad+bc$, поэтому оно коммутативно. Умножение на $(1;0)$ сохраняет обе координаты.

Проверим ассоциативность умножения для $(a;b), (c;d), (e;f)$. В обеих расстановках скобок действительная координата после раскрытия равна

$$ace - bde - adf - bcf,$$

а мнимая — $acf - bdf + ade + bce$. Значит, результаты совпадают. Для распределительности умножение $(a;b)$ на сумму двух других пар даёт координаты

$$a(c+e) - b(d+f) = (ac - bd) + (ae - bf),$$

$$a(d+f) + b(c+e) = (ad + bc) + (af + be).$$

Это сумма соответствующих произведений. Второй распределительный закон следует из коммутативности умножения.

Если $(a;b) \neq (0;0)$, то $a^2 + b^2 > 0$. Произведение с указанной обратной парой имеет действительную часть $\frac{a^2+b^2}{a^2+b^2} = 1$ и мнимую часть $\frac{-ab+ba}{a^2+b^2} = 0$. Оно равно единице в обоих порядках. Наконец, ноль и единица различны. Все аксиомы поля из предыдущей главы проверены. ■

В частности, в $\mathbb{C}$ допустимы сокращение ненулевого множителя и свойство нулевого произведения. Если $zw = 0$, то $z = 0$ или $w = 0$. Эти правила следуют из уже доказанных свойств любого поля, а не из изображения точек на рисунке.

Теорема 23.2 (Невозможность порядка, согласованного с полем). *На $\mathbb{C}$ нельзя задать строгий линейный порядок, который продолжает обычный порядок на $\mathbb{R}$, сохраняется при прибавлении одного и того же числа к обеим сторонам и делает произведение двух положительных чисел положительным.*

Доказательство. Предположим, что такой порядок существует. Поскольку $i \neq 0$, по свойству линейного порядка либо $i > 0$, либо $i < 0$. В первом случае произведение положительных i и i должно быть положительным, то есть $-1 = i^2 > 0$. Во втором случае прибавление $-i$ к $i < 0$ даёт $0 < -i$; снова произведение положительных чисел $(-i)(-i) = i^2 = -1$ должно быть положительным. Оба случая противоречат $-1 < 0$, унаследованному от действительных чисел. ■

Таким образом, привычные сравнения положительности и неотрицательности нельзя автоматически переносить на комплексные числа. Например, утверждение о неотрицательности любого действительного квадрата не даёт ограничения $z^2 \geq 0$ для комплексного z. Модули же являются действительными неотрицательными числами, поэтому их сравнивать можно.



Переход от действительных чисел к комплексным расширяет набор допустимых значений, но не отменяет необходимость проверять условия действий. Деление по-прежнему требует ненулевого знаменателя, а равенство требует совпадения обеих координат. Новое число удобно одновременно понимать как алгебраический объект и как пару действительных координат. Первая точка зрения помогает раскрывать скобки и решать уравнения, вторая позволяет независимо проверять результат. Если после преобразований получено одно вещественное уравнение вместо двух, полезно выяснить, не была ли потеряна часть исходного условия. Например, равенство модулей является лишь необходимым условием равенства чисел: оно сохраняет расстояние до начала координат, но не определяет направление. Выбор подходящей формы записи зависит от задачи; надёжное решение сохраняет возможность вернуться к исходному равенству и проверить обе его части.

Сопряжение, модуль и деление

Определение 23.3. Комплексное сопряжение (complex conjugation) заменяет $z = a+bi$ на $\overline{z} = a-bi$. Модуль комплексного числа (modulus; absolute value) определяется равенством

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Это неотрицательное действительное число. Оно равно нулю только при $z = 0$.

Например, для $z = 2 + 3i$ имеем $\overline{z} = 2 - 3i$, $|z| = \sqrt{13}$. Сопряжённое число обычно отличается от противоположного: $-z = -2 - 3i$.

Теорема 23.3 (Сопряжение и модуль произведения). *Для любых* $z, w \in \mathbb{C}$

$$\overline{z + w} = \overline{z} + \overline{w}, \qquad \overline{zw} = \overline{z}\,\overline{w}, \qquad \overline{\overline{z}} = z,$$

$$z\overline{z} = |z|^2, \qquad |\overline{z}| = |z|, \qquad |zw| = |z|\,|w|.$$

Доказательство. Пусть $z = a + bi$, $w = c + di$. У сопряжённого суммы обе части равны частям суммы сопряжённых. Далее

$$\overline{zw} = (ac - bd) - (ad + bc)i = (a - bi)(c - di).$$

Двукратная смена знака мнимой части возвращает z, а умножение $(a + bi)(a - bi)$ даёт $a^2 + b^2 = |z|^2$. Квадрат мнимой координаты при сопряжении не меняется, поэтому модули равны. Наконец,

$$|zw|^2 = zw\overline{zw} = zw\overline{z}\,\overline{w} = (z\overline{z})(w\overline{w}) = |z|^2|w|^2.$$

Обе стороны требуемого равенства модулей неотрицательны; извлечение квадратного корня завершает доказательство. ■

При $w \neq 0$ отсюда получаем удобные формулы

$$\frac{1}{w} = \frac{\overline{w}}{|w|^2}, \qquad \frac{z}{w} = \frac{z\overline{w}}{|w|^2}, \qquad \left|\frac{z}{w}\right| = \frac{|z|}{|w|}.$$

Первая проверяется умножением на w; вторая — умножением числителя и знаменателя на $\overline{w}$. Для третьей применим модуль к равенству $z = (\frac{z}{w})w$ и разделим на $|w| > 0$. В алгебраической форме деление сводится к действительному знаменателю:

$$\frac{a + bi}{c + di} = \frac{(ac + bd) + (bc - ad)i}{c^2 + d^2}, \qquad c + di \neq 0.$$

Комплексная плоскость, расстояние и аргумент

Определение 23.4. Комплексная плоскость (complex plane) — координатная плоскость, точке $(a;b)$ которой соответствует число $a+bi$. Горизонтальная ось действительная, вертикальная — мнимая. Расстояние между числами z, w на этой плоскости равно $|z-w|$.

Сложение чисел соответствует сложению векторов перемещения. Сопряжение отражает точку относительно действительной оси. Модуль — расстояние до начала координат: формула расстояния $|z-w| = \sqrt{(\operatorname{Re} z - \operatorname{Re} w)^2 + (\operatorname{Im} z - \operatorname{Im} w)^2}$ совпадает с формулой длины вектора из главы 18.

Определение 23.5. Для $z = a+bi \neq 0$ число $\varphi \in \mathbb{R}$ — аргумент (argument), если

$$\cos\varphi = \frac{a}{|z|}, \qquad \sin\varphi = \frac{b}{|z|}.$$

Обозначение $\arg z$ в этой главе означает *множество всех* аргументов:

$$\arg z = \{\varphi + 2\pi k : k \in \mathbb{Z}\}.$$

У нуля аргумент не определён. Главный аргумент (principal argument) $\operatorname{Arg} z$ — единственный аргумент в промежутке $(-\pi;\pi]$.

Точка $(\frac{a}{|z|};\frac{b}{|z|})$ лежит на единичной окружности, поэтому её угол существует. Один полный оборот равен 2π; все углы этой точки отличаются на целое число полных оборотов. Это объясняет как неоднозначность аргумента, так и единственность выбранного главного значения. Для отрицательного действительного числа главный аргумент равен π, а не $-\pi$, поскольку левый конец выбранного промежутка исключён. Для $2+3i$ главный аргумент лежит в первой четверти и равен $\operatorname{arctg}\frac{3}{2}$. Один только $\operatorname{arctg}\frac{b}{a}$ без учёта четверти не является общей формулой аргумента.

Определение 23.6. Тригонометрическая форма (polar form; trigonometric form) ненулевого комплексного числа — запись

$$z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi), \qquad r = |z| > 0, \quad \varphi \in \arg z.$$

Число 0 можно формально записать как $0(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ при любом φ, но это не задаёт аргумент нуля: никакого направления у нулевого перемещения нет.



Геометрическая запись разделяет две характеристики числа: расстояние до начала координат и направление луча. При переходе к алгебраической форме они снова соединяются в горизонтальную и вертикальную координаты. В задачах на сложение обычно удобнее складывать именно координаты, потому что длины и углы слагаемых по отдельности не дают длину и угол суммы. Для умножения ситуация меняется: длины перемножаются, а углы складываются, что будет доказано ниже. При записи ответа важно отличать конкретный угол от всего множества аргументов. Выбранное главное значение полезно для единого вида ответа, но после арифметического сложения двух главных значений иногда требуется добавить или вычесть полный оборот. На положение точки это не влияет, зато предотвращает ошибочное утверждение, что главный аргумент произведения всегда равен обычной сумме главных аргументов множителей.

Умножение как поворот и растяжение

Теорема 23.4 (Умножение в тригонометрической форме). *Если* $z = r(\cos\alpha + i\sin\alpha)$, $w = s(\cos\beta + i\sin\beta)$, *где* $r, s > 0$, *то*

$$zw = rs(\cos(\alpha+\beta) + i\sin(\alpha+\beta)).$$

При делении $w \neq 0$ *модуль делится на* s, *а аргумент можно взять равным* $\alpha - \beta$.

Доказательство. Обоснуем нужные формулы сложения углов геометрически. Поворот на угол β переводит первый единичный координатный вектор в $(\cos\beta; \sin\beta)$, а второй — в $(-\sin\beta; \cos\beta)$: второй получается из первого поворотом на прямой угол против часовой стрелки. Геометрический поворот сохраняет длины, направленные отношения отрезков на одной прямой и параллелограммы. Поэтому он сохраняет умножение вектора на действительное число и сложение векторов по правилу параллелограмма. Образ вектора $(x; y)$ равен

$$x(\cos\beta; \sin\beta) + y(-\sin\beta; \cos\beta).$$

Для $(x;y)=(\cos\alpha;\sin\alpha)$ это одновременно точка единичной окружности с углом $\alpha+\beta$. Сравнение координат даёт

$$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta,$$

$$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta.$$

Теперь раскроем произведение двух тригонометрических форм, заменим i^2 на -1 и применим эти равенства. Получается указанная формула. У $\cos\beta+i\sin\beta$ обратное число равно $\cos\beta-i\sin\beta$, поскольку их произведение — 1. Это число имеет угол $-\beta$; умножение на него и на $\frac{1}{s}$ доказывает правило деления. ■

Умножение всех точек на фиксированное ненулевое w поворачивает лучи на один и тот же угол β и изменяет длины в s раз. Положительные углы означают поворот против часовой стрелки. В частности, умножение на i поворачивает на 90°: $i(a+bi)=-b+ai$. Умножение на ноль переводит все точки в начало координат и не является поворотом.

Теорема 23.5 (Неравенство треугольника). *Для любых комплексных z,w*

$$|z+w|\le|z|+|w|.$$

Равенство выполняется, если одно из чисел нулевой, а при двух ненулевых — ровно когда они лежат на одном луче из начала координат.

Доказательство. Для любого $\zeta=u+vi$ имеем $\operatorname{Re}\zeta=u\le\sqrt{u^2+v^2}=|\zeta|$. Равенство здесь эквивалентно $v=0$, $u\ge0$. Раскрывая произведение с сопряжённым, получаем

$$|z+w|^2=|z|^2+2\operatorname{Re}(z\overline{w})+|w|^2\le|z|^2+2|z|\,|w|+|w|^2.$$

Извлекаем квадратный корень из неотрицательных сторон. При $z=0$ или $w=0$ равенство очевидно. Иначе оно эквивалентно тому, что $z\overline{w}$ — положительное действительное число. Тогда $\frac{w}{z}=\frac{z\overline{w}}{|z|^2}$ — положительное действительное число, то есть $w=tz$ с $t>0$: точки лежат на одном луче. Обратно, такая запись сразу даёт равенство модулей. ■

Целые степени и экспоненциальная запись на мнимой оси

Натуральная степень комплексного числа — произведение одинаковых множителей. При $z\neq0$ полагают $z^0=1$ и $z^{-n}=\frac{1}{z^n}$ для натурального n. У нуля положительные целые степени равны нулю; отрицательные и 0^0 в этой книге не определены.

Теорема 23.6 (Формула Муавра; de Moivre's formula). *Для $r > 0$, $\varphi \in \mathbb{R}$ и любого целого n*

$$\bigl(r(\cos\varphi + i\sin\varphi)\bigr)^n = r^n(\cos(n\varphi) + i\sin(n\varphi)).$$

Доказательство. При $n = 0$ обе стороны равны 1. Для $n \geq 1$ используем индукцию: умножение результата для n на исходное число умножает модуль на r и прибавляет к углу φ. Это ровно формула для $n+1$, а база $n = 1$ задана самой записью. Обратное к исходному числу имеет модуль r^{-1} и угол $-\varphi$. Применив доказанный натуральный случай к обратному числу, получаем формулу для отрицательных n. ■

Как удобное обозначение *для действительных углов* примем

$$e^{i\varphi} := \cos\varphi + i\sin\varphi.$$

Это экспоненциальная запись (exponential notation) точки единичной окружности; тригонометрическую форму теперь можно записывать как $z = re^{i\varphi}$. Доказанное правило умножения даёт $e^{i\alpha}e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)}$, а $e^{i(\varphi+2\pi)} = e^{i\varphi}$. Здесь мы вводим обозначение на мнимой оси и не строим аналитическую теорию экспоненты от произвольного комплексного аргумента. Комплексный логарифм для вычислений этой главы не нужен.

Все решения уравнения $z^n = w$

Определение 23.7. Комплексный корень степени n (complex nth root) из w — любое комплексное число z, удовлетворяющее $z^n = w$, где $n \in \mathbb{N}$. Требуется различать одно найденное решение и множество всех решений. В отличие от арифметического корня из неотрицательного действительного числа, здесь по умолчанию не выбирается одно выделенное значение.

Теорема 23.7 (Корни комплексного числа). *Если $w = 0$, уравнение $z^n = w$ имеет единственное решение $z = 0$. Если $w = R(\cos\theta + i\sin\theta) \neq 0$, где $R > 0$, то все его решения — ровно n различных чисел*

$$z_k = \sqrt[n]{R}\left(\cos\frac{\theta + 2\pi k}{n} + i\sin\frac{\theta + 2\pi k}{n}\right), \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

В этой формуле $\sqrt[n]{R}$ — положительный действительный корень; при $n = 1$ понимаем $\sqrt[1]{R} = R$.

Доказательство. Если $z^n = 0$, то $|z|^n = 0$, откуда $|z| = 0$ и $z = 0$. Обратно, нулевое число подходит.

Пусть $w \neq 0$. Формула Муавра сразу проверяет, что каждое указанное z_k в степени n даёт w. Если два таких числа совпадают, их углы отличаются на целое число полных оборотов. Поэтому $\frac{2\pi(k-l)}{n} = 2\pi q$ для целого q; значит, $k - l = nq$. Но $|k - l| < n$, так что $k = l$: числа различны.

Для полноты возьмём любое решение z, которое обязательно ненулевое, и запишем $z = r(\cos\psi + i\sin\psi)$. Тогда $r^n = R$, поэтому $r = \sqrt[n]{R}$, и $n\psi = \theta + 2\pi m$ для некоторого целого m. Разделим m с остатком: $m = nq + k$, где $0 \le k < n$. Получаем $\psi = \frac{\theta + 2\pi k}{n} + 2\pi q$, то есть то же число z_k. Других решений нет. ■

Для примера $z^3 = 8$ имеем $R = 8$, $\theta = 0$, $\sqrt[3]{R} = 2$. Углы трёх решений: 0, $\frac{2\pi}{3}$, $\frac{4\pi}{3}$; сами числа равны

$$2, \qquad -1 + i\sqrt{3}, \qquad -1 - i\sqrt{3}.$$

Все они лежат на окружности радиуса 2, а соседние углы отличаются на $\frac{2\pi}{3}$. Отрицательные углы вместо некоторых положительных описывают те же точки.



При извлечении комплексных корней важно сначала отделить модуль от угла, а затем перечислить все допустимые направления. Одна распространённая ошибка состоит в том, чтобы разделить только один выбранный аргумент на показатель степени и закончить решение. Такой шаг действительно даёт один корень, но обычно пропускает остальные. Другая ошибка — брать бесконечно много индексов и считать их разными ответами: после установленного числа шагов направления повторяются. Полнота ответа требует двух проверок: каждое записанное число должно удовлетворять уравнению, а любое возможное решение должно совпасть с одним из перечисленных. Отдельное рассмотрение нуля тоже существенно: у него нет аргумента, поэтому формулу для ненулевого числа нельзя применять буквально. Геометрический рисунок помогает заметить пропуск или повтор, однако окончательное обоснование даёт доказанная формула и проверка её условий.

Квадратные уравнения и сопряжённые корни

Теорема 23.8 (Квадратное уравнение с действительными коэффициентами). *Пусть $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, $D = b^2 - 4ac$. При поиске решений $az^2 + bz + c = 0$ в $\mathbb{C}$:*

- *если $D > 0$, решения — два действительных числа $\frac{-b+\sqrt{D}}{2a}$, $\frac{-b-\sqrt{D}}{2a}$;*
- *если $D = 0$, единственное значение решения — $-\frac{b}{2a}$;*
- *если $D < 0$, решения — два различных комплексных числа*

$$z = \frac{-b \pm i\sqrt{-D}}{2a}.$$

Во всех формулах квадратный корень применяется к неотрицательному действительному числу.

Доказательство. Раскрытие квадрата показывает, что исходное уравнение равносильно $(2az + b)^2 = D$; умножение и деление на $a \neq 0$ допустимы. При $D > 0$ разложение $(u - \sqrt{D})(u + \sqrt{D}) = 0$, где $u = 2az + b$, даёт $u = \pm\sqrt{D}$ по свойству нулевого произведения. При $D = 0$ из $u^2 = 0$ следует $u = 0$. При $D < 0$ положим $s = \sqrt{-D} > 0$. Тогда $u^2 = -s^2$, то есть $(u - is)(u + is) = 0$, откуда $u = \pm is$. После решения линейного равенства для z получаются все указанные значения; подстановка или обратное разложение подтверждает каждое из них. ■

Например, $z^2 - 4z + 13 = 0$ имеет $D = -36$ и решения $2 + 3i$, $2 - 3i$. Утверждение прежней главы о том, что при $D < 0$ нет *действительных* корней, остаётся верным: теперь расширена область поиска, а не изменено значение старого утверждения.

Теорема 23.9 (Сопряжённые корни многочлена). *Если многочлен P имеет действительные коэффициенты и $P(z) = 0$, то $P(\overline{z}) = 0$.*

Доказательство. Сопряжение сохраняет сумму и произведение и оставляет действительный коэффициент неизменным. По индукции оно сохраняет каждую натуральную степень: $\overline{z^k} = \overline{z}^k$. Поэтому при сопряжении суммы степенных слагаемых и свободного действительного члена получаем $\overline{P(z)} = P(\overline{z})$. Из $P(z) = 0$ следует $P(\overline{z}) = \overline{0} = 0$. ■

Таким образом, невещественные корни многочлена с действительными коэффициентами появляются сопряжёнными парами. Для уравнений, которые удаётся разложить на множители, свойство нулевого произведения позволяет найти все решения по отдельным множителям. Для уравнений $z^n = w$ полнота уже доказана специальной теоремой. Общего утверждения

о числе корней произвольного комплексного многочлена мы здесь не используем.

Общие формулы решения в радикалах



Общая формула решения должна работать не только тогда, когда корень удаётся угадать или многочлен уже удобно разложен на множители. Она должна начинаться с коэффициентов, указывать допустимые вычисления и возвращать все решения. После введения комплексных чисел можно последовательно извлекать квадратные и кубические корни даже из отрицательных действительных и из недействительных чисел. Однако у такого извлечения обычно несколько значений. Поэтому существенная часть формулы — правило согласования выбранных значений, а не только привычная запись с радикалами.

При ручном решении полезно сначала проверить простые возможности: свободный член может быть нулевым, многочлен может содержать только чётные степени или иметь удобный рациональный корень. Общие формулы нужны, когда эти сокращения не помогают, и одновременно объясняют, почему степени три и четыре разрешимы через радикалы. Нахождение одного решения ещё не завершает задачу: нужно восстановить сдвиг переменной, перечислить остальные решения и проверить, не совпали ли некоторые из них. Ниже полнота получается из явного разложения исходного многочлена на линейные или квадратные множители.

Определение 23.8. Формула в радикалах (formula by radicals) использует коэффициенты уравнения, рациональные числа и конечную последовательность сложений, вычитаний, умножений, допустимых делений и извлечений корней натуральных степеней. Промежуточные числа могут быть комплексными.

Определение 23.9. Кратность корня (multiplicity of a root) c ненулевого многочлена P — натуральное число $m \geq 1$, для которого $P(x) = (x - c)^m Q(x)$, где $Q(c) \neq 0$. При перечислении с кратностями такое значение записывают m раз.

В формулах этого раздела запись выбора корня означает любое число с указанной степенью; она не означает автоматически главное значение. Все ко-

эффициенты допускаются комплексными. Если нужны только действительные решения, их отбирают из полного комплексного списка.

Приведение кубического уравнения

Для $ax^3+bx^2+cx+d=0$, $a\neq 0$, сначала разделим на a и обозначим

$$A=\frac{b}{a},\qquad B=\frac{c}{a},\qquad C=\frac{d}{a}.$$

Теорема 23.10 (Устранение квадратного слагаемого). *Замена $x=y-\frac{A}{3}$ превращает $x^3+Ax^2+Bx+C=0$ в*

$$y^3+py+q=0,\qquad p=B-\frac{A^2}{3},\qquad q=\frac{2A^3}{27}-\frac{AB}{3}+C.$$

Доказательство. После подстановки коэффициент при y^2 равен $-A+A=0$. Коэффициент при y равен $\frac{A^2}{3}-\frac{2A^2}{3}+B=p$. Свободный член равен $-\frac{A^3}{27}+\frac{A^3}{9}-\frac{AB}{3}+C=q$. Коэффициент при кубе остаётся единицей. ■

Определение 23.10. Кубическое уравнение без квадратного слагаемого называют приведённым к неполной форме (depressed cubic). Для него обозначим

$$\Delta=\left(\frac{q}{2}\right)^2+\left(\frac{p}{3}\right)^3,\qquad \omega=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

Здесь $\omega^3=1$, $\omega\neq 1$, $1+\omega+\omega^2=0$. Величина Δ отличается от обычного дискриминанта кубика: последний равен -108Δ.

Формула Кардано и согласование кубических корней

Теорема 23.11 (Кардано; Cardano's formula). *Для $y^3+py+q=0$ полный алгоритм таков.*
Если $p=0$, решаем $y^3=-q$. При $q=0$ единственное значение решения — 0, кратность три. При $q\neq 0$ выбираем любое u с $u^3=-q$; все решения — $u,\omega u,\omega^2 u$.
Если $p\neq 0$, выбираем любое s с $s^2=\Delta$, затем любое u, для которого

$$u^3=-\frac{q}{2}+s,\qquad v=-\frac{p}{3u}.$$

Тогда все три корня с учётом кратностей имеют вид

$$y_k = \omega^k u + \omega^{-k} v, \qquad k = 0, 1, 2.$$

Все корни первоначального уравнения равны $x_k = y_k - \frac{A}{3}$.

Доказательство. Ветка $p = 0$ уже решена формулой всех комплексных кубических корней. Пусть $p \neq 0$. Обозначим $U = -\frac{q}{2} + s$, $V = -\frac{q}{2} - s$. Тогда

$$U + V = -q, \qquad UV = \frac{q^2}{4} - \Delta = -\frac{p^3}{27} \neq 0.$$

Поэтому $U \neq 0$, любой его кубический корень u ненулевой, и деление при выборе v законно. Получаем $uv = -\frac{p}{3}$, $v^3 = V$, $u^3 + v^3 = -q$. Для любого согласованного выбора

$$(u+v)^3 + p(u+v) + q = u^3 + v^3 + q + (3uv + p)(u+v) = 0.$$

Умножение u на ω^k, а v на ω^{-k} сохраняет эти условия. Для полноты используется тождество

$$\prod_{k=0}^{2} (t - \omega^k u - \omega^{-k} v) = t^3 - 3uv\,t - (u^3 + v^3) = t^3 + pt + q.$$

Оно получается раскрытием трёх множителей с учётом $1 + \omega + \omega^2 = 0$. Произведение равно нулю только при нулевом множителе, так что других решений нет. Само тождество также сохраняет кратности. ■



Нельзя независимо взять любые кубические корни из $-\frac{q}{2} + s$ и $-\frac{q}{2} - s$: их произведение обязано быть $-\frac{p}{3}$. Выбор v через u обеспечивает это автоматически. Замена u на другой кубический корень лишь переставляет три полученных значения; смена знака s также не меняет полный набор, поскольку доказанное произведение равно тому же многочлену.

При $\Delta = 0$, $p \neq 0$, можно сразу показать кратности. Положим $c = -\frac{3q}{2p}$. Из $q^2 = -\frac{4p^3}{27}$ следуют $p = -3c^2$, $q = 2c^3$, поэтому

$$y^3 + py + q = (y - c)^2 (y + 2c).$$

Корень c двойной, $-2c$ простой. Здесь $c \neq 0$; случай $p = q = 0$ разобран отдельно. Для действительных коэффициентов даже при действительных ответах промежуточные радикалы могут оказаться комплексными: это не ошибка и не основание отбрасывать решения.

Приведение уравнения четвёртой степени

Для $ax^4+bx^3+cx^2+dx+e=0$, $a\neq 0$, обозначим

$$A=\frac{b}{a},\quad B=\frac{c}{a},\quad C=\frac{d}{a},\quad D=\frac{e}{a}.$$

Теорема 23.12 (Устранение кубического слагаемого). *Замена $x=y-\frac{A}{4}$ превращает нормированное уравнение в*

$$y^4+py^2+qy+r=0,$$

где

$$p=B-\frac{3A^2}{8},\qquad q=C-\frac{AB}{2}+\frac{A^3}{8},$$
$$r=D-\frac{AC}{4}+\frac{A^2B}{16}-\frac{3A^4}{256}.$$

Доказательство. После раскрытия степеней коэффициент при y^3 равен $-A+A=0$. При y^2 получаем $\frac{6A^2}{16}-\frac{3A^2}{4}+B=p$; при y — $-\frac{A^3}{16}+\frac{3A^3}{16}-\frac{AB}{2}+C=q$. Свободный член равен $\frac{A^4}{256}-\frac{A^4}{64}+\frac{A^2B}{16}-\frac{AC}{4}+D=r$. ■

Сначала проверим $q=0$. Тогда уравнение биквадратное: $T=y^2$ удовлетворяет $T^2+pT+r=0$. Выберем любой d_0 с $d_0^2=p^2-4r$ и положим

$$T_1=\frac{-p+d_0}{2},\qquad T_2=\frac{-p-d_0}{2}.$$

Все решения — два квадратных корня каждого T_j, то есть $\pm\sqrt{T_1}$, $\pm\sqrt{T_2}$ с пониманием выбора комплексных корней. Полнота следует из $(y^2-T_1)(y^2-T_2)=0$. Если $T_j=0$, оба знака дают одно значение 0, которое учитывается дважды; если $T_1=T_2$, кратности также сохраняются.

Метод Феррари: от четвёртой степени к кубической



При решении четвёртой степени удобно искать не сразу четыре линейных множителя, а два квадратных. Исчезнувшее кубическое слагаемое подсказывает, что линейные коэффициенты этих множителей должны быть противоположными. Остаётся подобрать их величину и свободные члены так, чтобы совпали ещё три коэффициента. Это приводит к вспомогательному кубическому уравнению. Его решения уже можно получить формулой Кардано, после чего остаются только квадратные уравнения.

Выбор одного вспомогательного корня не означает выбора лишь части ответов исходной задачи. Он задаёт один способ разложить тот же многочлен на два квадратных множителя, а каждый из них решается полностью. Разные допустимые выборы могут менять промежуточные числа и порядок ответов, но проверяемое произведение остаётся прежним. Поэтому важно выписать оба квадратных множителя, взять по два корня каждого и лишь затем объединить совпадающие значения с учётом их кратностей. Отдельная биквадратная ветка выше нужна ещё и потому, что в общем преобразовании появится деление на выбранный параметр; условие его ненулевости должно быть доказано до деления.

Определение 23.11. Кубическая резольвента (resolvent cubic) для $y^4 + py^2 + qy + r$ в используемой параметризации — уравнение

$$z^3 + 2pz^2 + (p^2 - 4r)z - q^2 = 0.$$

Его корень будет равен квадрату линейного коэффициента в квадратных множителях.

Теорема 23.13 (Феррари; Ferrari's formula). *Пусть $q \neq 0$. Выберем любой корень z указанной резольвенты и любой s с $s^2 = z$. Тогда $z \neq 0$, $s \neq 0$. Положим*

$$t = \frac{p + z - \frac{q}{s}}{2}, \qquad u = \frac{p + z + \frac{q}{s}}{2}.$$

Выполняется разложение

$$y^4 + py^2 + qy + r = (y^2 + sy + t)(y^2 - sy + u).$$

Выберем любые d_1, d_2 с

$$d_1^2 = -2p - z + \frac{2q}{s}, \qquad d_2^2 = -2p - z - \frac{2q}{s}.$$

Все четыре корня с учётом кратностей:

$$y_1 = \frac{-s + d_1}{2}, \quad y_2 = \frac{-s - d_1}{2},$$

$$y_3 = \frac{s + d_2}{2}, \quad y_4 = \frac{s - d_2}{2}.$$

Для исходного уравнения к каждому значению применяют $x = y - \frac{A}{4}$.

Доказательство. Значение резольвенты в нуле равно $-q^2 \neq 0$, поэтому ни один её корень не нулевой. По определению $s \neq 0$, и все деления допустимы. Разложение проверяется четырьмя коэффициентами:

$$t + u - s^2 = p, \qquad s(u - t) = q,$$

$$tu = \frac{(p + z)^2 - \frac{q^2}{z}}{4} = r.$$

Последнее равенство есть резольвента, разделённая на $4z$. Коэффициент при y^3 равен нулю, при y^4 — единице. Значит, произведение действительно совпадает с исходным многочленом. Квадратное уравнение $y^2 + sy + t = 0$ имеет дискриминант $s^2 - 4t = d_1^2$ и даёт первые два корня. Для $y^2 - sy + u = 0$ дискриминант равен $s^2 - 4u = d_2^2$, получаются последние два. Свойство нулевого произведения доказывает полноту списка, в том числе при нулевом дискриминанте или общем корне двух множителей. ■



Для вычисления корня резольвенты можно непосредственно применить уже доказанный кубический алгоритм. Если желательно сначала убрать её квадратное слагаемое, положим $z = h - \frac{2p}{3}$. Получится

$$h^3 + Ph + Q = 0, \qquad P = -\frac{p^2}{3} - 4r,$$

$$Q = -\frac{2p^3}{27} + \frac{8pr}{3} - q^2.$$

В ветке $P = 0$ используют соответствующий простой случай Кардано. Существование хотя бы одного корня резольвенты следует из полного кубического алгоритма, а не предполагается дополнительно. Знак s можно выбирать любой: его смена переставляет квадратные множители. Знак каждого d_j лишь переставляет два корня своего множителя. В отличие от двух кубических радикалов Кардано, квадратные радикалы d_1, d_2 здесь не требуют взаимного согласования: из каждого в любом случае берут оба противоположных значения.

Граница радикальных формул


Теорема 23.14 (Абель–Руффини; Abel–Ruffini theorem; без доказательства)**.** *Для каждого натурального $n \geq 5$ не существует общей формулы, которая выражала бы все корни произвольного уравнения степени n через его коэффициенты и рациональные числа конечным числом арифметических операций и извлечений корней натуральных степеней. Уже среди уравнений с рациональными коэффициентами существуют уравнения, не все корни которых выражаются такими операциями из рациональных чисел.*

Без доказательства. Полное обоснование этого результата требует более глубокой алгебры, прежде всего теории расширений полей и теории Галуа; здесь оно не приводится. Приведённое объяснение границы метода не является доказательством теоремы.

Утверждение относится к общей радикальной формуле, а не к каждому отдельному уравнению. Например, $x^5 = 2$ решается всеми пятью комплексными корнями из 2, а разложенные на множители уравнения высокой степени могут сводиться к простым. Теорема не утверждает отсутствия корней и не запрещает численные алгоритмы приближённого нахождения решений. Формулы Кардано и Феррари дают точные выражения; для практиче-

ских десятичных вычислений также применяют численные методы с контролем ошибки.

Графики



Сопряжение и корни на комплексной плоскости

Задачи

23.1. Используя действия над парами, найди сумму и произведение чисел $(4; -5)$ и $(-2; 7)$. Запиши результаты в алгебраической форме.

23.2. Найди все действительные a, b, для которых $(2a - 1) + (b + 3)i = 7 - 4i$.

23.3. Для $z = -3 + \sqrt{2}\,i$ укажи $\operatorname{Re} z$, $\operatorname{Im} z$ и $\operatorname{Re} z + i \operatorname{Im} z$. Какие из этих значений являются действительными числами?

23.4. Вычисли $i^{2027} + i^{2028}$, обосновав сокращение показателей по циклу.

23.5. Для $z = -8 + 15i$ найди $\overline{z}$, $-z$, $|z|$, $z\overline{z}$.

23.6. Запиши в алгебраической форме $\dfrac{7 + 9i}{2 - i}$.

23.7. Найди обратное к $3 - 4i$ и проверь произведение.



23.8. Реши в $\mathbb{C}$ линейное уравнение $(2 - i)z = 4 + 7i$.

23.9. Найди все z, для которых одновременно $z + \overline{z} = 8$ и $z - \overline{z} = -6i$.

23.10. Докажи формулы $\operatorname{Re} z = \dfrac{z + \overline{z}}{2}$ и $\operatorname{Im} z = \dfrac{z - \overline{z}}{2i}$.

23.11. Докажи: $z = \overline{z}$ тогда и только тогда, когда z действительно; $z = -\overline{z}$ тогда и только тогда, когда $\operatorname{Re} z = 0$. Включён ли ноль во второе утверждение?

23.12. Докажи равенства $|-z| = |z|$ и $|\overline{z}| = |z|$, не используя рисунок.

23.13. На координатной схеме робот стартует в точке $1 - 2i$, затем совершает перемещения $3 + 5i$ и $-2 + i$. Найди конечную точку и прямое расстояние от неё до старта.

23.14. Найди расстояние и середину отрезка между точками $z_1 = -2 + 5i$, $z_2 = 4 - 3i$.

23.15. Опиши на комплексной плоскости множество $\{z : |z - (1 - 4i)| = 3\}$. Укажи центр, радиус и уравнение в координатах $z = x + yi$.

23.16. Опиши все z, для которых $\operatorname{Re} z = -2$ и $|z| \le 3$.

23.17. Найди $\arg(-4i)$ и $\operatorname{Arg}(-4i)$. Определён ли $\arg 0$?

23.18. Запиши $-3 + 3\sqrt{3}\,i$ в тригонометрической форме, указав модуль, все аргументы и главный аргумент.

23.19. Пусть $z = 3(\cos\dfrac{\pi}{6} + i\sin\dfrac{\pi}{6})$, $w = 4(\cos\dfrac{\pi}{3} + i\sin\dfrac{\pi}{3})$. Найди zw и $\dfrac{z}{w}$ в алгебраической форме.

23.20. В редакторе координат точку $-1 + 2i$ сначала поворачивают на 90° по часовой стрелке вокруг нуля, затем увеличивают расстояние до нуля вдвое. Каким множителем задаётся преобразование? Найди новую точку и её расстояние до нуля.

23.21. Точку $z = 4 + i$ поворачивают на 90° против часовой стрелки вокруг центра $c = 1 + i$. Найди образ. Объясни, почему нужно использовать $c + i(z - c)$, а не просто iz.

23.22. Докажи, что умножение всех точек на i сохраняет расстояния: $|iz_1 - iz_2| = |z_1 - z_2|$.

23.23. Вычисли $(\sqrt{3} + i)^6$ с помощью формулы Муавра.

23.24. Вычисли $(1 - i)^{-4}$. Объясни, почему отрицательная степень определена.

23.25. Найди все комплексные решения $z^2 = -49$. Есть ли среди них действительные?

23.26. Реши $z^2 + 6z + 25 = 0$ в $\mathbb{C}$ и укажи сопряжённую пару корней.

23.27. Реши $z^2 + 2z - 35 = 0$ в $\mathbb{C}$. Объясни, почему переход к комплексным числам не добавляет здесь новых решений.

23.28.* Найди все комплексные решения $z^3 = -27$. Запиши их в алгебраической форме и проверь, сколько различных значений получилось.

23.29.* Найди все комплексные решения $z^4 = -16$ и опиши их расположение на плоскости.

23.30.* Реши в $\mathbb{C}$ биквадратное уравнение $z^4 + 5z^2 + 4 = 0$, найдя все решения.

23.31.* Найди все комплексные решения $z^2 = 5 + 12i$, положив $z = a + bi$ с действительными a, b. Для полноты используй также модуль равенства.

23.32.* На координатном плане искомая точка находится на расстоянии 5 от начала координат и на расстоянии 5 от точки 6 действительной оси. Найди все её комплексные координаты и объясни геометрически число ответов.

23.33. Реши в $\mathbb{C}$ уравнение $x^3 - 6x^2 + 15x - 14 = 0$, сначала устранив квадратное слагаемое.

23.34. Для $y^3 + 3y - 4 = 0$ вычисли радикалы Кардано с согласованным произведением, найди один действительный корень и остальные два комплексных.

23.35. Реши $x^3 + 8 = 0$ в комплексных числах. Объясни, почему ветка $p = 0$ не требует деления на кубический радикал.

23.36. Реши $y^3 - 12y + 16 = 0$, вычисли Δ и укажи кратности.

23.37. Докажи, что множество корней $y^3 + py = 0$ симметрично относительно нуля. Выпиши все корни и различи случаи $p = 0$ и $p \neq 0$.

23.38.* Реши в $\mathbb{C}$ биквадратное уравнение $y^4 + 2y^2 + 5 = 0$. Запиши корни через действительные неотрицательные квадратные корни.

23.39. Примени метод Феррари к $y^4 + 2y^2 + y + 2 = 0$, проверив, что $z = 1$ подходит для резольвенты. Выпиши все корни.

23.40.* Для $y^4 - 3y^2 + 2y = 0$ примени Феррари сначала с $z = 1$, затем с $z = 4$. Сравни наборы корней и укажи кратности.

23.41. Докажи: если у $P(y) = y^4 + py^2 + qy + r$ есть корень a кратности не менее трёх, то $P(y) = (y - a)^3(y + 3a)$. Найди p, q, r через a и определи, когда кратность становится четырьмя.

23.42.* Реши $y^3 - 3y + 1 = 0$, используя согласованные радикалы Кардано и тригонометрическую форму. Почему комплексные промежуточные значения не мешают получить три действительных корня?

ГЛАВА 24

Кватернионы и повороты в пространстве

Четыре координаты и новые правила умножения

Комплексное число описывает пару действительных координат. Следующий пример расширения содержит четыре координаты: одну действительную и три мнимые. Он полезен для знакомства с некоммутативной алгеброй и для описания поворотов в трёхмерном пространстве. Эта дополнительная глава опирается на комплексные числа и матрицы; для начала математического анализа её можно отложить.



Определение 24.1. Кватернионы (*quaternions*) — множество $\mathbb{H} = \mathbb{C} \times \mathbb{C}$ с покоординатным сложением; умножение задаётся формулой

$$(a, b)(c, d) = (ac - b\overline{d},\ ad + b\overline{c}).$$

Здесь $a, b, c, d \in \mathbb{C}$, а черта означает комплексное сопряжение. Действительное число t отождествляется с $(t, 0)$.

Положим $1 = (1, 0)$, $i = (i_{\mathbb{C}}, 0)$, $j = (0, 1)$, $k = (0, i_{\mathbb{C}})$. Поэтому пара $(x_0 + x_1 i_{\mathbb{C}}, x_2 + x_3 i_{\mathbb{C}})$ записывается единственным образом как $q = x_0 + x_1 i + x_2 j + x_3 k$, где все x_r действительны. Значок $i_{\mathbb{C}}$ нужен только при построении: дальше i обозначает тот же комплексный элемент внутри $\mathbb{H}$.

$\cdot$	1	i	j	k
1	1	i	j	k
i	i	-1	k	$-j$
j	j	$-k$	-1	i
k	k	j	$-i$	-1

В таблице первый множитель выбирается по строке, второй — по столбцу. Например, $ij = k$, но $ji = -k$. Произведение общих кватернионов раскрывается по дистрибутивности, сохраняя порядок множителей. Уже эта таблица показывает, почему запись дроби с кватернионным знаменателем без уточнения стороны была бы неоднозначной.

Теорема 24.1 (Ассоциативность кватернионного умножения)**.** *Для любых $p, q, r \in \mathbb{H}$ выполнено $(pq)r = p(qr)$. Сложение коммутативно и ассоциативно; умножение дистрибутивно относительно сложения с обеих сторон и имеет единицу 1.*

Доказательство. Поставим паре (a, b) в соответствие комплексную матрицу

$$M(a,b) = \begin{pmatrix} a & b \\ -\overline{b} & \overline{a} \end{pmatrix}.$$

Непосредственное умножение даёт $M(a,b)M(c,d) = M(ac - b\overline{d}, ad + b\overline{c})$. Отображение M инъективно: пара восстанавливается по первой строке. Ассоциативность матриц поэтому даёт $M((pq)r) = M(p(qr))$, а значит, равенство кватернионов. Остальные свойства следуют покоординатно из определения; в частности, умножение любой пары на $(1, 0)$ с каждой стороны возвращает эту пару. ■

Сопряжение, норма и деление

Определение 24.2. Сопряжение кватерниона (*quaternion conjugation*) задаётся формулой $\overline{q} = x_0 - x_1 i - x_2 j - x_3 k$; для пары это $\overline{(a,b)} = (\overline{a}, -b)$.

Определение 24.3. Норма кватерниона (*quaternion norm*) — число $|q| = \sqrt{x_0^2 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}$. Обозначим $N(q) = |q|^2$; это квадрат нормы, а не сама норма.

Определение 24.4. Действительная часть (*real part*) — $\operatorname{Re} q = x_0$.

Теорема 24.2 (Сопряжение и норма). *Для $p, q \in \mathbb{H}$ выполнены*

$$\overline{pq} = \overline{q}\,\overline{p}, \qquad q\overline{q} = \overline{q}q = N(q), \qquad N(pq) = N(p)N(q).$$

При $q \neq 0$ существует двусторонний обратный $q^{-1} = \frac{\overline{q}}{N(q)}$.

Доказательство. Для пары $q = (a, b)$ умножение на $(\overline{a}, -b)$ с любой стороны даёт $(|a|^2 + |b|^2, 0)$. Кроме того, матрица $M(\overline{q})$ получается из $M(q)$ транспонированием и сопряжением каждого элемента. Такое действие обращает порядок произведения матриц: это проверяется по формуле для их элементов. Инъективность M доказывает первое равенство. Теперь, пользуясь уже доказанной ассоциативностью, получаем

$$(pq)\overline{pq} = p(q\overline{q})\overline{p} = N(q)p\overline{p} = N(p)N(q).$$

При $q \neq 0$ сумма квадратов его координат положительна, поэтому деление на действительное $N(q)$ допустимо и даёт обратный с обеих сторон. ■

Определение 24.5. Тело (*division ring; skew field*) — ассоциативное кольцо с $1 \neq 0$, в котором каждый ненулевой элемент имеет двусторонний обратный. Коммутативность умножения не требуется. Таким образом, $\mathbb{H}$ — тело, но не поле.

Чтобы решить $qx = b$ при $q \neq 0$, умножаем слева и получаем $x = q^{-1}b$. Для $xq = b$ ответ иной: $x = bq^{-1}$. Здесь сокращение обосновано и обратимостью, и ассоциативностью. Порядок в формуле для сопряжения произведения тоже существенен: его нельзя копировать из комплексного случая без изменения.

Теорема 24.3 (Два полезных равенства). *Для $u, v \in \mathbb{H}$ выполнены*

$$\operatorname{Re}(uv) = \operatorname{Re}(vu), \qquad N(u+v) = N(u) + N(v) + 2\operatorname{Re}(u\overline{v}).$$

Доказательство. Если координаты u равны $u_0, \dots, u_3$, а координаты v — $v_0, \dots, v_3$, то таблица умножения даёт $\operatorname{Re}(uv) = u_0v_0 - u_1v_1 - u_2v_2 - u_3v_3$. Выражение симметрично. Во второй формуле $\operatorname{Re}(u\overline{v}) = \sum_{r=0}^{3} u_r v_r$, а раскрытие $\sum_{r=0}^{3}(u_r + v_r)^2$ даёт требуемое равенство. ■

Как описать поворот

Определение 24.6. Чисто мнимый кватернион (*pure imaginary quaternion*) имеет нулевую действительную часть: $v = xi + yj + zk$. Его можно отождествить с вектором $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

Определение 24.7. Единичный кватернион (*unit quaternion*) удовлетворяет $|q| = 1$.



Трёхмерный вектор становится частью алгебры, в которой удобно вычислять повороты. Для единичного q рассмотрим $T_q(v) = qv\overline{q}$. В отличие от плоской формулы $z \mapsto wz$, здесь участвуют два умножения, с разных сторон. Такая запись используется в компьютерной графике и управлении ориентацией: последовательность преобразований можно вычислять умножением кватернионов.

Теорема 24.4 (Сохранение длин и поворот вокруг оси). *Для единичного q отображение T_q линейно над $\mathbb{R}$, переводит чисто мнимые кватернионы в чисто мнимые и сохраняет их нормы. Если*

$$q = \cos\frac{\theta}{2} + k\sin\frac{\theta}{2},$$

то $T_q(xi + yj + zk) = (x\cos\theta - y\sin\theta)i + (x\sin\theta + y\cos\theta)j + zk$.

Доказательство. Линейность следует из дистрибутивности и умножения на действительные числа. Так как $\overline{v} = -v$, имеем $\overline{qv\overline{q}} = q\overline{v}\,\overline{q} = -qv\overline{q}$, то есть результат чисто мнимый. Мультипликативность нормы даёт $|qv\overline{q}| = |q|\,|v|\,|\overline{q}| = |v|$. Положим $c = \cos\frac{\theta}{2}$, $s = \sin\frac{\theta}{2}$. По таблице

$$(c + ks)i(c - ks) = (c^2 - s^2)i + 2csj,$$

$$(c + ks)j(c - ks) = -2csi + (c^2 - s^2)j,$$

а $(c + ks)k(c - ks) = k$. Формулы двойного угла и линейность завершают доказательство. ∎

Два кватерниона q и $-q$ задают одно преобразование, поскольку два знака минус сокращаются. Например, $q = \frac{1+k}{\sqrt{2}}$ задаёт поворот на $\frac{\pi}{2}$: ось x переходит

в ось y, ось y — в противоположное направление оси x, а ось z остаётся на месте. Направления задаются правой системой координат, как в выведенной формуле.

Задачи

24.1. Вычисли ij, ji, jk, kj, ki, ik. Какие пары дают разные результаты при перестановке?

24.2. Для $p = 1 + 2i - j$, $q = 3 - i + 4k$ найди $p + q$ и $p - q$.

24.3. Раскрой $(1 + i)(1 + j)$ и $(1 + j)(1 + i)$.

24.4. Найди $(i + j)^2$ и объясни, почему здесь нельзя заменить смешанные слагаемые на $2ij$.

24.5. Для $q = 1 + 2i - 2j + 4k$ найди $\overline{q}$, $N(q)$, $|q|$ и q^{-1}.



24.6. Реши отдельно $ix = j$ и $xi = j$.

24.7. Запиши матрицу $M(q)$ для $q = 1+2i+3j-4k$.

24.8. Докажи $q + \overline{q} = 2\,\mathrm{Re}\,q$ и $\overline{\overline{q}} = q$.

24.9. Докажи, что ненулевые кватернионы не могут иметь нулевое произведение.

24.10. Вычисли (ijk), то есть произведение в указанном порядке. Проверь две расстановки скобок.

24.11. В графическом редакторе вектор $(2, -1, 3)$ поворачивают вокруг оси z на 90°. Используй $q = \dfrac{1 + k}{\sqrt{2}}$ и найди результат.

24.12. Камера должна изменить направление $(1, 0, 0)$ на $(-1, 0, 0)$ поворотом вокруг оси z. Подбери единичный кватернион и проверь действие.

24.13. Докажи $T_{-q}(v) = T_q(v)$ для любого единичного q.

24.14.* Докажи $T_p(T_q(v)) = T_{pq}(v)$ для единичных p, q. В каком порядке применяются два преобразования?

24.15.* Найди все кватернионы q, коммутирующие с i: $qi = iq$.

24.16.* Докажи: если q коммутирует с каждым кватернионом, то q является действительным числом.

24.17.* Докажи для чисто мнимого $v = xi + yj + zk$, что $v^2 = -|v|^2$.

24.18.* Докажи формулу $(pq)^{-1} = q^{-1}p^{-1}$ при $p, q \neq 0$.

ГЛАВА 25

Октонионы: когда важны скобки

Восемь координат



Удвоение числа координат можно повторить ещё раз, взяв пары кватернионов. При этом сохраняется норма и возможность решать линейные уравнения с ненулевым множителем, но исчезает ассоциативность. Именно явная проверка свойств, а не перенос знакомых правил по аналогии, делает этот пример полезным для изучения алгебры.

Определение 25.1. Октонионы (*octonions*) — множество $\mathbb{O} = \mathbb{H} \times \mathbb{H}$ с покоординатным сложением; умножение задаётся формулой

$$(a, b)(c, d) = (ac - \overline{d}\, b,\ da + b\overline{c}).$$

Все четыре компонента принадлежат $\mathbb{H}$. Здесь порядок кватернионных множителей обязателен. Эта формула фиксирует выбранное соглашение: таблицы базисных единиц в другой литературе могут отличаться из-за выбора базиса.

Единица равна $(1, 0)$, ноль — $(0, 0)$; действительное число t обозначает $(t, 0)$. Подмножество $\{(a, 0) : a \in \mathbb{H}\}$ воспроизводит умножение кватернионов. Выберем базис

$$e_0 = 1 = (1, 0), \quad e_1 = (i, 0), \quad e_2 = (j, 0), \quad e_3 = (k, 0),$$
$$e_4 = (0, 1), \quad e_5 = (0, i), \quad e_6 = (0, j), \quad e_7 = (0, k).$$

Любой октонион единственным образом записывается как $x = \sum_{r=0}^{7} x_r e_r$ с действительными координатами. Умножение пар позволяет вычислить произведение любых двух единиц, поэтому заучивать новую таблицу не требуется. В частности, $e_1 e_2 = e_3$, $e_2 e_4 = e_6$, $e_3 e_4 = e_7$, но $e_1 e_6 = -e_7$.

Теорема 25.1 (Неассоциативность). *Умножение октонионов не ассоциативно: существуют x, y, z, для которых $(xy)z \neq x(yz)$.*

Доказательство. По формулам выше $(e_1e_2)e_4 = e_3e_4 = e_7$, тогда как $e_1(e_2e_4) = e_1e_6 = -e_7$. Их разность $2e_7 \neq 0$, поскольку это ненулевой вектор из восьми действительных координат. ■

Определение 25.2. Ассоциатор (*associator*) трёх элементов — выражение $[x, y, z] = (xy)z - x(yz)$. В ассоциативной алгебре оно всегда равно нулю; для октонионов это не так.

После потери ассоциативности скобки становятся частью выражения. Например, даже при известном обратном элементе нельзя обосновать переход $x^{-1}(xy) = (x^{-1}x)y$ одной лишь перестановкой скобок. В этой главе каждое равенство доказывается по определению или по уже установленному свойству; сокращение тройного произведения требует отдельного обоснования.



Сопряжение и сохранение нормы

Определение 25.3. Сопряжение октониона (*octonion conjugation*) задаётся как $\overline{(a, b)} = (\overline{a}, -b)$.

Определение 25.4. Норма октониона (*octonion norm*) — $|x| = \sqrt{N_{\mathbb{H}}(a) + N_{\mathbb{H}}(b)}$. Здесь $N_{\mathbb{H}}(a) = N(a)$ — квадрат кватернионной нормы из предыдущей главы. Положим $N_{\mathbb{O}}(x) = |x|^2$; индексы у N отличают суммы четырёх и восьми квадратов.

Теорема 25.2 (Обратный элемент). *Для любого $x \in \mathbb{O}$ выполнено $x\overline{x} = \overline{x}x = N_{\mathbb{O}}(x)$. При $x \neq 0$ элемент $\frac{\overline{x}}{N_{\mathbb{O}}(x)}$ является двусторонним обратным.*

Доказательство. Пусть $x = (a, b)$. Произведение $(a, b)(\overline{a}, -b)$ равно

$$(a\overline{a} + \overline{b}b,\ -ba + ba) = (N_{\mathbb{H}}(a) + N_{\mathbb{H}}(b), 0).$$

В обратном порядке получаем $(\overline{a}a + \overline{b}b, b\overline{a} - b\overline{a})$, то есть то же число. При ненулевом x сумма восьми квадратов положительна; умножение на её действительную обратную величину даёт оба требуемых произведения, равных 1. ■

Теорема 25.3 (Мультипликативность нормы). *Для $x, y \in \mathbb{O}$ выполнено $N_{\mathbb{O}}(xy) = N_{\mathbb{O}}(x)N_{\mathbb{O}}(y)$, а значит, $|xy| = |x|\,|y|$.*

Доказательство. Запишем $x = (a, b)$, $y = (c, d)$. Обозначим кватернионный квадрат нормы просто N. Из формулы предыдущей главы получаем

$$\begin{aligned} N(ac - \overline{d}b) &= N(a)N(c) + N(d)N(b) \\ &\quad - 2\,\mathrm{Re}(ac\overline{b}d), \\ N(da + b\overline{c}) &= N(d)N(a) + N(b)N(c) \\ &\quad + 2\,\mathrm{Re}(dac\overline{b}). \end{aligned}$$

Здесь все произведения внутри действительной части — кватернионные, поэтому ассоциативны. Из $\mathrm{Re}(uv) = \mathrm{Re}(vu)$, применённого к $u = ac\overline{b}$, $v = d$, следует сокращение смешанных слагаемых. Оставшаяся сумма равна $(N(a) + N(b))(N(c) + N(d))$. Это и есть требуемое произведение октонионных квадратов норм. Для норм извлекаем неотрицательный квадратный корень. ■

Определение 25.5. Делитель нуля (*zero divisor*) — ненулевой элемент, произведение которого с некоторым ненулевым элементом с одной из сторон равно нулю. Из мультипликативности положительной нормы следует, что в $\mathbb{O}$ делителей нуля нет.

Сумма квадратов связывает необычное умножение с привычной евклидовой длиной в $\mathbb{R}^8$. Поэтому можно проверять вычислительную реализацию: квадрат нормы результата обязан совпасть с произведением квадратов норм входных данных. Это полезный тест, но один такой тест не заменяет проверку самой таблицы умножения — разные соглашения о базисе тоже могут сохранять норму.

Что здесь означает деление

Теорема 25.4 (Однозначная разрешимость). *Для $x \neq 0$ и любого $z \in \mathbb{O}$ каждое из уравнений $xy = z$ и $yx = z$ имеет ровно одно решение относительно y.*

Доказательство. Умножение билинейно над $\mathbb{R}$, что следует раскрытием формулы пар. Поэтому отображение $L_x : y \mapsto xy$ задаётся действительной матрицей 8×8. Если $L_x(y) = 0$, то из отсутствия делителей нуля следует $y = 0$. При приведении этой матрицы методом Гаусса свободных переменных в однородной системе нет: иначе существовало бы ненулевое решение. Следовательно, все восемь столбцов содержат ведущие элементы. Матрица квадратная, значит, они есть и во всех восьми строках. Для любой правой части система имеет единственное решение. Это доказывает утверждение для $xy = z$. Для правого умножения $R_x : y \mapsto yx$ рассуждение такое же. ■

Определение 25.6. Алгебра с делением (*division algebra*), в используемом здесь смысле, — вещественное векторное пространство с билинейным умножением и единицей, в котором оба уравнения из теоремы однозначно разрешимы при ненулевом x. Ассоциативность в этом определении не требуется. Поэтому $\mathbb{O}$ — алгебра с делением, но не тело в смысле предыдущей главы.

Мы получили цепочку $\mathbb{R} \subset \mathbb{C} \subset \mathbb{H} \subset \mathbb{O}$ при выбранных вложениях. Размерности над $\mathbb{R}$ равны $1, 2, 4, 8$. В $\mathbb{R}$ и $\mathbb{C}$ умножение коммутативно и ассоциативно; в $\mathbb{H}$ остаётся ассоциативность, а в $\mathbb{O}$ исчезает и она. У всех четырёх примеров сохраняются единица и мультипликативная евклидова норма. Здесь исследованы конкретные конструкции; утверждения о классификации всех подобных алгебр требуют более глубокой теории.

Задачи

25.1. Запиши $x = (1 + 2i, 3j - k)$ в базисе $e_0, \dots, e_7$.

25.2. Вычисли по определению $e_1 e_4$ и $e_4 e_1$.

25.3. Вычисли e_4^2, e_5^2, e_6^2, e_7^2.

25.4. Найди сумму и разность пар $x = (1 + i, j)$, $y = (2 - k, 1 + j)$.

25.5. Для $x = (1 + i, j)$ найди $\overline{x}$, $N_{\mathbb{O}}(x)$, $|x|$ и двусторонний обратный.



25.6. Найди $e_2 e_4$, затем оба произведения $(e_1 e_2) e_4$ и $e_1 (e_2 e_4)$.

25.7. Вычисли ассоциаторы $[e_1, e_2, e_4]$ и $[e_1, e_2, e_3]$.

25.8. Докажи $\overline{\overline{x}} = x$ и $x + \overline{x} = 2x_0$ для $x = \sum_{r=0}^{7} x_r e_r$.

25.9. Докажи, что каждый e_r, где $1 \le r \le 7$, имеет обратный $-e_r$.

25.10. В программе получены квадраты норм $N_{\mathbb{O}}(x) = 5$, $N_{\mathbb{O}}(y) = 13$, $N_{\mathbb{O}}(xy) = 64$. Может ли это быть точным результатом правильного умножения?

25.11. Для теста умножения пар выбраны $x = (1, i)$, $y = (j, k)$. Найди произведение и проверь норму.

25.12. Реши $e_4 y = 1$ и $y e_4 = 1$. Почему в обоих случаях решение единственно?

25.13.* Докажи трёхлинейность ассоциатора над $\mathbb{R}$: линейность по каждому из трёх аргументов отдельно.

25.14.* Докажи $\overline{xy} = \overline{y}\,\overline{x}$ непосредственно по формуле пар. Используй только доказанные свойства $\mathbb{H}$.

25.15.* Пусть $x \neq 0$ и $xy = xz$. Докажи $y = z$, не переставляя скобки и не умножая на обратный.

25.16.* Сравни $\mathbb{C}, \mathbb{H}, \mathbb{O}$: у каких примеров выполняются $xy = yx$ и $(xy)z = x(yz)$? Для отрицательных ответов приведи конкретные элементы.

ГЛАВА 26

Векторные пространства, базисы и линейные отображения

От координат к пространству

Вектор можно складывать с другим вектором и умножать на число. Эти действия важнее конкретной картинки со стрелками: те же правила выполняются для многочленов и матриц. Абстрактное определение выделяет общие свойства, после чего один аргумент работает сразу во многих примерах. В этой главе поле скаляров $\mathbb{K}$ равно $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$; если не сказано иное, используем $\mathbb{R}$.



Определение 26.1. Векторное, или линейное пространство (*vector space; linear space*) над $\mathbb{K}$ — непустое множество V с операциями $u+v \in V$ и $av \in V$, где $a \in \mathbb{K}$. Сложение коммутативно и ассоциативно, существует нулевой вектор и у каждого вектора есть противоположный. Кроме того,

$$a(u+v) = au + av, \qquad (a+b)v = av + bv,$$
$$a(bv) = (ab)v, \qquad 1v = v.$$

Эти равенства требуются для любых допустимых скаляров и векторов.

Числа a, b называют скалярами (*scalars*). В $\mathbb{R}^n$ действия выполняются по координатам. В пространстве $\mathcal{P}_m$ элементами служат многочлены $a_0 + a_1 t + \dots + a_m t^m$; старшие коэффициенты могут быть нулевыми, поэтому нулевой многочлен включён. Матрицы одного фиксированного размера также образуют пространство при обычном сложении и умножении на скаляр.

Определение 26.2. Линейная комбинация (*linear combination*) векторов $v_1, \dots, v_k$ — вектор $a_1 v_1 + \dots + a_k v_k$, где $a_i \in \mathbb{K}$.

Определение 26.3. Линейная оболочка (*linear span*) $\operatorname{span}(v_1, \dots, v_k)$ — множество всех таких комбинаций. Оболочка пустого списка по соглашению равна $\{0\}$.

Определение 26.4. Линейное подпространство (*linear subspace*) $W \subseteq V$ — непустое подмножество, замкнутое относительно сложения и умножения на любой скаляр, с операциями, унаследованными от V.

Теорема 26.1 (Критерий подпространства). *Непустое $W \subseteq V$ является подпространством тогда и только тогда, когда $au + bv \in W$ для всех $u, v \in W$ и $a, b \in \mathbb{K}$.*



Доказательство. Для подпространства это следует из двух замкнутостей. Обратно, выбирая $a = b = 0$, получаем $0 \in W$; выбирая коэффициенты $1, 1$, получаем замкнутость сложения, а $a, 0$ — умножения на скаляр. При $a = -1$ в W попадает противоположный вектор. Все остальные аксиомы уже верны в V, поэтому верны и для элементов W. ■

Например, решения однородной системы $Ax = 0$ образуют подпространство: $A(au + bv) = aAu + bAv = 0$. Прямая $x + y = 1$ не является подпространством $\mathbb{R}^2$, поскольку не содержит нуля. Перенесённая прямая может быть полезным геометрическим объектом, но проверять для неё аксиомы нужно заново.

Независимость, базис и размерность

Определение 26.5. Линейная независимость (*linear independence*) списка $v_1, \dots, v_k$ означает, что равенство $\sum_{i=1}^{k} a_i v_i = 0$ возможно только при $a_1 = \dots = a_k = 0$. Иначе список линейно зависим. Пустой список независим.

Определение 26.6. Базис (*basis*) пространства V — линейно независимый список векторов, линейная оболочка которого равна V.

Теорема 26.2 (Однозначность координат). *Каждый вектор имеет единственное представление линейной комбинацией векторов базиса.*

Доказательство. Существование следует из условия о линейной оболочке. Если две комбинации дают один вектор, вычтем их. Получится нулевая комбинация базисных векторов. Независимость заставляет каждую разность коэффициентов равняться нулю, то есть представления совпадают. ■

Определение 26.7. Координаты в базисе (*coordinates relative to a basis*) $B = (b_1, \dots, b_n)$ — коэффициенты единственного разложения $v = \sum a_i b_i$. Их столбец обозначается $[v]_B$.



Координаты зависят от выбора базиса, а сам вектор остаётся тем же. Например, $(3,1) = 2(1,1) + (1,-1)$, поэтому в базисе $B = ((1,1),(1,-1))$ его координаты равны $(2,1)$, хотя стандартные координаты равны $(3,1)$. Для многочлена роль координат могут играть коэффициенты при $1, t, t^2$. Наличие удобного базиса превращает вопрос о новых объектах в уже знакомую линейную систему.

Теорема 26.3 (Конечный базис и число его элементов). *Если V порождается конечным списком из n векторов, то у V есть конечный базис. Любой независимый список содержит не более n векторов. Все конечные базисы одного пространства имеют одинаковое число элементов.*

Доказательство. Из зависимого порождающего списка можно удалить вектор, выражающийся через остальные: оболочка не изменится. Повторяя удаление, получим независимый порождающий список.

Докажем оценку для независимых $u_1, \dots, u_m$ и порождающих $v_1, \dots, v_n$. В выражении u_1 через v_i хотя бы один коэффициент ненулевой; решим равенство относительно соответствующего v_i и заменим его на u_1. Новый список всё ещё порождает V. После k замен он содержит $u_1, \dots, u_k$. Если есть u_{k+1}, его выражение обязано содержать ненулевой коэффициент при ещё не заменённом v_i, иначе нарушилась бы независимость u_j. Снова выполняем замену. Более n замен невозможно, значит, $m \le n$. Для двух базисов применяем эту оценку в обе стороны: их длины равны. ■

Определение 26.8. Размерность (*dimension*) конечномерного пространства — число элементов его базиса, обозначаемое $\dim V$. Для нулевого пространства базис пуст и размерность равна 0.

У $\mathbb{R}^n$ стандартный базис состоит из $e_1, \dots, e_n$, где ровно одна координата равна 1. Поэтому $\dim \mathbb{R}^n = n$. У $\mathcal{P}_m$ базис $(1, t, \dots, t^m)$, и размерность равна $m+1$: коэффициенты многочлена определяются однозначно. Пространство всех многочленов без ограничения степени уже не имеет конечного базиса, поскольку конечное число многочленов не порождает степени выше наибольшей из их степеней.

Линейные отображения

Определение 26.9. Линейное отображение (*linear map; linear transformation*) $T : V \to W$ над одним полем удовлетворяет $T(au + bv) = aT(u) + bT(v)$.

Определение 26.10. Ядро (*kernel*) T — подпространство $\ker T = \{v : T(v) = 0\}$.

Определение 26.11. Образ (*image; range*) T — подпространство $\operatorname{im} T = \{T(v) : v \in V\}$.

Обе замкнутости следуют из линейности. Выбрав базис в V и базис в W, получаем матрицу отображения: её столбцы — координаты образов базисных векторов V. Для любого v линейность даёт $[T(v)]_C = A[v]_B$. Ранг отображения — размерность его образа; для матрицы это совпадает с числом ведущих элементов после метода Гаусса: столбцы исходной матрицы, соответствующие ведущим столбцам ступенчатой матрицы, образуют базис её образа.

Теорема 26.4 (Размерность ядра и образа; rank–nullity theorem). *Если V конечномерно и $T : V \to W$ линейно, то*

$$\dim V = \dim \ker T + \dim \operatorname{im} T.$$

В частности, T инъективно тогда и только тогда, когда $\ker T = \{0\}$.

Доказательство. В любом подпространстве можно выбирать независимые векторы, пока они не начнут порождать всё подпространство. Процесс заканчивается не позднее $\dim V$ шагов по предыдущей теореме. Выберем базис $u_1, \dots, u_p$ ядра и дополним его до базиса $u_1, \dots, u_p, v_1, \dots, v_q$ пространства V

тем же способом. Образы $T(v_j)$ порождают образ, поскольку $T(u_i)=0$. Если $\sum c_j T(v_j)=0$, то $\sum c_j v_j$ лежит в ядре, то есть выражается через u_i. Независимость полного базиса даёт все $c_j=0$. Значит, образы $T(v_j)$ — базис образа и $\dim V = p+q$. Наконец, $T(u)=T(v)$ равносильно $T(u-v)=0$, что доказывает критерий инъективности. ■

Скалярное произведение в произвольной размерности

Определение 26.12. Евклидово скалярное произведение (*Euclidean inner product*) в $\mathbb{R}^n$ задаётся как $\langle u, v\rangle = \sum_{i=1}^{n} u_i v_i$.
Евклидова норма (*Euclidean norm*) равна $\|v\| = \sqrt{\langle v, v\rangle}$.

Определение 26.13. Ортогональные векторы (*orthogonal vectors*) удовлетворяют $\langle u, v\rangle = 0$. Базис называют ортонормированным (*orthonormal*), если его векторы попарно ортогональны и имеют норму 1.


Теорема 26.5 (Коши–Буняковский в $\mathbb{R}^n$). *Для любых $u, v \in \mathbb{R}^n$ выполнено* $|\langle u, v\rangle| \le \|u\|\|v\|$.

Доказательство. При $v=0$ обе стороны нулевые. Иначе подставим $t = \frac{\langle u,v\rangle}{\|v\|^2}$ в неотрицательную сумму $\|u - tv\|^2$. Раскрытие квадратов даёт $\|u\|^2 - \frac{\langle u,v\rangle^2}{\|v\|^2} \ge 0$. Умножение на положительную норму в квадрате и извлечение корня дают результат. ■

Ортонормированный базис особенно удобен для измерений. Если $v = \sum a_i b_i$, то $\langle v, b_j\rangle = a_j$, а $\|v\|^2 = \sum a_i^2$: смешанные произведения исчезают. Поэтому смена одного ортонормированного базиса на другой сохраняет длины. Для произвольного базиса формулу суммы квадратов координат применять без дополнительной проверки нельзя.



Графики



Базис, координаты и ядро линейного отображения

Задачи

26.1. Проверь, является ли $W = \{(x, y) : x + y = 0\}$ подпространством $\mathbb{R}^2$. Найди базис.

26.2. Какие из множеств $x+y = 1$, $y = 2x$, $x \geq 0$ являются подпространствами $\mathbb{R}^2$?

26.3. Представь $(5, 1)$ через $u = (1, 1)$, $v = (1, -1)$.

26.4. Независимы ли $(1, 2, 3)$ и $(2, 4, 6)$? Предъяви ненулевые коэффициенты нулевой комбинации.

26.5. Проверь независимость $(1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 0)$ и объясни, образуют ли они базис $\mathbb{R}^3$.

26.6. Найди координаты $(4, -2)$ в базисе $((1, 1), (1, -1))$.



26.7. В $\mathcal{P}_2$ найди координаты $3 - 2t + 5t^2$ в базисе $(1, t, t^2)$ и размерность пространства.

26.8. Найди базис подпространства многочленов $p \in \mathcal{P}_2$, удовлетворяющих $p(0) = 0$.

26.9. Какова размерность пространства действительных матриц размера 2×3? Опиши базис.

26.10. Для $T(x, y, z) = (x + y, y + z)$ найди ядро, образ и их размерности.

26.11. Линейно ли отображение $T(x, y) = (x + 1, y)$? Обоснуй одним необходимым свойством.

26.12. Линейный датчик выдаёт одно число $T(x, y, z) = x - 2y + z$. Найди два независимых изменения входа, которых датчик не заметит.

26.13. Найди $\langle u, v\rangle$, $\|u\|$, $\|v\|$ для $u = (1, 2, -1)$, $v = (2, 0, 2)$. Ортогональны ли векторы?

26.14. Нормируй $(3, 4, 0)$. Сколько единичных векторов лежит на той же прямой?

26.15. Докажи, что пересечение двух подпространств является подпространством.

26.16. Приведи два подпространства $\mathbb{R}^2$, объединение которых не является подпространством.

26.17. Докажи: список, содержащий нулевой вектор, зависим. Что меняется для пустого списка?

26.18. Линейное отображение $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ имеет ранг 2. Найди размерность ядра. Может ли оно быть инъективным?

26.19.* Докажи, что любые пять векторов $\mathcal{P}_3$ линейно зависимы.

26.20.* Для $D : \mathcal{P}_3 \to \mathcal{P}_2$, $D(p) = p'$, докажи линейность, найди ядро и образ.

26.21. В ортонормированном базисе b_1, b_2 сила имеет вид $F = 6b_1 + 8b_2$. Найди длину и проекции на обе оси.

26.22.* Докажи, что линейное отображение между двумя пространствами одинаковой конечной размерности инъективно тогда и только тогда, когда сюръективно.

ГЛАВА 27

Собственные значения и квадратичные формы

Направления, которые сохраняет преобразование

Матрица обычно меняет и длину, и направление вектора. Однако некоторые направления могут сохраняться: образ вектора оказывается на той же прямой. Найти такие направления — значит выделить простейшие составляющие преобразования. Если из них удаётся составить базис, повторное применение матрицы сводится к возведению нескольких чисел в степень.



Определение 27.1. Собственный вектор (*eigenvector*) линейного оператора $A : V \to V$ — ненулевой v, для которого $Av = \lambda v$. Скаляру λ соответствует название
собственное значение (*eigenvalue*). Поле скаляров указывается заранее.

Определение 27.2. Собственное подпространство (*eigenspace*) для λ — $E_\lambda = \ker(A - \lambda I)$, включая нулевой вектор. При собственном значении это подпространство ненулевое.

Теорема 27.1 (Поиск в размерности два). *Для* $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ *собственные значения — решения*

$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^2 - (a+d)\lambda + ad - bc = 0.$$

После выбора λ *собственные векторы — ненулевые решения* $(A - \lambda I)v = 0$.



Доказательство. Однородная система двух уравнений имеет ненулевое решение ровно тогда, когда её матрица вырождена, то есть определитель нулевой; это следует из метода Гаусса или формулы обратной матрицы. Раскрытие определителя даёт выписанный многочлен. В размерности два $\det(\lambda I - A) = \det(A - \lambda I)$. ■

Определение 27.3. Характеристический многочлен (*characteristic polynomial*) в рассмотренном случае — многочлен χ_A, определённый в теореме.

У матрицы $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ значения $1, 3$; направления можно взять $(1, -1)$ и $(1, 1)$. У поворота на $\frac{\pi}{2}$, матрица которого равна $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, над $\mathbb{R}$ собственных векторов нет. Над $\mathbb{C}$ появляются собственные значения $i, -i$. Поэтому смена поля — содержательное действие, а не только смена шрифта в обозначении множества.

Диагонализация

Теорема 27.2 (Независимость собственных направлений)**.** *Собственные векторы, отвечающие попарно различным собственным значениям, линейно независимы.*

Доказательство. Индукция по числу векторов. Один ненулевой вектор независим. Пусть $\sum_{j=1}^{m} c_j v_j = 0$, где $A v_j = \lambda_j v_j$. Применим $A - \lambda_m I$; получим $\sum_{j<m} c_j (\lambda_j - \lambda_m) v_j = 0$. По индукции все эти коэффициенты нулевые. Разности значений ненулевые, значит, $c_j = 0$ для $j < m$, а исходное равенство даёт $c_m = 0$. ■

Определение 27.4. Диагонализация (*diagonalization*) — представление $A = PDP^{-1}$, где P обратима, а D диагональна.

Теорема 27.3 (Базис из собственных векторов). *Матрица диагонализируема над выбранным полем тогда и только тогда, когда существует базис из её собственных векторов. При таком базисе столбцы P — эти векторы, а диагональ D содержит соответствующие собственные значения.*

Доказательство. Умножение матрицы на столбцы даёт $AP = PD$ ровно тогда, когда каждый столбец P собственный с нужным значением. Столбцы образуют базис ровно при обратимости P. Умножение равенства на P^{-1} даёт утверждение в обе стороны. ■



При повторении преобразования можно использовать $A^m = PD^mP^{-1}$, $m \in \mathbb{N}$: соседние множители $P^{-1}P$ сокращаются по ассоциативности. Например, в двух найденных направлениях матрица со значениями $1, 3$ после m повторений умножает координаты на 1 и 3^m. Кратное собственное значение само по себе не гарантирует диагонализации: для $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ядро $A - I$ одномерно и собственного базиса в двумерном пространстве нет.

Симметрия и ортогональность

Определение 27.5. Транспонирование (*transpose*) меняет строки и столбцы местами: $(A^{\mathrm{T}})_{ij} = A_{ji}$. Действительная матрица симметрична (*symmetric*), если $A^{\mathrm{T}} = A$.

Определение 27.6. Ортогональная матрица (*orthogonal matrix*) — действительная квадратная матрица P, удовлетворяющая $P^{\mathrm{T}}P = I$; её столбцы образуют ортонормированный базис, и $P^{-1} = P^{\mathrm{T}}$.

Теорема 27.4 (Симметричная матрица размера два). *Действительная симметричная матрица $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ имеет действительные собственные значения и ортонормированный базис из собственных векторов. Следовательно, $A = PDP^{\mathrm{T}}$ для ортогональной P.*

Доказательство. Дискриминант характеристического многочлена равен $(a-c)^2+4b^2 \geq 0$. Если значения λ, μ различны и $Au = \lambda u$, $Av = \mu v$, то

$$\lambda\langle u, v\rangle = \langle Au, v\rangle = \langle u, A^{\mathrm{T}}v\rangle = \mu\langle u, v\rangle.$$

Среднее равенство проверяется раскрытием конечных сумм. Поэтому u, v ортогональны. Деление на положительные нормы делает их ортонормированными, а два независимых вектора дают базис. Если дискриминант нулевой, то $a = c, b = 0$, то есть $A = aI$, и подходит стандартный базис. Матрица с ортонормированными столбцами сохраняет нормы и обратима; из $P^{\mathrm{T}}P = I$ следует указанная обратная. ■

Квадратичные формы

Определение 27.7. Квадратичная форма (*quadratic form*) на $\mathbb{R}^n$ — функция $Q(x) = x^{\mathrm{T}}Ax$, где A — действительная симметричная матрица. В двух переменных $Q(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2$.

Определение 27.8. Положительно определённая форма (*positive definite form*) положительна при каждом ненулевом аргументе.
Отрицательно определённая форма (*negative definite form*) при каждом таком аргументе отрицательна.

Определение 27.9. Положительно полуопределённая форма (*positive semidefinite form*) неотрицательна для всех аргументов; отрицательная полуопределённость определяется аналогично.

Определение 27.10. Неопределённая форма (*indefinite form*) принимает как положительные, так и отрицательные значения.



Квадратичная форма описывает зависимость второго порядка: например, заданную в модели энергию или квадратичную ошибку. Смешанное слагаемое $2bxy$ мешает сразу увидеть поведение по осям. Для симметричной матрицы размера два ортогональная замена координат убирает это слагаемое, сохраняя длины. В новых координатах знаки коэффициентов показывают, растёт ли величина по всем направлениям или может уменьшаться по некоторым из них.

Теорема 27.5 (Главные оси в размерности два). *После замены $x = Pu$, где столбцы P — ортонормированные собственные векторы A, форма превращается в $\lambda_1 u_1^2 + \lambda_2 u_2^2$. Она положительно определена ровно при $\lambda_1, \lambda_2 > 0$, неотрицательна ровно при $\lambda_1, \lambda_2 \geq 0$, неопределённа при разных знаках значений.*

Доказательство. Из $P^{\mathrm{T}} A P = D$ получаем $x^{\mathrm{T}} A x = u^{\mathrm{T}} D u$. Замена обратима, поэтому охватывает все аргументы. Знаки диагональной формы проверяются по сумме квадратов и по двум координатным векторам. При разных знаках эти векторы дают значения разных знаков. ■

Теорема 27.6 (Критерий положительности в двух переменных). *Форма $ax^2 + 2bxy + cy^2$ положительно определена тогда и только тогда, когда $a > 0$ и $ac - b^2 > 0$.*


Доказательство. При $a > 0$ выделим квадрат:

$$Q = a\left(x + \frac{b}{a}y\right)^2 + \frac{ac - b^2}{a}y^2.$$

Два положительных коэффициента обеспечивают положительность при ненулевом аргументе. Обратно, положительность в $(1, 0)$ даёт $a > 0$; подстановка $(-\frac{b}{a}, 1)$ даёт $\frac{ac-b^2}{a} > 0$. ■

Например, $2x^2+2xy+2y^2$ превращается в $3u^2+v^2$ при $u = \frac{x+y}{\sqrt{2}}$, $v = \frac{x-y}{\sqrt{2}}$. Множество уровня $Q = 1$ — эллипс с полуосями $\frac{1}{\sqrt{3}}$ и 1, повёрнутый относительно исходных осей. А форма $x^2 - y^2$ равна нулю на двух прямых, хотя её матрица обратима: наличие ненулевого нулевого значения формы не означает вырожденности матрицы.

Графики



Собственные направления и главные оси квадратичной формы

Задачи

27.1. Найди собственные значения и подпространства матрицы $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$.

27.2. Для $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ найди характеристический многочлен и по одному собственному вектору.

27.3. Является ли нулевой вектор собственным вектором? Может ли 0 быть собственным значением? Приведи пример.

27.4. Найди все собственные значения $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ над $\mathbb{R}$ и над $\mathbb{C}$.

27.5. Докажи, что если $Av = \lambda v$, то $A^m v = \lambda^m v$ для каждого натурального m.



27.6. Диагонализируй $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, выбрав ортонормированные столбцы P.

27.7. Почему $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ не диагонализируется даже над $\mathbb{C}$?

27.8. В заданной модели повторного преобразования $x_{n+1} = Ax_n$, $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $x_0 = (1, 0)$. Найди x_n.

27.9. Для трёхмерного поворота $A(x, y, z) = (-y, x, z)$ найди неподвижные векторы. Какое собственное значение им соответствует?

27.10. Докажи: собственные векторы симметричной действительной матрицы с разными значениями ортогональны.

27.11. Докажи, что диагональная матрица с одним и тем же числом c на диагонали имеет каждый ненулевой вектор собственным.

27.12.* Для $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ найди $A^n(1, -1)$.

27.13. Запиши симметричную матрицу формы $3x^2 - 4xy + 5y^2$.

27.14. Определи знак формы $3x^2 - 4xy + 5y^2$ по критерию положительности.

27.15. Классифицируй формы $x^2 + y^2$, $-x^2 - y^2$, $x^2 - y^2$, x^2.

27.16. Выдели квадрат в $x^2 + 4xy + 7y^2$ и найди минимум по x при фиксированном y.

27.17. Найди собственные значения матрицы формы $2x^2 + 2xy + 2y^2$ и её главные оси.

27.18.* В модели энергии $E = 2x^2 + 2xy + 2y^2$ ограничение равно $x^2 + y^2 = 1$. Найди наименьшее и наибольшее значения энергии.

27.19. При каких действительных t форма $x^2 + 2txy + y^2$ положительно определена?

27.20. Докажи, что $Q(x, y) = xy$ неопределённа, хотя её матрица обратима.

27.21. Опиши множество $2x^2 + 2xy + 2y^2 = 1$ в главных координатах и найди длины его полуосей.

27.22. Докажи: если оба собственных значения симметричной матрицы размера два положительны, то форма положительна на каждом ненулевом векторе.

27.23.* Докажи, что форма $ax^2 + 2bxy + cy^2$ неотрицательна тогда и только тогда, когда $a \geq 0, c \geq 0, ac - b^2 \geq 0$.

27.24.* Построй эскизы уровней $Q = 1$ для $x^2 + y^2$, $x^2 - y^2$, x^2. Какие из них ограничены?

ГЛАВА 28

Полнота и метрические пространства

Последовательности Коши и полнота

В главе 12 полнота действительных чисел была сформулирована через точную верхнюю грань. Теперь рассмотрим другой способ заметить отсутствие «дырок»: члены последовательности сближаются друг с другом и должны иметь предел в том же пространстве.

Определение 28.1. Последовательность Коши (*Cauchy sequence*) — последовательность (a_n), для которой

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N \in \mathbb{N} \; \forall m, n \geq N : |a_m - a_n| < \varepsilon.$$

В этом условии не требуется заранее знать предел.

Теорема 28.1 (Сходимость и условие Коши). *Всякая сходящаяся действительная последовательность является последовательностью Коши. Всякая последовательность Коши ограничена.*

Доказательство. Если $a_n \to a$, выберем N так, чтобы при $n \geq N$ было $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$. При $m, n \geq N$ неравенство треугольника даёт $|a_m - a_n| \leq |a_m - a| + |a_n - a| < \varepsilon$. Для ограниченности применим условие Коши с $\varepsilon = 1$. При $n \geq N$ имеем $|a_n| \leq |a_N| + 1$. Конечное число первых членов тоже ограничено: достаточно взять максимум их модулей и числа $|a_N| + 1$. $\blacksquare$

Теорема 28.2 (Критерий Коши для действительных последовательностей). *Действительная последовательность сходится тогда и только тогда, когда она является последовательностью Коши.*

Доказательство. Одна импликация уже доказана. Пусть (a_n) — последовательность Коши. Она ограничена, поэтому определены

$$l_N = \inf\{a_n : n \geq N\}, \qquad u_N = \sup\{a_n : n \geq N\}.$$

Последовательность l_N не убывает, u_N не возрастает; обе ограничены. По теореме о монотонной последовательности из главы 12 они имеют пределы l, u. Для любого $\varepsilon > 0$ найдётся N, после которого любые два члена различаются меньше чем на ε. Тогда $u_N - l_N \le \varepsilon$: каждый член хвоста не больше любого другого плюс ε, после чего можно взять верхнюю и нижнюю грани. Следовательно, $u - l = 0$. Из $l_n \le a_n \le u_n$ получаем $a_n \to l = u$. ■



Рациональные числа позволяют приближать длины с любой конечной точностью, но этого недостаточно для полноты. Рациональные десятичные усечения числа $\sqrt{2}$ образуют последовательность Коши: ошибка усечения стремится к нулю. В $\mathbb{R}$ её предел равен $\sqrt{2}$, а в $\mathbb{Q}$ такого предела нет. Иррациональность $\sqrt{2}$ доказывается привычным рассуждением: из несократимой дроби $\frac{p}{q}$ и равенства $p^2 = 2q^2$ следовала бы чётность и p, и q.

Расстояние без координат

Определение 28.2. Метрика (*metric*) на множестве X — функция $d : X \times X \to \mathbb{R}$, для которой при любых $x, y, z \in X$:

$$d(x,y) \ge 0, \qquad d(x,y) = 0 \iff x = y,$$
$$d(x,y) = d(y,x), \qquad d(x,z) \le d(x,y) + d(y,z).$$

Последнее свойство — неравенство треугольника.

Определение 28.3. Метрическое пространство (*metric space*) — множество X вместе с метрикой d; записывают (X, d).



На прямой стандартное расстояние равно $|x-y|$. На плоскости можно измерять путь «по прямой» или вдоль прямоугольной сетки улиц. Один и тот же набор точек получает разные расстояния, если меняется правило измерения. Определения сходимости при этом сохраняют одну форму: нужно лишь заменить модуль разности на выбранную метрику.

На $\mathbb{R}^n$ используются, например,

$$d_2(x,y)=\sqrt{\sum_{j=1}^{n}(x_j-y_j)^2},$$
$$d_1(x,y)=\sum_{j=1}^{n}|x_j-y_j|,$$
$$d_\infty(x,y)=\max_{1\le j\le n}|x_j-y_j|.$$

Это евклидова метрика, метрика суммы модулей и метрика максимума. Для первой неравенство треугольника следует из неравенства Коши — Буняковского главы 26: $\|u+v\|^2\le(\|u\|+\|v\|)^2$. Для второй складываются обычные неравенства треугольника по координатам. Для третьей каждая разность координат не больше суммы двух соответствующих максимумов.

Определение 28.4. Дискретная метрика (*discrete metric*) задаётся правилом $d(x,y)=0$ при $x=y$ и $d(x,y)=1$ при $x\neq y$.

Определение 28.5. Открытый шар (*open ball*) с центром a и радиусом $r>0$ — множество $B_r(a)=\{x\in X: d(x,a)<r\}$.

Определение 28.6. Сходимость в метрическом пространстве (*convergence in a metric space*) означает $x_n\to x$, если $d(x_n,x)\to 0$.

Определение 28.7. Полное метрическое пространство (*complete metric space*) — пространство, в котором каждая последовательность Коши имеет предел. Условие Коши имеет вид $\forall\varepsilon>0\ \exists N\ \forall m,n\ge N:\ d(x_m,x_n)<\varepsilon$.

Теорема 28.3 (Единственность предела). *Последовательность в метрическом пространстве не может иметь два разных предела.*

Доказательство. Если $x_n \to a$ и $x_n \to b$, то $0 \le d(a,b) \le d(a,x_n) + d(x_n,b) \to 0$. Поэтому $d(a,b) = 0$, откуда $a = b$. ■

Открытые и замкнутые множества

Определение 28.8. Открытое множество (*open set*) $G \subseteq X$ содержит вместе с каждой своей точкой некоторый открытый шар с центром в этой точке.

Определение 28.9. Замкнутое множество (*closed set*) $F \subseteq X$ — множество, дополнение $X \setminus F$ которого открыто.

Теорема 28.4 (Замкнутость и пределы последовательностей). *Множество F замкнуто тогда и только тогда, когда предел любой сходящейся в X последовательности его точек принадлежит F.*

Доказательство. Если F замкнуто, $x_n \in F$ и $x_n \to x \notin F$, открытость дополнения даёт шар $B_r(x)$, не встречающий F. Но при больших n точка x_n должна попасть в этот шар — противоречие. Обратно, если дополнение не открыто, существует $x \notin F$, у которого каждый шар встречает F. Выбираем $x_n \in F \cap B_{1/n}(x)$. Тогда $x_n \to x \notin F$, что нарушает указанное свойство. ■

Теорема 28.5 (Замкнутое подмножество полного пространства). *Если X полно, а $F \subseteq X$ замкнуто, то F с той же метрикой полно.*

Доказательство. Последовательность Коши в F является последовательностью Коши и в X, поэтому имеет предел в X. Замкнутость F означает, что этот предел лежит в F. ■

Замкнутость всегда рассматривается относительно пространства, в котором находится множество. Например, $\mathbb{Q}$ замкнуто в самом себе, но не полно со стандартным расстоянием. Отрезок $[0;1]$ полон как замкнутое подмножество $\mathbb{R}$, а интервал $(0;1)$ не полон: последовательность $\frac{1}{n+1}$ имеет предел 0, который ему не принадлежит. Ограниченность сама по себе также не гарантирует полноту.



Подпоследовательности и непрерывность на отрезке

Определение 28.10. Подпоследовательность (*subsequence*) последовательности (x_n) — последовательность (x_{n_k}), где $n_1 < n_2 < \cdots$.

Теорема 28.6 (Больцано — Вейерштрасс; Bolzano–Weierstrass theorem). *Из всякой ограниченной действительной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность.*

Доказательство. Возьмём отрезок, содержащий все члены. Разделим его пополам и выберем замкнутую половину, содержащую члены с бесконечным числом индексов. Повторяем деление: получаем вложенные отрезки $[a_k; b_k]$, длины которых стремятся к нулю. Число $c = \sup\{a_k : k \geq 1\}$ принадлежит каждому из них: $a_k \leq c \leq b_k$. В каждом отрезке выберем член x_{n_k} с индексом больше предыдущего; это возможно из-за бесконечности набора индексов. Тогда $|x_{n_k} - c| \leq b_k - a_k \to 0$. ■

Определение 28.11. Секвенциально компактное множество (*sequentially compact set*) — множество, у любой последовательности точек которого есть подпоследовательность, сходящаяся к точке того же множества. Замкнутый ограниченный отрезок обладает этим свойством по предыдущей теореме и замкнутости.

Теорема 28.7 (Промежуточное значение; intermediate value theorem). *Если f непрерывна на $[a; b]$, то она принимает каждое значение между $f(a)$ и $f(b)$.*

Доказательство. Концевые значения достигаются на концах. Для строго промежуточного y рассмотрим сначала $f(a) < y < f(b)$. Множество $E = \{x \in [a; b] : f(x) \leq y\}$ непусто и ограничено. Положим $c = \sup E$. Непрерывность и строгие неравенства на концах дают $a < c < b$: около a есть точки из E, около b точек из E нет. Из определения супремума можно выбрать $x_n \in E$ с $x_n \to c$, поэтому $f(c) \leq y$. Если бы $f(c) < y$, непрерывность дала бы точку правее c со значением меньше y, вопреки определению c. Значит, $f(c) = y$. При $f(a) > y > f(b)$ применяем доказанное к $-f$. ■

Теорема 28.8 (Вейерштрасс о непрерывной функции; extreme value theorem). *Непрерывная действительная функция на отрезке $[a; b]$ ограничена и достигает своего наибольшего и наименьшего значений.*

Доказательство. Если функция не ограничена, можно выбрать $x_n \in [a;b]$ с $|f(x_n)| > n$. Из (x_n) выделяется подпоследовательность, сходящаяся к $c \in [a;b]$. По непрерывности её значения стремятся к конечному $f(c)$, что невозможно. Теперь $M = \sup f([a;b])$ существует. Для каждого n найдётся x_n с $M - \frac{1}{n} < f(x_n) \le M$. У сходящейся подпоследовательности аргументов предел $c \in [a;b]$, а значения стремятся к M. Следовательно, $f(c) = M$. Минимум получается применением этого рассуждения к $-f$. ■

Определение 28.12. Равномерная непрерывность (*uniform continuity*) функции $f : E \to \mathbb{R}$, $E \subseteq \mathbb{R}$, означает

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x, y \in E : |x - y| < \delta \Longrightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Один выбор δ подходит для всех точек E.




На отрезке непрерывность даёт сразу два удобных результата: существование максимума и возможность контролировать изменение функции одним шагом по аргументу. Если построить сетку достаточно мелкой, значения в пределах каждой её ячейки будут близки одновременно во всех ячейках. Именно такой контроль понадобится при определении интеграла через прямоугольники.

Теорема 28.9 (Кантор; Heine–Cantor theorem). *Непрерывная на отрезке функция равномерно непрерывна на нём.*

Доказательство. Если это неверно, найдётся $\varepsilon_0 > 0$ и для каждого n точки $x_n, y_n \in [a;b]$ с $|x_n - y_n| < \frac{1}{n}$, но $|f(x_n) - f(y_n)| \ge \varepsilon_0$. Выделим подпоследовательность $x_{n_k} \to c \in [a;b]$. Неравенство треугольника даёт $y_{n_k} \to c$. Непрерывность в c означает, что обе последовательности значений стремятся к $f(c)$, вопреки их различию не меньше чем на ε_0. ■

Графики



Единичные шары для трёх метрик на плоскости

Задачи

28.1. Докажи непосредственно по определению Коши, что $a_n = \dfrac{1}{n}$ — последовательность Коши.

28.2. Является ли $a_n = (-1)^n$ последовательностью Коши? Укажи значение ε, на котором условие нарушается.

28.3. Для $a_n = 3 + \dfrac{2}{n}$ найди номер N, после которого расстояние между любыми двумя членами меньше $0{,}01$.

28.4. Десятичные усечения $1;\ 1{,}4;\ 1{,}41;\ 1{,}414;\ \ldots$ числа $\sqrt{2}$ рассматриваются как последовательность в $\mathbb{Q}$. Почему она является последовательностью Коши, но не сходится в $\mathbb{Q}$?

28.5. Между точками $(1, 2)$ и $(4, 6)$ найди расстояния d_2, d_1, d_∞.

28.6. Нарисуй на плоскости открытые единичные шары с центром в нуле для метрик d_2, d_1, d_∞.



28.7. В дискретной метрике опиши $B_{1/2}(a)$, $B_1(a)$, $B_2(a)$.

28.8. Является ли $d(x, y) = (x - y)^2$ метрикой на $\mathbb{R}$?

28.9. Докажи неравенство треугольника для метрики максимума в $\mathbb{R}^n$.

28.10. В пространстве $\mathbb{R}$ со стандартной метрикой укажи, какие множества открыты, какие замкнуты: $(0;1)$, $[0;1]$, $[0;1)$, $\emptyset$, $\mathbb{R}$.

28.11. Какое из пространств $[0;1]$, $(0;1)$, $\mathbb{Z}$ полно со стандартным расстоянием?

28.12. Последовательность $x_n = (-1)^n + \dfrac{1}{n}$ ограничена. Найди две её подпоследовательности с разными пределами.

28.13. Почему теорема Вейерштрасса не гарантирует максимум функции $f(x) = x$ на $(0;1)$? Есть ли максимум фактически?

28.14. Найди минимум и максимум $f(x) = x^2 - 2x + 3$ на $[0;3]$.

28.15. Для $f(x) = 3x - 2$ на всей прямой подбери δ через ε, доказывающую равномерную непрерывность.

28.16. Докажи равномерную непрерывность $f(x) = x^2$ на $[0;2]$ прямой оценкой.

28.17. Датчик сообщает точки $p_n = (\dfrac{1}{n}, \dfrac{2}{n})$ на плоскости. К какой точке они сходятся в трёх метриках d_1, d_2, d_∞? Найди расстояния до предела.

28.18. По прямоугольной сетке улиц нужно попасть из $(0,0)$ в $(3,4)$. Сравни кратчайший путь вдоль улиц с расстоянием по прямой.

28.19.* Докажи, что любое пространство с дискретной метрикой полно.

28.20.* Докажи, что $\mathbb{R}^n$ полно в метрике d_∞.

28.21.* Докажи, что $f(x) = \dfrac{1}{x}$ не является равномерно непрерывной на $(0;1)$. Используй точки $\dfrac{1}{n}$ и $\dfrac{1}{n+1}$, $n \geq 2$.

28.22.* Докажи, что равномерно непрерывная функция $f : E \to \mathbb{R}$ переводит любую последовательность Коши в E в последовательность Коши значений.

28.23.* Докажи: всякая ограниченная действительная последовательность, у которой все сходящиеся подпоследовательности имеют один и тот же предел a, сама сходится к a.

28.24. Докажи, что шар $B_r(a)$ открыт в любом метрическом пространстве.

ГЛАВА 29

Интеграл Римана и первообразная

Площадь через нижние и верхние оценки

Если скорость меняется со временем, произведение «скорость на время» приходится заменять суммой по коротким промежуткам. На каждом таком промежутке можно взять минимальную и максимальную скорость. Получаются две оценки общего перемещения. Если при измельчении сетки их можно сделать сколь угодно близкими, общий результат определяется однозначно. Так устроено определение интеграла.



Определение 29.1. Разбиение отрезка (*partition*) $[a;b]$, $a<b$, — конечный набор точек $P:\ a=x_0<x_1<\dots<x_n=b$. Его мелкость (*mesh*) равна $\|P\|=\max_i(x_i-x_{i-1})$.

Определение 29.2. Для ограниченной функции $f:[a;b]\to\mathbb{R}$ нижняя и верхняя суммы Дарбу (*lower and upper Darboux sums*) определяются формулами

$$m_i=\inf_{x\in[x_{i-1};x_i]} f(x),\qquad M_i=\sup_{x\in[x_{i-1};x_i]} f(x),$$

$$L(f,P)=\sum_{i=1}^{n} m_i(x_i-x_{i-1}),\quad U(f,P)=\sum_{i=1}^{n} M_i(x_i-x_{i-1}).$$

Теорема 29.1 (Измельчение разбиения). *При добавлении точек разбиения нижняя сумма не уменьшается, верхняя не увеличивается. Для любых разбиений P,Q выполнено $L(f,P)\le U(f,Q)$.*

Доказательство. На меньшем отрезке инфимум не меньше прежнего, а супремум не больше прежнего. После умножения на длины частей и сложения получаем первое утверждение. Объединим точки P, Q в разбиение R. Тогда $L(f,P) \le L(f,R) \le U(f,R) \le U(f,Q)$. ■

Определение 29.3. Интегрируемость по Риману (*Riemann integrability*) ограниченной функции на $[a;b]$ означает равенство

$$\sup_P L(f,P) = \inf_P U(f,P).$$

Общее значение — определённый интеграл (*definite integral*), обозначаемый $\int_a^b f(x)\,dx$.

Теорема 29.2 (Критерий Дарбу; Darboux criterion). *Ограниченная функция интегрируема тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ существует разбиение P с $U(f,P) - L(f,P) < \varepsilon$.*

Доказательство. Обозначим нижний интеграл через I_-, верхний через I_+. По предыдущей теореме $I_- \le I_+$. Если зазор сумм можно сделать меньше любого положительного числа, то $0 \le I_+ - I_- \le U(f,P) - L(f,P) < \varepsilon$, значит, зазор интегралов равен нулю. Если $I_- = I_+ = I$, из определений супремума и инфимума выберем P, Q с $L(f,P) > I - \frac{\varepsilon}{2}$, $U(f,Q) < I + \frac{\varepsilon}{2}$. Общее измельчение R имеет $U(f,R) - L(f,R) < \varepsilon$. ■

Теорема 29.3 (Интегрируемость непрерывной функции). *Непрерывная функция на отрезке интегрируема по Риману.*

Доказательство. По главе 28 функция ограничена и равномерно непрерывна. Выберем $\delta > 0$, при котором $|x-y| < \delta$ влечёт $|f(x)-f(y)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$. Возьмём разбиение с мелкостью меньше δ. На каждой его части минимум и максимум достигаются, поэтому $M_i - m_i < \frac{\varepsilon}{b-a}$. Тогда $U - L = \sum_i (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) < \varepsilon$. Применяем критерий Дарбу. ■

Определение 29.4. Интегральная сумма Римана (*Riemann sum*) имеет вид $S(f,P,\xi) = \sum_i f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$, где $\xi_i \in [x_{i-1}; x_i]$.



Всегда $L(f,P) \le S(f,P,\xi) \le U(f,P)$. Для непрерывной функции при $\|P\| \to 0$ верхняя и нижняя суммы сближаются по только что доказанной оценке; любая сумма Римана стремится к интегралу. Если функция принимает отрицательные значения, вклад соответствующих прямоугольников отрицателен. Для геометрической площади между графиком и осью нужно интегрировать $|f|$.

Свойства определённого интеграла

Теорема 29.4 (Линейность, порядок и разбиение промежутка). *Если f, g интегрируемы на $[a;b]$, а $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, то*

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g)\,dx = \alpha \int_a^b f\,dx + \beta \int_a^b g\,dx.$$

Из $f \le g$ следует $\int_a^b f \le \int_a^b g$. При $a < c < b$ обе функции интегрируемы на частях отрезка и

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx.$$

Доказательство. Для общего разбиения сумма колебаний $\alpha f + \beta g$, умноженных на длины частей, не превосходит $|\alpha|(U_f - L_f) + |\beta|(U_g - L_g)$. Объединяя хорошие разбиения для f, g, делаем эту величину сколь угодно малой. Критерий Дарбу доказывает интегрируемость линейной комбинации. На таких разбиениях каждая сумма Римана отличается от своего интеграла не больше соответствующего зазора $U - L$. Линейность конечных сумм и стремление всех зазоров к нулю дают линейность интеграла. Если $f \le g$, то $L(f,P) \le L(g,P)$ для каждого P; взятие супремумов даёт порядок интегралов. Добавим c в хорошее разбиение. Зазор сумм на каждой части не больше зазора на всём отрезке, поэтому обе части интегрируемы. Обратно, хорошие разбиения частей можно объединить. Нижние и верхние суммы на объединении равны суммам соответствующих величин на частях; при стремлении зазоров к нулю получаем аддитивность. ■

Договоримся также, что $\int_a^a f(x)\,dx = 0$, а $\int_b^a f(x)\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx$. Это ориентированный интеграл: при перестановке пределов меняется знак.

От производной к первообразной

Определение 29.5. Первообразная (*antiderivative*) функции f на интервале — дифференцируемая функция F, для которой $F' = f$. Если она определена и непрерывна на концах отрезка, производная на концах для последующих формул не требуется.

Теорема 29.5 (Ролль; Rolle's theorem). *Если g непрерывна на $[a;b]$, дифференцируема на $(a;b)$ и $g(a) = g(b)$, то существует $c \in (a;b)$ с $g'(c) = 0$.*

Доказательство. Если функция постоянна, подойдёт любая внутренняя точка. Иначе хотя бы одно из наибольшего и наименьшего значений, существующих по теореме Вейерштрасса, отличается от общего значения на концах. Оно достигается внутри. По теореме Ферма из главы 20 производная там равна нулю. ■

Теорема 29.6 (Лагранж; mean value theorem). *Если g непрерывна на $[a;b]$ и дифференцируема на $(a;b)$, то для некоторого $c \in (a;b)$*

$$g(b) - g(a) = g'(c)(b-a).$$

В частности, функция с нулевой производной на интервале постоянна на нём.

Доказательство. Применим теорему Ролля к $h(x) = g(x) - g(a) - \frac{g(b)-g(a)}{b-a}(x-a)$. Она равна нулю на концах, а равенство $h'(c) = 0$ даёт нужную формулу. Если $g' = 0$, применяем формулу к любым двум точкам интервала. ■

Определение 29.6. Неопределённый интеграл (*indefinite integral*) $\int f(x)\,dx$ на интервале — семейство всех первообразных: $F(x) + C$, где C — произвольная действительная постоянная. Любые две первообразные различаются на постоянную по теореме Лагранжа.

Первообразная и определённый интеграл отвечают на разные вопросы. Первая восстанавливает функцию по её скорости изменения и оставляет произвольную постоянную. Второй вычисляет число, накопленное между двумя границами. Связь появляется у функции $A(x)$, которая каждому верхнему пределу сопоставляет накопленный интеграл: при небольшом сдвиге границы добавляется узкая полоска площади.



Теорема 29.7 (Производная интеграла с переменным верхним пределом). *Если f непрерывна на $[a;b]$, то функция $A(x)=\int_a^x f(t)\,dt$ непрерывна на $[a;b]$, дифференцируема внутри и $A'(x)=f(x)$.*

Доказательство. Пусть $|f|\le M$. Порядок интегралов даёт $|A(y)-A(x)|\le M|y-x|$, то есть непрерывность. Для внутренней точки x и малого ненулевого h аддитивность и ориентация дают

$$\frac{A(x+h)-A(x)}{h}-f(x)=\frac{1}{h}\int_x^{x+h}\bigl(f(t)-f(x)\bigr)\,dt.$$

Модуль правой части не больше максимума $|f(t)-f(x)|$ на отрезке между x и $x+h$. По непрерывности он стремится к нулю при $h\to 0$, независимо от знака h. ■

Теорема 29.8 (Ньютон — Лейбниц; fundamental theorem of calculus). *Если f непрерывна на $[a;b]$, а F непрерывна на этом отрезке и является первообразной f внутри, то*

$$\int_a^b f(x)\,dx=F(b)-F(a).$$

Доказательство. У $F-A$ нулевая производная внутри отрезка. По теореме Лагранжа эта разность постоянна внутри, а по непрерывности — и на концах. Поскольку $A(a)=0$, получаем $F(b)-F(a)=A(b)$. ■

Например, $\int_0^2 x^2\,dx=\frac{2^3}{3}-\frac{0^3}{3}=\frac{8}{3}$. Для $\int \frac{1}{x}\,dx$ первообразная равна $\ln|x|+C$ на любом интервале, не содержащем нуля; через ноль такое вычисление переносить нельзя.

Два способа преобразовать интеграл



При вычислении интеграла полезно смотреть на знакомые правила производной в обратном направлении. Произведение функций приводит к интегрированию по частям, а композиция — к замене переменной. У замены важно преобразовать не только выражение, но и оба предела: они описывают тот же путь через новый параметр.

Теорема 29.9 (Интегрирование по частям; integration by parts). *Для непрерывно дифференцируемых u, v на $[a; b]$*

$$\int_a^b u(x)v'(x)\,dx = u(b)v(b) - u(a)v(a) - \int_a^b u'(x)v(x)\,dx.$$

Доказательство. Проинтегрируем $(uv)' = u'v + uv'$ и применим формулу Ньютона — Лейбница и линейность. ■


Теорема 29.10 (Замена переменной; substitution rule). *Если f непрерывна на интервале, содержащем все значения непрерывно дифференцируемой φ на $[\alpha; \beta]$, то*

$$\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)\,dx.$$

Монотонность φ для этой формулы не требуется.

Доказательство. У непрерывной f есть первообразная F, построенная интегралом с переменным верхним пределом. По правилу цепочки $(F \circ \varphi)' = (f \circ \varphi)\varphi'$. Применение Ньютона — Лейбница к обеим сторонам даёт одну разность $F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha))$. ■

Графики



Суммы Дарбу и ориентированная площадь

Задачи

29.1. Для $f(x) = x$ на $[0; 2]$ и разбиения $0, 1, 2$ найди нижнюю и верхнюю суммы Дарбу.

29.2. Для $f(x) = x^2$ на $[0; 1]$ и четырёх равных частей вычисли суммы Дарбу и проверь, что $\dfrac{1}{3}$ лежит между ними.

29.3. Вычисли $\int_1^4 3\,dx$, $\int_0^2 2x\,dx$, $\int_{-1}^1 x\,dx$.

29.4. Найди площадь между графиком $y = x$ и осью x на $[-1; 1]$. Сравни с интегралом функции.

29.5. Вычисли $\int_0^1 (3x^2 - 2x + 1)\,dx$.

29.6. Найди $\int_1^e \dfrac{1}{x}\,dx$ и $\int_0^{\pi/2} \cos x\,dx$.

29.7. Известно, что $\int_0^1 f = 2$, $\int_1^3 f = 5$, $\int_0^3 g = -1$. Найди $\int_0^3 (2f - g)$ и $\int_3^0 f$.

29.8. Найди все первообразные $f(x) = 4x^3 - 2$ на $\mathbb{R}$.

29.9. Найди первообразную $f(x) = 2x$, удовлетворяющую условию $F(1) = 5$.



29.10. Проверь дифференцированием, что $\int \operatorname{ch} x\,dx = \operatorname{sh} x + C$, и вычисли $\int_0^{\ln 2} \operatorname{ch} x\,dx$.

29.11. Тележка движется по прямой со скоростью $v(t) = 2t + 1$ м/с при $0 \le t \le 3$ с. Найди перемещение за это время.

29.12. Плотность тонкой рейки длины 2 м равна $\rho(x) = 1 + x$ кг/м, где x отсчитывается от левого края в метрах. Найди массу.

29.13. Среднее значение непрерывной функции на $[a;b]$ определяют как $\dfrac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$. Найди среднее значение $f(x) = x^2$ на $[0;3]$.

29.14. Для $A(x) = \int_1^x (t^2 + 1)\,dt$ найди $A'(x)$ и $A(1)$.

29.15. Вычисли заменой переменной $\int_0^1 2xe^{x^2}\,dx$.

29.16. Вычисли по частям $\int_0^1 xe^x\,dx$.

29.17. Применима ли формула $\int_{-1}^{1} \dfrac{1}{x}\,dx = [\ln|x|]_{-1}^{1} = 0$ в смысле введённого здесь интеграла Римана?

29.18. Докажи оценку $\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \le M(b-a)$, если $a < b$, функция интегрируема и $|f(x)| \le M$.

29.19.* Докажи, что непрерывная неотрицательная функция на невырожденном отрезке с нулевым интегралом тождественно равна нулю.

29.20. Докажи: если $F' = G'$ на интервале, то $F - G$ постоянна на нём.

29.21.* Найди $\dfrac{d}{dx}\int_0^{x^2} \cos t\,dt$ и объясни оба использованных правила.

29.22.* Вычисли $\int_0^{\pi} \cos t\, e^{\sin t}\,dt$. Объясни, почему немонотонность $\sin t$ не мешает формуле замены.

29.23.* Докажи формулу $\int_0^b x\,dx = \dfrac{b^2}{2}$, $b > 0$, только через суммы Дарбу на n равных частях.

29.24.* Докажи теорему о среднем для интеграла: для непрерывной f на $[a;b]$, $a < b$, существует $c \in [a;b]$ с $\int_a^b f(x)\,dx = f(c)(b-a)$.

ГЛАВА 30

Числовые и степенные ряды

Бесконечная сумма и её частичные суммы

Определение 30.1. Числовой ряд (*numerical series*) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ изучается через
частичные суммы (*partial sums*) $S_N = \sum_{n=1}^{N} a_n$. Ряд
сходится (*converges*), если S_N имеет конечный предел S; этот предел называется суммой ряда. В остальных случаях ряд расходится.

Запись бесконечной суммы требует отдельной проверки сходимости. Слагаемые могут становиться маленькими, а общий итог всё равно расти без ограничения. Полезно каждый раз возвращаться к конечной сумме S_N, оценивать её и лишь затем переходить к пределу. Обычные действия с бесконечными выражениями оправдываются такими оценками.



Теорема 30.1 (Необходимое условие сходимости). *Если ряд $\sum a_n$ сходится, то $a_n \to 0$. Обратное утверждение неверно.*



Доказательство. При $n \geq 2$ имеем $a_n = S_n - S_{n-1}$. Если обе частичные суммы стремятся к S, разность стремится к нулю. Контрпример к обратному утверждению — гармонический ряд, расходимость которого докажем ниже. ■

Теорема 30.2 (Критерий Коши для ряда). *Ряд с действительными членами сходится тогда и только тогда, когда*

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N \; \forall m > n \geq N : \left| \sum_{k=n+1}^{m} a_k \right| < \varepsilon.$$

Доказательство. Сумма в модуле равна $S_m - S_n$. Условие означает, что последовательность частичных сумм является последовательностью Коши. Применяем полноту $\mathbb{R}$ из главы 28. ■

Ряды с неотрицательными членами

Теорема 30.3 (Ограниченность частичных сумм). *Для $a_n \geq 0$ ряд сходится тогда и только тогда, когда его частичные суммы ограничены сверху.*

Доказательство. Частичные суммы не убывают. Если они ограничены, применяется теорема о монотонной последовательности из главы 12. Обратно, сходящаяся последовательность ограничена. ■

Теорема 30.4 (Признак сравнения; comparison test). *Пусть начиная с некоторого номера $0 \leq a_n \leq b_n$. Если $\sum b_n$ сходится, то $\sum a_n$ сходится. Если $\sum a_n$ расходится, то $\sum b_n$ расходится.*

Доказательство. Удаление конечного числа первых членов не влияет на сходимость: частичные суммы меняются на одну постоянную. Для оставшихся членов частичные суммы меньшего ряда не превосходят частичных

сумм большего. Ограниченность большого ряда влечёт ограниченность малого. Второе утверждение — контрапозиция первого. ■

Теорема 30.5 (Гармонический ряд; harmonic series). *Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ расходится, хотя $\frac{1}{n} \to 0$.*

Доказательство. Сгруппируем члены от $2^{k-1}+1$ до 2^k, $k \geq 1$. В группе 2^{k-1} слагаемых, каждое не меньше 2^{-k}, поэтому сумма группы не меньше $\frac{1}{2}$. Следовательно, $S_{2^m} \geq 1 + \frac{m}{2} \to +\infty$. ■

Теорема 30.6 (Степенные числовые ряды; p-series). *Для действительного p ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ сходится тогда и только тогда, когда $p > 1$.*

Доказательство. При $p \leq 0$ члены не стремятся к нулю. При $0 < p \leq 1$ они не меньше $\frac{1}{n}$, поэтому ряд расходится по сравнению с гармоническим. Если $p > 1$, в группе $2^k \leq n < 2^{k+1}$ имеется 2^k членов, каждый не больше 2^{-kp}. Сумма группы не больше $2^{k(1-p)}$. Эти оценки образуют сходящуюся геометрическую прогрессию со знаменателем $2^{1-p} < 1$. Все частичные суммы исходного ряда ограничены суммой этой прогрессии; следовательно, ряд сходится. ■

Знаки слагаемых и оценка ошибки

Определение 30.2. Абсолютная сходимость (*absolute convergence*) ряда $\sum a_n$ означает сходимость ряда $\sum |a_n|$.

Определение 30.3. Условная сходимость (*conditional convergence*) означает, что $\sum a_n$ сходится, а $\sum |a_n|$ расходится.

Теорема 30.7 (Абсолютная сходимость влечёт сходимость). *Всякий абсолютно сходящийся действительный ряд сходится.*

Доказательство. По неравенству треугольника $\left|\sum_{k=n+1}^{m} a_k\right| \leq \sum_{k=n+1}^{m} |a_k|$. Правая часть меньше любого заданного $\varepsilon > 0$ при больших $m > n$ по критерию Коши для ряда модулей. Тот же критерий применим к исходному ряду. ■

Теорема 30.8 (Лейбниц; alternating series test). *Если $b_n \geq 0$, $b_{n+1} \leq b_n$ и $b_n \to 0$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} b_n$ сходится. Его сумма S удовлетворяет оценке $|S - S_N| \leq b_{N+1}$.*

Доказательство. Чётные частичные суммы не убывают, поскольку $S_{2k+2} - S_{2k} = b_{2k+1} - b_{2k+2} \geq 0$. Нечётные не возрастают, поскольку $S_{2k+3} - S_{2k+1} = -b_{2k+2} + b_{2k+3} \leq 0$. Все чётные суммы не больше всех нечётных: это следует из монотонности и $S_{2k+1} - S_{2k} = b_{2k+1} \geq 0$. Поэтому обе последовательности имеют пределы; их разность стремится к нулю. Обе сходятся к одному S, как и вся последовательность частичных сумм. Сумма S лежит между S_N и S_{N+1}, расстояние между которыми равно b_{N+1}. ■



При знакопеременных слагаемых соседние приближения могут подходить к ответу с разных сторон. Оценка Лейбница превращает эту картину в практическое правило: первый отброшенный член ограничивает ошибку. Например, ряд $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots$ сходится условно. Пока мы не доказали отдельную формулу его суммы, признак Лейбница сообщает сходимость и точность приближения, но не называет сумму.

Признак отношений

Теорема 30.9 (Даламбер; ratio test). *Пусть начиная с некоторого номера $a_n \neq 0$ и существует предел $L = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$, возможно равный $+\infty$. Если $L < 1$, ряд сходится абсолютно. Если $L > 1$, ряд расходится. При $L = 1$ этот признак ответа не даёт.*

Доказательство. Если $L < 1$, выберем q с $L < q < 1$. После некоторого номера $|a_{n+1}| \leq q|a_n|$; последовательное применение неравенства ограничивает хвост модулей геометрической прогрессией. При $L > 1$ аналогично найдётся $q > 1$ с $|a_{n+1}| \geq q|a_n|$ начиная с некоторого номера. Тогда модули не стремятся к нулю. При $L = 1$ ряд $\sum \frac{1}{n}$ расходится, а $\sum \frac{1}{n^2}$ сходится: оба имеют предел отношений 1. ■

Степенной ряд как семейство числовых рядов

Определение 30.4. Степенной ряд (*power series*) с центром a — выражение $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$. Член с $n=0$ равен c_0, в том числе при $x=a$; это соглашение о записи постоянного члена, а не присвоение общего значения 0^0.

Для каждого фиксированного x получается числовой ряд. При изменении x его сходимость может измениться. Геометрический ряд $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ сходится при $|x|<1$ и имеет сумму $\frac{1}{1-x}$; при $x=1$ и $x=-1$ его члены не стремятся к нулю. Концы промежутка всегда следует проверять отдельно.



Определение 30.5. Радиус сходимости (*radius of convergence*) степенного ряда — число $R = \sup\{|x-a| : \text{ряд сходится в точке } x\}$. Если это множество не ограничено, пишут $R=+\infty$.

Теорема 30.10 (Область сходимости степенного ряда). *При $|x-a|<R$ степенной ряд сходится абсолютно, при $|x-a|>R$ расходится. Для конечного положительного R сходимость в точках $a-R, a+R$ проверяется отдельно. Если $R=0$, сходимость есть только в центре; если $R=+\infty$, она абсолютна при всех действительных x.*


Доказательство. Пусть ряд сходится при $|x_0-a|=\rho>0$. Его слагаемые ограничены: $|c_n|\rho^n \le M$ при некотором M. Тогда при $|x-a|=r<\rho$

$$|c_n(x-a)^n| \le M\left(\frac{r}{\rho}\right)^n,$$

поэтому ряд сходится абсолютно по сравнению с геометрическим. Если $r<R$, по определению супремума существует расстояние сходимости $\rho>r$, и работает эта оценка. Если $r>R$, сходимость противоречила бы определению R. Для неограниченного множества расстояний выбор $\rho>r$ возможен при любом конечном r. В центре остаётся только постоянный член; случаи $R=0$ и конечных граничных точек следуют из того же рассуждения. ■

Почленное дифференцирование, интегрирование и перестановка бесконечного числа слагаемых требуют дополнительных теорем. На этом этапе используем конечные частичные суммы, уже доказанные признаки и отдельную проверку граничных точек.

Графики



Частичные суммы и проверка концов промежутка сходимости

Задачи

30.1. Для ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{2^n}$ выпиши первые четыре частичные суммы и найди сумму ряда.

30.2. Может ли сходиться ряд с членами $a_n = \dfrac{n}{n+1}$?

30.3. Найди сумму $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n(n+1)}$, разложив слагаемое на разность двух дробей.

30.4. Исследуй сходимость рядов $\sum \dfrac{1}{n^3}$, $\sum \dfrac{1}{\sqrt{n}}$, $\sum \dfrac{1}{n}$, $\sum \dfrac{1}{n^{1,1}}$. Во всех суммах $n \geq 1$.

30.5. Докажи сходимость $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^2+5}$ сравнением.

30.6. Докажи расходимость $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{2n+1}$ сравнением.



30.7. Является ли сходимость $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^{n-1}}{n}$ абсолютной или условной?

30.8. Исследуй абсолютную сходимость $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^n}{n^2}$.

30.9. Сколько первых членов ряда $1 - \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} - \cdots$ достаточно сложить для ошибки не более $0{,}01$ по оценке Лейбница? Укажи наименьшее число, которое гарантирует именно эта оценка.

30.10. Используя признак Даламбера, исследуй $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{3^n}{n!}$ и $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{n!}{3^n}$.

30.11. Почему признак Даламбера не решает вопрос для $\sum \dfrac{1}{n^2}$? Какой уже известный результат его решает?

30.12. Найди сумму и все действительные x, при которых сходится $\sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n$.

30.13. Для $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{x^n}{n}$ найди радиус и полный промежуток сходимости, включая проверку концов.

30.14. То же для $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{x^n}{n^2}$.

30.15. Для $\sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{x^n}{n!}$ найди радиус сходимости. Вычислять сумму не требуется.

30.16. Найди радиус сходимости $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$.

30.17. В бак сначала налили 1 л воды, затем $\dfrac{1}{2}$ л, затем $\dfrac{1}{4}$ л и так далее. Найди предельный объём и сколько таких порций нужно, чтобы до него не хватало меньше $0{,}01$ л.

30.18. Длина отрезка в узоре на каждом шаге уменьшается в 3 раза; первая длина равна 9 см. Найди сумму длин всех отрезков и остаток после пяти.

30.19. Докажи, что изменение конечного числа членов ряда не меняет его сходимость.

30.20. Докажи линейность суммы: если $\sum a_n = A$ и $\sum b_n = B$, то для действительных α, β ряд $\sum (\alpha a_n + \beta b_n)$ сходится к $\alpha A + \beta B$.

30.21.* Оцени сверху хвост $\sum_{n=N+1}^{\infty} \dfrac{1}{n^2}$ без интеграла, используя сравнение с $\dfrac{1}{n(n-1)}$, $N \geq 1$.

30.22.* Построй ряд, у которого $a_n \to 0$, но частичные суммы не ограничены. Докажи оба свойства.

30.23.* Найди область сходимости $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{(x-2)^n}{n3^n}$.

30.24.* Докажи: если степенной ряд с центром a сходится при $x = a + 2$, то он абсолютно сходится при $x = a - 1$. Обязан ли он сходиться при $x = a - 2$?

Ответы и краткие решения

Глава 1. Числа и свойства арифметических действий

1.1. $-8 < -3; 0 > -5; -4 < 4$.

1.2. -12.

1.3. 3.

1.4. -3.

1.5. -8.

1.6. 7. Делить на ноль нельзя.

1.7. -14.

1.8. -20.

1.9. -26.

1.10. -4. В записи -2^2 степень относится только к двойке.

1.11. $-2^\circ C$.

1.12. На уровне 2.

1.13. 115 очков.

1.14.* 3. Скобки равны 8 и 3, поэтому $-6 + 9 = 3$.

1.15.* $(18 - 6) : (3 + 1) = 3$.

1.16.* 8 верных и 4 неверных: $8 \cdot 5 - 4 \cdot 3 = 28$.

1.17. База $n = 0$: $0 = 0$. Переход: если сумма до n равна $\frac{n(n+1)}{2}$, то сумма до $n+1$ равна $\frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.



1.18. База $n = 1$: $1 = 1^2$. При переходе добавляется следующее нечётное число $2n+1$, а $n^2+(2n+1) = (n+1)^2$.

1.19.* База $n = 0$: обе части нулевые. Переход: $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$. Это нужная формула с $n+1$ вместо n.

1.20. База $n = 0$: $1 = 2 - 1$. Переход: к сумме до n добавляется 2^{n+1}, поэтому новая сумма равна $(2^{n+1} - 1) + 2^{n+1} = 2^{n+2} - 1$.

1.21. База $n = 0$: $1 \geq 1$. Если $3^n \geq 2n + 1$, то $3^{n+1} \geq 3(2n+1) = 6n+3 \geq 2n+3 = 2(n+1)+1$, поскольку $n \geq 0$.

1.22. База $n = 4$: $16 = 16$. Если $2^n \geq n^2$, то $2^{n+1} \geq 2n^2 \geq (n+1)^2$. Последнее неравенство верно при $n \geq 4$, так как $2n^2 - (n+1)^2 = (n-1)^2 - 2 \geq 7 > 0$.

1.23.* База $n = 0$: обе части нулевые. Переход: $\frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4} = \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2}\right)^2$.

1.24.* База $n = 1$: равенство. По предположению $(1 + x)^n \geq 1 + nx$. Умножая на $1 + x \geq 0$, сохраняем направление неравенства: $(1 + x)^{n+1} \geq (1 + nx)(1 + x) = 1 + (n + 1)x + nx^2 \geq 1 + (n + 1)x$. Без неотрицательности множителя направление могло бы измениться.

1.25. Из коммутативности $x + a = 0$. Тогда $x = x + 0 = x + (a + y) = (x + a) + y = 0 + y = y$.

1.26. Если один множитель нулевой, произведение равно нулю. Обратно: пусть $ab = 0$. При $a = 0$ утверждение уже выполнено. При $a \neq 0$ умножим равенство на $\frac{1}{a}$ и воспользуемся ассоциативностью: $b = \frac{1}{a}(ab) = \frac{1}{a} \cdot 0 = 0$.

Глава 2. Делимость, простые числа, НОД и НОК

2.1. $1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36$.

2.2. $1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48$.

2.3. $1, 2, 5, 10$.

2.4. $21, 28, 35, 42, 49, 56$.

2.5. 104.

2.6. Простые: $17, 31, 53$. Составные: $25, 39, 49, 51$.

2.7. $23, 29, 31, 37$.

2.8. Нет: такое натуральное число не меньше 10 и имеет делитель 2, отличный от 1 и самого числа.

2.9. Нет, например $9 = 3 \cdot 3$.

2.10. На 3 и на 9 делятся $126, 234, 405, 702$; 517 не делится ни на 3, ни на 9.

2.11. $230, 480$.

2.12. $2, 5, 8$.

2.13. 0 или 9.

2.14. $0, 6$.

2.15. $2^3 \cdot 3^2$.

2.16. $2 \cdot 3 \cdot 5^2$.

2.17. $2^2 \cdot 3^2 \cdot 7$.

2.18. $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$.

2.19. НОД $= 12$; НОК $= 72$.

2.20. НОД $= 9$; НОК $= 90$.

2.21. НОД $= 1$; НОК $= 120$.

2.22. НОД $= 6$; НОК $= 180$.

2.23. 12 наборов, в каждом 2 карандаша и 3 ручки.

2.24. В 9:36.

2.25. Сторона 12 см; 35 квадратов.

2.26. $1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24$.

2.27. $6, 12, 18, 24, 30$.

2.28. $2, 13, 29$. Число 1 не простое и не составное.

2.29. На все перечисленные.

2.30. $2^2 \cdot 3 \cdot 7$.

2.31. НОД $= 6$; НОК $= 36$.



2.32. 14 подарков; по 3 яблока и 4 мандарина.

2.33. Через 24 секунды.

2.34. Нет: 97 — простое число.

2.35.* 73: $\text{НОК}(6, 8, 9) = 72$, затем прибавляем 1.

2.36.* 36. Решение: $\frac{6 \cdot 180}{30} = 36$.

2.37.* 3150 и 3555. Сумма цифр равна соответственно 9 и 18.

2.38. Если $d \mid a$ и $d \mid b$, то $a = du$, $b = dv$, поэтому $a - b = d(u - v)$ и $d \mid (a - b)$. Обратно, если $d \mid b$ и $d \mid (a - b)$, то $d \mid ((a - b) + b) = a$. Множества общих делителей совпадают, значит, совпадают и их наибольшие элементы.

2.39. Если $a = 1$ или $b = 1$, вывод немедленно следует из условия. Иначе разложим оба множителя на простые. Их произведение даёт разложение ab. Поскольку $p \mid ab$, число p входит в разложение произведения; по единственности разложения оно входит в разложение хотя бы одного множителя. Значит, p делит этот множитель.

Глава 3. Обыкновенные дроби

3.1. $\frac{3}{4}$.

3.2. $3\frac{2}{5}$.

3.3. $\frac{17}{7}$.

3.4. $\frac{5}{8} > \frac{7}{12}$.

3.5. $-\frac{1}{12}$.

3.6. $\frac{31}{45}$.

3.7. $-\frac{2}{3}$.

3.8. $\frac{3}{2}$.

3.9. $\frac{1}{2}$.

3.10. 1.

3.11. $\frac{2}{3}$.

3.12. 32 страницы.

3.13. $\frac{17}{12}$ кг, или $1\frac{5}{12}$ кг.

3.14. 6 стаканов.

3.15. 9 км.

3.16.* $-\frac{1}{4}$. Решение: $(-\frac{1}{12}) : (\frac{1}{9}) + \frac{1}{2} = -\frac{3}{4} + \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}$.

3.17.* 180 страниц: осталось $(\frac{2}{3}) \cdot (\frac{3}{5}) = \frac{2}{5}$ книги.

3.18.* 30 л: осталось $(\frac{3}{4}) \cdot (\frac{2}{3}) = \frac{1}{2}$ бака.

3.19. Умножение равенства дробей на ненулевое число bd даёт $ad = bc$. Обратно, деление $ad = bc$ на $bd \neq 0$ даёт равенство дробей.

3.20. Для каждого $k \geq 1$ имеем $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$. При сложении соседние дроби взаимно уничтожаются: $\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$.

Глава 4. Десятичные дроби и проценты

4.1. $3{,}836$.

4.2. $5{,}53$.

4.3. $0{,}12$.

4.4. 60.

4.5. $0{,}875$.

4.6. $\frac{1}{8}$.

4.7. $0{,}(6)$.


4.8. $3{,}14$; $3{,}142$.

4.9. 36.

4.10. 180.

4.11. На 15%.

4.12. 960 рублей; снижение на 4%.



4.13. 225 рублей.

4.14. 4080 рублей.

4.15. $13{,}33$ км; после округления $13{,}3$ км.

4.16.* 3000 рублей: $\frac{2160}{0{,}8\cdot 0{,}9}$.

4.17.* На 20%. Решение: $\frac{25}{125} = 0{,}2 = 20\%$.

4.18.* 16%. Решение: $\frac{20+60}{500}\cdot 100\% = 16\%$.

4.19. Если исходная цена $S > 0$, конечная цена равна $S\left(1+\frac{p}{100}\right)\left(1+\frac{q}{100}\right) = S\left(1+\frac{p+q}{100}+\frac{pq}{10000}\right)$. Прибавка, делённая на S и умноженная на 100, равна $p+q+\frac{pq}{100}$.

4.20.* Если $\frac{p}{q} = \frac{m}{10^k}$, то $p10^k = mq$. Поскольку p и q взаимно просты, все простые множители q, с их кратностями, должны входить в $10^k = 2^k5^k$. Поэтому $q = 2^\alpha 5^\beta$. Обратно, при таком знаменателе возьмём $k = \max(\alpha,\beta)$ и домножим числитель и знаменатель на $2^{k-\alpha}5^{k-\beta}$. Знаменатель станет 10^k, а значит, дробь имеет конечную десятичную запись.

Глава 5. Отношения и пропорции

5.1. $3:4$.

5.2. $x = 12$.

5.3. $x = 6$.

5.4. 24 и 40.

5.5. 750 г.

5.6. 288 рублей.

5.7. $3,5$ км.

5.8. За 4 дня.

5.9. 2 часа.

5.10. $0{,}6$ л сока; $0{,}9$ л воды.

5.11. $y = 12$; удвоится.

5.12. $y = 4$; уменьшится вдвое.

5.13. 750 г.

5.14. За 6 часов.

5.15. $0{,}25$ л сиропа и $1{,}75$ л воды.

5.16.* 10 дней: $6\cdot 8\cdot\frac{5}{4\cdot 6}$.

5.17.* 7 л: $\frac{2k}{5k+3} = \frac{1}{4}$ даёт $k = 1$.

5.18.* При равных временах 75 км/ч. При равных расстояниях 72 км/ч: $\frac{2}{\frac{1}{60}+\frac{1}{90}}$.

5.19. Из условия $a = kb$, $c = kd$. Тогда $\frac{a+c}{b+d} = \frac{k(b+d)}{b+d} = k$; деление допустимо, поскольку $b + d > 0$.

5.20.* Из исходного неравенства следует $bc - ad > 0$. Разности равны $\frac{a+c}{b+d} - \frac{a}{b} = \frac{bc-ad}{b(b+d)} > 0$ и $\frac{c}{d} - \frac{a+c}{b+d} = \frac{bc-ad}{d(b+d)} > 0$. Обе границы доказаны.

Глава 6. Степени с целым показателем

6.1. 32.

6.2. 81 и -81.

6.3. $\frac{9}{8}$.

6.4. 5^7.

6.5. 2^5.

6.6. 3^8.

6.7. $\frac{9}{4}$.

6.8. 100.

6.9. $5{,}6 \cdot 10^{-4}$.

6.10. 720000.

6.11. a^3.

6.12. -1.

6.13. $2^8 = 256$ бактерий.

6.14. 10^6 м^2 $= 1000000$ м^2.

6.15. $1{,}2 \cdot 10^9$ байт.

6.16.* $16 = 2^4$.

6.17.* $\frac{9}{2}$. Решение: $\frac{3^4 \cdot 2}{3^2 \cdot 4} = \frac{9}{2}$.

6.18.* Сначала 2 МБ; через 6 дней 1458 МБ.

6.19. a^m содержит m множителей a, а a^n — ещё n. По сочетательному свойству их произведение состоит из $m + n$ таких множителей, то есть равно a^{m+n}.

6.20. $a^{-m}a^{-n} = \frac{1}{a^m}\frac{1}{a^n} = \frac{1}{a^{m+n}} = a^{-(m+n)}$. Все знаменатели ненулевые, поскольку $a \neq 0$.

Глава 7. Корни и действительные числа

7.1. $9; -3$.

7.2. $\frac{7}{10}$.

7.3. $6\sqrt{2}$.

7.4. $5\sqrt{2}$.

7.5. $\sqrt{45}$.

7.6. 6.

7.7. 5.

7.8. 7.

7.9. Между 5 и 6.

7.10. $\sqrt{7} < 2{,}7$, так как $7 < 2{,}7^2 = 7{,}29$.

7.11. $\sqrt{16}, -\frac{3}{7}, 0{,}(3)$.

7.12. $\sqrt{-9}$ не существует; $\sqrt[3]{-8} = -2$.

7.13. 7 м.

7.14. 5 м.

7.15. $0{,}5$ м, или 50 см.

7.16.* $2\sqrt{3}$. Решение: $4\sqrt{3} + 5\sqrt{3} - 7\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$.

7.17.* Квадрат левой части $5 + 2\sqrt{6} < 10$, поскольку $\sqrt{6} < \frac{5}{2}$. Поэтому исходное утверждение неверно: $\sqrt{2} + \sqrt{3} < \sqrt{10}$.

7.18.* 4 м и 12 м; диагональ $4\sqrt{10}$ м.

7.19. $|x| \geq 0$ и $|x|^n = x^n$. По определению арифметического корня единственное неотрицательное число с такой n-й степенью равно $|x|$.

7.20. Если $u = \sqrt[n]{a}$, то $(-u)^n = -u^n = -a$, так как n нечётно. По единственности нечётного корня $\sqrt[n]{-a} = -u$.

7.21. 3, -2, 2 соответственно.

7.22. $\sqrt[4]{-16}$ не определено в $\mathbb{R}$; $\sqrt[3]{-64} = -4$; $\sqrt[6]{0} = 0$.

7.23. $\sqrt[6]{x^6} = |x|$, $\sqrt[5]{x^5} = x$.

7.24. $\sqrt[4]{48} = 2\sqrt[4]{3}$; $\frac{\sqrt[3]{54}}{\sqrt[3]{2}} = \sqrt[3]{27} = 3$.

7.25. 4, $-\frac{1}{2}$, $\frac{1}{8}$ соответственно. В первых двух выражениях знаменатели несократимых показателей нечётны.

7.26. Первое уравнение: $x + 7 = 16$, поэтому $x = 9$. Второе: $2x - 1 = -27$, поэтому $x = -13$. Подстановка подтверждает оба ответа.

7.27.* Для четвёртого корня требуется $x - 2 \geq 0$, а знаменатель исключает $x = 2$. Кубический корень ограничений не добавляет. Область определения: $(2; +\infty)$.

7.28.* Получаем $|x-1| = 2-x$, поэтому $x \le 2$. При $x < 1$ равенство $1-x = 2-x$ невозможно; при $1 \le x \le 2$ получаем $x - 1 = 2 - x$, откуда $x = \frac{3}{2}$.

Глава 8. Модуль и числовые промежутки

8.1. 11.

8.2. 3.

8.3. 11.

8.4. $|-6| > |5|$.

8.5. $(-2; 3]$.

8.6. $-4 \le x < 1$.

8.7. $-2, -1, 0, 1, 2$.

8.8. $(1; 4]$.

8.9. $(-\infty; 5)$.

8.10. $x = -5$ или $x = 5$.

8.11. $-1 < x < 5$.

8.12. $|x|; 4$.



8.13. На $40^\circ C$.

8.14. $|x - 50| \le 0{,}2$; $[49{,}8; 50{,}2]$ мм.

8.15. $120 \le h < 190$; $[120; 190)$; при 190 см нельзя.

8.16.* $x = -2$ или $x = 4$. Между -1 и 3 сумма равна 4.

8.17.* $-2, -1, 2, 3$: допустимый отрезок $[-2; 3]$, исключаются 0 и 1.

8.18.* $(20; 23]$: пересечение $[17; 23]$ и $(20; 28)$.

8.19. Из $|a| = |(a-b)+b| \le |a-b| + |b|$ следует $|a|-|b| \le |a-b|$. После перестановки a, b получаем $|b|-|a| \le |a-b|$. Вместе эти два неравенства дают требуемое.

8.20. Для любого u и $r \ge 0$ условие $|u| \le r$ равносильно $-r \le u \le r$, что проверяется по случаям $u \ge 0$ и $u < 0$. Подставляем $u = x - a$ и прибавляем a к обеим границам.

Глава 9. Преобразование алгебраических выражений

9.1. $4x - 17$.

9.2. $6a + 2b$.

9.3. $x^2 + 6x + 9$.

9.4. $4x^2 - 1$.

9.5. $3x(2x - 3)$.

9.6. $(x - 4)(x + 4)$.

9.7. $(x + 2)(x + 3)$.

9.8. $x + 1$ при $x \neq 1$.

9.9. $\frac{7}{2x}$, $x \neq 0$.

9.10. $\frac{a}{b}$, $a \neq 0$ и $b \neq 0$.

9.11. $\frac{x-2}{x+2}$, $x \neq -2$.

9.12. $\sqrt{5} + 2$.

9.13. $3x + 2(x - 100) = 5x - 200$ рублей.

9.14. $x^2 + 7x + 10$ м^2.

9.15. $(x + 3)^2 - x^2 = 6x + 9$ м^2.

9.16.* $\frac{x+3}{x+2}$, $x \neq 3$ и $x \neq -2$.

9.17.* 1 при $x \neq -1$ и $x \neq 1$.

9.18.* Разность равна $4ab$; при данных значениях 39964.

9.19. После раскрытия квадратов левая часть равна $a^2+2ab+b^2+a^2-2ab+b^2 = 2a^2 + 2b^2$.

9.20. Общий знаменатель равен $(x-1)(x+1) = x^2 - 1$, а числитель разности — $(x+1) - (x-1) = 2$. При $x = 1$ или $x = -1$ один из исходных знаменателей нулевой, поэтому эти значения исключаются.

Глава 10. Комбинаторика и бином Ньютона

10.1. $5+3 = 8$ способов: группы книг не пересекаются, поэтому применяется правило суммы.

10.2. $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ комплекта по правилу произведения.

10.3. а) Порядок важен, повторений нет: размещение без повторений. б) Порядок не важен, повторений нет: сочетание без повторений. в) Порядок важен, повторения разрешены: размещение с повторениями. г) Порядок не важен, повторения разрешены: сочетание с повторениями.

10.4. 120, 1, 42; в последнем выражении сокращаются множители от 1 до 5, остаётся $7 \cdot 6$.

10.5. $6! = 720$ способов.

10.6. $\frac{5!}{2!2!} = 30$: буквы Т и О встречаются по два раза.

10.7. $A_8^3 = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$ вариантов.

10.8. $\binom{8}{3} = \frac{8!}{3!5!} = 56$ выборов.

10.9. $10^4 = 10000$ кодов: для каждой позиции независимо есть 10 вариантов.

10.10. $9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 4536$. Для первой цифры есть 9 ненулевых вариантов; для второй снова 9 вариантов, включая ноль и исключая уже выбранную цифру.

10.11. $\overline{C}_4^3 = \binom{4+3-1}{3} = \binom{6}{3} = 20$ выборов.

10.12. Нужно посчитать тройки (x_1, x_2, x_3) неотрицательных целых чисел с суммой 7. По методу звёздочек и перегородок ответ $\binom{7+3-1}{3-1} = \binom{9}{2} = 36$.



10.13. $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2} = 45$, значит, $n(n-1) = 90$. Подходит $n = 10$. Другого решения при $n \geq 2$ нет: произведение $n(n-1)$ строго возрастает с ростом n.

10.14. $\binom{8}{3} = \binom{7}{2} + \binom{7}{3} = 21 + 35 = 56$.

10.15. $x^4 + 8x^3 + 24x^2 + 32x + 16$.

10.16. $\binom{7}{3} 2^4 = 35 \cdot 16 = 560$.

10.17. При $n = 0$ обе части равны 1. При $n \geq 1$ подставим $a = b = 1$ в бином Ньютона: получим сумму всех коэффициентов и 2^n. Есть и подсчёт двумя способами: каждое из n различных элементов можно включить или не включить в подмножество, всего 2^n вариантов; группировка по числу выбранных элементов даёт левую часть.

10.18.* В группе может быть 2, 3 или 4 девушки. Эти случаи не пересекаются. Ответ: $\binom{4}{2}\binom{6}{3} + \binom{4}{3}\binom{6}{2} + \binom{4}{4}\binom{6}{1} = 120 + 60 + 6 = 186$.

10.19.* Из 10^5 кодов вычтем 9^5 кодов без нуля и 9^5 кодов без единицы. Коды, в которых нет ни нуля, ни единицы, были вычтены дважды; их 8^5, поэтому их нужно прибавить один раз. Ответ: $10^5 - 2 \cdot 9^5 + 8^5 = 14670$.

10.20.* Разделим $m+n$ различных элементов на две непересекающиеся группы размеров m и n. Всего выбрать r элементов можно $\binom{m+n}{r}$ способами. Если из первой группы взято ровно k элементов, из второй нужно взять $r-k$; вариантов $\binom{m}{k}\binom{n}{r-k}$. Суммирование по всем k даёт левую часть. Невозможные случаи дают ноль по условленному обозначению.

Глава 11. Уравнения, системы и неравенства

11.1. $x = 6$.

11.2. $x = -5$.

11.3. $x = 2$ или 3.

11.4. $x = -2$ или 2.

11.5. $x = 5$; ОДЗ: $x \neq 2$.

11.6. $x = 4, y = 3$.

11.7. $x < -4$.

11.8. $[-3; 3]$.

11.9. $(-\infty; -2) \cup (1; +\infty)$.

11.10. $(-1; 3]$.

11.11. $x = -2$ или 3.

11.12. $x = 2$. ОДЗ: $x \geq -2$. Для выполнения равенства необходимо $x \geq 0$. После возведения в квадрат кандидаты 2 и -1; проверка исключает -1.

11.13. 12 км.

11.14. 120 рублей.

11.15. 5 билетов.

11.16.* $x = 3$. После возведения в квадрат корни 3 и $-1; -1$ посторонний.

11.17.* $x < -3$: дробь после переноса равна $-\frac{5}{x+3}$.

11.18.* 5 м и 12 м: $x(17 - x) = 60$.

11.19. По формуле корней $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$. Их сумма равна $-\frac{b}{a}$, произведение — $\frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} = \frac{c}{a}$. При нулевом дискриминанте обе записи обозначают один и тот же корень, взятый дважды.

11.20. Уравнение равносильно $(2ax + b)^2 = D$, так как $4a(ax^2 + bx + c) = (2ax + b)^2 - D$ и $4a \neq 0$. Квадрат действительного числа неотрицателен, поэтому $D \geq 0$ необходимо. При $D \geq 0$ числа $x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$ удовлетворяют равенству, поэтому условие достаточно.

11.21. $x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$. Второй множитель равен $(x + 1)^2 + 3 > 0$, поэтому единственный действительный корень $x = 2$.

11.22. $x^3 + 27 = (x + 3)(x^2 - 3x + 9)$. Второй множитель равен $(x - \frac{3}{2})^2 + \frac{27}{4} > 0$, поэтому $x = -3$.

11.23. $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$. Корни: $1, 2, 3$.

11.24. Группировка даёт $x^2(2x - 3) - 4(2x - 3) = (2x - 3)(x - 2)(x + 2)$. Корни: $-2, \frac{3}{2}, 2$.

11.25.* Получаем $t^3 - 3t - 2 = (t - 2)(t + 1)^2 = 0$. Поэтому $t = 2$ или $t = -1$, а $x = 4$ или $x = 1$. Корень $x = 1$ имеет кратность 2.

11.26. При $u = x^2 \geq 0$ получаем $(u-1)(u-4) = 0$. Поэтому $x = -2, -1, 1, 2$.

11.27. $u^2 + 3u - 4 = (u-1)(u+4) = 0$. Значение $u = -4$ невозможно для $u = x^2$. При $u = 1$ получаем $x = -1$ или $x = 1$.

11.28.* $x \neq 0$. Получаем $t^2 - 5t + 4 = 0$, откуда $t = 1$ или $t = 4$. Значение 1 не подходит, а $t = 4$ даёт $x^2 - 4x + 1 = 0$. Ответ: $x = 2 - \sqrt{3}$ или $x = 2 + \sqrt{3}$.

Глава 12. Последовательности и прогрессии

12.1. $1, 4, 7, 10, 13$; $a_{10} = 28$.

12.2. $-1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{4}$. Член a_{25} отрицателен, a_{26} положителен.

12.3. $2, 3, 5, 9, 17$.

12.4. $d = 4$, $a_n = 3 + 4(n-1) = 4n - 1$.

12.5. $a_8 = 7 + 7(-3) = -14$.

12.6. $d = \frac{35-11}{9-3} = 4$, $a_1 = 11 - 2 \cdot 4 = 3$.

12.7. $a_{20} = 43$, $S_{20} = \frac{20(5+43)}{2} = 480$.

12.8. $q = -2$, $a_n = 3(-2)^{n-1}$, $a_6 = -96$.

12.9. $a_5 = 81(\frac{1}{3})^4 = 1$.

12.10. $q^3 = \frac{48}{6} = 8$, поэтому $q = 2$, $a_1 = 3$.

12.11. $128 = 2^7$, поэтому слагаемых 8. Сумма $S_8 = \frac{1-2^8}{1-2} = 255$.

12.12. $q = -\frac{1}{3}$, $|q| < 1$, поэтому $S = \frac{18}{1+\frac{1}{3}} = \frac{27}{2}$.



12.13. В двенадцатую неделю 650 рублей; всего $\frac{12(100+650)}{2} = 4500$ рублей.

12.14. В последнем ряду $12+19\cdot 2 = 50$ мест; всего $\frac{20(12+50)}{2} = 620$ мест.

12.15. За седьмой день $2\cdot 2^6 = 128$ монет; всего $\frac{2(2^7-1)}{2-1} = 254$ монеты.

12.16. Первый член равен 1, последний — $2N-1$, слагаемых N. Поэтому $S_N = \frac{N(1+2N-1)}{2} = N^2$.

12.17. $S_{2k} = 0$, $S_{2k-1} = a$. Если бы существовал предел S, для $\varepsilon = \frac{|a|}{3}$ все поздние суммы удовлетворяли бы $|S_N - S| < \varepsilon$. Среди них есть и 0, и a, поэтому $|a| \le |a-S| + |S| < \frac{2|a|}{3}$, что невозможно при $a \ne 0$.

12.18.* Положим $b_n = a_n + 1$. Тогда $b_1 = 4$, $b_{n+1} = 2b_n$, откуда $a_n = 4\cdot 2^{n-1} - 1$. Поэтому $S_{10} = 4(2^{10}-1) - 10 = 4082$.

12.19.* Из $2a_1 + 5d = 34$ получаем $a_3 = 17 - \frac{d}{2}$, $a_4 = 17 + \frac{d}{2}$. Тогда $289 - \frac{d^2}{4} = 280$, то есть $d = 6$, поскольку $d > 0$. Отсюда $a_1 = 2$, $S_{10} = 290$.

12.20.* $q = \frac{1}{4}$, $S = \frac{256}{3}$, $R_N = \frac{256}{3}\cdot 4^{-N}$. При $N = 4$ остаток $\frac{1}{3}$, при $N = 5$ — $\frac{1}{12} < \frac{1}{10}$. Остатки положительны и убывают, поэтому минимальное $N = 5$.

12.21. Супремум и наибольший элемент равны 5; инфимум равен -2, наименьшего элемента нет.

12.22. $\sup A = 2$, достигается при $n = 1$. Все элементы больше 1, но для любого $\varepsilon > 0$ можно выбрать $n > \frac{1}{\varepsilon}$, получив $1 + \frac{1}{n} < 1 + \varepsilon$. Поэтому $\inf A = 1 \notin A$.

12.23. Нижние грани: $(-\infty; -3]$, верхние: $[7; +\infty)$. $\inf A = -3$, $\sup A = 7$. Обе грани являются элементами A.

12.24. Пусть $m = \inf A$. Число $c + m$ — нижняя грань сдвинутого множества. Если b — другая нижняя грань, то $b - c$ — нижняя грань A, поэтому $b - c \le m$, то есть $b \le c + m$.

Глава 13. Функции и графики

13.1. $-7, -3, 3$.

13.2. Все действительные x, кроме 4.

13.3. $[-3; +\infty)$.

13.4. $x = -2$ и 2.

13.5. При $x > 2$.

13.6. С осью y: $(0; 1)$; с осью x: $(-\frac{1}{2}; 0)$.

13.7. Вершина $(2;-1)$; сдвиг $y=x^2$ на 2 вправо и на 1 вниз.

13.8. Убывает на $(-\infty;0]$, возрастает на $[0;+\infty)$.

13.9. f нечётная; g чётная.

13.10. $(x+1)^2; x^2+1$.

13.11. $[2;+\infty)$.

13.12. $(-1;1)$ и $(2;4)$.

13.13. $C(0)=200, C(2)=500, C(4)=800$ рублей; луч из точки $(0;200)$.

13.14. $V(t)=60-5t; 0\le t\le 12$; бак пуст через 12 минут.

13.15. Равны при 5 км; при 2 км дешевле B: 80 против 140; при 8 км дешевле A: 260 против 320 рублей.

13.16.* $[1;3)\cup(3;+\infty)$.

13.17.* Вершина $(2;1); x\in[-1;5]$.

13.18.* $S=x(10-x)=25-(x-5)^2, 0<x<10$. Максимум 25 м^2 при сторонах 5 м.

13.19.* Из $ax_1+b=ax_2+b$ следует $a(x_1-x_2)=0$, а затем $x_1=x_2$: функция инъективна. Для каждого $y\in\mathbb{R}$ подходит $x=\frac{y-b}{a}$: функция сюръективна. Поэтому $f^{-1}(y)=\frac{y-b}{a}$. Подстановка даёт $f^{-1}(f(x))=\frac{ax+b-b}{a}=x$ и $f(f^{-1}(y))=a\frac{y-b}{a}+b=y$.

13.20.* Если $f(g(x_1))=f(g(x_2))$, инъективность f даёт $g(x_1)=g(x_2)$, а инъективность g — $x_1=x_2$. Для сюръекций возьмём любой $z\in Z$: найдётся $y\in Y$ с $f(y)=z$, а затем $x\in X$ с $g(x)=y$. Тогда $(f\circ g)(x)=z$, что доказывает сюръективность.

13.21. График — две полупрямые с общей вершиной $(0;-2)$, проходящие через $(-2;0)$ и $(2;0)$. Область значений $[-2;+\infty)$. Это сюръекция: для каждого $y\ge -2$ можно взять $x=y+2$. Инъекции нет, поскольку $f(-1)=f(1)=-1$; биекции и обратного отображения на всей $\mathbb{R}$ нет.

13.22.* Для f область определения $[-1;+\infty)$, область значений $[2;+\infty)$. Из $y-2=\sqrt{x+1}$, где $y\ge 2$, следует $x=(y-2)^2-1$. Поэтому $f^{-1}(x)=(x-2)^2-1$ при $x\ge 2$. Точки графика f: $(-1;2),(0;3),(3;4),(8;5)$; точки обратного графика: $(2;-1),(3;0),(4;3),(5;8)$. Координаты меняются местами, что подтверждает симметрию.

Глава 14. Степенные, показательные и логарифмические функции

14.1. Обе: все действительные числа, кроме 0; ветви в I и III четвертях.

14.2. Обе: $[0;+\infty)$; график проходит через $(0;0),(1;1),(4;2)$.

14.3. $x = -3$.

14.4. $x = 5$.

14.5. $x = 3$.

14.6. $x < 3$.

14.7. 3.

14.8. -2.

14.9. $x = 9$; ОДЗ: $x > 1$.

14.10. $x < 5$.

14.11. 3.

14.12. Первое меньше второго в первой паре; первое больше второго во второй паре.

14.13. 10000 рублей.

14.14. Через 4 часа.

14.15. 10 шагов в заданной модели.

14.16.* $x = 0$ или $x = 2$. Подстановка $t = 2^x$ даёт $t^2 - 5t + 4 = 0$, откуда $t = 1$ или $t = 4$.

14.17.* $x = 3$: ОДЗ $x > 1$; $x^2 - 1 = 8$; отрицательный корень исключается.

14.18.* 3 года: $1,1^3 = 1,331$, а через 2 года сумма 12100 рублей.

14.19.* По формуле смены основания произведение равно $\frac{\ln b}{\ln a} \cdot \frac{\ln a}{\ln b} = 1$. При $a = 1$ или $b = 1$ один из логарифмов имел бы недопустимое основание; соответствующий знаменатель в этой записи был бы нулём.

14.20.* Квадрат неотрицателен: $(e^{x/2} - e^{-x/2})^2 = e^x + e^{-x} - 2 \geq 0$. Поэтому $\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \geq 1$. Равенство возможно ровно при $e^{x/2} = e^{-x/2}$; инъективность экспоненты даёт $x = 0$.



14.21. Соответственно $1, 0, 3, 5$.

14.22. ОДЗ: $x > 1$. Равенство равносильно $x - 1 = e^2$, поэтому $x = 1 + e^2$; этот корень удовлетворяет ОДЗ.

14.23. Первое выражение равно $\log_2 8 = 3$. Во втором $2\ln 3 = \ln 9$, поэтому значение равно $e^0 = 1$.

14.24. При $n = 2$: $1000(\frac{3}{2})^2 = 2250$ рублей. При $n = 4$: $1000(\frac{5}{4})^4 = 2441{,}40625$, то есть $2441{,}41$ рубля. Предельная сумма $1000e \approx 2718{,}28$ рубля.

14.25. Поскольку $e^{\ln 2} = 2$, а $e^{-\ln 2} = \frac{1}{2}$, получаем $\operatorname{sh}(\ln 2) = \frac{3}{4}$, $\operatorname{ch}(\ln 2) = \frac{5}{4}$. Проверка: $(\frac{5}{4})^2 - (\frac{3}{4})^2 = \frac{25-9}{16} = 1$.

14.26.* Имеем $t > 0$ и $\frac{t-\frac{1}{t}}{2} = \frac{3}{4}$, откуда $2t^2 - 3t - 2 = 0$. Корни $t = 2$, $t = -\frac{1}{2}$; отрицательный не подходит. Поэтому $x = \ln 2$.

14.27.* При $t = e^x > 0$ получаем $\frac{t+\frac{1}{t}}{2} = \frac{5}{4}$, то есть $2t^2 - 5t + 2 = 0$. Оба корня положительны: $t = 2$ и $t = \frac{1}{2}$. Ответ: $x = \ln 2$ или $x = -\ln 2$.

14.28. Для sh точки равны $(-\ln 2; -\frac{3}{4}), (0; 0), (\ln 2; \frac{3}{4})$; график нечётен и возрастает, ниже оси при $x < 0$, выше при $x > 0$. Для ch точки $(-\ln 2; \frac{5}{4}), (0; 1), (\ln 2; \frac{5}{4})$; график чётен, весь лежит не ниже прямой $y = 1$.

14.29. $\operatorname{ch}(\ln 2) = \frac{2+\frac{1}{2}}{2} = \frac{5}{4}$, поэтому $y = 1$ м. При $x = -4\ln 2$ высота та же по чётности.

14.30.* Для $t = \frac{x}{a}$ имеем $\operatorname{ch} t - 1 = \frac{(e^t-1)^2}{2e^t} \geq 0$. Равенство возможно ровно при $e^t = 1$, то есть $t = 0$, а значит $x = 0$. Минимум $y = 0$.

14.31. $X = \frac{3+\frac{1}{3}}{2} = \frac{5}{3}$, $Y = \frac{3-\frac{1}{3}}{2} = \frac{4}{3}$. Разность квадратов $\frac{25-16}{9} = 1$.

14.32. Соответственно 0, $\frac{3}{5}$, $\frac{5}{3}$, поскольку $e^{2\ln 2} = 4$.

14.33. $-\frac{4}{5}$ и $-\frac{5}{4}$: используем $e^{2\ln 3} = 9$ и нечётность.

14.34. Для $t = e^{2x}$ получаем $\frac{t-1}{t+1} = \frac{1}{2}$, откуда $t = 3$. Единственное решение $x = \frac{1}{2}\ln 3$.

14.35. $\frac{t+1}{t-1} = 2$ даёт $t = 3$, то есть $x = \frac{1}{2}\ln 3 \neq 0$.

14.36. Ни одно: первые два значения не принадлежат $(-1; 1)$, последнее — множеству $\{|y| > 1\}$.

14.37. Для th: вся прямая, нечётность, возрастание, значения $(-1; 1)$; пределы при $x \to \pm\infty$ равны ± 1. Для cth: $x \neq 0$, нечётность, убывание на каждой ветви, те же пределы на бесконечностях и вертикальная асимптота $x = 0$. Всё следует из дробей через $t = e^{2x}$.

14.38. $t = \frac{1}{2}\ln 3$. Уровень 2 при конечном t не достигается, поскольку $\operatorname{th} t < 1$.

14.39. При $x \neq 0$ обе функции определены, и произведение двух взаимно обратных дробей равно 1. При $x = 0$ исходное произведение не определено.

14.40.* Положим $A = e^{2x}$, $B = e^{2y}$. После приведения к общему знаменателю числитель равен $\frac{2(AB-1)}{(A+1)(B+1)}$, знаменатель — $\frac{2(AB+1)}{(A+1)(B+1)} > 0$. Их частное равно $\frac{AB-1}{AB+1} = \operatorname{th}(x+y)$.

14.41.* Из нечётности и строгого возрастания следует $-a \leq x \leq a$. Все концы включены.

Глава 15. Тригонометрия

15.1. $\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}$.

15.2. $45°$ и $210°$.

15.3. $\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 1$.

15.4. sin положителен, cos отрицателен.

15.5. $-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}$.

15.6. 3.

15.7. $\cos x = \frac{4}{5}; \operatorname{tg} x = \frac{3}{4}$.

15.8. $\sin x; -\cos x$.

15.9. $0, \pi, 2\pi$.

15.10. $\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$.

15.11. Нули: $0, \pi, 2\pi$; максимум 1 при $\frac{\pi}{2}$; минимум -1 при $\frac{3\pi}{2}$.

15.12. π.

15.13. 6 м.

15.14. 5 м.

15.15. 12 м, 22 м, 2 м соответственно.

15.16.* $\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}$. После решения квадратного уравнения получаем $\sin x = \frac{1}{2}$ или $\sin x = 1$.

15.17.* $4\sqrt{3}$ м.

15.18.* Минимум 3 м, максимум 27 м; первый максимум при $t = 20$ с.

15.19.* Пусть $\alpha = \arcsin t$. Тогда $\alpha \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ и $\sin \alpha = t$. Угол $-\alpha$ лежит в том же промежутке, причём $\sin(-\alpha) = -t$. По единственности угла в определении $\arcsin(-t) = -\alpha = -\arcsin t$.

15.20.* Пусть $\alpha = \arccos t \in [0; \pi]$. Тогда $\pi - \alpha \in [0; \pi]$ и $\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha = -t$. По определению арккосинуса $\arccos(-t) = \pi - \alpha$.

15.21. Соответственно 0, $\frac{\pi}{6}$, $-\frac{\pi}{3}$. Все углы входят в $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$.

15.22. Соответственно $\frac{2\pi}{3}$, 0, $\frac{\pi}{2}$. Все углы входят в $[0; \pi]$.

15.23. Соответственно $-\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$, 0.



15.24.* Получаем $\arcsin\frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$, $\arccos\frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}$, $\operatorname{arctg}(-1) = -\frac{\pi}{4}$. Исходные углы не лежат в соответствующих диапазонах обратных функций, поэтому механически сокращать функции нельзя.

15.25. Оба значения равны $\frac{4}{5}$. Угол арксинуса лежит в $[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}]$, где косинус неотрицателен; угол арккосинуса лежит в $[0;\pi]$, где синус неотрицателен. В обоих случаях по основному тождеству модуль искомого значения равен $\sqrt{1-\frac{9}{25}} = \frac{4}{5}$.

15.26. Из $-1 \leq 2x-1 \leq 1$ получаем ОДЗ $0 \leq x \leq 1$. Синус обеих частей даёт $2x-1 = \frac{1}{2}$, поэтому $x = \frac{3}{4}$. Правая часть исходного уравнения принадлежит диапазону арксинуса; подстановка подтверждает корень.

15.27. Уравнение определено для всех действительных x. Поскольку $-\frac{\pi}{4} \in (-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2})$, получаем $x-2 = \operatorname{tg}(-\frac{\pi}{4}) = -1$. Ответ: $x = 1$.

15.28. Точки $(-1;-\frac{\pi}{4}), (0;0), (1;\frac{\pi}{4})$. Область определения $\mathbb{R}$, область значений $(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2})$. Функция нечётная и строго возрастает; график приближается к прямым $y = -\frac{\pi}{2}$ слева и $y = \frac{\pi}{2}$ справа, но не достигает их. Значение $\frac{\pi}{2}$ невозможно.

15.29. $\sqrt{3}, 1, \frac{\sqrt{3}}{3}, 0$.

15.30. Область: $x \neq \frac{\pi k}{2}$. Нули: $x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$.

15.31. $x = \frac{\pi}{6} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. Единственность на $(0;\pi)$ следует из строгого убывания.

15.32. $\operatorname{ctg}\alpha = \frac{3}{4}$, гипотенуза 10 см.

15.33. Первый график имеет асимптоты $x = \pi k$, нули $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$, период π. Второй сдвинут вправо на $\frac{\pi}{4}$; асимптоты $\frac{\pi}{4} + \pi k$, нули $\frac{3\pi}{4} + \pi k$.

15.34. Для $\sin x \cos x \neq 0$ произведение дробей равно 1. При $x = \frac{\pi}{2}$ тангенс не определён, поэтому произведение не существует.

15.35.* $\sin\frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$, $\cos\frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.

15.36.* Требуются $\sin x \neq 0$, $\sin y \neq 0$, $\sin(x+y) \neq 0$. Делим формулы косинуса и синуса суммы на $\sin x \sin y$. Знаменатель равен $\frac{\sin(x+y)}{\sin x \sin y} \neq 0$.

Глава 16. Множества, логика и доказательства

16.1. Пересечение: $\{3\}$; объединение: $\{1,2,3,4\}$.

16.2. $\forall x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 0$.

16.3. Существует целое x, квадрат которого равен 9. Верно: $x = 3$ или -3.

16.4. Нет: при $x = 0$ квадрат равен 0.

16.5. В наборе есть хотя бы одно число, которое не положительно (≤ 0).

16.6. Прямая верна; обратная нет, контрпример 6.

16.7. Необходимое, но недостаточное: 2 чётно, но на 6 не делится.

16.8. $2m + 2n = 2(m + n)$, где $m, n \in \mathbb{Z}$.

16.9. Пусть $n = 2k+1$, где $k \in \mathbb{Z}$. Тогда $n^2 = 2(2k^2+2k)+1$; число $2k^2+2k$ целое, поэтому n^2 нечётно.

16.10. Контрпример: $a = 1, b = -1$.

16.11. База $n = 1$ верна. Если сумма до k равна $\frac{k(k+1)}{2}$, то после прибавления $k + 1$ получаем $(k + 1)\frac{k+2}{2}$.

16.12. Доказательство как в задаче 9. Контрапозиция: если n^2 чётно, то n чётно.

16.13. Нет: напиток мог быть куплен отдельно.

16.14. Хотя бы один любят 16; ни один не любят 4.

16.15. Достаточно одного автобуса этого маршрута, который не низкопольный. Отрицание: существует такой автобус.

16.16.* Оба языка изучают 4; только английский 14.

16.17.* При делении любого целого числа на 3 возможны остатки $0, 1, 2$. Остатки квадратов: $0, 1, 1$. Нулевой остаток возможен только при остатке 0 у самого числа.

16.18.* База: $1 = 1^2$. Переход: $k^2 + (2k + 1) = (k + 1)^2$.



16.19.* Для любого x условие $x \in A \setminus B$ равносильно одновременному выполнению $x \in A$ и $x \notin B$. Поскольку $A \subseteq U$, это равносильно $x \in A$ и $x \in U \setminus B$, то есть $x \in A \cap (U \setminus B)$. Все переходы обратимы, следовательно, множества равны.

16.20.* Элемент x принадлежит левой части тогда и только тогда, когда он принадлежит A и хотя бы одному из B, C. Это означает: x принадлежит одновременно A, B или одновременно A, C, что равносильно принадлежности правой части. На диаграмме слева выделяют часть объединения $B \cup C$, лежащую внутри A; справа объединяют области $A \cap B$ и $A \cap C$. Получается одна и та же область.

16.21. Соответственно: верно, верно, неверно, верно. Для третьей записи контрпример — элемент $4 \in C$, которого нет в B. Пустое множество является подмножеством любого множества.

16.22. $\mathcal{P}(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$. Множество из четырёх элементов имеет $2^4 = 16$ подмножеств, включая пустое множество и само себя.

16.23. Соответственно: $\{6, 8\}$, $\{1, 3\}$, $\{1, 3, 6, 8\}$, $\{1, 3, 5, 7\}$, $\{5, 6, 7, 8\}$.

16.24. $A \times B = \{(1, 3), (2, 3)\}$, $B \times A = \{(3, 1), (3, 2)\}$. Множества различны: например, $(1, 3)$ принадлежит только первому. В каждом по два элемента.

16.25. Если U — вся группа, A — занимающиеся английским, B — музыкой, то $A \triangle B = \{\text{Аня}, \text{Боря}, \text{Даша}\}$, а $U \setminus (A \cup B) = \{\text{Глеб}\}$.

16.26.* Свободно выбирается подмножество множества $\{\text{Глеб}, \text{Даша}, \text{Егор}\}$ из трёх человек. К нему всегда добавляют Аню и Борю. Каждому такому подмножеству соответствует ровно одна допустимая команда, поэтому команд $2^3 = 8$.



16.27. Получаем соответственно $0, 1, 1$. В первой формуле $\neg r = 0$. Во второй $p \uparrow q = 1$, а $1 \to 1 = 1$. В третьей $p \oplus r = 0$, поэтому $0 \downarrow 0 = 1$.

16.28. Да. Сравни значения двух импликаций:

p	q	$p \to q$	$\neg q \to \neg p$	вся формула
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	1	1	1	1

Это семантическая проверка контрапозиции.

16.29. Первая — тавтология, вторая — противоречие. Третья не относится ни к одному из этих классов: при $p = 1, q = 0$ её значение 1, а при $p = q = 0$ — 0.

16.30. Получается $(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)$. Это формула, равносильная $p \leftrightarrow q$: оба выражения истинны ровно при одинаковых значениях p, q.

16.31. Первое неверно: $p = 0, q = 1$. Второе верно: из истинности $p \wedge q$ следует $p = 1$, поэтому $p \vee r$ истинно при любом значении r.

16.32. Сначала отрицание внешней конъюнкции даёт $\neg(p \vee q) \vee \neg r$. Затем отрицание внутренней дизъюнкции даёт $(\neg p \wedge \neg q) \vee \neg r$. Каждый переход является логической равносильностью.

16.33. Правило: $o \leftrightarrow ((p \wedge q) \wedge \neg r)$. Значения o: $1, 0, 0$. Закрытая дверь не доказывает включение блокировки: при $p = 1, q = 0, r = 0$ дверь закрыта без блокировки.

16.34. Правило: $l \leftrightarrow (p \oplus q)$. Если положения одинаковы, изменение одного делает их разными, и лампа загорается. Если положения различны, изменение одного делает их одинаковыми, и лампа гаснет. Эти случаи исчерпывают все четыре пары значений.

16.35. 1. $\Gamma \vdash p \wedge q$ — Ах. 2. $\Gamma \vdash q$ — $\wedge E_2$, шаг 1. 3. $\Gamma \vdash p$ — $\wedge E_1$, шаг 1. 4. $\Gamma \vdash p \to r$ — Ах. 5. $\Gamma \vdash r$ — $\to E$, шаги 4 и 3. 6. $\Gamma \vdash q \wedge r$ — $\wedge I$, шаги 2 и 5.

16.36. Получаем дерево

$$\dfrac{\dfrac{\{p, q\} \vdash p}{\{p\} \vdash q \to p}\,(\to I)}{\emptyset \vdash p \to (q \to p)}\,(\to I).$$

Верхний лист законен по Ах, так как $p \in \{p, q\}$. Сначала снимается добавленное q, затем p. Правило $\to I$ требует вывода при разрешённом дополнительном предположении, но не требует его фактического использования.

16.37. Положим $\Delta = \Gamma \cup \{p\}$. По Ах доступны $\Delta \vdash p$, $\Delta \vdash p \to q$, $\Delta \vdash q \to r$. Из первых двух по $\to E$ получаем $\Delta \vdash q$, затем из $q \to r$ и q ещё раз по $\to E$ — $\Delta \vdash r$. Правило $\to I$ снимает временное p и даёт $\Gamma \vdash p \to r$.

16.38.* По Ах имеем $\Gamma \vdash p \vee q$. В контексте Γ, p по Ах доступны $p, p \to r$; modus ponens даёт $\Gamma, p \vdash r$. Аналогично получаем $\Gamma, q \vdash r$. По $\vee E$ заключаем $\Gamma \vdash r$, снимая дополнительные предположения в двух ветвях. Выбирать одну часть нельзя: из истинности дизъюнкции неизвестно, какая именно часть истинна.

16.39.* Обозначим $H = p \wedge (q \vee r)$, $D = (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$, $\Delta = \{H\}$. По Ах и $\wedge E_1, \wedge E_2$ получаем $\Delta \vdash p$ и $\Delta \vdash q \vee r$. В контексте Δ, q из посылки H снова по $\wedge E_1$ получаем p, а q доступно по Ах; по $\wedge I$ и $\vee I_1$ получаем $\Delta, q \vdash D$. Аналогично в контексте Δ, r правила $\wedge E_1$, Ах, $\wedge I$, $\vee I_2$ дают $\Delta, r \vdash D$. По $\vee E$ получаем $\Delta \vdash D$. Правило $\to I$ снимает H, и открытых посылок не остаётся.

16.40. Modus ponens использует условие импликации, а ученик использует её заключение. При $p = 0, q = 1$ обе посылки $p \to q, q$ истинны, но p ложно. Поэтому семантического следования нет. Если бы формальный вывод существовал, теорема о сохранении истины дала бы это следование. Полученное противоречие исключает такой вывод.

16.41.* Подходят $p \uparrow p$, $(p \uparrow q) \uparrow (p \uparrow q)$ и $(p \uparrow p) \uparrow (q \uparrow q)$. Первая формула равна по значению $\neg(p \wedge p) = \neg p$. Вторая отрицает $\neg(p \wedge q)$, возвращая $p \wedge q$. Третья имеет значение $\neg(\neg p \wedge \neg q)$, то есть $p \vee q$ по закону де Моргана.

16.42.* Положим $t = p \downarrow q$, $u = p \downarrow t$, $w = q \downarrow t$, $s = u \downarrow w$. Ответ: $s \downarrow s$. Здесь $u \equiv \neg p \wedge q$, $w \equiv p \wedge \neg q$, поэтому $s \downarrow s \equiv u \vee w \equiv p \oplus q$. Проверка:

p	q	t	u	w	s	$s \downarrow s$
0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	1
1	1	0	0	0	1	0

Глава 17. Неравенства, оценки и методы доказательства

17.1. $-5 \le 2x - 1 \le 5$. Минимум -5 при $x = -2$, максимум 5 при $x = 3$: умножение на положительное 2 сохраняет порядок.

17.2. $0 \le x^2 \le 9$. Минимум достигается при $x = 0$, максимум — при $x = 3$. Левая граница отрезка даёт только 4.

17.3. Все числа положительны. Их квадраты: $6^2 = 36 < 45 = (3\sqrt{5})^2 < 49 = 7^2$. Строгая монотонность квадратного корня даёт нужные сравнения.

17.4. По AM–GM $x + \frac{16}{x} \geq 2\sqrt{16} = 8$. Равенство требует $x = \frac{16}{x}$, поэтому $x = 4$. Минимум равен 8.

17.5. $ab = 25 - (a-5)^2 \leq 25$. Значение 25 достигается при $a = b = 5$.

17.6. $|3 \cdot 5 + 4 \cdot 12| = 63$, а $\sqrt{3^2+4^2}\sqrt{5^2+12^2} = 5 \cdot 13 = 65$. Неравенство строго: $3 \cdot 12 - 4 \cdot 5 = 16 \neq 0$.

17.7. $a^2 + b^2 - 2ab = (a-b)^2 \geq 0$. Равенство тогда и только тогда, когда $a = b$.

17.8. Разность равна $(x+1)^2 - 4x = (x-1)^2 \geq 0$. Равенство ровно при $x = 1$. Доказательство не требует условия $x \geq 0$.

17.9. При $a = b = 1$ получаем ложное $\sqrt{2} \geq 2$. На самом деле $\sqrt{2} < 2$, поскольку $2 < 4$.

17.10. $x(x-1) \geq 0$, поэтому $x \in (-\infty; 0] \cup [1; +\infty)$. При $x < 0$ деление меняет направление, при $x = 0$ запрещено. Например, $x = -1$ удовлетворяет исходному условию, но не выводу.

17.11. Сумма $S = 10000(1+\frac{1}{50})^5 \geq 10000(1+\frac{5}{50}) = 11000$ рублей. Фактически $S > 11000$, поскольку показатель больше 1, а прибавка ненулевая. Это граница, а не точное значение.

17.12. Для сторон $a, b > 0$ имеем $a + b = 20$, поэтому $ab \leq \frac{20^2}{4} = 100$. Площадь 100 м^2 достигается у квадрата 10×10 м.

17.13. Сторона $a \in [2{,}9; 3{,}1]$ положительна. Поэтому $a^2 \in [2{,}9^2; 3{,}1^2] = [8{,}41; 9{,}61]$ м^2. Обе границы возможны.

17.14. При $100 \leq a \leq 110$, $140 \leq b \leq 150$ стоимость $2a + 3b$ лежит в $[620; 670]$ рублей. Обе границы достигаются при одновременном выборе нижних либо верхних цен.

17.15. Расстояние $d = \sqrt{a^2+b^2}$. Из $(a+b)^2 \leq 2(a^2+b^2)$ получаем $d \geq \frac{14}{\sqrt{2}} = 7\sqrt{2}$ м. Равенство достигается при $a = b = 7$.

17.16. Месяцев 12. Если бы каждому соответствовало не более двух человек, людей было бы не больше 24. По принципу Дирихле в одном месяце родились как минимум трое.

17.17. Хотя бы одна коробка содержит не меньше 5: иначе всего не больше $5 \cdot 4 = 20$. Максимальную заполненность 5 даёт распределение $(5; 5; 5; 4; 4)$. Поэтому искомый минимум равен 5.

17.18. Нет. Чётность сохраняется; из нечётного 7 получаются только нечётные числа, а 20 чётно.

17.19. Нет: сумма — инвариант. Вначале она равна 13, в целевом состоянии 14.



17.20. Количество фишек — неотрицательный целочисленный полуинвариант, уменьшающийся хотя бы на 1, значит, шагов не более 9. Максимум 9 получается при удалении по одной. За четыре шага уберут не более 8, поэтому минимум 5; он достигается удалением $2, 2, 2, 2, 1$.

17.21. $\min A = -4$, $\max A = 7$. Например, 8 — верхняя оценка, но не наибольший элемент: $8 \notin A$.

17.22. Для любого $x \in (0;1)$ число $\frac{x+1}{2}$ лежит в том же интервале и строго больше x. Максимума нет. Супремум равен 1: это верхняя грань, а всякое меньшее число верхней гранью не является.

17.23. Есть две группы — чётные и нечётные. Если бы в каждой было не более двух чисел, всего их было бы не более четырёх. По принципу Дирихле одна группа содержит как минимум три числа.

17.24. Нет. Число единиц за ход меняется на $2, 0$ или -2, поэтому его чётность сохраняется. Вначале единиц 0, а требуется нечётное количество 1.

17.25.* $ab \le 9$, поэтому $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{6}{ab} \ge \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$. Деление допустимо, так как $ab > 0$. Равенство ровно при $a = b = 3$.

17.26.* Коши–Буняковский даёт $|3x - 4y| \le \sqrt{3^2 + (-4)^2}\sqrt{4} = 10$. Максимум 10 достигается при $(x;y) = (\frac{6}{5}; -\frac{8}{5})$, минимум -10 — при противоположной паре. Равенство требует $4x + 3y = 0$; совместно с $x^2 + y^2 = 4$ это даёт ровно указанные две пары.

17.27.* Нельзя. Сумма в обоих случаях равна 6, но разность первых двух координат на каждом ходе меняется на 0, 3 или -3. Поэтому её отличие от начального -1 всегда кратно 3. Целевая разность 0 отличается от -1 на 1, что не кратно 3.

17.28.* В конечном непустом наборе есть максимум M. Оба соседа выбранного максимума не больше M, а их среднее равно M; значит, оба равны M. Применяя тот же вывод к соседям, последовательно обходим всё кольцо. Каждое число равно M.

Глава 18. Векторы, матрицы и линейные системы

18.1. $2(1;-1) + (3;2) = (5;0)$.

18.2. $\mathbf{u} - \mathbf{v} = (3;-5;3)$, $-2\mathbf{v} = (2;-8;0)$.

18.3. $\overrightarrow{AB} = (-3;4)$, $AB = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = 5$.

18.4. Обе длины равны 5; $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 12 - 12 = 0$, поэтому векторы ортогональны.

18.5. Из $\alpha+\beta=5$, $\alpha-\beta=1$ получаем $\alpha=3$, $\beta=2$. Решение единственно.

18.6. Да: второй вектор равен первому, умноженному на -2. Например, $2(2;-3)+(-4;6)=(0;0)$.

18.7. Из $\alpha(1;2)+\beta(2;1)=\mathbf{0}$ получаем $\alpha+2\beta=0$, $2\alpha+\beta=0$. Вычитание удвоенного первого уравнения из второго даёт $-3\beta=0$, значит, $\beta=0$ и $\alpha=0$.

18.8. $\mathbf{u}+\mathbf{v}-\mathbf{w}=\mathbf{0}$. Коэффициенты $1,1,-1$ не все нулевые, поэтому набор зависим.

18.9. Если восток и север — положительные направления координат, итоговый вектор $(3-1;4-2)=(2;2)$ км. Его длина $2\sqrt{2}$ км, общий путь $3+4+1+2=10$ км.

18.10. Сумма сил $(5;5)$ Н, её длина $\sqrt{25+25}=5\sqrt{2}$ Н.

18.11. Размер 2×3. Произведение равно $\begin{pmatrix}2-1-2\\0+3-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$.

18.12. $AB=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}$, $BA=\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix}$. Они различны; например, первые диагональные элементы равны 2 и 1.

18.13. Матрица $M=\begin{pmatrix}2&1\\1&3\end{pmatrix}$. Столбец расхода $M\begin{pmatrix}4\\5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}13\\19\end{pmatrix}$: 13 единиц A и 19 единиц B.

18.14. $T(1;2)=(4;2)$. Из $y=3$, $2x+y=7$ получаем единственный прообраз $(2;3)$.

18.15. T задаётся матрицей $\begin{pmatrix}2&-1\\1&3\end{pmatrix}$, поэтому линейно. G нелинейно: $G(\mathbf{0})=(1;0)\neq\mathbf{0}$, а линейное отображение обязано сохранять нулевой вектор.

18.16. В равенстве $T(\alpha\mathbf{u}+\beta\mathbf{v})=\alpha T(\mathbf{u})+\beta T(\mathbf{v})$ возьмём $\alpha=\beta=0$. Левая часть равна $T(\mathbf{0})$, правая — нулевому вектору.

18.17. При умножении слева строки становятся $(1\cdot a+0\cdot c;1\cdot b+0\cdot d)=(a;b)$ и $(c;d)$. Справа столбцы аналогично остаются $(a;c)$ и $(b;d)$. Поэтому оба произведения равны A.

18.18. Сложение уравнений даёт $3x=9$, значит, $x=3$, затем $y=1$. Проверка: $2\cdot 3+1=7$, $3-1=2$.

18.19. Вторая строка минус удвоенная первая даёт $0=0$. Все решения $(x;y)=(5-2t;t)$, $t\in\mathbb{R}$. Свободный параметр один; можно выбрать любую из двух переменных свободной.



18.20. После вычитания удвоенной первой строки из второй возникает $0 = 1$. Система несовместна.

18.21. Вычитание удвоенной первой строки из второй даёт $-y - z = -2$, вычитание первой из третьей — $y + 2z = 5$. Складывая их, получаем $z = 3$; затем $y = -1$, $x = 2$. Все три исходных уравнения выполнены.

18.22. Вторая строка зависит от первой. Можно выбрать $y = s$, $z = t$; тогда $x = 4 - s - t$. Все решения $(4 - s - t; s; t)$, $s, t \in \mathbb{R}$. Свободных параметров два.

18.23. $\det A = 3 - 2 = 1$, $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$. Умножение даёт $(x; y) = (5 - 4; -10 + 12) = (1; 2)$.

18.24. Для цен x, y: $2x + y = 170$, $x + 2y = 160$. Определитель $4 - 1 = 3 \neq 0$, поэтому решение единственно. Из уравнений $x = 60$, $y = 50$ рублей; $120 + 50 = 170$, $60 + 100 = 160$.

18.25.* Определитель $t^2 - 1$. При $t \neq \pm 1$ единственное решение $x = y = \frac{1}{t+1}$. При $t = 1$ остаётся $x + y = 1$, все решения $(s; 1 - s)$, $s \in \mathbb{R}$. При $t = -1$ сложение уравнений даёт $0 = 2$: решений нет.

18.26.* После вычитания удвоенной первой строки из второй возникает нулевая строка; переставим её вниз. Две ненулевые строки имеют ведущие позиции в столбцах x и y, ранг равен 2. Выбирая $z = s$, получаем $y = 2 - s$, $x = -3 + 3s$. Все решения $(-3 + 3s; 2 - s; s)$, $s \in \mathbb{R}$.

18.27.* База $n = 0$: справа I_2. Если формула верна при n, умножение справа на A даёт $\begin{pmatrix} 1 & n+1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Обратная равна $\begin{pmatrix} 1 & -n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$: произведения в обоих порядках равны I_2.

18.28.* Так как $P(x; y) = (x; 0)$, первая группа — $(s; 0)$, вторая — $(0; t)$, где $s, t \in \mathbb{R}$. Прямое перемножение даёт $P^2 = P$. Ненулевой $(0; 1)$ переходит в ноль, поэтому обратное действие не может восстановить каждый вектор; также $\det P = 0$.

Глава 19. Предел функции и непрерывность

19.1. Сначала задают любое $\varepsilon > 0$, затем выбирают подходящее $\delta > 0$. Оно должно работать для всех x из указанной проколотой окрестности и не зависит от отдельного x.

19.2. Предел 4. Поскольку $|3x - 2 - 4| = 3|x - 2|$, годится $\delta = 0{,}02$.

19.3. Ответ 3. Многочлен непрерывен: $(-1)^2 - 2(-1) = 3$.

19.4. При $x \neq 3$ дробь равна $x + 3$, поэтому предел 6. В предельном условии сама точка 3 исключена.

19.5. При $x \neq 4$ после домножения на сопряжённое получаем $\frac{1}{\sqrt{x}+2}$; предел равен $\frac{1}{4}$.

19.6. Значение 8, предел 1. Они различны, поэтому функция в нуле не непрерывна; разрыв устранимый.

19.7. Слева частное равно -1, справа 1. Односторонние пределы различны, двустороннего предела нет.

19.8. Левый и правый пределы равны 3; значение в точке также 3. Функция непрерывна.

19.9. Для $\frac{1}{x^2}$ оба предела $+\infty$, поэтому есть и двусторонний бесконечный предел. Для $\frac{1}{x}$ слева $-\infty$, справа $+\infty$; общего предела нет.

19.10. После деления на x^2 получаем $\frac{3-\frac{1}{x}+\frac{2}{x^2}}{2+\frac{1}{x^2}} \to \frac{3}{2}$.

19.11. Предел 0, поскольку $-x^2 \leq x^2 b(x) \leq x^2$, а обе границы стремятся к нулю.

19.12. Область $[-2; 1) \cup (1; +\infty)$. Функция непрерывна во всех её точках; в точке -2 непрерывность проверяют справа внутри области определения.

19.13. Нужно $f(2) = 4$, поскольку при $x \neq 2$ функция равна $x + 2$.

19.14. Предел 26 градусов. Ошибка $|T(t) - 26| = 4|t - 2|$, поэтому годится $\delta = 0{,}05$ минуты.

19.15. Средняя стоимость $30 + \frac{1500}{n}$ стремится к 30 рублям. Постоянные затраты в расчёте на одно изделие стремятся к нулю.

19.16. Оба предела 0, как и $V(10)$. До опустошения объём равен $20 - 2t$, после — нулю; функция непрерывна в 10.

19.17. Слева предел 100, справа 150 рублей. Это скачок, двустороннего предела нет. Изменением только цены при $t = 10$ его устранить нельзя.



19.18. Предел 20 градусов. Условие $\frac{60}{t+1} < 0{,}1$ равносильно $t > 599$. Первый целый момент — 600 минут. При конечном времени температура строго больше 20.

19.19. Выбираем $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$. Тогда из $0 < |x-3| < \delta$ следует $|2x-6| = 2|x-3| < \varepsilon$.

19.20. Обратное неравенство треугольника даёт $\big||f(x)|-|L|\big| \le |f(x)-L|$. Радиус, обеспечивающий для правой части ошибку меньше ε, подходит и для левой.

19.21. В определении берём $\varepsilon = \frac{L}{2}$. Тогда $|f(x)-L| < \frac{L}{2}$, откуда $f(x) > \frac{L}{2} > 0$.

19.22.* Необходимо $c = 4$. Если числитель в 1 ненулевой, отношение не имеет конечного предела, поэтому $1 + a + b = 0$. Тогда числитель равен $(x-1)(x+a+1)$, предел — $a+2$. Получаем $a = 2$, $b = -3$, $c = 4$. Эти значения подходят.

19.23.* При $|x| < \frac{1}{4}$ оба подкоренных выражения положительны. Домножение на сопряжённое даёт $\frac{2}{\sqrt{1+3x}+\sqrt{1+x}} \to 1$.

19.24.* При $x > 0$ разность равна $\frac{3x}{\sqrt{x^2+3x}+x} = \frac{3}{\sqrt{1+\frac{3}{x}}+1}$, поэтому предел $\frac{3}{2}$.

19.25.* При $|x-3| < 1$ имеем $2 < x < 4$, поэтому $|x+3| < 7$. Тогда $|x^2-9| = |x-3||x+3| < 7\delta \le \varepsilon$. Выбранный радиус положителен и подходит для любого $\varepsilon > 0$.

19.26.* Можно взять: $f = x^2, g = x$, тогда частное $x \to 0$; $f = x, g = x$, тогда частное 1; $f = x^2, g = x^4$, тогда частное $\frac{1}{x^2} \to +\infty$. Все знаменатели ненулевые при $x \neq 0$, обе функции каждой пары стремятся к нулю.

Глава 20. Производная и линейное приближение

20.1. $\frac{(3+h)^2-9}{h} = 6 + h$ при $h \neq 0$, поэтому $f'(3) = 6$.

20.2. $\frac{(-2+h)^3-(-2)^3}{h} = 12 - 6h + h^2 \to 12$. Значит, $f'(-2) = 12$.

20.3. Ответ $20x^3 - 6x$: применяем формулу степени и правило суммы, постоянная даёт ноль.

20.4. $2(x^2-3) + (2x+1)2x = 6x^2 + 2x - 6$. Исходный многочлен равен $2x^3 + x^2 - 6x - 3$, его производная та же.

20.5. $f'(x) = -\frac{3}{(x-2)^2}$, $x \neq 2$. Точка 2 исключена уже у исходной функции.

20.6. $\frac{\sqrt{9+h}-3}{h} = \frac{1}{\sqrt{9+h}+3} \to \frac{1}{6}$.

20.7. Внешняя функция $u \mapsto u^4$, внутренняя $3x^2 - 1$. Производная равна $4(3x^2-1)^3 \cdot 6x = 24x(3x^2-1)^3$.

20.8. $f'(x) = \frac{2}{2\sqrt{2x+3}} = \frac{1}{\sqrt{2x+3}}$ при $x > -\frac{3}{2}$.

20.9. Значение функции 1, производная 3. Касательная: $y = 1 + 3(x-1) = 3x - 2$.

20.10. $\frac{|h|}{h} = 1$ справа и -1 слева. Конечного общего предела нет, поэтому производной в нуле нет.

20.11. Из $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0$ получаем $a = \pm 1$. При $a = 1$: $f(x) - f(1) = (x-1)^2(x+2) \geq 0$ около 1, поэтому это минимум, $f(1) = -2$. При $a = -1$: $f(x) - f(-1) = (x+1)^2(x-2) \leq 0$ около -1, поэтому это максимум, $f(-1) = 2$.

20.12. При $x < y$ имеем $y^3 - x^3 = (y-x)(x^2 + xy + y^2) > 0$. Второй множитель равен $(x + \frac{y}{2})^2 + \frac{3}{4}y^2$ и может быть нулём только при $x = y = 0$, что исключено. Строгое возрастание означает сравнение значений, а нулевая производная в одной точке его не опровергает.

20.13. $s'(t) = 3t^2 - 12t + 12 = 3(t-2)^2$. При $t = 1$ скорость 3 метра в секунду, при $t = 2$ — 0.

20.14. $C'(q) = 5 + 0{,}04q$, поэтому линейная оценка приращения равна 7 рублям. Точно $C(51) - C(50) = 5 + 0{,}02(51^2 - 50^2) = 7{,}02$ рубля; ошибка оценки $0{,}02$ рубля.

20.15. Для $A(s) = s^2$ производная при 10 равна 20. При $h = 0{,}02$ оценка $20h = 0{,}4$ квадратного метра. Точный прирост $20h + h^2 = 0{,}4004$ квадратного метра.

20.16. $L'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+9}}$, поэтому $L'(4) = \frac{4}{5}$. Линейная оценка прироста равна $\frac{4}{5} \cdot 0{,}1 = 0{,}08$ метра.

20.17. $P'(q) = -2q + 40$, откуда $q = 20$. Поскольку $P(q) = 300 - (q-20)^2 \leq 300$, максимум равен 300 и достигается при $q = 20$, допустимом в заданном отрезке.



20.18. $f(16)=4$, $f'(16)=\frac{1}{8}$, $h=0{,}08$. Получаем $4+\frac{0{,}08}{8}=4{,}01$. Это приближённое значение.

20.19. При любом $h\neq 0$ разностное отношение $\frac{c-c}{h}=0$. Его предел равен нулю.

20.20. Для $h\neq 0$ приращение равно $h\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$. Первый множитель стремится к нулю, второй — к конечной производной, поэтому произведение стремится к нулю.

20.21. Обозначим $Q(h)=\frac{f(h)-f(0)}{h}$. Чётность даёт $Q(-h)=-Q(h)$. При $h\to 0$ обе стороны имеют предел: слева $f'(0)$, справа $-f'(0)$. Значит, $f'(0)=-f'(0)$, то есть $f'(0)=0$.

20.22.* Необходима непрерывность, откуда $b=0$. Тогда правое разностное отношение равно $h\to 0$, левое — a. Поэтому $a=0$, $b=0$. При этих значениях оба предела нулевые, производная существует.

20.23.* При $x>0$ функция равна x^2, при $x<0$ — $-x^2$, поэтому производная $2x$ справа и $-2x$ слева. В нуле $\frac{h|h|}{h}=|h|\to 0$. Итак, $f'(x)=2|x|$ всюду. Ноль стационарный, но не экстремум: слева значения отрицательны, справа положительны.

20.24.* $f'(x)=1-\frac{16}{x^2}$, стационарная точка $x=4$. Для всех $x>0$ имеем $f(x)-8=\frac{(x-4)^2}{x}\geq 0$. Минимум 8 достигается только при $x=4$.

20.25.* Положим $r=\sqrt{4+h}$. Тогда $r-2=\frac{h}{r+2}$, откуда $2+\frac{h}{4}-r=\frac{h}{4}-\frac{h}{r+2}=\frac{h(r-2)}{4(r+2)}=\frac{h^2}{4(r+2)^2}$. При $h\geq 0$ имеем $r\geq 2$, поэтому знаменатель не меньше 64; числитель неотрицателен.

20.26.* Из первой касательной $d=1$, $c=-2$. Вторая даёт $p(1)=3$, $p'(1)=4$, поэтому $a+b=4$, $3a+2b=6$. Получаем $a=-2$, $b=6$. Ответ: $p(x)=-2x^3+6x^2-2x+1$. Подстановка даёт обе заданные точки и оба наклона.

20.27. $20x(2x^2+1)^4$.

20.28. $-\frac{3}{\sin^2(3x)}$; $x\neq\frac{\pi k}{3}$, $k\in\mathbb{Z}$.

20.29. $\frac{2x}{\operatorname{ch}^2(x^2)}$, все действительные x.

20.30. $-\frac{2}{\operatorname{sh}^2(2x+1)}$, $x\neq-\frac{1}{2}$.

20.31. Оба способа дают $\frac{x^2-2x-1}{(x-1)^2}=1-\frac{2}{(x-1)^2}$, $x\neq 1$.

20.32.* Применяем правило цепочки к $f\circ(g\circ h)$, а затем к $g\circ h$. Все промежуточные аргументы должны принадлежать областям определения.

Глава 21. Остатки, сравнения и целочисленные уравнения

21.1. $47 = 5 \cdot 9 + 2$; $q = 9, r = 2$.

21.2. $-47 = 5 \cdot (-10) + 3$; $q = -10, r = 3$.

21.3. 4, поскольку $-3 = 7 \cdot (-1) + 4$.

21.4. Первое верно: $22 - 4 = 18$. Второе неверно: 17 не делится на 6.

21.5. $137 \equiv 2$, $284 \equiv 5 \pmod 9$; остаток 7.

21.6. 1, так как $10 \equiv 1 \pmod 9$.

21.7. $2^{10} = (2^3)^3 \cdot 2 \equiv 2 \pmod 7$.

21.8. 1: остатки степеней повторяются циклом $7, 9, 3, 1$, а 100 делится на 4.

21.9. $7{:}00$; $23 + 8 \equiv 7 \pmod{24}$.

21.10. Охра: $31 - 1 = 30 \equiv 2 \pmod 4$, то есть третий цвет цикла.

21.11. Среда: $100 \equiv 2 \pmod 7$.

21.12. $x = 8$. Перебор остатков $3, 8, 13$ по модулю 15 оставляет только 8.

21.13. $18 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198$. Цепочка делений приведена в теории.

21.14. $[5]_7$, поскольку $3 \cdot 5 \equiv 1 \pmod 7$.

21.15. Нет: $\gcd(6, 9) = 3 \neq 1$.

21.16. $x = 6 + 7t$, $t \in \mathbb{Z}$.

21.17. $[1]_6$ и $[4]_6$; эквивалентно $x = 1 + 3t$, $t \in \mathbb{Z}$.

21.18. Решений нет: $2x - 1$ нечётно и не может делиться на 6.

21.19.* $x = 2 + 3t$, $y = -1 - 2t$, $t \in \mathbb{Z}$.

21.20. Нет: $\gcd(6, 10) = 2$ не делит 7.



21.21.* $2x + 3y = 20$. Поэтому y чётно и $0 \leq y \leq 6$: $(x, y) = (10, 0), (7, 2), (4, 4), (1, 6)$.

21.22. Если $n = \sum_{k=0}^{s} a_k 10^k$, то $n \equiv \sum_{k=0}^{s} a_k \pmod 3$. Поэтому число и сумма его цифр делятся на 3 одновременно.

21.23. При $n = 2k$ квадрат равен $4k^2$. При $n = 2k + 1$ он равен $4k(k + 1) + 1$.

21.24. Нет, по предыдущей задаче возможны только остатки $0, 1$.

21.25. При $m = 1$ вывод очевиден, поскольку все целые сравнимы. Пусть $m \geq 2$. Умножение на обратное к c даёт $a \equiv b$. Без условия $2 \cdot 1 \equiv 2 \cdot 4 \pmod 6$, но $1 \not\equiv 4 \pmod 6$.

21.26.* Все нечётные классы: $[1]_8, [3]_8, [5]_8, [7]_8$. При $x = 2k + 1$ имеем $x^2 = 4k(k + 1) + 1$, а $k(k + 1)$ чётно. Квадраты чётных дают 0 или 4.

21.27.* По модулю 3: $2y \equiv 1$, то есть $y \equiv 2 \pmod 3$. При $0 \leq y \leq 6$ получаем $y = 2, 5$, соответственно $x = 7, 2$.

21.28.* $10a+6b \equiv a \pmod 3$ и $\equiv b \pmod 5$, значит, решение есть. Разность любых двух решений делится на 3 и 5, а значит, на 15 (числа взаимно просты). Все решения образуют один класс $[10a + 6b]_{15}$.

Глава 22. Полугруппы, моноиды, группы, кольца и поля

22.1. На $\mathbb{N}_0$ нет: $1 - 2 = -1$ вне множества. На $\mathbb{Z}$ да.

22.2. Это коммутативный моноид и полугруппа с нейтральным 0, но не группа: у 1 нет противоположного в $\mathbb{N}_0$.

22.3. Нет. Получается полугруппа без нейтрального элемента: если $e+n = n$, то $e = 0$, а $0 \notin \mathbb{N}$.

22.4. Произведение замкнуто и ассоциативно, нейтральный элемент 1; обратный к $a \neq 0$ равен $\frac{1}{a}$. Умножение коммутативно: это абелева группа.

22.5. Есть ассоциативное замкнутое умножение и единица 1. У 0 нет обратного: $0b = 0 \neq 1$.

22.6.* $e = -1$, обратный к a равен $-a - 2$. Обе расстановки скобок дают $a + b + c + 2$; замкнутость и коммутативность очевидны из сложения. Это абелева группа.

22.7. $(3 * 2) * 1 = (3 - 2) - 1 = 0$, а $3 * (2 * 1) = 3 - (2 - 1) = 2$.

22.8. $UV = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $VU = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. В общем случае умножение матриц некоммутативно.

22.9. c^2: $1 \mapsto 3, 2 \mapsto 1, 3 \mapsto 2$. $c^3 = \mathrm{id}$, поэтому $c^{-1} = c^2$.

22.10. Три поворота дают 270°. Обратный к 90° — 270° против часовой стрелки (или 90° по часовой).

22.11. $T_8 \circ T_{-3} = T_5$, нейтральный T_0, обратный T_{-8}. Все целочисленные сдвиги образуют абелеву группу.

22.12. Отменяет сдвиг на 4 вперёд, так как $3+4 \equiv 0 \pmod 7$. Три применения дают $9 \equiv 2 \pmod 7$ дня вперёд.

22.13. Только $1, -1$. Если $ab = 1$ с целыми a, b, то $|a||b| = 1$, поэтому оба модуля равны 1.

22.14. $[2]_6[3]_6 = [6]_6 = [0]_6$, причём оба множителя ненулевые.



22.15. $[1]^{-1} = [1]$, $[2]^{-1} = [3]$, $[3]^{-1} = [2]$, $[4]^{-1} = [4]$; все классы по модулю 5.

22.16. Ненулевой класс $[2]_4$ даёт $[2]_4^2 = [0]_4$, поэтому обратного к нему не существует.

22.17. В $\mathbb{Z}$ решений нет, в $\mathbb{Q}$ ответ $\frac{1}{2}$, в $\mathbb{F}_5$ ответ $[3]_5$.

22.18. Умножим слева на a^{-1}: $b = (a^{-1}a)b = a^{-1}(ab) = a^{-1}0 = 0$. Последнее равенство следует из распределительности.

22.19. Сложение сохраняется: $[a+b]_5 = [a]_5 + [b]_5$. Отображение сюръективно, но не инъективно: $\varphi(0) = \varphi(5)$.

22.20. Это гомоморфизм: $2(a+b) = 2a+2b$. Он инъективен, но не сюръективен (нет прообраза 1); изоморфизма нет.

22.21. $e^{x+y} = e^x e^y$; экспонента биективна $\mathbb{R} \to (0, \infty)$, её обратное отображение — $\ln$.

22.22. Если e, f оба нейтральны, то $e = e*f = f$: первое равенство использует нейтральность f, второе — e.

22.23. $b = b * e = b * (a * c) = (b * a) * c = e * c = c$.

22.24. Сначала f, затем g: $(g \circ f)(x) = 2x+3$. Сначала g, затем f: $(f \circ g)(x) = 2x+6$. Композиции различны.

22.25.* $\psi(a) = 1 + a$ — биекция $S \to \mathbb{R} \setminus \{0\}$, переводящая $*$ в умножение. Поэтому операция замкнута, ассоциативна и коммутативна. Нейтральный 0, обратный к a равен $-\frac{a}{1+a}$, он не равен -1.

22.26.* В поле $x(x-1) = 0$, поэтому $x = 0$ или $x = 1$. По модулю 6 проверка шести классов даёт $[0], [1], [3], [4]$. Дополнительные решения возможны из-за делителей нуля.

22.27.* По распределительности $(a+b)^2 = a^2 + ab + ba + b^2$. В коммутативном кольце $ab = ba$, и средние слагаемые объединяются. В общем кольце заменить $ab + ba$ на $2ab$ нельзя.

22.28.* $(s \circ t)(1) = s(1) = 2$, $(t \circ s)(1) = t(2) = 3$. Отображения различны, значит, операция композиции в S_3 некоммутативна.

Глава 23. Комплексные числа

23.1. Сумма $(2;2)$, то есть $2+2i$. Произведение $(4\cdot(-2)-(-5)\cdot 7; 4\cdot 7+(-5)\cdot(-2)) = (27;38)$, то есть $27+38i$.

23.2. Равенство частей даёт $2a-1=7$, $b+3=-4$. Поэтому $a=4$, $b=-7$.

23.3. $\operatorname{Re} z = -3$ и $\operatorname{Im} z = \sqrt{2}$ — оба действительные. Их комбинация $\operatorname{Re} z + i \operatorname{Im} z = -3 + \sqrt{2}\, i = z$ не является действительным числом.

23.4. Из $i^4 = 1$ следует $i^{2027} = i^3 = -i$, $i^{2028} = 1$. Ответ: $1 - i$.

23.5. $\overline{z} = -8 - 15i$, $-z = 8 - 15i$, $|z| = \sqrt{64+225} = 17$, $z\overline{z} = 289$.

23.6. Умножение на сопряжённое знаменателя даёт $\frac{(7+9i)(2+i)}{5} = \frac{5+25i}{5} = 1+5i$.

23.7. $\frac{1}{3-4i} = \frac{3+4i}{25}$. Произведение равно $\frac{(3-4i)(3+4i)}{25} = \frac{9+16}{25} = 1$.

23.8. $2 - i \neq 0$, поэтому решение единственно: $z = \frac{(4+7i)(2+i)}{5} = \frac{1+18i}{5}$.

23.9. Для $z = a + bi$ условия дают $2a = 8$, $2bi = -6i$, то есть $a = 4$, $b = -3$. Ответ: $z = 4 - 3i$.

23.10. Если $z = a + bi$, то $z + \overline{z} = 2a$, $z - \overline{z} = 2bi$. Деление на ненулевые 2 и $2i$ даёт соответственно a и b.

23.11. Для $z = a + bi$ первое равенство эквивалентно $2bi = 0$, то есть $b = 0$. Второе эквивалентно $2a = 0$, то есть $a = 0$. Ноль удовлетворяет обоим условиям, в частности, включён во второе утверждение.

23.12. Для $z = a + bi$ квадраты модулей всех трёх чисел равны $a^2 + b^2$: смена знаков координат не меняет их квадратов. Все модули неотрицательны, поэтому сами модули равны.

23.13. Конечная точка $(1-2i)+(3+5i)+(-2+i) = 2+4i$. Итоговое перемещение относительно старта равно $1 + 6i$, его длина $\sqrt{37}$. Это расстояние от старта, а не сумма длин двух перемещений.

23.14. Расстояние $|z_2 - z_1| = |6 - 8i| = 10$. Середина $\frac{z_1+z_2}{2} = 1 + i$.

23.15. Это окружность с центром $(1;-4)$ и радиусом 3. Уравнение: $(x-1)^2 + (y+4)^2 = 9$.

23.16. Все числа $z = -2 + yi$, где $-\sqrt{5} \le y \le \sqrt{5}$: условие модуля равносильно $4 + y^2 \le 9$. На плоскости это замкнутый вертикальный отрезок.



23.17. $\arg(-4i) = \{-\frac{\pi}{2} + 2\pi k : k \in \mathbb{Z}\}$, $\operatorname{Arg}(-4i) = -\frac{\pi}{2}$. Аргумент нуля не определён: у нулевого вектора нет направления.

23.18. Модуль 6, число во второй четверти: $z = 6(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3})$. Все аргументы $\{\frac{2\pi}{3} + 2\pi k : k \in \mathbb{Z}\}$, главный $\frac{2\pi}{3}$.

23.19. У произведения модуль 12, угол $\frac{\pi}{2}$, поэтому $zw = 12i$. У частного модуль $\frac{3}{4}$, угол $-\frac{\pi}{6}$, поэтому $\frac{z}{w} = \frac{3\sqrt{3}}{8} - \frac{3}{8}i$.

23.20. Повороту по часовой стрелке соответствует $-i$, увеличению — 2; общий множитель $-2i$. Новая точка $(-2i)(-1+2i) = 4+2i$, расстояние $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$.

23.21. Относительно центра точка задаётся $z - c = 3$, после поворота — $3i$. Прибавляя центр, получаем $1 + 4i$. Формула iz вращала бы вокруг нуля и дала бы другое число $-1 + 4i$.

23.22. $iz_1 - iz_2 = i(z_1 - z_2)$. Модуль произведения равен произведению модулей, а $|i| = 1$, поэтому расстояние не меняется.

23.23. $\sqrt{3} + i = 2(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6})$. Шестая степень равна $2^6(\cos\pi + i\sin\pi) = -64$.

23.24. $1 - i \neq 0$. Его квадрат равен $-2i$, четвёртая степень — -4. Значит, $(1-i)^{-4} = -\frac{1}{4}$.

23.25. $(z - 7i)(z + 7i) = 0$, поэтому $z = 7i$ или $z = -7i$. Ни одно решение не является действительным.

23.26. $D = 36 - 100 = -64$. Все решения $z = \frac{-6 \pm 8i}{2} = -3 \pm 4i$; они сопряжены.

23.27. $(z-5)(z+7) = 0$. Поле не имеет делителей нуля, поэтому все решения — 5 и -7. Оба действительные; других комплексных решений разложение не допускает.

23.28.* Модуль корней 3, углы $\frac{\pi}{3}, \pi, \frac{5\pi}{3}$. Все три решения: $\frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i$, -3, $\frac{3}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2}i$. Углы различны по модулю 2π, поэтому значения различны.

23.29.* Модуль корней 2, углы $\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$. Алгебраически это четыре числа $\sqrt{2} + i\sqrt{2}$, $-\sqrt{2} + i\sqrt{2}$, $-\sqrt{2} - i\sqrt{2}$, $\sqrt{2} - i\sqrt{2}$. Они образуют вершины квадрата на окружности радиуса 2.

23.30.* $(z^2 + 1)(z^2 + 4) = 0$. Значит, $z^2 = -1$ или $z^2 = -4$. Все решения: $i, -i, 2i, -2i$. В отличие от действительной подстановки $u = x^2$, здесь нельзя требовать $u \geq 0$ для комплексного z.

23.31.* Получаем $a^2 - b^2 = 5$, $2ab = 12$. Кроме того, $|z|^2 = |5 + 12i| = 13$, то есть $a^2 + b^2 = 13$. Отсюда $a^2 = 9$, $b^2 = 4$; условие $ab = 6$ оставляет $(a, b) = (3, 2)$ и $(-3, -2)$. Все решения: $3 + 2i$, $-3 - 2i$; их квадраты действительно равны $5 + 12i$.

23.32.* Пусть $z = x + yi$. Из $x^2 + y^2 = 25$ и $(x-6)^2 + y^2 = 25$ вычитанием получаем $x = 3$, затем $y^2 = 16$. Ответы $3+4i$ и $3-4i$. Это две точки пересечения окружностей радиуса 5 с центрами 0 и 6; они симметричны относительно действительной оси.

23.33. Подстановка $x = y + 2$ даёт $y^3 + 3y = 0$. Поэтому $y = 0$ или $y^2 = -3$. Все решения: 2, $2 + i\sqrt{3}$, $2 - i\sqrt{3}$.

23.34. $\Delta = 5$. Можно взять $u = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, поскольку $u^3 = 2 + \sqrt{5}$, и $v = -\frac{1}{u} = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$. Их сумма 1. Разложение $(y-1)(y^2+y+4) = 0$ даёт все корни 1, $\frac{-1+i\sqrt{15}}{2}$, $\frac{-1-i\sqrt{15}}{2}$.

23.35. Здесь $p = 0$, $q = 8$, так что непосредственно решаем $x^3 = -8$. Все корни: -2, $1 + i\sqrt{3}$, $1 - i\sqrt{3}$. Они получаются умножением выбранного корня -2 на кубические корни из единицы; дополнительное деление не нужно.

23.36. $\Delta = 8^2 + (-4)^3 = 0$. Имеем $y^3 - 12y + 16 = (y-2)^2(y+4)$. Корень 2 двойной, -4 простой.

23.37. Разложение $y(y^2 + p) = 0$ даёт 0 и два противоположных квадратных корня из $-p$. При $p \neq 0$ это три различных значения, каждое простое. При $p = 0$ остаётся только 0, кратность три. Вместе с каждым корнем присутствует противоположный, что и означает указанную симметрию.

23.38.* Для $T = y^2$ получаем $T = -1 \pm 2i$. Положим $a = \sqrt{\frac{\sqrt{5}-1}{2}}$, $b = \sqrt{\frac{\sqrt{5}+1}{2}}$. Тогда $a^2 - b^2 = -1$, $2ab = 2$. Все четыре корня: $a + bi$, $-a - bi$, $a - bi$, $-a + bi$.

23.39. Резольвента $z^3 + 4z^2 - 4z - 1 = 0$ действительно имеет корень 1. Берём $s = 1$, $t = 1$, $u = 2$. Разложение: $(y^2 + y + 1)(y^2 - y + 2) = 0$. Корни: $\frac{-1\pm i\sqrt{3}}{2}$ и $\frac{1\pm i\sqrt{7}}{2}$, по два значения в каждой паре.

23.40.* Резольвента $z^3 - 6z^2 + 9z - 4 = (z-1)^2(z-4)$. При $z = 1$, $s = 1$ получаем $(y^2 + y - 2)(y^2 - y)$. При $z = 4$, $s = 2$ получаем $(y^2 + 2y)(y^2 - 2y + 1)$. Оба произведения равны $y(y+2)(y-1)^2$. Корни $0, -2$ простые, 1 двойной.

23.41. После выделения $(y-a)^3$ оставшийся множитель имеет вид $y - b$. Коэффициент при кубе равен $-(3a + b) = 0$, откуда $b = -3a$. Раскрытие даёт $p = -6a^2$, $q = 8a^3$, $r = -3a^4$. Четвёртый корень $-3a$ совпадает с a только при $a = 0$; тогда $P(y) = y^4$. При $a \neq 0$ кратность a ровно три.

23.42.* $\Delta = -\frac{3}{4}$. Берём $s = \frac{\sqrt{3}}{2}i$, $u = \cos\frac{2\pi}{9} + i\sin\frac{2\pi}{9}$; тогда $u^3 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$. Поскольку $-\frac{p}{3} = 1$, выбираем $v = \frac{1}{u} = \overline{u}$. Все корни: $y_k = 2\cos(\frac{2\pi}{9} + \frac{2\pi k}{3})$, $k = 0, 1, 2$. Согласованные слагаемые в каждой сумме сопряжены, поэтому суммы действительны. Три угла дают различные значения; подстановка через формулу тройного угла подтверждает каждый корень.

Глава 24. Кватернионы и повороты в пространстве

24.1. Соответственно $k, -k, i, -i, j, -j$. Все три пары меняют знак и дают разные результаты.

24.2. $p+q = 4+i-j+4k$, $p-q = -2+3i-j-4k$.

24.3. Первое произведение $1+i+j+k$, второе $1+i+j-k$.

24.4. $i^2+ij+ji+j^2 = -2$. Смешанные произведения k и $-k$ сокращаются; коммутативности нет.

24.5. $\overline{q} = 1-2i+2j-4k$, $N(q) = 25$, $|q| = 5$, $q^{-1} = \frac{1-2i+2j-4k}{25}$.

24.6. Так как $i^{-1} = -i$, первое решение $x = (-i)j = -k$, второе $x = j(-i) = k$. Подстановка даёт $i(-k) = j$, $ki = j$.

24.7. Пара равна $(1+2i_{\mathbb{C}}, 3-4i_{\mathbb{C}})$, поэтому $M(q) = \begin{pmatrix} 1+2i_{\mathbb{C}} & 3-4i_{\mathbb{C}} \\ -3-4i_{\mathbb{C}} & 1-2i_{\mathbb{C}} \end{pmatrix}$.



24.8. В первой сумме мнимые координаты сокращаются. Дважды изменив знаки трёх мнимых координат, получаем исходные координаты.

24.9. Из $pq = 0$ следует $N(p)N(q) = 0$. Для ненулевых p, q оба квадрата нормы положительны, что невозможно.

24.10. $(ij)k = k^2 = -1$, $i(jk) = i^2 = -1$. Равенство согласуется с ассоциативностью.

24.11. При $\cos\theta = 0$, $\sin\theta = 1$ получаем $(1,2,3)$. Длина до и после равна $\sqrt{14}$.

24.12. Можно взять $q = k$, соответствующий $\theta = \pi$. Тогда $ki(-k) = j(-k) = -i$.

24.13. Сопряжение сохраняет действительный множитель -1, поэтому $(-q)v\overline{-q} = (-q)v(-\overline{q}) = qv\overline{q}$.

24.14.* По ассоциативности $p(qv\overline{q})\overline{p} = (pq)v(\overline{q}\,\overline{p}) = (pq)v\overline{pq}$. Сначала применяется T_q, затем T_p.

24.15.* Для $q = a+bi+cj+dk$ разность $qi - iq = 2dj - 2ck$. Она равна нулю ровно при $c = d = 0$. Ответ: все $a+bi$, где $a, b \in \mathbb{R}$.

24.16.* Коммутирование с i даёт $q = a+bi$. Условие $qj = jq$ теперь даёт $2bk = 0$, значит $b = 0$. Обратно, действительные числа коммутируют со всеми элементами по определению умножения.

24.17.* Квадраты основных слагаемых дают $-x^2 - y^2 - z^2$. Для каждой пары смешанные произведения взаимно уничтожаются: $ij+ji = jk+kj = ki+ik = 0$.

24.18.* По ассоциативности $(pq)(q^{-1}p^{-1}) = p(qq^{-1})p^{-1} = 1$; аналогично произведение в обратном порядке равно 1. Следовательно, это двусторонний обратный.

Глава 25. Октонионы: когда важны скобки

25.1. $x = e_0 + 2e_1 + 3e_6 - e_7$.

25.2. $(i,0)(0,1) = (0,i) = e_5$; $(0,1)(i,0) = (0,-i) = -e_5$.

25.3. Каждый квадрат равен $-e_0 = -1$: для пары $(0,b)$ первая компонента квадрата равна $-\overline{b}b$, вторая нулевая; у $b = 1,i,j,k$ квадрат нормы равен 1.

25.4. $x + y = (3 + i - k, 1 + 2j)$, $x - y = (-1 + i + k, -1)$.

25.5. $\overline{x} = (1 - i, -j)$, $N_{\mathbb{O}}(x) = 3$, $|x| = \sqrt{3}$, обратный $\frac{1}{3}(1 - i, -j)$.

25.6. $e_2e_4 = e_6$, первое тройное произведение e_7, второе $-e_7$.



25.7. Первый равен $2e_7$. Второй равен нулю: все три элемента принадлежат ассоциативной копии $\mathbb{H}$; непосредственно обе расстановки скобок дают -1.

25.8. Сопряжение сохраняет координату x_0 и меняет знаки остальных семи. Двойное изменение знаков возвращает x, а в сумме мнимые координаты сокращаются.

25.9. Для $r = 1,2,3$ это следует из кватернионной таблицы, для $r = 4,5,6,7$ — из вычисленных квадратов: $e_r^2 = -1$. Следовательно, произведение e_r и $-e_r$ в каждом порядке равно 1.

25.10. Нет: мультипликативность требует $N_{\mathbb{O}}(xy) = 65$. При точной арифметике хотя бы одно вычисление ошибочно.

25.11. $xy = (j - \overline{k}i, k + i\overline{j}) = (j + ki, k - ij) = (2j, 0)$. Его квадрат нормы 4, а каждый вход имеет квадрат нормы 2. Проверка даёт $4 = 2 \cdot 2$.

25.12. В обоих случаях $y = -e_4$, поскольку $e_4^2 = -1$. Единственность следует из теоремы об однозначной разрешимости.

25.13.* Например, $[x + x', y, z] = ((x + x')y)z - (x + x')(yz) = [x,y,z] + [x',y,z]$ по дистрибутивности. Действительный множитель выносится по билинейности. Те же раскрытия работают для второго и третьего аргументов.

25.14.* Для $x = (a,b)$, $y = (c,d)$ левая часть равна $(\overline{c}\,\overline{a} - \overline{b}d, -da - b\overline{c})$. Произведение $(\overline{c}, -d)(\overline{a}, -b)$ по определению даёт ровно ту же пару.

25.15.* Дистрибутивность даёт $x(y - z) = 0$. Поэтому $N_{\mathbb{O}}(x)N_{\mathbb{O}}(y - z) = 0$. Первый множитель положителен, значит, второй нулевой, то есть $y = z$.

25.16.* В $\mathbb{C}$ верны оба свойства. В $\mathbb{H}$ ассоциативность верна, коммутативность нарушается: $ij = k$, $ji = -k$. В $\mathbb{O}$ нет ни одного из этих двух свойств для всех элементов: некоммутативность наследуется из $\mathbb{H}$, а ассоциативность опровергается тройкой e_1, e_2, e_4.

Глава 26. Векторные пространства, базисы и линейные отображения

26.1. Да: сумма и умножение на скаляр сохраняют условие. Каждый вектор равен $x(1, -1)$; базис $((1, -1))$, размерность 1.

26.2. Только $y = 2x$. Первое множество не содержит нуля; третье не замкнуто относительно умножения на -1.

26.3. $(5, 1) = 3u + 2v$.

26.4. Нет: $2(1, 2, 3) - (2, 4, 6) = 0$.

26.5. Из $a + c = 0, b + c = 0, a + b = 0$ следует $a = b = c = 0$. Три независимых вектора образуют базис: матрица системы имеет три ведущих элемента.

26.6. $(1, 3)$, поскольку $(4, -2) = 1(1, 1) + 3(1, -1)$.

26.7. Координаты $(3, -2, 5)$, размерность 3.



26.8. (t, t^2): свободный коэффициент равен нулю. Размерность 2.

26.9. 6. Базис состоит из шести матриц E_{ij} с одной единицей на месте (i, j) и нулями на остальных местах.

26.10. Ядро: $\operatorname{span}((-1, 1, -1))$, размерность 1. Образ равен $\mathbb{R}^2$: для (a, b) подходит $(a, 0, b)$. Его размерность 2, и $3 = 1 + 2$.

26.11. Нет: $T(0, 0) = (1, 0) \neq 0$, тогда как всякое линейное отображение переводит ноль в ноль.

26.12. Например, $(2, 1, 0)$ и $(-1, 0, 1)$. Они лежат в ядре и независимы. Ядро двумерно.

26.13. Скалярное произведение 0, нормы $\sqrt{6}$, $2\sqrt{2}$; векторы ортогональны.

26.14. $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}, 0)$. На прямой два единичных вектора: этот и противоположный.

26.15. Пересечение содержит ноль. Если u, v лежат в обоих подпространствах, то любая $au + bv$ лежит в каждом из них, следовательно, и в пересечении.

26.16. Две координатные оси. Векторы $(1,0)$, $(0,1)$ лежат в объединении, их сумма $(1,1)$ — нет.

26.17. Коэффициент при нулевом векторе можно взять равным 1, остальные — нулю. У пустого списка нет ненулевого набора коэффициентов, поэтому он независим.

26.18. Размерность ядра $4-2=2$; инъективность невозможна.

26.19.* Пространство имеет базис $(1,t,t^2,t^3)$ из четырёх элементов. Независимый список не может быть длиннее порождающего.

26.20.* Линейность следует из производной суммы и постоянного множителя. Ядро — постоянные многочлены. Любой $a+bt+ct^2$ есть производная $at+\frac{b}{2}t^2+\frac{c}{3}t^3$, поэтому образ равен $\mathcal{P}_2$. Размерности 1 и 3.

26.21. Длина 10; скалярные проекции 6 и 8.

26.22.* По формуле размерностей нулевое ядро равносильно тому, что размерность образа равна размерности пространства назначения. Подпространство с такой размерностью совпадает со всем пространством: его базис уже является базисом назначения.

Глава 27. Собственные значения и квадратичные формы

27.1. Значения $2,5$; подпространства соответственно $\operatorname{span}((1,0))$, $\operatorname{span}((0,1))$.

27.2. $\chi_A(\lambda)=\lambda^2-4\lambda+3$. Для 1 подходит $(1,-1)$, для 3 — $(1,1)$.

27.3. Нулевой вектор исключён определением. Нулевое значение возможно: у $\operatorname{diag}(0,1)$ вектор $(1,0)$ отвечает значению 0.

27.4. Характеристический многочлен λ^2+1. Над $\mathbb{R}$ значений нет, над $\mathbb{C}$ — $i,-i$.

27.5. База $m=1$ дана. Из $A^m v=\lambda^m v$ следует $A^{m+1}v=A(\lambda^m v)=\lambda^m Av=\lambda^{m+1}v$.

27.6. Можно взять $P=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & 1\end{pmatrix}$, $D=\operatorname{diag}(1,3)$. Тогда $A=PDP^{\mathrm{T}}$.

27.7. Единственное собственное значение 1, а $\ker(J-I)=\{(x,0)\}$ одномерно. Двух собственных векторов для базиса нет.



27.8. $(1,0) = \frac{1}{2}(1,-1) + \frac{1}{2}(1,1)$, поэтому $x_n = (\frac{1+3^n}{2}, \frac{3^n-1}{2})$.

27.9. $x = -y, y = x$ дают $x = y = 0$; z произвольно. Ненулевые векторы оси z отвечают значению 1.

27.10. Из симметрии $\langle Au, v\rangle = \langle u, Av\rangle$. Следовательно, $(\lambda - \mu)\langle u, v\rangle = 0$; разность ненулевая, поэтому скалярное произведение равно нулю.

27.11. Такая матрица равна cI, поэтому $Av = cv$ для любого v.

27.12.* $(1,-1)$ — собственный вектор со значением 2, поэтому ответ $2^n(1,-1)$.

27.13. $\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$; коэффициент при xy равен удвоенному внедиагональному элементу.

27.14. Положительно определена: $a = 3 > 0$, $ac - b^2 = 15 - 4 = 11 > 0$.

27.15. Соответственно положительно определённая, отрицательно определённая, неопределённая, положительно полуопределённая (но не определённая).

27.16. $(x + 2y)^2 + 3y^2$; минимум $3y^2$ при $x = -2y$.

27.17. Значения $1, 3$. Главные направления $(1,-1)$ и $(1,1)$; в ортонормированных координатах форма равна $v^2 + 3u^2$.

27.18.* Минимум 1 на направлении $(1,-1)$, максимум 3 на направлении $(1,1)$, при нормировке до длины 1. В главных координатах $E = v^2 + 3u^2$, $u^2 + v^2 = 1$.

27.19. Ровно при $|t| < 1$, поскольку определитель $1 - t^2$. При $|t| = 1$ форма — квадрат $(x \pm y)^2$, а при $|t| > 1$ неопределённа.

27.20. Матрица $\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$ имеет определитель $-\frac{1}{4} \neq 0$. Значения в $(1,1)$ и $(1,-1)$ равны 1 и -1.

27.21. $3u^2 + v^2 = 1$, где $u = \frac{x+y}{\sqrt{2}}, v = \frac{x-y}{\sqrt{2}}$. Полуоси $\frac{1}{\sqrt{3}}$ и 1.

27.22. Ортогональная замена приводит к $\lambda_1 u_1^2 + \lambda_2 u_2^2$. При ненулевом векторе хотя бы один квадрат положителен, а оба коэффициента положительны.

27.23.* Необходимость первых двух условий следует из координатных векторов. При $a > 0$ выделение квадрата даёт необходимость и достаточность третьего. Если $a = 0$, неотрицательность для всех x при $y = 1$ требует $b = 0$; условие определителя тоже даёт $b = 0$, и остаётся $cy^2 \geq 0$.

27.24.* Окружность, гипербола и две прямые $x = \pm 1$. Ограничена только окружность.

Глава 28. Полнота и метрические пространства

28.1. При $m, n \geq N$: $\left|\frac{1}{m} - \frac{1}{n}\right| \leq \frac{1}{N}$. Достаточно взять натуральное $N > \frac{1}{\varepsilon}$.

28.2. Нет. При $\varepsilon = 1$ после любого номера есть чётный и нечётный индексы; разность членов по модулю равна 2.

28.3. При $m, n \geq 201$ разность по модулю не больше $\frac{2}{201} < 0{,}01$. Подходит $N = 201$.

28.4. Оба достаточно точных усечения отличаются от $\sqrt{2}$ меньше чем на 10^{-k}, поэтому отличаются друг от друга меньше чем на $2 \cdot 10^{-k}$. Любой рациональный предел был бы и действительным пределом, то есть равнялся бы иррациональному $\sqrt{2}$, что невозможно.

28.5. $d_2 = 5$, $d_1 = 7$, $d_\infty = 4$.

28.6. Внутренность круга $x^2 + y^2 < 1$; внутренность ромба $|x| + |y| < 1$; открытый квадрат $\max(|x|, |y|) < 1$. Границы не входят.

28.7. Первые два шара равны $\{a\}$, третий — всему пространству.



28.8. Нет: для $x = 0, y = 1, z = 2$ неравенство треугольника потребовало бы $4 \leq 1 + 1$.

28.9. Для каждого j: $|x_j - z_j| \leq |x_j - y_j| + |y_j - z_j| \leq d_\infty(x, y) + d_\infty(y, z)$. Взятие максимума слева даёт требуемое.

28.10. $(0; 1)$ открыто, но не замкнуто; $[0; 1]$ замкнуто, но не открыто; $[0; 1)$ ни открыто, ни замкнуто. $\emptyset$ и $\mathbb{R}$ одновременно открыты и замкнуты.

28.11. $[0; 1]$ и $\mathbb{Z}$ полны как замкнутые подмножества $\mathbb{R}$. Интервал $(0; 1)$ не полон: $\frac{1}{n+1} \to 0 \notin (0; 1)$.

28.12. Чётные индексы дают $x_{2k} = 1 + \frac{1}{2k} \to 1$; нечётные — $x_{2k-1} = -1 + \frac{1}{2k-1} \to -1$.

28.13. Множество — открытый интервал, а не замкнутый отрезок. Максимума нет: для каждого $x < 1$ точка $\frac{x+1}{2}$ принадлежит интервалу и имеет большее значение. Супремум равен 1.

28.14. $f(x) = (x - 1)^2 + 2$. Минимум 2 при $x = 1$, максимум 6 при $x = 3$.

28.15. $\delta = \frac{\varepsilon}{3}$, поскольку $|f(x) - f(y)| = 3|x - y|$.

28.16. $|x^2 - y^2| = |x - y||x + y| \leq 4|x - y|$. Подходит $\delta = \frac{\varepsilon}{4}$.

28.17. К $(0, 0)$. Расстояния равны соответственно $\frac{3}{n}$, $\frac{\sqrt{5}}{n}$, $\frac{2}{n}$; все стремятся к нулю.

28.18. Вдоль улиц 7 единиц, по прямой 5. Это d_1 и d_2; для такой сетки обход неизбежен.

28.19.* Условие Коши с $\varepsilon = \frac{1}{2}$ означает, что после некоторого номера все члены совпадают. Такая последовательность сходится к своему постоянному хвосту.

28.20.* Каждая координата последовательности Коши сама является действительной последовательностью Коши и имеет предел. Для заданного ε выберем номер с точностью ε в каждой из конечного числа координат и возьмём максимум этих номеров. Тогда максимум координатных ошибок меньше ε.

28.21.* Расстояние между точками равно $\frac{1}{n(n+1)} \to 0$, а разность значений по модулю всегда 1. Для $\varepsilon = \frac{1}{2}$ ни одно общее $\delta > 0$ не подходит.

28.22.* Для заданного ε возьмём общее δ из равномерной непрерывности. У последовательности Коши после некоторого номера все расстояния меньше δ, поэтому расстояния между соответствующими значениями меньше ε.

28.23.* Иначе для некоторого $\varepsilon > 0$ можно выбрать подпоследовательность с $|x_{n_k} - a| \geq \varepsilon$. Она ограничена, поэтому имеет сходящуюся подпоследовательность. Её предел b удовлетворяет $|b - a| \geq \varepsilon$, вопреки условию.

28.24. Для $x \in B_r(a)$ число $s = r - d(x,a) > 0$. Если $d(y,x) < s$, то $d(y,a) \leq d(y,x) + d(x,a) < r$. Значит, $B_s(x) \subseteq B_r(a)$.

Глава 29. Интеграл Римана и первообразная

29.1. $L = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 1$, $U = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 3$. Сам интеграл равен 2.

29.2. $L = \frac{0+1+4+9}{64} = \frac{7}{32}$, $U = \frac{1+4+9+16}{64} = \frac{15}{32}$. Действительно, $\frac{7}{32} < \frac{1}{3} < \frac{15}{32}$.

29.3. $9;\ 4;\ 0$.

29.4. Площадь $\int_{-1}^{1} |x|\,dx = 1$; ориентированный интеграл $\int_{-1}^{1} x\,dx = 0$.

29.5. $[x^3 - x^2 + x]_0^1 = 1$.

29.6. 1 и 1.

29.7. 15 и -7.



29.8. $F(x) = x^4 - 2x + C$, $C \in \mathbb{R}$.

29.9. $F(x) = x^2 + 4$.

29.10. $(\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x$; определённый интеграл равен $\operatorname{sh}(\ln 2) = \frac{2-\frac{1}{2}}{2} = \frac{3}{4}$.

29.11. $\int_0^3 (2t+1)\,dt = [t^2+t]_0^3 = 12$ м. Скорость положительна, поэтому это также пройденный путь.

29.12. $\int_0^2 (1+x)\,dx = 4$ кг.

29.13. $\frac{1}{3} \cdot [\frac{x^3}{3}]_0^3 = 3$.

29.14. $A'(x) = x^2 + 1$, $A(1) = 0$.

29.15. При $u = x^2$ пределы $0, 1$, поэтому $\int_0^1 e^u\,du = e - 1$.

29.16. $[xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x\,dx = e - (e-1) = 1$.

29.17. Нет: функция не определена и не ограничена у нуля. Теорема Ньютона — Лейбница на этом отрезке неприменима. Симметричное сокращение не создаёт интеграл Римана.

29.18. Интегрируем неравенства $-M \le f \le M$: $-M(b-a) \le \int_a^b f \le M(b-a)$.

29.19.* Если $f(c) > 0$, по непрерывности на некотором подотрезке положительной длины выполнено $f(x) > \frac{f(c)}{2}$. Тогда интеграл на нём положителен, на остальных частях неотрицателен. Получаем противоречие нулевому интегралу.

29.20. Для любых точек $a < b$ внутри интервала теорема Лагранжа для $F - G$ даёт $(F-G)(b) - (F-G)(a) = 0$. Значит, значения одинаковы во всех точках.

29.21.* Производная интеграла по верхнему пределу равна косинусу этого предела. Затем правило цепочки даёт $2x\cos(x^2)$.

29.22.* Это производная $e^{\sin t}$, поэтому ответ $e^{\sin \pi} - e^{\sin 0} = 0$. Теорема замены использует правило цепочки и значения на концах; монотонности в её условиях нет.

29.23.* $L_n = \frac{b^2}{n^2}\sum_{k=0}^{n-1} k = \frac{b^2(n-1)}{2n}$, $U_n = \frac{b^2}{n^2}\sum_{k=1}^{n} k = \frac{b^2(n+1)}{2n}$. Их разность $\frac{b^2}{n} \to 0$, оба предела равны $\frac{b^2}{2}$.

29.24.* Положим $A(x) = \int_a^x f(t)\,dt$. Эта функция непрерывна на отрезке и дифференцируема внутри, поэтому по теореме Лагранжа $A(b) - A(a) = A'(c)(b-a)$ для некоторого $c \in (a;b)$. Здесь $A(a) = 0$, $A'(c) = f(c)$, что даёт требуемое равенство.

Глава 30. Числовые и степенные ряды

30.1. $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{7}{8}, \frac{15}{16}$; $S_N = 1 - 2^{-N} \to 1$.

30.2. Нет: $a_n \to 1 \neq 0$.

30.3. $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$; $S_N = 1 - \frac{1}{N+1} \to 1$.

30.4. Первый и четвёртый сходятся, второй и третий расходятся по признаку для p-рядов.

30.5. $0 < \frac{1}{n^2+5} \le \frac{1}{n^2}$, а ряд справа сходится.

30.6. При $n \ge 1$: $2n+1 \le 3n$, значит, $\frac{1}{2n+1} \ge \frac{1}{3n}$. Последний ряд — постоянное положительное кратное гармонического.

30.7. Условной: признак Лейбница даёт сходимость, а ряд модулей гармонический и расходится.



30.8. Абсолютно сходится, поскольку $\sum \frac{1}{n^2}$ сходится.

30.9. Нужно $\frac{1}{N+1} \le 0{,}01$, то есть $N \ge 99$. Наименьшее по этой оценке — 99.

30.10. В первом случае отношение $\frac{3}{n+1} \to 0$: ряд сходится. Во втором $\frac{n+1}{3} \to +\infty$: расходится.

30.11. Отношение $\frac{n^2}{(n+1)^2} \to 1$. Сходимость следует из признака для p-ряда при $p = 2 > 1$.

30.12. $|x| < \frac{1}{2}$, сумма $\frac{1}{1-2x}$; на обоих концах члены не стремятся к нулю.

30.13. Радиус 1: для $x \neq 0$ отношение модулей стремится к $|x|$. При $x = 1$ гармонический ряд расходится, при $x = -1$ ряд сходится по Лейбницу. Область $[-1; 1)$.

30.14. Радиус 1, на обоих концах абсолютная сходимость по сравнению с $\sum \frac{1}{n^2}$. Область $[-1; 1]$.

30.15. При любом фиксированном $x \neq 0$ отношение модулей равно $\frac{|x|}{n+1} \to 0$; в нуле остаётся постоянный член. Радиус $+\infty$.

30.16. При $x \neq 0$ отношение модулей $(n+1)|x| \to +\infty$, поэтому ряд расходится. В нуле сходится к 1; радиус 0.

30.17. Предел 2 л. После N порций остаток 2^{1-N} л; $N = 8$ даёт $\frac{1}{128} < 0{,}01$, а $N = 7$ ещё недостаточно.

30.18. Сумма $\frac{9}{1-\frac{1}{3}} = \frac{27}{2}$ см. Остаток $\frac{27}{2} \cdot 3^{-5} = \frac{1}{18}$ см.

30.19. После последнего изменённого номера все частичные суммы двух рядов отличаются на одну постоянную. Поэтому одна последовательность частичных сумм имеет конечный предел тогда и только тогда, когда другая его имеет.

30.20. Для конечных частичных сумм $S_N = \alpha A_N + \beta B_N$. Переход к пределу по правилам пределов даёт утверждение.

30.21.* Для $n \geq N+1 \geq 2$ имеем $\frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$. После суммирования и предельного перехода хвост не больше $\frac{1}{N}$.

30.22.* Гармонический ряд: $a_n = \frac{1}{n} \to 0$, а группировка по степеням двойки даёт $S_{2^m} \geq 1 + \frac{m}{2} \to +\infty$.

30.23.* Отношение модулей стремится к $\frac{|x-2|}{3}$, значит, центр 2, радиус 3. При $x = -1$ ряд знакопеременный гармонический и сходится, при $x = 5$ гармонический и расходится. Область $[-1; 5)$.

30.24.* Члены в точке $a+2$ ограничены: $|c_n| 2^n \leq M$. В точке $a-1$ модуль члена не больше $M 2^{-n}$, значит, есть абсолютная сходимость. На противоположном конце гарантии нет: ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (x-a)^n}{n 2^n}$ при $a+2$ сходится по Лейбницу, а при $a-2$ становится гармоническим.