


F. Illustrated Key to Order

1A शरीरको बाहिरि भाग नरम हुन; tergite मा सेटा(setae-रौ) को गुच्छा(tufts) हुने; र पछाडि पट्टि लामो सेटा(setae) को २ वटा गुच्छा(tufts) पुच्छर जस्तै देखिने (Fig. 8); ११-१३ वटा खण्ड(rings); धेरै सानो (४ mm भन्दा छोटो); १७ जोडी भन्दा बढी खुट्टा नहुने; न्यानो ठाउमा संसारभर पाइने Polyxenida



Polyxenida: Fig. 8 full body, dorsal aspect

1B शरीरको बाहिरि भाग कडा र कठोर हुने; tergite मा सेटा(setae) भए पनि गुच्छा(tufts) को रूपमा नहुने, ११ वटा भन्दा बढी खण्ड, वयस्कमा १७ भन्दा बढी खुट्टाको जोडी हुने (केहि female Glomerida बाहेक), धेरै प्रजातिको वयस्कमा ४ mm भन्दा लामो हुने..... 2


2A शरीरमा २२ वटा सम्म खण्डहरु.....3

2B शरीरमा २२ वटा भन्दा बढी खण्डहरु.....4

3 [2a] शरीरमा २२ वटा सम्म खण्डहरु

3A वयस्कको शरीरमा १२ वटा खण्ड हुने; पछाडिबाट गन्दा, collum साघुरो; दोश्रो खण्डको tergite धेरै चौडा(Fig. 9); शरीर बेरेपछि भकुण्डो जस्तै बन्ने (Fig. 10); घोडाकोखुट्टाको छाप जस्तो Tömösváry's organ; ocelli छ भने एकै पङ्क्तिमा (Fig. 11); उत्तरी गोलार्ध र दक्षिण-पूर्वी एसिया..... Glomerida

ध्यान दिनु पर्ने कुरा: Glomerida and Sphaerotheriida मा collum धेरै सानो हुन्छ, त्यसैले बेरिएको बेला देखिन गाह्रो हुन्छ; तर दोश्रो tergite ठुलो हुने भएकाले सजिलै चिनिन्छ र त्यसलाई खण्ड २ भनेर गन्दै पछाडितिर




Glomerida: Fig. 9 body, lateral aspect; Fig. 10 rolled into a ball; Fig. 11 head with row of ocelli

जानुहोस; Glomerida मा १२ खण्ड हुन्छन् जसमध्ये ११ औं खण्ड पातलो हुन्छ, जुन नदेखिन सक्छ र अन्तिम २ जोडी खुट्टा telepods को रूपमा हुन्छन्।


3B वयस्कको शरीरमा १३ वटा खण्ड हुने; पछाडिबाट गन्दा, collum धेरै सानो र अण्डाकार हुने; दोस्रो tergite धेरै चौडा हुने (Figs 12, 13); १३औं खण्ड सबैभन्दा चौडा हुने; ozopores नहुने; भारत, श्रीलंका, दक्षिणपूर्वी एसिया, अष्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड, पूर्वी र दक्षिणी अफ्रिका, मडागास्कर र सेशेल्समा मात्र पाइने।..... **Sphaerotheriida**

ध्यान दिनु पर्ने कुरा: Glomerida and Sphaerotheriida मा collum धेरै सानो हुन्छ, त्यसैले बेरिएको बेला देखिन गाह्रो हुन्छ; तर दोस्रो tergite ठुलो हुने भएकाले सजिलै चिनिन्छ र त्यसलाई खण्ड २ भनेर गन्दै पछाडितिर जानुहोस; Sphaerotheriida मा १३ वटा खण्ड; Glomerida को तुलनामा Sphaerotheriida सधैं ठुलो हुन्छन्; आँखा मृगौला आकारको र ocelli केहि संख्यामा हुन्छन्; अन्तिम २ जोडी खुट्टा telepods को रूपमा हुन्छन्।




Sphaerotheriida: Fig. 12 body, dorsal aspect; Fig. 13 rolled into ball

3C वयस्कको शरीरमा १९ अथवा २० वटा खण्ड हुने; आँखा अथवा ocelli नहुने; paranota हुने अथवा नहुने (Figs 14, 15); वयस्क maleको सातौं खण्डमा अगाडिको खुट्टा gonopods मा modified हुने (Fig. 16, Fig. 34 संग तुलना गर्नुहोस); सातौं खण्डमा पछाडिको खुट्टा सामान्य हिड्ने खुट्टा जस्तै हुन्छ; संसारभर पाइने.... Polydesmida



Polydesmida: Figs. 14, dorsal aspect of body; Fig. 15 cross section through the body of *Polydesmus* (after Blower, 1985); Fig. 16 male, ventral view, showing single pair of gonopods (gray)

3D वयस्कको शरीरमा २२ वटा खण्ड (गन्न गार्हो हुने); शरीर अगाडी र पछाडितिर साँघुरो(सानो) हुदै जाने; अन्तिम जोडी खुट्टा पातलो हुने; शरीरको अन्त्यमा फैलिएको, cerci जस्तै देखिने (Figs 17, 18); subadult specimen को सबै खण्डहरूमा खुट्टा हुने; एन्टेना सकेटको पछाडि ठुलो र अण्डाकार Tömösváry's organ(Fig. 19); ocelli नहुने; वयस्क female मा दोस्रो जोडी खुट्टामा लामो नलियुक्त ovipositor (Fig. 20); दक्षिणपूर्वी एसिया, वेस्ट इन्डिज, मेक्सिको, उत्तरी दक्षिण अमेरिका..... Glomeridesmida



Glomeridesmida: Fig. 17, entire body, dorsal view; Fig. 18 hind body end, enlarged (after Mauriès, 1980); Fig. 19 lateral aspect of head with Tömösváry's organ (after Mauriès, 1980); Fig. 20 female ovipositors at second leg pair (after Chamberlin, 1922)

4[2b]: वयस्कको शरीरमा २२ वटा भन्दा बढी खण्डहरू

4A tergite मा लम्ब खाल्डो(longitudinal groove) ले छुट्याउने, खाल्डो दुई लम्ब रेखाजस्तै देखिने; सामान्यतया रंगहीन हुने.....5


4B tergite मा लम्ब खाल्डो(longitudinal groove) नहुने; पछाडि बिचमा रंगिन रेखा पातलो फिक्का सिलाइ रेखा देखिने..... 10

ध्यान दिनु पर्ने कुरा: तपाईंलाई शुरुवाती चरणमा गाह्रो हुन् सक्छ। तपाईंले गरेको पहिचान गलत भन्ने लग्यो भने बैकल्पिक बुँदामा जानुहोस।

5 [4a]: tergiteमा लम्ब खाल्डो(longitudinal groove) ले छुट्याउने

5A वयस्कको शरीरमा २६ देखि ३२ वटा खण्डहरू हुने; प्रत्येक tergite मा ३+३ वटा पङ्क्ति (Fig. 21); सेटा (setae) हुने; ocelli टाढा टाढा हुने (Fig. 23); शरीर अगाडी र पछाडितिर साँघुरो(सानो) हुदै जाने (Fig. 22); paranota हुने अथवा नहुने; वयस्क maleको सातौं खण्डमा अगाडी र पछाडि दुवै खुट्टा gonopod को रूपमा हुने; संसारभर; [उप-सहारा अफ्रिका (मडागास्करमा उपस्थित) र उष्णकटिबंधीय दक्षिण अमेरिका बाहेक]....**Chordeumatida**

Note: The setae are longer and hence easier to see towards the end of the body. In dorsal view, looking onto the thin but distinct dorsal longitudinal groove, only two setae may be clearly visible from above. The third setae of every row often inserts on the lateral side of the animal, with only the tip of the setae visible from above.



Chordeumatida: Fig. 21 dorsal view, showing 3+3 setae; Fig. 22 hind body, side view; Fig. 23 head

5B वयस्कको शरीरमा ३२ वटा भन्दा बढी खण्डहरू6

6A ocelli अथवा आँखा हुने7

6B ocelli अथवा आँखा नहुने; टाउकोमा एन्टेना सकेटको माथिपट्टि उठेको भाग हुने (Figs 24, 25); स्पष्ट paranota हुने (Figs 26, 27); ३५ वटा भन्दा बढी खण्डहरू; वयस्क male को gonopods भन्दा अगाडी ८ जोडी खुट्टा हुने (Fig. 34); उत्तर र मध्य अमेरिका, युरोप, जापान, दक्षिणपूर्वी एसिया..... **Platydesmida**