

Guía Álgebra - Práctica 1

Lorenzo Durante

1. Introducción

Esta es la resolución de la primera guía de ejercicios de Álgebra 1 para Ciencias de la Computación en la UBA.

2. Conjuntos

2.1. Dado el conjunto $A = \{1, 2, 3\}$, determinar cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas.

- i) $1 \in A$
- ii) $\{1\} \subseteq A$
- iii) $\{2, 1\} \subseteq A$
- iv) $\{1, 3\} \in A$
- v) $\{2\} \in A$

Resolución

- i) $1 \in A$: el número 1 pertenece al conjunto A . (**Verdadero**)
- ii) $\{1\} \subseteq A$: todos los elementos de $\{1\}$ pertenecen a A . (**Verdadero**)
- iii) $\{2, 1\} \subseteq A$: 1 y 2 pertenecen a A . (**Verdadero**)
- iv) $\{1, 3\} \notin A$: A no contiene al conjunto $\{1, 3\}$ como *elemento*. (**Verdadero**)
- v) $\{2\} \notin A$: el elemento $\{2\}$ no pertenece a A . (**Verdadero**)

2.2. Dado el conjunto $A = \{1, 2, \{3\}, \{1, 2\}\}$, determinar cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas.

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| i) $3 \in A$ | vii) $\{\{1, 2\}\} \subseteq A$ |
| ii) $\{3\} \subseteq A$ | viii) $\{\{1, 2\}, 3\} \subseteq A$ |
| iii) $\{3\} \in A$ | ix) $\emptyset \in A$ |
| iv) $\{\{3\}\} \subseteq A$ | x) $\emptyset \subseteq A$ |
| v) $\{1, 2\} \in A$ | xi) $A \in A$ |
| vi) $\{1, 2\} \subseteq A$ | xii) $A \subseteq A$ |

Resolución

- I) $3 \notin A$. **Falso** que $3 \in A$.
- II) $\{3\} \not\subseteq A$. **Falso** que $\{3\} \subseteq A$.
- III) $\{3\} \in A$. **Verdadero**.
- IV) $\{\{3\}\} \subseteq A$. **Verdadero**.
- V) $\{1, 2\} \in A$. **Verdadero**.
- VI) $\{1, 2\} \subseteq A$. **Verdadero**.
- VII) $\{\{1, 2\}\} \subseteq A$. **Verdadero**.
- VIII) $\{\{1, 2\}, 3\} \not\subseteq A$ porque $3 \notin A$. **Falso** que sea subconjunto.
- IX) $\emptyset \in A$. **Falso**.
- X) $\emptyset \subseteq A$. **Verdadero**.
- XI) $A \in A$. **Falso**.
- XII) $A \subseteq A$. **Verdadero**.

2.3. Determinar si $A \subseteq B$ en cada uno de los siguientes casos.

- I) $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{5, 4, 3, 2, 1\}$
- II) $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2, \{3\}, -3\}$
- III) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 < |x| < 3\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 3\}$
- IV) $A = \{\emptyset\}$, $B = \emptyset$

Resolución

- I) $A \subseteq B$.
- II) $A \not\subseteq B$ (porque $3 \notin B$).
- III) $A \not\subseteq B$. En efecto,

$$A = (-3, -2) \cup (2, 3), \quad B = (-\sqrt{3}, \sqrt{3}),$$

y, por ejemplo, $-2,5 \in A$ pero $-2,5 \notin B$.

- IV) $A \not\subseteq B$ (porque $\emptyset \notin \emptyset$).

2.4. Dados los subconjuntos

$$\begin{aligned}A &= \{1, -2, 7, 3\}, \\B &= \{1, \{3\}, 10\}, \\C &= \{-2, \{1, 2, 3\}, 3\}\end{aligned}$$

del conjunto referencial

$$V = \{1, \{3\}, -2, 7, 10, \{1, 2, 3\}, 3\},$$

hallar

- i) $A \cap (B \Delta C)$
- ii) $(A \cap B) \Delta (A \cap C)$
- iii) $A^c \cap B^c \cap C^c$

Resolución

- i) $A \cap (B \Delta C) = \{1, -2, 3\}.$
- ii) $(A \cap B) \Delta (A \cap C) = \{1, -2, 3\}.$

$$A \cap B = \{1\}, \quad A \cap C = \{-2, 3\}.$$

- iii) $A^c \cap B^c \cap C^c = \emptyset.$ Con V como referencial:

$$A^c = \{\{3\}, 10, \{1, 2, 3\}\}, \quad B^c = \{-2, 7, \{1, 2, 3\}, 3\}, \quad C^c = \{1, \{3\}, 7, 10\}.$$

La intersección es vacía.

2.5. Dados subconjuntos A, B, C de un conjunto referencial V , describir $(A \cup B \cup C)^c$ en términos de intersecciones y complementos, y $(A \cap B \cap C)^c$ en términos de uniones y complementos.

Resolución. (Leyes de De Morgan)

$$(A \cup B \cup C)^c = A^c \cap B^c \cap C^c, \quad (A \cap B \cap C)^c = A^c \cup B^c \cup C^c.$$

2.6. Sean A, B y C conjuntos. Representar en un diagrama de Venn

- i) $(A \cup B^c) \cap C$
- ii) $A \Delta (B \cup C)$
- iii) $A \cup (B \Delta C)$

Completado en hoja.

2.7. Encontrar fórmulas que describan las partes rayadas de los siguientes diagramas de Venn, utilizando únicamente intersecciones, uniones y complementos.

Resolución

- i) $(B^c \cap A) \cup (A^c \cap C \cap B)$
- ii) (Revisar con el diagrama) $(A \cap B^c \cap C^c) \cup (A^c \cap B^c \cap C)$
- iii) $(C^c \cap B \cap A) \cup (A^c \cap B \cap C) \cup (B^c \cap A \cap C)$

2.8. Hallar el conjunto $P(A)$ de partes de A en los casos




Figura 1: Diagramas de Venn

i) $A = \{1\}$

ii) $A = \{a, b\}$

iii) $A = \{1, \{1, 2\}, 3\}$

Resolución

i) $P(A) = \{\emptyset, \{1\}\}$

ii) $P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$

iii) $P(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{\{1, 2\}\}, \{3\}, \{1, \{1, 2\}\}, \{1, 3\}, \{\{1, 2\}, 3\}, \{1, \{1, 2\}, 3\}\}$

2.9. Sean A y B conjuntos. Probar que $P(A) \subseteq P(B) \Leftrightarrow A \subseteq B$.

Demostración. (\Rightarrow) Si $P(A) \subseteq P(B)$ entonces, como $A \in P(A)$, se tiene $A \in P(B)$, luego $A \subseteq B$. (\Leftarrow) Si $A \subseteq B$ y $X \in P(A)$, entonces $X \subseteq A \subseteq B$, por lo tanto $X \in P(B)$. Concluye $P(A) \subseteq P(B)$.

2.10. Sean p, q proposiciones. Verificar que las siguientes expresiones tienen la misma tabla de verdad para concluir que son equivalentes.

i) $p \Rightarrow q, \quad \neg q \Rightarrow \neg p, \quad \neg p \vee q \quad \text{y} \quad \neg(p \wedge \neg q).$

Esto permite demostrar $p \Rightarrow q$ probando en su lugar $\neg q \Rightarrow \neg p$ (contrarrecíproco), o probando $\neg(p \wedge \neg q)$ (reducción al absurdo).

ii) $\neg(p \Rightarrow q) \quad \text{y} \quad p \wedge \neg q.$

Resolución

i)

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

p	q	$\neg q \rightarrow \neg p$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

p	q	$\neg p \vee q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

p	q	$\neg(p \wedge \neg q)$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Todas coinciden, por lo tanto son equivalentes.

II)

p	q	$\neg(p \rightarrow q)$	p	q	$p \wedge \neg q$
V	V	F	V	V	F
V	F	V	V	F	V
F	V	F	F	V	F
F	F	F	F	F	F

Es equivalente.

2.11. Hallar contraejemplos para mostrar que las siguientes proposiciones son falsas.

- I) $\forall a \in \mathbb{N}, \frac{a-1}{a}$ no es un número entero.
- II) $\forall x, y \in \mathbb{R}$ con $x, y > 0$, $\sqrt{x+y} = \sqrt{x} + \sqrt{y}$.
- III) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 4 \Rightarrow x > 2$.

Resolución

- I) Tomando $a = 1$: $\frac{1-1}{1} = 0 \in \mathbb{Z}$. (Contraejemplo)
- II) Tomando $x = y = 1$: $\sqrt{2} \neq 1 + 1$. (Contraejemplo)
- III) Tomando $x = -3$: $x^2 = 9 > 4$ pero $-3 \not> 2$. (Contraejemplo)

2.12.

- I) Decidir si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas, justificando debidamente.
 - (a) $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 5 \vee n \leq 8$.
 - (b) $\exists n \in \mathbb{N} / n \geq 5 \wedge n \leq 8$.
 - (c) $\forall n \in \mathbb{N}, \exists m \in \mathbb{N} / m > n$.
 - (d) $\exists n \in \mathbb{N} / \forall m \in \mathbb{N}, m > n$.
 - (e) $\forall x \in \mathbb{R}, x > 3 \Rightarrow x^2 > 4$.
 - (f) Si n es un número natural terminado en 4, entonces n es par.
- II) Negar las proposiciones anteriores, y en cada caso verificar que la proposición negada tiene el valor de verdad opuesto al de la original.
- III) Reescribir las proposiciones **e)** y **f)** del ítem i) utilizando las equivalencias del ejercicio 10i).
 - a) Esta proposición es **verdadera**, ya que para todo $n \in \mathbb{N}$ siempre se cumple al menos una de las condiciones. Si $n < 5$, entonces $n \leq 8$ es cierto; y si $n \geq 5$, se cumple la primera condición. No existe valor de n que invalide ambas.
 - b) La proposición es **verdadera** porque todos los números naturales cumplen simultáneamente $n \geq 5$ y $n \leq 8$. Por ejemplo, $n = 6$ satisface ambas condiciones, por lo que la proposición es cierta.
 - c) La proposición es **falsa** porque siempre se puede elegir $m = n$ lo que contradice la proposición.

- d) La proposición es **falsa** por el mismo motivo del item anterior. Siempre se puede elegir $m = n$.
- e) La proposición es **falsa** porque si $x = 1$, $1 > 3$ es falso y $1^2 > 4$ es nuevamente falso por lo que la proposición es falsa.

f) La proposición es **falsa**.

a) 1)

$$\begin{aligned} & \neg(\forall n \in \mathbb{N} \mid n \geq 5 \vee n \leq 8) \\ \equiv & \exists n \in \mathbb{N} \mid \neg(n \geq 5 \vee n \leq 8) \\ \equiv & \exists n \in \mathbb{N} \mid (n < 5) \wedge (n > 8) \end{aligned}$$

La negación es imposible, no existe un posible valor de n que sea a la misma vez menos que 5 y mayor que 8. Que sea imposible, confirma que la proposición original es **verdadera**.

b)

$$\begin{aligned} & \forall n \in \mathbb{N} \mid \neg(n \geq 5 \vee n \leq 8) \\ \equiv & \forall n \in \mathbb{N} \mid (n < 5 \wedge n > 8) \end{aligned}$$

La negación es imposible por lo que se confirma que la proposición original es **verdadera**.

c)

$$\begin{aligned} & \exists n \in \mathbb{N}, \forall m \in \mathbb{N} \mid \neg(m > n) \\ \equiv & \exists n \in \mathbb{N}, \forall m \in \mathbb{N} \mid m \leq n \end{aligned}$$

Esto es verdadero ya que 1 cumple la condición. Esto hace que la negación sea verdadera y confirma que la proposición original es **falsa**.

d)

$$\begin{aligned} & \forall n \in \mathbb{N} \mid \exists m \in \mathbb{N}, \neg(m > n) \\ & \forall n \in \mathbb{N} \mid \exists m \in \mathbb{N}, m \leq n \end{aligned}$$

Esta negación es falsa ya que se puede elegir los valores para $n = 1$ y $m = 1$ para que no se cumpla la negación. Esto hace que la proposición original se confirme como **verdadera**.

e)

$$\begin{aligned} & \exists x \in \mathbb{R}, \neg(x > 3 \rightarrow x^2 > 4) \\ & \exists x \in \mathbb{R}, (x > 3) \wedge (x^2 \leq 4) \end{aligned}$$

Esta negación es imposible lo que hace la preposición original **verdadera**.

f) Existe un número natural que termina en 4 y no es par.

Esta negación es falsa por lo que la proposición original es **verdadera**.

2.13. Determinar cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas cualesquiera sean los subconjuntos A , B y C de un conjunto referencial V y cuáles no. Para las que sean verdaderas, dar una demostración, para las otras dar un contraejemplo.

I) $(A \Delta B) - C = (A - C) \Delta (B - C)$.

II) $(A \cap B) \Delta C = (A \Delta C) \cap (B \Delta C)$.

III) $C \subseteq A \Rightarrow B \cap C \subseteq (A \Delta B)^c$.

IV) $A \Delta B = \emptyset \Leftrightarrow A = B$.

I) Demostrar que

$$(A \Delta B) - C = (A - C) \Delta (B - C).$$

Demostración.

$$\begin{aligned} (A \Delta B) - C &= (A - C) \Delta (B - C) \\ [(A - B) \cup (B - A)] - C &= [(A - C) - (B - C)] \cup [(B - C) - (A - C)] \\ [(A - B) - C \cup (B - A) - C] &= [A - (B \cup C)] \cup [B - (C \cup A)] \\ A - (B \cup C) \cup B - (A \cup C) &= A(B \cup C) \cup B - (A \cup C) \end{aligned}$$

$$A = \{1\}, \quad B = \{2\}, \quad C = \{1, 3\}.$$

Verifiquemos la igualdad en este caso:

(i) Lado izquierdo

$$\begin{aligned} (A \cap B) \Delta C &= \{1\} \cap \{2\} \Delta \{1, 3\} \\ &= \emptyset \Delta \{1, 3\} \\ &= \{1, 3\}. \end{aligned}$$

(ii) Lado derecho

$$\begin{aligned} (A \Delta C) \cap (B \Delta C) &= (\{1\} \Delta \{1, 3\}) \cap (\{2\} \Delta \{1, 3\}) \\ &= \{3\} \cap \{1, 2, 3\} \\ &= \{3\}. \end{aligned}$$

Conclusión.

El lado izquierdo resulta en $\{1, 3\}$, mientras que el lado derecho resulta en $\{3\}$. Por lo tanto, la igualdad no se cumple en este caso, lo que confirma que la proposición no es verdadera en general.

II)