

线性代数习题课 14

2025.12.30



半双线性型与二次型

设 U 是 \mathbb{C}^n 的线性子空间。函数 $f : U \times U \rightarrow \mathbb{C}$ 称为 (U 上的) 半双线性型, 如果它对第一个变量是线性的, 对第二个变量是半线性的。

即对任意复数 a, b 和 U 中的向量 x, y, z , 有

1. $f(ax + by, z) = af(x, z) + bf(y, z)$
2. $f(x, ay + bz) = \bar{a}f(x, y) + \bar{b}f(x, z)$

设 v_1, \dots, v_s 是 U 的基, 则半双线性型 f 在诸 (v_i, v_j) 处的值完全确定了 f :

$$f(x, y) = \sum_{i,j=1}^s f_{ij} x_i \bar{y}_j, \quad f_{ij} = f(v_i, v_j).$$

其中 $x = \sum_{i=1}^s x_i v_i$, $y = \sum_{j=1}^s y_j v_j$.

矩阵 $F = (f_{ij})$ 称为 f 在基 (v_i) 下的矩阵

半双线性型与二次型

如果从基 v_1, \dots, v_s 到另一个基 v'_1, \dots, v'_s 的转换矩阵是 A , 那么 f 在基 (v'_i) 下的矩阵为

$$F' = A^T F \bar{A}$$

称半双线性型 f 是埃尔米特型, 如果 $f(x, y) = \overline{f(y, x)}$, 等价于它的矩阵 $F = (f_{ij})$ 满足条件 $F^* = F$, 即 F 是埃尔米特矩阵

称半双线性型 f 是斜埃尔米特型, 如果 $f(x, y) = -\overline{f(y, x)}$, 等价于它的矩阵 $F = (f_{ij})$ 满足 $F^* = -F$, 即 F 为斜埃尔米特矩阵

每个埃尔米特型 f 确定了一个埃尔米特二次型 $q(x) = f(x, x)$, 这是 U 上的实值函数

半双线性型与二次型

如果埃尔米特型 f 在某个基下的矩阵是对角的，那么 f 和它给出的二次型就有如下整齐简洁的形式：

$$f(x, y) = f_1 x_1 \overline{y_1} + \cdots + f_s x_s \overline{y_s},$$
$$q(x) = f_1 |x_1|^2 + \cdots + f_s |x_s|^2$$

上面两式分别称为埃尔米特型 f 和埃尔米特二次型 q 的一个典范式，相应的基称为 f 和 q 的典范基

称埃尔米特二次型 $q(x)$ 是正定的：若对任意非零的 $x \in U$ 有 $q(x) > 0$. 如果 $q(x)$ 是正定的，我们也称 $q(x)$ （或相应的埃尔米特型）在任何基下的矩阵是正定的

半双线性型与二次型

定理：设 U 是 \mathbb{C}^n 的线性子空间， f 是 U 上的埃尔米特型。那么 f 有典范标准正交基。特别地，向量空间 \mathbb{C}^n 上的每个埃尔米特型 f 都有典范标准正交基

推论：设 U 是 \mathbb{C}^n 的线性子空间， q 是 U 上的埃尔米特二次型，秩为 r 。那么存在 U 的标准正交基使得 q 有如下的典范式：

$$q(x) = \lambda_1 |x_1|^2 + \cdots + \lambda_r |x_r|^2,$$

其中 x_1, x_2, \cdots, x_s 是 x 在这个标准正交基下的坐标， $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_r$ 是 $q(x)$ 在这个标准正交基的前 r 个向量的值，也是 q 在任何一个标准正交基下的矩阵的非零特征值

特别地， $q(x)$ 是正定的（或半正定的）当且仅当 $q(x)$ 在一个标准正交基下的矩阵的特征值都是正的（或非负的）

半双线性型与二次型

推论（主轴定理）：设 $q(x) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_i\overline{x_j}$ 是复二次函数，且 $a_{ij} = \overline{a_{ji}}$. 那么存在 n 阶酉矩阵 T 使得做变量替换 $x = Ty$ 后有

$$q(x) = \lambda_1|y_1|^2 + \lambda_2|y_2|^2 + \cdots + \lambda_r|y_r|^2.$$

这里 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_r$ 是 n 阶方阵 (a_{ij}) 的非零特征值

设 A 是 n 阶埃尔米特矩阵，那么下面条件等价：

1. A 是正定的；
2. A 的特征值都是正的；
3. 存在可逆矩阵 P (n 阶方阵) 使得 $A = P^*P$
4. A 的各阶主子式都为正

酉算子

复内积空间 V 上的线性算子 \mathcal{A} 如果保持内积不变, 即

$$(\mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}\beta) = (\alpha, \beta), \quad \forall \alpha, \beta \in V,$$

那么称 \mathcal{A} 是 V 上的一个酉变换

n 维酉空间 V 上的线性变换 \mathcal{A} 是酉变换

$\iff A$ 在 V 的标准正交基下的矩阵是酉矩阵

$\iff A$ 把 V 的标准正交基映成标准正交基

酉算子的不变子空间的正交补依然是不变子空间 (这个命题对埃尔米特算子也成立)

酉矩阵

酉矩阵的性质

1. 特征值的模长都为 1
2. 行列式的模长为 1
3. 不同特征值对应的特征向量正交
4. 酉矩阵的逆，乘积，共轭转置依然是酉矩阵
5. 可被酉对角化

定理： 设 A 是 n 阶酉矩阵，那么存在 n 阶酉矩阵 B 使得 $B^{-1}AB$ 为对角矩阵，而且对角线上的数的模都是 1

酉矩阵的酉对角化步骤跟埃尔米特矩阵的酉对角化完全相同

约当标准形

设 λ 是复数，如下形式的 n 阶方阵 $J_n(\lambda)$ 称为以 λ 为特征值的 n 阶约当块：

$$J_n(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

约当标准形

约当矩阵就是一个分块对角矩阵：

$$\begin{pmatrix} J_{m_1}(\lambda_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_{m_2}(\lambda_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & J_{m_s}(\lambda_s) \end{pmatrix}$$

这里 λ_i, m_i 可以相同

定理： 设 A 是 n 阶复方阵，那么 A 有约当标准形，即存在 n 阶复可逆方阵 C 使得 $C^{-1}AC = J(A)$ 是约当矩阵。若不计约当块之间的置换， A 的约当标准形是唯一的

两个复矩阵相似，当且仅当它们具有相同的约当标准形，允许对约当块的排列顺序进行置换

约当标准形-求约当标准形

建议看看教材和丘老高代上的一些例子

1. 首先求出 A 的特征多项式，并把它分解成一次多项式的乘积：

$$\chi_A(t) = \prod_{i=1}^p (t - \lambda_i)^{n_i}.$$

2. 对每一个特征值 $\lambda \in \{\lambda_1 \cdots \lambda_p\}$ ，求出 $A - \lambda E$ 的秩。

那么 $J(A)$ 中以 λ 为特征值的约当块的个数是 λ 的几何重数

$$N(\lambda) = n - \text{rank}(A - \lambda E).$$

设 m 是 λ 的代数重数（即当 $\lambda = \lambda_i$ 时 $m = n_i$ ），则 m 是 λ 出现在 $J(A)$ 的对角线上的次数，它等于以 λ 为特征值的约当块的阶数的和。

约当标准形-求约当标准形

3. 要求出 k 阶约当块 $J_k(\lambda)$ 在 $J(A)$ 中出现的次数 $N(\lambda, k)$, 应用公式:

$$N(\lambda, k) = \text{rank}(A - \lambda E)^{k-1} - 2 \text{rank}(A - \lambda E)^k + \text{rank}(A - \lambda E)^{k+1}.$$

在 $k \geq m$ 时, 有 $\text{rank}(A - \lambda E)^k = n - m$. (若 $\lambda = \lambda_i$, 则 $m = n_i$)

通过上面三个步骤, 就可以求出约当标准形 $J(A)$. 如果要求出矩阵 C 使得 $C^{-1}AC = J(A)$, 还要求出算子 $\mathcal{A} : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n, X \mapsto AX$ 的约当基。

约当标准形-求约当基

4. 对特征值 λ , 有广义特征空间

$$V(\lambda) = \{X \in \mathbb{C}^n \mid (A - \lambda E)^m X = 0\}$$

广义特征空间是 \mathcal{A} 的不变子空间, 贡献所有以 λ 为特征值的约当块, 并且也只贡献以 λ 为特征值的约当块。这里 $m = n_i$ 如果 $\lambda = \lambda_i$.

如果 p 是以 λ 为特征值的约当块的最大阶数, 那么有

$$V(\lambda) = \{X \in \mathbb{C}^n \mid (A - \lambda E)^p X = 0\}.$$

约当标准形-求约当基

5. 给定特征值 λ 及其约当块的最高阶数 p (p 为 A 的极小多项式 $\mu_A(t)$ 里 $t - \lambda$ 的次数/ $A - \lambda E$ 的幂零指数)

首先考虑贡献 $N(\lambda, p)$ 个 p 阶约当块的约当基

取 $\ker(A - \lambda E)^p \setminus \ker(A - \lambda E)^{p-1}$ 的 $s_p = N(\lambda, p)$ 个向量 e_1, \dots, e_{s_p} 使得向量组

$$(A - \lambda E)^{p-1}e_1, \dots, (A - \lambda E)^{p-1}e_{s_p}$$

线性无关

对 e_1, \dots, e_{s_p} 中每一个元素 e_i , 通过 $A - \lambda E$ 及其幂的作用得到向量组

$$(A - \lambda E)^{p-1}e_i, (A - \lambda E)^{p-2}e_i, \dots, (A - \lambda E)e_i, e_i.$$

这些向量给出一个 p 阶的以 λ 为特征值的约当块. 如此一来得到了约当基中贡献所有 s_p 个 $J_p(\lambda)$ 的那一部分基向量.

约当标准形-求约当基

接下来考虑贡献 $N(\lambda, k)$ 个 k 阶约当块的约当基 ($\forall k \leq p$)

对于 $p - 1$ 阶约当块 (如果存在), 取 $\ker(A - \lambda E)^{p-1} \setminus \ker(A - \lambda E)^{p-2}$ 的 $s_{p-1} - s_p = N(\lambda, p - 1)$ 个向量 $e_{s_p+1}, \dots, e_{s_{p-1}}$ 使得向量组

$$(A - \lambda E)^{p-1}e_1, \dots, (A - \lambda E)^{p-1}e_{s_p}, (A - \lambda E)^{p-2}e_{s_p+1}, \dots, (A - \lambda E)^{p-2}e_{s_{p-1}}$$

线性无关

对 $e_{s_p+1}, \dots, e_{s_{p-1}}$ 中每一个元素 e_j , 通过 $A - \lambda E$ 及其幂的作用得到向量组

$$(A - \lambda E)^{p-2}e_j, (A - \lambda E)^{p-3}e_j, \dots, (A - \lambda E)e_j, e_j.$$

这些向量给出一个 $p - 1$ 阶的以 λ 为特征值的约当块. 如此一来得到了约当基中贡献所有 $s_{p-1} - s_p$ 个 $J_{p-1}(\lambda)$ 的那一部分基向量.

如果没有 $p - 1$ 阶的以 λ 为特征值的约当块, 则跳过这一步考虑次高阶的约当基

约当标准形-求约当基

以此类推, 取 $\ker(A - \lambda E)^k \setminus \ker(A - \lambda E)^{k-1}$ 的 $s_{k-1} - s_k = N(\lambda, k)$ 个向量 $e_{s_k+1}, \dots, e_{s_{k-1}}$ 使得向量组

$$(A - \lambda E)^{p-1}e_1, \dots, (A - \lambda E)^{p-1}e_{s_p}, \dots, (A - \lambda E)^{k-1}e_{s_k+1}, \dots, (A - \lambda E)^{k-1}e_{s_{k-1}}$$

线性无关

对 $e_{s_k+1}, \dots, e_{s_{k-1}}$ 中每一个元素 e_j , 通过 $A - \lambda E$ 及其幂的作用得到向量组

$$(A - \lambda E)^{k-1}e_j, (A - \lambda E)^{k-2}e_j, \dots, (A - \lambda E)e_j, e_j.$$

这些向量给出一个 k 阶的以 λ 为特征值的约当块. 如此一来得到了约当基中贡献所有 $s_{k-1} - s_k$ 个 $J_{p-1}(\lambda)$ 的那一部分基向量

综上, 我们得到约当基中给出以 λ 为特征值的所有约当块的那一部分基向量. 把每一个特征值对应的这些向量合起来, 就得到 A 的一个约当基. 以这个基的向量为列向量得到一个矩阵 C , 就有 $CAC^{-1} = J(A)$.

Goodbye Linear Algebra I