

第12周 习题

1. 实对称矩阵 A 有实特征值 λ_i 和实标准正交特征向量组 $\{V_i\}$

$$\forall x \in \mathbb{R}^n (x \neq 0) \quad x = \sum_{i=1}^n a_i V_i$$

$$x^T A x = (\sum_{i=1}^n a_i V_i)^T A (\sum_{j=1}^n a_j V_j) = \sum_{i,j} a_i a_j V_i^T A V_j = \sum_{i,j} a_i a_j \lambda_j V_i^T V_j = \sum_{i=1}^n a_i^2 \lambda_i$$

$$x^T x = \sum_{i=1}^n a_i^2$$

$$\frac{x^T A x}{x^T x} = \frac{\sum_{i=1}^n a_i^2 \lambda_i}{\sum_{i=1}^n a_i^2} \leq \lambda_{\max} \quad (\lambda_i \text{ 的加权平均值})$$

且当 x 取属于 λ_{\max} 的特征向量时上式可取等

$$\text{故 } \max_{0 \neq x \in \mathbb{R}^n} \frac{x^T A x}{x^T x} = \lambda_{\max}$$

2. (a) $\chi_A(t)$ 是 3 次实系数多项式, 至少有一个实根 λ_1 , 设 $\chi_A(t) = (t - \lambda_1)g(t)$ $\deg g(t) = 2$

$$\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = |A| = 1 \quad \lambda_2, \lambda_3 \text{ 要么都为实数, 要么为共轭虚数}$$

若 λ_2, λ_3 都为实数, $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$, 三根只可能为 ± 1 且不能全是 -1 , 故 $\lambda_1 = 1$ 为 A 的特征值

若 λ_2, λ_3 为共轭虚数, $\lambda_1 = \frac{1}{|\lambda_2|^2} > 0$, $\lambda_1 = 1$

综上, A 至少有一个特征值为 1

(b) (结合定理 5.6 理解) 设 x_1 是 A 的特征值 1 的特征向量, 令 $P_1 = \frac{x_1}{\|x_1\|}$

将 P_1 扩张为 \mathbb{R}^3 的标准正交基 $\{P_1, P_2, P_3\}$, $T = (P_1, P_2, P_3)$ 为正交矩阵

令 $B = T^T A T$, B 为正交矩阵

$$A T = A (P_1, P_2, P_3) = (P_1, A P_2, A P_3) = T B = (P_1, P_2, P_3) B$$

$$\text{则 } B \text{ 的第 1 列为 } [1, 0, 0]^T, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & b_{12} & b_{13} \\ 0 & b_{22} & b_{23} \\ 0 & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} \text{ 正交 } |B| = |A| = 1$$

$$b_{12} = b_{13} = 0 \quad B_2 = \begin{pmatrix} b_{22} & b_{23} \\ b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} \text{ 为行列式为 1 的正交矩阵}$$

$$\text{故 } T^T A T = B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$(c) \quad B \sim A \quad \text{tr } B = \text{tr } A = 1 + 2 \cos \theta \quad \theta = \arccos\left(\frac{\text{tr } A - 1}{2}\right) \quad (\text{加个小条件 } \theta \in [0, \pi])$$

3. 设 A 为秩为 r 的对角矩阵, 不妨设 $A = \text{diag}(a_1, \dots, a_r, 0, \dots, 0)$, 其中 $a_i \neq 0 (i \leq r)$

取 $A_i = \text{diag}(0, \dots, 0, a_i, 0, \dots, 0)$ 为仅有对角线第 i 个为 a_i , 其余阵元为 0 的对角矩阵

$$\text{则 } A = \sum_{i=1}^r A_i \text{ 且 } \text{rank}(A_i) = 1$$

设 B 为秩为 r 的对称矩阵, 它的特征值 λ_1 到 λ_r 不为 0 , λ_{r+1} 到 λ_n 为 0

$$\exists \text{ 正交矩阵 } P \text{ s.t. } P^T B P = \text{diag}\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\} = \tilde{B}$$

$$\text{由上述过程, } \exists \tilde{B}_i (1 \leq i \leq r) \text{ s.t. } \tilde{B} = \sum_{i=1}^r \tilde{B}_i \text{ 且 } \text{rank}(\tilde{B}_i) = 1$$

$$\text{取 } B_i = P \tilde{B}_i P^T \text{ 则有 } B = P \tilde{B} P^T = \sum_{i=1}^r P \tilde{B}_i P^T = \sum_{i=1}^r B_i \text{ 且 } \text{rank } B_i = \text{rank } \tilde{B}_i = 1$$

4. 见附件

$$5. \quad AB - BA = I_n \Rightarrow \text{tr}(AB - BA) = \text{tr}(I_n) \Rightarrow 0 = \text{tr}(AB) - \text{tr}(BA) = n \text{ 矛盾}$$

例 4 证明: n 级实矩阵 A 正交相似于一个上三角矩阵的充分必要条件是: A 的特征多项式在复数域中的根都是实数。

证明 必要性。设 n 级实矩阵 A 正交相似于一个上三角矩阵 $B=(b_{ij})$, 则

$$|\lambda I - A| = |\lambda I - B| = (\lambda - b_{11})(\lambda - b_{22}) \cdots (\lambda - b_{nn}).$$

这表明 $|\lambda I - A|$ 的根 $b_{11}, b_{22}, \cdots, b_{nn}$ 都是实数。

充分性。对实矩阵的级数作数学归纳法。 $n=1$ 时, 显然命题为真。假设对于 $n-1$ 级实矩阵命题为真, 现在来看 n 级实矩阵 A 。由于 A 的特征多项式在复数域中的根都是实数, 因此可以取 A 的一个特征值 λ_1 。设 η_1 是 A 的属于 λ_1 的一个特征向量, 且 $|\eta_1|=1$ 。把 η_1 扩充成 \mathbf{R}^n 的一个基, 然后经过施密特正交化和单位化, 得到 \mathbf{R}^n 的一个标准正交基: $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n$ 。令 $T_1=(\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n)$, 则 T_1 是正交矩阵。

$$T_1^{-1}AT_1 = T_1^{-1}(A\eta_1, A\eta_2, \cdots, A\eta_n) = (T_1^{-1}\lambda_1\eta_1, T_1^{-1}A\eta_2, \cdots, T_1^{-1}A\eta_n).$$

由于 $T_1^{-1}T_1=I$, 因此 $T_1^{-1}\eta_1=\varepsilon_1$ 。从而

$$T_1^{-1}AT_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \alpha \\ \mathbf{0} & B \end{pmatrix}.$$

于是 $|\lambda I - A| = (\lambda - \lambda_1)|\lambda I - B|$ 。因此 $n-1$ 级实矩阵 B 的特征多项式在复数域中的根都是实数。从而对 B 可用归纳假设: 存在 $n-1$ 级正交矩阵 T_2 , 使得 $T_2^{-1}BT_2$ 为上三角矩阵。

令

$$T = T_1 \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & T_2 \end{pmatrix},$$

则 T 是 n 级正交矩阵, 且

$$\begin{aligned} T^{-1}AT &= \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & T_2 \end{pmatrix}^{-1} T_1^{-1}AT_1 \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & T_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & T_2^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & \alpha \\ \mathbf{0} & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & T_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \lambda_1 & \alpha T_2 \\ \mathbf{0} & T_2^{-1}BT_2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

因此 $T^{-1}AT$ 是上三角矩阵。

据数学归纳法原理, 对一切正整数 n , 此命题为真。 ■

例 5 证明: 如果 n 级实矩阵 A 的特征多项式在复数域中的根都是实数, 且 $AA'=A'A$, 那么 A 是对称矩阵。

证明 据例 4 的结论得, 存在 n 级正交矩阵 T , 使得 $T^{-1}AT=B$, 其中 $B=(b_{ij})$ 是上三角矩阵。从而 $T'A'(T^{-1})'=B'$, 即 $T^{-1}A'T=B'$ 。由于 $AA'=A'A$, 因此 $BB'=B'B$ 。于是根据习题 4.2 的第 12 题得, B 是对角矩阵。由于 A 正交相似于对角矩阵 B , 因此 A 是对称矩阵 (据本节命题 1)。 ■