

CHIA DÃY SỐ

Cho dãy A gồm N số nguyên $A_1, \dots, A_N$. Hỏi có bao nhiêu cách chia dãy A thành 3 phần liên tiếp có tổng bằng nhau (mỗi phần có ít nhất một phần tử). Hay nói cách khác: có bao nhiêu cặp $(L; R)$ với $L < R$ thỏa mãn:

$$\sum_{K=1}^L A_K = \sum_{K=L+1}^R A_K = \sum_{K=R+1}^N A_K$$

Dữ liệu vào từ tệp văn bản CHIABA.INP:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N là số lượng phần tử trong dãy A .
- Dòng thứ hai chứa các phần tử theo trình tự $A_1, \dots, A_N$. Hai số kề nhau được phân cách nhau bởi khoảng trắng.

Dữ liệu ra ghi vào tệp văn bản CHIABA.OUT:

- Số lượng cặp $(L; R)$ thỏa mãn yêu cầu.

Giới hạn:

- $3 \leq N \leq 10^6$
- $1 \leq L < R < N$
- $|A_i| \leq 10^4$, với $1 \leq i \leq N$

Ví dụ:

CHIABA.INP	CHIABA.OUT
8 -2 6 -1 3 -2 4 5 -1	2

Có 2 cách chia là: $\{(-2,6); (-1,3,-2,4); (5,-1)\}$ và $\{(-2,6,-1,3,-2); (4); (5,-1)\}$.