

Vận Động Viên

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 256M

Trong một trung tâm thể thao, có n vận động viên đang chuẩn bị tham gia một buổi tập luyện theo nhóm. Mỗi vận động viên có chỉ số thể lực riêng, được biểu diễn bằng một số nguyên a_i . Để đảm bảo việc tập luyện diễn ra hiệu quả và công bằng, không có hai vận động viên nào có cùng chỉ số thể lực. Huấn luyện viên muốn chọn ra một số vận động viên và chia họ thành các cặp, sao cho trong mỗi cặp, độ chênh lệch chỉ số thể lực giữa hai người không vượt quá 1. Nói cách khác, với hai vận động viên trong cùng một cặp có chỉ số lần lượt là ax và ay , điều kiện cần thỏa mãn là: $|ax - ay| \leq 1$

Mục tiêu của huấn luyện viên là tạo ra nhiều cặp vận động viên nhất có thể cho buổi tập luyện.

Nhiệm vụ của bạn là xác định số cách khác nhau để tạo ra số cặp tối đa đó. Hai cách được xem là khác nhau nếu tồn tại ít nhất một cặp vận động viên xuất hiện trong cách này nhưng không xuất hiện trong cách kia.

Input

Mỗi bộ test gồm nhiều bộ test con.

Dòng đầu tiên chứa số lượng test T ($1 \leq T \leq 2 * 10^5$). Với mỗi test:

Dòng đầu chứa số nguyên n là số lượng vận động viên ($1 \leq n \leq 2 * 10^5$)

Dòng tiếp theo chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ - chỉ số thể lực của các vận động viên ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Output

Với mỗi test, in ra một số nguyên là số cách khác nhau để tạo ra số cặp tối đa, lấy mod 998244353.

Sample Input

```
4
5
4 5 7 9 10
6
1 2 3 4 9 8
2
1 100
3
1 99 999
```

Sample Output

```
1
1
1
1
```