

# Relatório do Laboratório 3

Felipe Bandeira da Silva

6 de setembro de 2013

**Questão 1.** Faça a expansão em frações parciais das funções abaixo com o auxílio do Matlab e em seguida obtenha a transformada inversa de laplace.

(a)

$$F(s) = \frac{10(s+2)(s+4)}{(s+1)(s+3)(s+5)^2}$$

Usando a seguinte sequência de comandos para a obtenção da expansão,

```
1 a = [1 2];  
  b = [1 4];  
3 num = 10*conv(a, b);  
  a = [1 1];  
5 b = [1 3];  
  c = [1 5];  
7 den = conv(conv(a, b), conv(c, c));  
  [r, p, k] = residue(num, den);  
9
```

Resultado,

```
1 r =  
  -2.1875  
3   3.7500  
   1.2500  
5   0.9375  
  
7 p =  
  -5.0000  
9  -5.0000  
  -3.0000  
11 -1.0000  
  
13 k =  
    []  
15
```

Rearranjando os valores dos resíduos, polos e termo de evidenciamento,

$$F(s) = \frac{-2.1875}{s+5} + \frac{3.75}{s+5} + \frac{1.25}{s+3} + \frac{0.9375}{s+1}$$

Aplicando a transformada inversa de laplace,

$$f(t) = -2.1875e^{-5t} + 3.75e^{-5t} + 1.25e^{-3t} + 0.9375e^{-t}$$

(b)

$$F(s) = \frac{s+1}{s(s^2+s+1)}$$

Usando a mesma ideia usando no item (a) é possível obter,

$$\begin{array}{l} \text{r} = [] \\ \text{p} = [] \\ \text{k} = [] \end{array}$$

(c)

$$F(s) = \frac{2s^3 + 5s^2 + 3s + 6}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}$$

Usando a mesma ideia usando no item (a) é possível obter,

$$\begin{array}{l} \text{r} = \\ \quad -6.0000 \\ \quad -4.0000 \\ \quad 3.0000 \\ \text{p} = \\ \quad -3.0000 \\ \quad -2.0000 \\ \quad -1.0000 \\ \text{k} = \\ \quad 2 \end{array}$$

Rearranjando os termos,

$$F(s) = \frac{-6}{s+3} + \frac{-4}{s+2} + \frac{3}{s+1} + 2$$

Aplicando a transformada inversa de laplace,

$$f(t) = -6e^{-3t} - 4e^{-2t} + 3e^{-t} + 2\delta(t)$$

**Questão 2.** Com base no sistema definido pela seguinte função de transferência, obtenha:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{3}{s(s+1)}$$

(a) Função temporal  $y(t)$  que representa a resposta do sistema quando excitado por um impulso unitário  $x(t) = \delta(t)$  e rampa unitário  $x(t) = r(t)$

O  $\mathcal{L}(\delta(t)) = 1$  com isto é possível obter a resposta  $Y(s)$  ao impulso,

$$Y(s) = \frac{3}{s(s+1)} \cdot 1$$

Usando o comando "residue" para a expansão em frações parciais, temos,

$$Y(s) = -\frac{3}{s+1} + \frac{3}{s}$$

Aplicando  $\mathcal{L}^{-1}$ ,

$$\mathcal{L}^{-1}Y(s) = \mathcal{L}^{-1}\left(-\frac{3}{s+1} + \frac{3}{s}\right),$$

Resolvendo para  $t$ ,

$$y(t) = 3 - 3e^{-t}$$

Para o degrau unitário o  $\mathcal{L}(u(t)) = \frac{1}{s}$ , a resposta a excitação,

$$Y(s) = \frac{3}{s(s+1)} \cdot \frac{1}{s} = \frac{3}{s^3 + s^2}$$

Expandindo em frações parciais,

$$Y(s) = \frac{3}{s+1} - \frac{3}{s} + \frac{3}{s^2}$$

Aplicando  $\mathcal{L}^{-1}$ ,

$$y(t) = 3 - 3t + 3e^{-t}$$

Para a ultima resposta, a  $\mathcal{L}$  da rampa unitária é  $\mathcal{L}(r(t)) = \frac{1}{s^2}$ , logo,

$$Y(s) = \frac{3}{s(s+1)} \cdot \frac{1}{s^2} = \frac{3}{s^4 + s^3}$$


Expandindo em frações parciais,

$$Y(s) = \frac{3}{s^3} - \frac{3}{s^2} + \frac{3}{s} - \frac{3}{s+1}$$

Aplicando  $\mathcal{L}^{-1}$ ,

$$y(t) = \frac{3t^2}{2} - 3t + 3 - 3e^{-t}$$

- (b) Apresente um um mesmo gráfico a resposta  $y(t)$  obtida no item anterior, considerando um intervalo de tempo de 0seg a 10seg com passo de 0.01seg.




**Questão 3.** Encontre os zeros, polos e ganho da função de transferência abaixo. Em seguida, represente e identifique os polos e zeros no plano-s.

$$G(s) = \frac{4s^2 + 16s + 12}{s^4 + 12s^3 + 44s^2 + 48s}$$

Para a solução deste problema, criei o seguinte código,

```
num = [4 16 12];  
2 den = [1 12 44 48 0];  
z = roots(num);  
4 p = roots(den);  
k = 1;  
6 fun = zpk(z, p, k);
```

Obtendo os pólos e zeros no plano-s,



**Questão 4.** Dados os zeros, pólos e ganho K a seguir, obtenha a função de transferência que representa o respectivo sistema:

- (a) Não existe zeros, os pólos estão em  $-2 \pm 5j$  e o ganho é 10.

Para a solução, o seguinte código foi utilizado,

```

z = [];
2 p = [-2+5j -2-5j];
k = 10;
4 zpk(z, p, k);

```

Resultando na seguinte função de transferência,

$$G(s) = \frac{10}{s^2 + 4s + 29}$$

- (b) O zero está em 0, os pólos estão em  $-1 \pm 2j$  e o ganho é 1.

Usando o mesmo código usando no item a, a função de transferência fica,

$$G(s) = \frac{s}{s^2 + 2s + 5}$$


- (c) Os zeros estão em 0 e -1, os pólos estão em -2, -3 e  $-2 \pm 5j$  e o ganho é 4.

A função de transferência é,

$$G(s) = \frac{4s(s+1)}{(s+2)(s+3)(s^2+4s+29)}$$

Obtenha a função de transferência equivalente dos sistemas abaixo, sendo:

(a) Figura 1



Usando os comandos *series* e *feedback* é possível criar a função de transferência, para tanto o código abaixo foi construído,

```


1 gc = tf([1 0],[1 1])
2 gp = tf([2],[1 1 2])
3 gs = tf([1],[1 0.5])
4 s = series(gc, gp)
5 f = feedback(s, gs)
6

```

Resultando na seguinte equação de transferência,

$$H(s) = \frac{2s^2 + s}{s^4 + 2.5s^3 + 4s^2 + 5.5s + 1}$$

(b) Figura 2



Com uma pequena alteração do código usando no item a, para suportar a associação em paralelo

```


1 gc = tf([1 0],[1 1])
2 gp = tf([2],[1 1 2])
3 gs = tf([1],[1 0.5])
4 p = parallel(gc, gp)
5 f1 = feedback(p, gs)
6

```

Resultando na seguinte equação de transferência,

$$H(s) = \frac{s^4 + 1.5s^3 + 4.5s^2 + 4s + 1}{s^4 + 3.5s^3 + 5s^2 + 7.5s + 3}$$

**Questão 5.** Com base no sistema dinâmico abaixo, obtenha analiticamente as matrizes de estado (**A**, **B**, **C**, **D**) considerando o posição  $x(t)$  e a velocidade  $\frac{dx(t)}{dt}$  com variáveis de estado,  $F(t)$  como entrada e  $x(t)$  como saída. Em seguida utilize o Matla para encontrar a função de transferência correspondente. Considere  $m = 1.0kg$ ,  $b = 0.2Ns/m$ ,  $k = 3.0N/m$





**Questão 6.** Com o auxílio do Matlab, obtenha as matrizes de estado ( $A, B, C, D$ ) do sistema mostrado a seguir:

