


PHY 493 HW 6

Nicholas
Lodovelli

1 a $e^+ + e^- \rightarrow e + \bar{e}$, $E \gg m_e, m_e$, $Q_e = e_e/e$



Note: I did this out in full because I didn't quite get it in HW 5.

b $-iM(2\pi)^4 \delta^4(p_1 + p_2 - p_3 - p_4)$

$$= \int \bar{u}(p_2) [i g_e \gamma^\mu (2\pi)^4 \delta^4(p_1 + p_2 - q)] u(p_1) \frac{-i g_{\mu\nu}}{q^2} \bar{u}(p_3) C_i^\dagger [i Q_e g_e \gamma^\nu (2\pi)^4 \delta^4(q - p_3 - p_4)] C_i u(p_4) \frac{d^4 q}{(2\pi)^4}$$

$$= \frac{i Q_e g_e^2}{(p_2 + p_3)^2} [\bar{u}(p_2) \gamma^\mu u(p_1)] [\bar{u}(p_3) \gamma_\mu u(p_4)] C_i^\dagger C_i (2\pi)^4 \delta^4(p_1 + p_2 - p_3 - p_4)$$

$$\Rightarrow M = \frac{Q_e g_e^2}{(p_2 + p_3)^2} [\bar{u}(p_2) \gamma^\mu u(p_1)] [\bar{u}(p_3) \gamma_\mu u(p_4)] C_i^\dagger C_i$$

$$\Rightarrow \langle 1 | M | 1 \rangle = \frac{1}{4} \left(\sum_{i,j} C_i^\dagger C_j \right) \frac{Q_e^2 g_e^4}{(p_2 + p_3)^4} \text{tr}(\gamma^\mu (\not{p}_1 + m_e) \gamma^\nu (\not{p}_2 - m_e))$$

avg. spin in
color out

$$\text{tr}(\gamma_\mu (\not{p}_4 - m_e) \gamma_\nu (\not{p}_3 + m_e))$$

$$= \left(\frac{3}{4} \right) \frac{(4\pi e_e e)^2}{(p_2 + p_3)^4} \text{tr}(\gamma^\mu \not{p}_1 \gamma^\nu \not{p}_2 - \gamma^\mu m_e \gamma^\nu m_e) = A$$

$$\text{tr}(\gamma_\mu \not{p}_4 \gamma_\nu \not{p}_3 - \gamma_\mu m_e \gamma_\nu m_e) = B$$

In the center-of-momentum frame,


$$p_1 = (E, \vec{p}_e), p_2 = (E, -\vec{p}_e), p_3 = (E, \vec{p}_e), p_4 = (E, -\vec{p}_e)$$

so then

$$A = \text{tr}(\gamma^\mu \not{p}_1 \gamma^\nu \not{p}_2) - \text{tr}(\gamma^\mu m_e \gamma^\nu m_e)$$

$$= p_{1\alpha} p_{2\beta} \text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\alpha \gamma^\nu \gamma^\beta) - m_e^2 \text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu)$$

$$= 4 p_{1\alpha} p_{2\beta} (g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} - g^{\mu\nu} g^{\alpha\beta} + g^{\alpha\nu} g^{\mu\beta}) - 4 m_e^2 g^{\mu\nu}$$



$$= 4(p_1^\mu p_2^\nu + p_1^\nu p_2^\mu - g^{\mu\nu}(m_e^2 + p_1 \cdot p_2))$$

$$\approx 4(p_1^\mu p_2^\nu + p_1^\nu p_2^\mu - g^{\mu\nu}(p_1 \cdot p_2)), \text{ since } p_1 \cdot p_2 = E^2 + |\vec{p}_e|^2 \gg m_e^2.$$

Similarly,

$$B = 4(p_{4\mu} p_{3\nu} + p_{4\nu} p_{3\mu} - g_{\mu\nu}(p_3 \cdot p_4)).$$

Then

$$\begin{aligned} \langle |M|^2 \rangle &= \frac{12(4\pi e_a e)^2}{(p_1 + p_2)^4} \left[p_1^\mu p_2^\nu + p_1^\nu p_2^\mu - g^{\mu\nu}(p_1 \cdot p_2) \right] \\ &\quad \left[p_{4\mu} p_{3\nu} + p_{4\nu} p_{3\mu} - g_{\mu\nu}(p_4 \cdot p_3) \right] \\ &= \frac{24(4\pi e_a e)^2}{(p_1 + p_2)^4} \left[(p_1 \cdot p_4)(p_2 \cdot p_3) + (p_1 \cdot p_3)(p_2 \cdot p_4) \right] \\ &= \frac{24(4\pi e_a e)^2}{(p_1 + p_2)^4} \left[(E^2 + |\vec{p}_e| |\vec{p}_a| \cos \theta)^2 + (E^2 - |\vec{p}_e| |\vec{p}_a| \cos \theta)^2 \right] \\ &= \frac{24(4\pi e_a e)^2}{(p_1 + p_2)^4} \left[2E^4 + 2|\vec{p}_e|^2 |\vec{p}_a|^2 \cos^2 \theta \right] \\ &= \frac{48(4\pi e_a e)^2}{(p_1 + p_2)^4} E^4 [1 + \cos^2 \theta] \end{aligned}$$

Note

$$(p_1 + p_2)^2 = 2m_e^2 + 2(E^2 + |\vec{p}_e|^2) = 2m_e^2 + 2(E^2 + E^2 - m_e^2) = 4E^2,$$

$$|\vec{p}_e|^2 |\vec{p}_a|^2 = (E^2 - m_e^2)(E^2 - m_a^2) \approx E^4.$$

we finally have

$$\langle |M|^2 \rangle = \frac{48}{4^2} (4\pi e_a e)^2 (1 + \cos^2 \theta) = 48 \pi^2 e_a^2 e^2 (1 + \cos^2 \theta).$$

The cross section is then

$$\frac{d\sigma_a}{d\Omega} = \frac{1}{(8\pi)^2} \frac{\langle |M|^2 \rangle}{(2E)^2} \frac{|\vec{p}_a|}{|\vec{p}_e|} \approx \frac{1}{(8\pi)^2} \frac{\langle |M|^2 \rangle}{(2E)^2} \frac{E}{E} = \frac{3e_a^2 e^2}{16E^2} (1 + \cos^2 \theta).$$

$$\Rightarrow \sigma_a = \frac{3e_a^2 e^2}{16E^2} 2\pi \int_0^\pi (1 + \cos^2 \theta) (\sin \theta) d\theta = \frac{3\pi e_a^2 e^2}{8E^2} \left(2 + \frac{2}{3}\right)$$

$$\sigma_a = \frac{\pi e_a^2 e^2}{E^2}$$

c The relevant quark flavors with $m_q < 30 \text{ GeV}$ are u, d, c, s, b (all but t). So, summing over these flavors gives a total cross section of

$$\sum_q \sigma_q = \frac{\pi e^4}{E^2} \sum_q \frac{e_q^2}{e^2} = \frac{\pi \alpha^2}{E^2} \left[2 \left(\frac{2}{3} \right)^2 + 3 \left(\frac{1}{3} \right)^2 \right] = \frac{11\pi \alpha^2}{9E^2}.$$

Comparing to the $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ cross section σ_μ , we find the $e^+e^- \rightarrow q\bar{q}$ reaction almost 4 times more likely:

$$\sum_q \sigma_q / \sigma_\mu = \frac{11\pi \alpha^2}{9E^2} / \frac{\pi \alpha^2}{3E^2} = \frac{11}{3} \approx 3.67.$$