
Emplacement de la PCV et PFMD



Si la PCV apposée se trouve sur l'étiquette:

- *Une fois ouvert, le flacon peut être gardé jusqu'à 28 jours pour des séances de vaccination ultérieures, quelle que soit la présentation du produit (liquide ou lyophilisé) sous certaines conditions :*
  1. Le vaccin est actuellement préqualifié par l'OMS.
  2. Son utilisation jusqu'à 28 jours après l'ouverture du flacon est homologuée, conformément à ce qui a été déterminé par l'OMS.
  3. La date de péremption du vaccin n'est pas dépassée
  4. Le flacon de vaccin a été et continuera d'être conservé aux températures recommandées par l'OMS ou le fabricant ; de plus, la pastille de contrôle du vaccin, s'il en est muni, est visible sur l'étiquette du vaccin et n'a pas dépassé le point limite d'utilisation, et le vaccin n'a pas été endommagé par le gel.

Si la PCV est apposée ailleurs que sur l'étiquette

(par exemple sur le bouchon ou le col de l'ampoule):

- **Dans ce cas, le flacon, une fois ouvert, doit être jeté à la fin de la séance de vaccination ou au maximum six heures après l'ouverture, selon l'éventualité se présentant en premier.**

Vaccin Vial Monitor « VVM »
Pastille de Contrôle des Vaccin « PCV »



Le carré intérieur est plus clair que le cercle et si la date de péremption n'est pas dépassée :


UTILISER CE VACCIN




Le carré a la même couleur ou est plus foncé que le cercle, quel que soit la date de péremption :

NE PAS UTILISER CE VACCIN

Différents étapes de l'évolution de la PCV selon l'exposition à la Chaleur et au temps





Version révisée Mai 2017