

FARMACIA 2022



MINISTERIO
DE SANIDAD

PRUEBAS SELECTIVAS 2022 CUADERNO DE EXAMEN

FARMACIA - VERSIÓN: 3

NÚMERO DE MESA:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

Nº DE D.N.I. O EQUIVALENTE PARA EXTRANJEROS:

APELLIDOS Y NOMBRE:

ADVERTENCIA IMPORTANTE

ANTES DE COMENZAR SU EXAMEN, LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

1. **MUY IMPORTANTE:** Compruebe que este Cuaderno de Examen, integrado por 200 preguntas más 10 de reserva, lleva todas sus páginas y no tiene defectos de impresión. Si detecta alguna anomalía, pida otro Cuaderno de Examen a la Mesa. **Realice esta operación al principio**, pues si tiene que cambiar el cuaderno de examen posteriormente, se le facilitará una versión "0", que **no coincide** con su versión personal en la colocación de preguntas y **no dispondrá** de tiempo adicional.
2. Compruebe que el **número de versión** de examen que figura en su "Hoja de Respuestas", **coincide** con el número de versión que figura en el cuestionario. Compruebe también el resto de sus datos identificativos.
3. La "Hoja de Respuestas" está nominalizada. Se compone de dos ejemplares en papel autocopiativo que deben colocarse correctamente para permitir la impresión de las contestaciones en todos ellos. **Recuerde que debe firmar esta Hoja.**
4. Compruebe que la respuesta que va a señalar en la "Hoja de Respuestas" corresponde al número de pregunta del cuestionario. **Sólo se valoran** las respuestas marcadas en la "Hoja de Respuestas", siempre que se tengan en cuenta las instrucciones contenidas en la misma.
5. Si inutiliza su "Hoja de Respuestas" pida un nuevo juego de repuesto a la Mesa de Examen y no olvide consignar sus datos personales.
6. Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de **cuatro horas y treinta minutos** improrrogables y que están **prohibidos** el uso de **calculadoras** y la utilización de **teléfonos móviles**, o de cualquier otro dispositivo con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación mediante voz o datos.
7. **No se entregarán**, en ningún caso, **los cuestionarios** con las preguntas de examen. Las distintas versiones de los cuadernos de examen se publicarán en la Web del Ministerio de Sanidad, al cierre de la última mesa de examen.

1. **¿Cuál de las siguientes ecuaciones define al coeficiente de partición (P) de un fármaco, siendo [fármaco] la concentración de dicho fármaco en el disolvente indicado?:**
 1. $P = [\text{fármaco}]_{\text{agua}} / [\text{fármaco}]_{\text{octanol}}$.
 2. $P = \text{Log}[\text{fármaco}]_{\text{agua}}$.
 3. $P = [\text{fármaco}]_{\text{octanol}} / [\text{fármaco}]_{\text{agua}}$.
 4. $P = \text{Log}[\text{fármaco}]_{\text{octanol}}$.
2. **Saquinavir y ritonavir son fármacos utilizados en el tratamiento del SIDA que son además un ejemplo de diseño racional basado en la estructura. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente a estos compuestos?:**
 1. Son peptidomiméticos diseñados para inhibir la proteasa del VIH y actuar como análogos del estado de transición.
 2. Son análogos de los ácidos nucleicos y actúan como inhibidores competitivos de la transcriptasa inversa.
 3. Son peptidomiméticos diseñados para inhibir la integrasa del VIH y actuar como inhibidores reversibles.
 4. Son compuestos que contienen en su estructura un sistema de didesoxiribosa, diseñados para actuar como inhibidores de una proteasa del VIH.
3. **En el diseño de fármacos, la sustitución de una función éster por un grupo carbamato, ¿qué consecuencia tiene?:**
 1. Un aumento de la lipofilia y, por tanto, mejor absorción.
 2. Una disminución de la vida media.
 3. Un aumento de la estabilidad metabólica.
 4. Un incremento del impedimento estérico.
4. **En el diseño de las estatinas, ¿qué fragmento de la estructura se considera esencial para realizar la actividad inhibidora del enzima HMG-CoA reductasa?:**
 1. El fragmento de decalina.
 2. El fragmento de β -hidroxi- δ -lactona o su correspondiente dihidroxiácido.
 3. El anillo aromático halogenado.
 4. El grupo isopropilo.
5. **Las penicilinas poseen una estructura bicíclica que contiene una β -lactama fundamental para su actividad antibacteriana. Este sistema bicíclico:**
 1. Confiere una elevada tensión que dificulta su apertura por las β -lactamasas bacterianas, confiriéndole así resistencia a estas enzimas.
 2. Mimetiza el enlace glicosídico entre N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina impidiendo así la síntesis del peptidoglicano presente en la pared celular bacteriana.
 3. Mimetiza el dímero de D-Ala-D-Ala presente en el peptidoglicano, inhibiendo irreversiblemente la transpeptidasa.
 4. Puede ser modificado bioisostéricamente, sustituyendo el nitrógeno por un oxígeno y dando lugar a una β -lactona química y enzimáticamente más estable.
6. **¿Cuál de los siguientes antagonistas de los canales NMDA del ácido glutámico es además un agente antiviral?:**
 1. Ketamina.
 2. Amantadina.
 3. Ganciclovir.
 4. Dextrometorfano.
7. **¿Qué tipo de intermedio reactivo se forma en el metabolismo oxidativo de los anillos aromáticos y es responsable de su toxicidad?:**
 1. Quinona.
 2. 1,2-Diol.
 3. Epóxido.
 4. Radical hidroxilo.
8. **¿Qué consecuencia tiene la introducción de un grupo etinilo en la posición 17- α del estradiol?:**
 1. Aumenta la selectividad al facilitar la unión al receptor α y al impedir la interacción con el receptor β .
 2. Prolonga la actividad del fármaco por inhibición de su metabolismo.
 3. Aumenta la unión al receptor al incrementar la acidez del grupo OH en la posición 17- β .
 4. Cambia la actividad del fármaco de agonista a antagonista.
9. **¿Qué característica estructural es común en los agentes intercalantes del ADN?:**
 1. Una cadena peptídica.
 2. Un anillo de aziridina.
 3. Un sistema plano de anillos aromáticos o heteroaromáticos.
 4. Un fragmento de β -hidroxicarbonilo.

10. **El sistema de quinolina forma parte de la estructura de muchos fármacos. Su síntesis se puede llevar a cabo mediante el método de Skraup, que implica hacer reaccionar derivados de:**
 1. Anilina con ácido sulfúrico y glicerina en presencia de nitrobenzeno.
 2. Piridina con malonato de dietilo en medio básico.
 3. Fenilpropilamina en condiciones de ciclación.
 4. Anilina con propanol en condiciones de sustitución nucleófila aromática.
11. **Las oripavinas son análogos rígidos de la morfina. Se obtienen a partir del alcaloide tebaina, aprovechando la presencia en su estructura de un sistema de dos dobles enlaces conjugados, por medio de la siguiente reacción:**
 1. Cicloadición [4+2].
 2. Expansión de anillo.
 3. Cicloadición [3+2].
 4. Contracción de anillo.
12. **¿Cuál es el papel fundamental del grupo metoxilo en la posición 4 del anillo de piridina del omeprazol?:**
 1. Aumentar su estabilidad metabólica.
 2. Disminuir su lipofilia para disminuir su absorción.
 3. Aumentar la nucleofilia del nitrógeno piridínico para su bioactivación.
 4. Aumentar su lipofilia para favorecer su absorción.
13. **Los β -bloqueantes fueron diseñados para actuar como antagonistas de los receptores β -1 del corazón. Estructuralmente son ariloxipropanolaminas y su selectividad cardíaca se consigue:**
 1. Introduciendo un grupo pequeño (H, metilo) en el grupo amino.
 2. Introduciendo un grupo moderadamente voluminoso (isopropilo) en el grupo amino.
 3. Eliminando el grupo catecol y sustituyéndolo por un arilo más voluminoso.
 4. Epimerizando el grupo hidroxilo.
14. **¿Con qué nombre se describen los fármacos que mantienen la actividad opioide de la morfina y carecen del anillo de epóxido y del anillo C de esta?:**
 1. Morfinanos.
 2. Fenilpiperidinas.
 3. Anilino piperidinas.
 4. Benzomorfanos.
15. **¿Cuáles de los siguientes fragmentos deben estar presentes en la estructura de los antagonistas nicotínicos?:**
 1. Dos restos de acetilcolina situados a una determinada distancia el uno del otro.
 2. Un átomo de nitrógeno cuaternario, una función oxigenada, y dos grupos apolares próximos a esta última.
 3. Dos átomos de nitrógeno cargados unidos por un espaciador, de manera que estén situados a una distancia determinada el uno del otro.
 4. Un nitrógeno cuaternario y anillos aromáticos con grupos aceptores de electrones.
16. **La metodología utilizada para preparar, en un proceso único y eficiente, una mezcla o colección de compuestos estructuralmente relacionados, se denomina:**
 1. Química supramolecular.
 2. Química combinatoria.
 3. Química divergente.
 4. Química sostenible.
17. **¿Qué parte de la estructura de la eritromicina es responsable de su inestabilidad química?:**
 1. El fragmento de β -hidroxicarbonilo.
 2. El resto de aminoazúcar.
 3. El grupo lactona.
 4. Los dos fragmentos de γ -hidroxicarbonilo.
18. **El atracurio es un bloqueante neuromuscular análogo sintético de la tubocurarina que se inactiva rápidamente en la sangre (pH= 7,4) por una reacción de:**
 1. Hidrólisis de un grupo carbamato.
 2. Desmetilación de la sal de amonio cuaternario.
 3. Oxidación del heterociclo nitrogenado.
 4. Eliminación de Hofmann.
19. **En el cultivo de un aspirado bronquial, tras 24 horas de incubación a 37 °C, se observa crecimiento en agar MacConkey. Las colonias son oxidasa positiva y presentan pigmento verde. ¿Cuál sería la identificación presuntiva?:**
 1. *Staphylococcus aureus*.
 2. *Escherichia coli*.
 3. *Pseudomonas aeruginosa*.
 4. *Acinetobacter baumannii*.

20. Señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre *Campylobacter jejuni* es INCORRECTA:
1. Es un bacilo gramnegativo curvo.
 2. Gran parte de las infecciones que produce están relacionadas con el consumo de pollo.
 3. Para su aislamiento a partir de heces se requiere la incubación con atmósfera de microaerofilia.
 4. Es resistente a los macrólidos.
21. ¿Cuál es la respuesta correcta respecto al microorganismo *Hafnia alvei*?:
1. Es una enterobacteria.
 2. Es un bacilo gramnegativo no fermentador.
 3. Es una espiroqueta.
 4. Es una bacteria intracelular.
22. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA respecto al género *Bartonella*?:
1. Son pequeños cocobacilos o bacilos gramnegativos con requerimientos de crecimiento exigentes.
 2. *Bartonella bacilliformis* es responsable de la enfermedad de Carrión.
 3. *Bartonella quintana* se transmite de persona a persona a través de los piojos.
 4. *Bartonella henselae* se transmite a través de las moscas de la arena.
23. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es grampositivo?:
1. *Listeria monocytogenes*.
 2. *Bordetella pertussis*.
 3. *Francisella tularensis*.
 4. *Helicobacter pylori*.
24. ¿Por qué es difícil el aislamiento microbiológico de *Francisella tularensis*?:
1. Solo crece en anaerobiosis tras una incubación prolongada.
 2. Necesita medios de cultivo enriquecidos con cisteína y una incubación prolongada.
 3. Necesita medios de cultivo enriquecidos con carbón vegetal y una incubación prolongada.
 4. Necesita sistemas de cultivo celulares y una incubación prolongada.
25. Una niña de 5 años natural de Ecuador presenta epigastralgias, falta de apetito, y déficit de desarrollo corporal. En el examen parasitológico de las heces se observa la presencia de un huevo ovalado de 45 x 38 µm, que contiene un embrión hexacanto y 4 filamentos polares entre las dos membranas. ¿A qué parásito corresponde la descripción?:
1. *Taenia saginata*.
 2. *Hymenolepis nana*.
 3. *Hymenolepis diminuta*.
 4. *Dipylidium caninum*.
26. ¿Cuál de los siguientes fármacos NO se utiliza en el tratamiento de la tuberculosis?:
1. Amikacina.
 2. Bedaquilina.
 3. Vancomicina.
 4. Isoniazida.
27. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es un patógeno humano estricto?:
1. *Shigella dysenteriae*.
 2. *Yersinia pestis*.
 3. *Campylobacter jejuni*.
 4. *Francisella tularensis*.
28. Señale la relación INCORRECTA entre antibiótico y mecanismo de acción:
1. Ciprofloxacino – inhibición de la síntesis de la pared bacteriana.
 2. Colistina – acción sobre el lipopolisacárido de la membrana bacteriana.
 3. Vancomicina – bloqueo de la transglucosilación en la síntesis del peptidoglicano.
 4. Gentamicina – alteración de la síntesis proteica.
29. ¿Cuál de los siguientes antibióticos NO es activo frente a bacterias grampositivas?:
1. Daptomicina.
 2. Linezolid.
 3. Dalbavancina.
 4. Colistina.
30. ¿Qué parásito se distribuye mayoritariamente en Estados Unidos?:
1. *Babesia microti*.
 2. *Clonorchis sinensis*.
 3. *Dipyllobothrium latum*.
 4. *Acanthotrema felis*.

31. ¿Qué afirmación es cierta en relación al ciclo biológico de *Trichuris trichura*?:
1. Los huevos embrionados se excretan en las heces.
 2. Después de la ingesta, los huevos eclosionan en el intestino grueso.
 3. Las larvas maduran en adultos y se establecen en el intestino delgado.
 4. Los gusanos adultos viven en el ciego.
32. Señale cuál de los siguientes microorganismos presenta resistencia intrínseca de bajo nivel a vancomicina:
1. *Enterococcus casseliflavus*.
 2. *Abiotrophia defectiva*.
 3. *Streptococcus gallolyticus*.
 4. *Gemella haemolysans*.
33. ¿Qué microorganismo es el principal agente causal de infección de tracto urinario en población general?:
1. *Staphylococcus saprophyticus*.
 2. *Escherichia coli*.
 3. *Pseudomonas aeruginosa*.
 4. *Proteus mirabilis*.
34. Las micosis sistémicas endémicas son aquellas causadas por:
1. Dermatófitos.
 2. Hongos dimórficos.
 3. Mucorales.
 4. Hongos hialinos.
35. En la tinción de Gram de un exudado uretral se observan diplococos gramnegativos intracelulares y un predominio de leucocitos polimorfonucleares. ¿Qué microorganismo cuenta con un alto grado de sospecha?:
1. *Mycoplasma genitalium*.
 2. *Chlamydia trachomatis*.
 3. *Neisseria gonorrhoeae*.
 4. *Haemophilus ducreyi*.
36. ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta respecto al virus SARS-CoV-2?:
1. Es un virus ARN bicatenario de simetría helicoidal.
 2. Reconoce el receptor humano ACE2 (enzima convertidora de angiotensina 2).
 3. El gen estructural S es idéntico al del virus SARS-CoV-1.
 4. Pertenece a la familia *Orthomyxoviridae*.
37. ¿Cuál de los siguientes antibióticos sería adecuado para tratar una infección causada por *Klebsiella pneumoniae* productora de β -lactamasa de espectro extendido (BLEE)?:
1. Ertapenem.
 2. Amoxicilina.
 3. Cefotaxima.
 4. Aztreonam.
38. ¿Cuál es la respuesta INCORRECTA respecto al virus de la parotiditis?:
1. Pertenece a la familia *Paramyxoviridae*.
 2. El único hospedador es el ser humano.
 3. Puede producir epidídimo-orquitis.
 4. Es un virus ARN monocatenario con simetría icosaédrica.
39. Señale la respuesta correcta sobre el género *Mycobacterium*:
1. *Mycobacterium chelonae* es una micobacteria de crecimiento lento.
 2. *Mycobacterium kansasii* es una micobacteria no cromógena.
 3. *Mycobacterium tuberculosis* da positiva la prueba de niacina.
 4. *Mycobacterium bovis* es sensible a pirazinamida.
40. ¿Cuál de las siguientes NO es una forma de tularemia?:
1. Enfermedad pulmonar.
 2. Enfermedad ulceroglandular.
 3. Enfermedad oculoganglionar.
 4. Enfermedad de Brill-Zinsser.
41. ¿Cuál de los siguientes parámetros expresa la fluidez de un material pulverulento según la relación entre las densidades apelmazada y aparente?:
1. El índice de Hausner.
 2. El parámetro de densificación de Ostwald.
 3. El índice de densificación de Heckel.
 4. El índice de porosidad.

42. ¿Qué finalidad tienen los sistemas de vectorización activa de fármacos?:

1. Modular la velocidad de liberación del fármaco basándose en el cambio de pH o entorno enzimático, como por ejemplo un comprimido con recubrimiento entérico.
2. Dirigir la liberación del fármaco en un lugar determinado basándose en técnicas que incrementan el tiempo de residencia de la formulación mediante procedimientos de estabilización como la pegilación.
3. Dirigir la liberación del fármaco en un órgano determinado basándose en técnicas de micro o nano encapsulación.
4. Dirigir la liberación del fármaco en un lugar determinado basándose en la unión a ligandos específicos.

43. ¿Para qué sirve el test de activación de monocitos (MAT)?:

1. Detección y cuantificación de bacterias gram-negativas en preparados de administración parenteral.
2. Detección, *in vitro*, de pirógenos en preparados de administración parenteral.
3. Detección, *in vivo*, de pirógenos en preparados de administración parenteral.
4. Detección de monocitos en preparados de administración parenteral.

44. ¿Mediante qué procedimientos se puede obtener agua para preparaciones inyectables de acuerdo con la normativa europea?:

1. Solamente puede obtenerse mediante destilación a partir de agua purificada, apta para elaboración de medicamentos.
2. Solamente puede obtenerse mediante retro-ósmosis con electro-desionización, a partir de agua purificada, apta para elaboración de medicamentos.
3. Puede obtenerse mediante esterilización por calor a partir de agua potable, apta para consumo humano, y posterior envasado estéril.
4. Puede obtenerse mediante destilación o mediante un proceso equivalente como la retro-ósmosis con electro-desionización.

45. ¿Deben ser estériles las preparaciones líquidas para inhalación no presurizadas?:

1. Solamente en aquellas destinadas a uso quirúrgico o heridas abiertas.
2. Solo en preparaciones presentadas en dispositivos unidos, los cuales están exentos de conservantes, o en multidosis que no contengan conservante.
3. No es necesario en ningún caso, ya que estos preparados deben incluir conservantes en su composición salvo que posean propiedades antimicrobianas propias.
4. Sí. Es un requisito indispensable de farmacopea para este tipo de formulaciones, salvo que la formulación presente propiedades antimicrobianas.

46. El mecanismo de pulverización por roce o fricción da lugar a partículas con una forma más próxima a la siguiente:

1. Esférica.
2. Acicular.
3. Elipsoide.
4. Dentrítica.

47. El planteamiento matemático de Arrhenius dentro del campo del desarrollo farmacéutico sirve para estimar:

1. La velocidad de degradación de un fármaco a diferentes temperaturas a partir de la temperatura cinética media.
2. La solubilidad real de un fármaco a partir de su solubilidad ideal, según los valores de entalpía de disolución.
3. La velocidad de disolución de un fármaco a diferentes temperaturas, según los valores de entalpía de fusión.
4. La solubilidad de un fármaco a diferentes temperaturas según los valores de entalpía de fusión.

48. Señale la respuesta correcta respecto al impacto de las interferencias preanalíticas en los resultados de las pruebas de coagulación:

1. Cuando existe hemoglobina libre después de la centrifugación se altera la línea de base detectada por el analizador, debido a la disminución de absorbancia de la misma a las longitudes de onda usadas en los métodos coagulométricos.
2. La liberación de moléculas citoplasmáticas y de moléculas de membrana pueden activar la coagulación y las plaquetas, generando un sesgo en los resultados del análisis por activación temprana de la coagulación o por consumo de factores de coagulación.
3. La hemólisis de la muestra raramente se debe a problemas en la toma de muestras.
4. Aunque la interferencia por hiperbilirrubinemia se debe a un solapamiento espectral, en el caso de la hipertrigliceridemia la turbidez de la muestra no afecta a la dispersión de la luz.

49. Acerca de las hemorragias digestivas, señale la afirmación correcta:

1. Es esperable un descenso de la frecuencia cardíaca, una disminución de la presión arterial, y un descenso de la hemoglobina.
2. La hematemesis es típica de hemorragias digestivas de tubo alto y las melenas de las hemorragias de tubo digestivo bajo.
3. La hematoquecia puede tener lugar tanto en hemorragias de tubo digestivo alto como en hemorragias de tubo digestivo bajo, si bien es más frecuente en las segundas.
4. La elevación de nitrógeno ureico en sangre es característica de hemorragias de colon debido a la absorción de las proteínas plasmáticas procedentes del sangrado.

50. ¿Cuál es el orden correcto de maduración de la línea mieloide?:

1. Promielocito, metamielocito, mielocito, cayado.
2. Promielocito, mielocito, metamielocito, cayado.
3. Mielocito, promielocito, metamielocito, cayado.
4. Metamielocito, promielocito, mielocito, cayado.

51. AG es una mujer de 82 años, con antecedentes de hipertensión arterial mal controlada a pesar de recibir tratamiento con ramipril 5 mg cada 24 horas, diabetes mellitus tipo 2 insulínica dependiente en seguimiento por endocrinología, y reciente diagnóstico de fibrilación auricular apenas sintomática. ¿Qué actitud sería la más adecuada ante este diagnóstico reciente?:

1. Realizar un control de ritmo con fármacos que ralenticen el paso del impulso cardíaco de las aurículas a los ventrículos y un control de la frecuencia con fármacos que intenten revertir el ritmo a un ritmo sinusal.
2. Dada la edad de la paciente, la actitud más recomendada sería una estrategia conservadora donde no se usen fármacos, priorizando el control del estrés y la modificación del estilo de vida, para mejorar los factores desencadenantes de la fibrilación auricular.
3. La paciente aparentemente cumple criterios para iniciar tratamiento anticoagulante como una de las primeras actitudes a tomar.
4. Es esencial observar el tamaño de las ondas P del electrocardiograma antes de decidir qué hacer.

52. En cuanto a las enfermedades relacionadas con la mielina, indique el enunciado correcto:

1. Los anticuerpos anti-acuaporina 4 (AQP4) son patognomónicos de la esclerosis múltiple.
2. Una hiponatremia debe corregirse rápidamente, ya que subidas menores a 8 mmol/L de sodio diarios pueden conducir a un síndrome de desmielinización osmótica.
3. El bloqueo de la vía del complemento o de la señalización de la interleucina 6 son estrategias útiles para tratar la neuromielitis óptica.
4. Actualmente existen disponibles más fármacos para tratar las formas de esclerosis múltiple progresiva primaria que las formas remitentes-recurrentes.

53. ¿Cuál de los siguientes fenómenos está asociado a un desplazamiento hacia la derecha de la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina?:

1. Disminución del pH.
2. Disminución de 2,3-difosfoglicerato.
3. Disminución de CO₂.
4. Disminución de la temperatura.

54. El conducto torácico drena la linfa en:

1. La vena yuxtglomerular derecha.
2. La vena subclavia izquierda.
3. La arteria subaracnoidea.
4. La arteria linfática prefrontal.

55. ¿Qué entidad hematológica cursa con una cifra elevada de hematíes, hemoglobina en rango normal o muy próximo a este, y un volumen corpuscular medio (VCM) bajo?:
1. Drepanocitosis.
 2. Policitemia vera.
 3. Talasemia menor.
 4. Anemia ferropénica.
56. La síntesis y liberación de aldosterona ocurren:
1. En la zona glomerular suprarrenal y están reguladas por la angiotensina I.
 2. En la zona glomerular suprarrenal y están reguladas por la angiotensina II.
 3. En la zona fasciculada suprarrenal y están reguladas por la angiotensina II.
 4. En la zona fasciculada suprarrenal y están reguladas por la angiotensina I.
57. ¿Cuál de las siguientes interleucinas (IL) se asocia con la patogenia del asma y, por tanto, es una diana terapéutica en su tratamiento?:
1. IL-1.
 2. IL-5.
 3. IL-6.
 4. IL-17.
58. Acerca del accidente isquémico transitorio (AIT) es cierto que:
1. Se trata de una lesión isquémica de menos de 24 horas de evolución, detectada radiológicamente (en TC o RMN), sin manifestaciones clínicas, por lo que suele pasar inadvertida para los pacientes.
 2. Cuando se diagnostica, es necesario comenzar una triple terapia antiagregante plaquetaria, ya que esta ha demostrado reducir el riesgo de desarrollo posterior de ictus.
 3. El factor de riesgo más influyente para desarrollarlo es presentar valores de LDL por encima de los valores de referencia de forma sostenida.
 4. Puede aparecer *amaurosis fugax*, que consiste en la pérdida transitoria de la visión.
59. ¿En cuál de las siguientes entidades hematológicas encontraremos macrotrombocitos?:
1. Trombocitopenia asociada al gen MYH9.
 2. Anemia megaloblástica.
 3. Anemia aplásica.
 4. Leucemia linfóide crónica.
60. BT es una paciente mayor que presenta diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina y dapagliflozina, pero no es muy adherente. ¿Cuál de las siguientes complicaciones NO esperaríamos encontrar en ella?:
1. Otitis externa maligna que curse con otalgia y otorrea.
 2. Estado de hiperosmolaridad plasmática, acidosis metabólica y elevación de cuerpos cetónicos.
 3. Polineuropatía distal simétrica.
 4. Edema macular con reducción de la agudeza visual.
61. La presencia en sangre periférica de una cifra anormalmente elevada de linfocitos pequeños con cromatina en “caparazón de tortuga” o “grumelée” es típica de la siguiente neoplasia linfóide:
1. Linfoma-leucemia de Burkitt.
 2. Linfoma del manto.
 3. Leucemia linfática crónica.
 4. Leucemia prolinfocítica B.
62. Según la clasificación de sensibilidad de las fibras nerviosas, las del grupo Ib son:
1. Fibras procedentes de las terminaciones anuloespirales de los husos musculares.
 2. Fibras procedentes de los órganos tendinosos de Golgi.
 3. Fibras procedentes de los órganos táctiles de la piel y de las terminaciones en ramillete.
 4. Fibras que conducen la temperatura, el tacto grueso y las sensaciones de dolor y escozor.
63. La presión de pulso es una medida de:
1. La suma de las presiones diastólica y sistólica.
 2. El número de latidos cardíacos por minuto.
 3. La diferencia entre las presiones arterial y venosa.
 4. La diferencia entre las presiones sistólica y diastólica.
64. Señale la afirmación cierta para la tricoleucemia o leucemia de células peludas clásica:
1. Es una neoplasia de linfocitos T.
 2. Es frecuente en niños.
 3. Cursa con monocitopenia.
 4. Las células presentan un citoplasma altamente basófilo.

65. Con respecto a la formación de cálculos renales:

1. El 80% de los cálculos encontrados están compuestos por ácido úrico.
2. Habitualmente la aparición de cálculos de oxalato cálcico se acompaña de niveles altos de citrato en orina.
3. Los cálculos de fosfato amónico y magnésico son típicos de personas con orina alcalina debido a ciertas infecciones del tracto urinario.
4. Previo al inicio del tratamiento de una leucemia, es importante acidificar la orina para prevenir la formación de cálculos de ácido úrico.

66. Los órganos accesorios de reproducción masculinos derivan de:

1. Los conductos wolffianos (mesofrénicos).
2. Los conductos mullerianos (paramesofrénicos).
3. Los conductos seminíferos (paramesentéricos).
4. Los conductos antimullerianos (paramesofrénicos).

67. Los hematíes que presentan formas irregulares, con espículas alargadas repartidas de forma asimétrica por la superficie, y que aparecen en pacientes con hepatopatía grave se denominan:

1. Equinocitos.
2. Drepanocitos.
3. Esquistocitos.
4. Acantocitos.

68. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a los diferentes tipos de shock?:

1. En un shock séptico refractario, emplear vasopresina por su acción agonista del receptor V1 podría resultar una opción adecuada.
2. Tras una hemorragia masiva, lo más probable es encontrarnos ante un shock distributivo.
3. La noradrenalina se utiliza frecuentemente en los estados de shock para aumentar la frecuencia cardíaca.
4. En un shock cardiogénico no hay manifestaciones de isquemia tisular, como es el aumento de lactato en sangre, a diferencia del resto de subtipos.

69. MS es una mujer de 28 años que acude a consulta con múltiples úlceras en la boca, fatiga importante, eritema facial, y dolor articular. Se sospecha entonces de un Lupus Eritematoso Sistémico (LES). ¿Cuál de los siguientes enfoques es correcto?:

1. Si en una analítica los anticuerpos antipéptido citrulinado salieran positivos, la sospecha de LES se afianzaría.
2. El uso de anticuerpos anti-interleucina 2 en estos pacientes mejora la sintomatología.
3. El síndrome de Behçet es una forma específica de LES con afectación fundamentalmente renal.
4. Una característica esperable en esta paciente sería la detección de niveles bajos de factores del complemento.

70. La fibrosis pulmonar idiopática:

1. Es una enfermedad pulmonar obstructiva.
2. Se diagnostica en la mayoría de los pacientes en la infancia.
3. En la actualidad carece de un tratamiento farmacológico curativo.
4. Puede manifestarse como consecuencia de la utilización de fármacos antagonistas de PD-1.

71. ¿Cuál de los siguientes trastornos tiene un origen hereditario autosómico dominante?:

1. Distrofia muscular de Duchenne.
2. Hipertermia maligna.
3. Miastenia gravis.
4. Botulismo.

72. Un bloqueo cardíaco de primer grado se caracteriza porque:

1. El intervalo PR del electrocardiograma está alargado.
2. Resulta esencial tratarlo con verapamilo, el antiarrítmico de elección en estos casos.
3. La onda T del electrocardiograma está invertida.
4. La onda P del electrocardiograma solamente en ocasiones va seguida de un complejo QRS.

73. El epitelio que se observa en el esófago de Barrett es:

1. Columnar simple.
2. Escamoso estratificado.
3. Columnar estratificado.
4. Escamoso simple.

74. ¿En cuál de las siguientes células se produce la secreción de gastrina?:

1. Células S del duodeno.
2. Células I del duodeno y del yeyuno.
3. Células G del antro.
4. Células K del duodeno y del yeyuno.

75. Señale la afirmación correcta en relación con la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) de tipo exudativo o húmeda:

1. La única alternativa disponible para tratarla es el uso de vitaminas C, E y zinc para retrasar su aparición.
2. Se inicia por acumulación de depósitos extracelulares denominados drusas.
3. Es una enfermedad típica de personas jóvenes, entre 20 y 30 años.
4. Los factores de crecimiento vascular endotelial (VEGF) tienen un papel central en su desarrollo.

76. ¿Cuál de las siguientes sustancias produce un aumento de la filtración glomerular?:

1. Noradrenalina.
2. Adrenalina.
3. Endotelina.
4. Prostaglandina E2.

77. ¿Cómo se denomina la hendidura o depresión del riñón a través del cual pasan la arteria y venas renales, los vasos linfáticos, la inervación y el uréter?:

1. Hilio renal.
2. Pirámide renal.
3. Pelvis renal.
4. Columna renal.

78. Los receptores de estiramiento del arco aórtico y del seno carotídeo:

1. Sirven como barorreceptores que estimulan la secreción de péptido natriurético auricular.
2. Sirven como barorreceptores que afectan la actividad del centro de control vasomotor y cardíaco del bulbo raquídeo.
3. Sirven como osmorreceptores que estimulan la liberación de ADH.
4. Sirven como barorreceptores que estimulan la secreción de renina, aumentando la formación de angiotensina II.

79. Los factores que determinan la presión de un gas disuelto en un líquido, como, por ejemplo, el aire alveolar y la sangre, se relacionan mediante una de las siguientes leyes:

1. Ley de Ohm.
2. Ley de Henry.
3. Ley de Fick.
4. Ley de Laplace.

80. ¿Cuál de las siguientes vacunas se formula con agentes atenuados?:

1. Vacuna de la hepatitis B.
2. Vacuna de la fiebre amarilla.
3. Vacuna de la rabia.
4. Vacuna del papilomavirus.

81. Indique la respuesta INCORRECTA sobre los preparados de insulina de acción prolongada:

1. La afinidad de la insulina detemir es 4-5 veces menor que la de la insulina soluble por lo que se formula a una concentración mayor.
2. La insulina glargina se formula a un pH básico para mantener la solubilidad.
3. En la insulina degludec, los monómeros se liberan constantemente en la circulación sistémica y su duración de acción es mayor de 42 h.
4. En la insulina NPH la dosis regula el perfil de acción; las dosis pequeñas tienen picos más bajos, más tempranos, y una acción de corta duración.

82. En relación con los receptores acoplados a proteínas G (RAPG), señale la opción correcta:

1. Las β -arrestinas forman complejos con los RAPG fosforilados.
2. El complejo RAPG-agonista interactúa directamente con clatrina antes de internalizarse.
3. Los RAPG ocupados por un agonista se unen a las proteínas G solamente cuando han sido fosforilados previamente por las cinasas de receptores acoplados a proteínas G (GRK).
4. Los complejos β -arrestina-RAPG son sistemáticamente degradados.

83. ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta con respecto al síndrome de hipersensibilidad al alopurinol (AHS)?:

1. Los síntomas ocurren después de 3-5 días del inicio del tratamiento.
2. La disfunción hepática favorece su desencadenamiento.
3. La prevalencia es mayor en pacientes de ascendencia coreana o tailandesa frente a pacientes caucásicos.
4. Es bastante frecuente y benigno, por lo general se resuelve disminuyendo la dosis de alopurinol.

- 84. En relación con el uso de β -bloqueantes en el tratamiento de la cardiopatía isquémica, señale la opción correcta:**
1. La discontinuación abrupta de un tratamiento con β -bloqueantes puede aumentar el riesgo de muerte súbita.
 2. Están indicados en monoterapia en el tratamiento de la angina vasoespástica (angina en reposo).
 3. En el miocardio isquémico, los β -bloqueantes aumentan el aporte de oxígeno, pero no tienen efecto neto sobre su consumo.
 4. Los β -bloqueantes son muy útiles en pacientes diabéticos al mejorar su control de la glucemia.
- 85. Respecto a los antidepresivos, ¿qué asociación de fármaco y mecanismo de acción es INCORRECTA?:**
1. Trazodona - Antagonista del receptor 5-HT₂.
 2. Venlafaxina - Inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina (IRSN).
 3. Escitalopram - Inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS).
 4. Bupropión - Inhibidor de la monoaminoxidasa (MAO).
- 86. Señale la asociación correcta en relación con la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH):**
1. Candidiasis esofágica – Etapa 1 de la infección VIH (CDC).
 2. Combinaciones con tenofovir disoproxilato – Osteomalacia.
 3. Combinaciones con enfavurtida – Tratamiento de infección por VIH-2.
 4. ARN de VIH en <50 copias/mL – Alto riesgo de enfermedades oportunistas.
- 87. ¿Cuál de los siguientes anticuerpos monoclonales se utiliza para la profilaxis de la migraña?:**
1. Belimumab.
 2. Vedolizumab.
 3. Galcanezumab.
 4. Evolocumab.
- 88. En relación con los fármacos que se comportan como antagonistas competitivos, señale la opción correcta:**
1. En su presencia, disminuye la concentración eficaz 50 (CE₅₀) de los agonistas puros del mismo receptor.
 2. En su presencia, disminuye el efecto máximo de los agonistas puros del mismo receptor.
 3. Disminuyen la eficacia, pero no la potencia, de los agonistas puros del mismo receptor.
 4. Disminuyen la potencia, pero no la eficacia, de los agonistas puros del mismo receptor.
- 89. Se presenta un paciente con adenocarcinoma de pulmón en estadio IV, con metástasis óseas y hepáticas. En el estudio de biomarcadores de una muestra del pulmón biopsiada se obtiene el siguiente resultado: EGFR mutado (Ex19Del), HER2 negativo, BRAF nativo, reordenamiento ALK negativo, fusión ROS 1 negativa, PDL-1 negativo, ¿cuál sería el tratamiento adecuado?:**
1. Lapatinib.
 2. Crizotinib.
 3. Osimertinib.
 4. Dabrafenib.
- 90. ¿Cuál de las siguientes es una reacción metabólica de fase I?:**
1. Desulfuración.
 2. Glucuronidación.
 3. Acetilación.
 4. Descarboxilación.
- 91. Señale la respuesta correcta sobre los fármacos del grupo de los tioureílicos, empleados en las enfermedades tiroideas:**
1. Son análogos sintéticos de la tiroxina (T₄).
 2. Tienen como mecanismo de acción la inhibición de la enzima tiroperoxidasa, reduciendo con ello la yodación de los residuos de la tiroglobulina.
 3. Poseen acción citotóxica sobre las células de los folículos tiroideos.
 4. Solo son empleados en cuadros de hipotiroidismo severo debido a su elevada potencia.
- 92. Referidos a *Glicirryza glabra*, indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:**
1. Contiene glicirricina, un saponósido triterpénico pentacíclico.
 2. La droga está constituida por la raíz.
 3. Entre sus principios activos se encuentran otros saponósidos como el liquiritósido.
 4. Tiene acción mineralocorticoide.
- 93. Pramipexol se utiliza para el tratamiento de:**
1. Miastenia gravis.
 2. Enfermedad de Parkinson.
 3. Esclerosis múltiple.
 4. Enfermedad de Alzheimer.

94. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con relación al tratamiento del cáncer?:

1. Los efectos inmunomediados graves producidos por la inmunoterapia pueden tratarse con corticoides.
2. La hipotensión es un efecto adverso muy frecuente de bevacizumab y de otros medicamentos antiangiogénicos.
3. Rituximab es un anticuerpo monoclonal dirigido al antígeno CD33.
4. Los inmunoterápicos con diferentes blancos (PD-1 y CTLA-4) no deben combinarse en el tratamiento del cáncer.

95. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con relación a los fármacos pertenecientes al grupo de los bisfosfonatos es correcta?:

1. Su uso a largo plazo se relaciona con fracturas atípicas de fémur, algo que no sucede con el denosumab.
2. El ácido aledrónico es el bifosfonato más potente de todos los disponibles.
3. Tienen una pobre absorción oral por lo que se recomienda su administración en ayunas.
4. Su mecanismo de acción se basa en la formación de hueso.

96. ¿Cuál de los siguientes fármacos para el tratamiento de la esclerosis múltiple puede producir rubor facial al inicio del tratamiento?:

1. Dimetilfumarato.
2. Teriflunomida.
3. Natalizumab.
4. Alemtuzumab.

97. La Kd (constante de disociación) de un fármaco:

1. Coincide con la CE_{50} (concentración eficaz 50) de dicho fármaco.
2. Se corresponde con la concentración de fármaco que ocupa la mitad de los receptores existentes en el sistema en estudio.
3. Es independiente de la afinidad del fármaco por su receptor.
4. Depende de la eficacia del fármaco.

98. Señalar la opción correcta en relación con el tramadol:

1. Es un opioide desprovisto de riesgo de tolerancia y dependencia.
2. Su acción agonista opioide se debe fundamentalmente a uno de sus metabolitos.
3. Es tan eficaz como la morfina para el tratamiento del dolor severo.
4. Se utiliza preferentemente como antitussivo.

99. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referidas al manejo del estreñimiento es FALSA?:

1. Los preparados de fosfato de sodio son el tratamiento de elección en pacientes de edad avanzada o con insuficiencia renal.
2. Naloxegol está indicado para el tratamiento del estreñimiento inducido por opioides.
3. Los laxantes formadores del bolo pueden provocar distensión abdominal y meteorismo.
4. El uso a largo plazo de laxantes lubricantes y emolientes puede provocar una malabsorción de vitaminas liposolubles.

100. Algunos fármacos se caracterizan por tener la capacidad de producir efectos adversos anticolinérgicos, especialmente en pacientes de edad avanzada. ¿Cuál de los siguientes grupos de fármacos NO presenta una elevada potencia anticolinérgica?:

1. Antidepresivos tricíclicos (amitriptilina).
2. Antihistamínicos de 1ª generación (doxilamina).
3. Antiespasmódicos urinarios (tolterodina).
4. Antimigrañosos (sumatriptán).

101. ¿Qué tipo de fármaco se utiliza para disminuir los efectos secundarios periféricos de la levodopa, en pacientes con enfermedad de Parkinson?:

1. Antagonistas colinérgicos.
2. Agonistas dopaminérgicos no ergóticos.
3. Inhibidores de la MAO-B (monoaminoxidasa-B).
4. Inhibidores periféricos de la LAAD (L-aminoácidoaromático-descarboxilasa).

102. En relación con anakinra, señale la opción correcta:

1. Es una proteína de fusión compuesta por el receptor p75 del factor de necrosis tumoral (TNF) y la porción Fc de la IgG1 humana.
2. Inhibe la unión de CD80 al receptor CD28 en los linfocitos T.
3. Es un receptor de factor de necrosis tumoral recombinante que inhibe la unión de TNF α a su receptor.
4. Es un receptor de interleucina 1 (IL-1) recombinante que inhibe la unión de la IL-1 α a su receptor.

103. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre repaglinida es correcta?

1. Presenta un inicio de acción lento con una concentración máxima y efecto máximo de alrededor de 3 h después de la ingestión.
2. No hay riesgo de hipoglucemia si una vez que se toma el medicamento la comida se retrasa o se omite.
3. Se puede usar en pacientes con insuficiencia renal y de edad avanzada.
4. Contiene azufre en su estructura por lo que no puede emplearse en diabéticos tipo 2 con alergia a las sulfonilureas.

104. En relación con la lamotrigina, señale la opción INCORRECTA:

1. Entre otros, bloquea receptores metabotrópicos de glutamato.
2. Está indicada en el tratamiento del trastorno bipolar, pero solo para la prevención de los episodios depresivos.
3. Su espectro de acción es amplio, pudiéndose emplear tanto en crisis parciales como generalizadas.
4. Es un antiepiléptico que presenta menor evidencia de teratogenicidad que otros como el valproato.

105. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

1. A partir del fruto de *Pygeum africanum* se obtiene un extracto acuoso que se emplea en el tratamiento de la hipertrofia benigna de próstata.
2. A partir de las cortezas de *Rhamnus purshianus* se obtienen O-heterósidos y C-heterósidos con estructura de emodina antro-na.
3. El oleuropeósido es uno de los ácidos grasos presentes en el aceite de oliva.
4. El aceite obtenido de las semillas de *Oenothera biennis* contiene como componente mayoritario triglicéridos formados por ácidos grasos saturados.

106. Paciente con SIDA en tratamiento con darunavir/cobicistat que ingresa en el hospital. Nos realizan una consulta sobre el hipnótico/ansiolítico adecuado para tratar el insomnio que padece acompañado de ansiedad, entre los disponibles en el hospital. ¿Cuál es la respuesta correcta?:

1. Lorazepam.
2. Midazolam.
3. Diazepam.
4. Triazolam.

107. ¿Cuál de los siguientes fármacos se utiliza como hipnótico, por sus propiedades sedantes y bajo riesgo de dependencia, en las personas de edad avanzada?:

1. Trazodona.
2. Diazepam.
3. Bupropión.
4. Duloxetina.

108. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con relación al tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)?:

1. El efecto secundario más frecuente de los agonistas muscarínicos anticolinérgicos es la sequedad bucal.
2. La utilización prolongada de corticoides inhalados se ha asociado con candidiasis orofaríngea y pérdida de densidad ósea.
3. Se recomienda el uso continuado de corticoides orales debido a su buen perfil de seguridad.
4. El papel principal de los corticoides inhalados es emplearse como tratamiento agudo de las exacerbaciones.

109. Se presenta el caso de un paciente con enfermedad renal crónica en diálisis peritoneal y tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoyesis. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

1. No es importante conocer las reservas férricas en médula ósea para asegurar una respuesta adecuada al tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoyesis, ya que estos funcionan independientemente de la cantidad de hierro del organismo.
2. La diálisis peritoneal se acompaña de diversas complicaciones metabólicas como la hipoproteínemia.
3. Una de las complicaciones frecuentes de la diálisis es la hipoglucemia.
4. Cuando utilizamos agentes estimulantes de la eritropoyesis, buscamos conseguir subidas muy rápidas de hemoglobina, por encima de los 3 g/dL al mes.

110. La forma farmacéutica y el tamaño de las partículas influyen sobre el proceso de absorción del fármaco, cuando éste es administrado por vía oral, al condicionar:

1. La disgregación.
2. La eliminación del principio activo.
3. El volumen de distribución.
4. La excreción renal.

111. Indique cuál de las siguientes expresiones es la correcta:

1. Las cumarinas se consideran derivados fenólicos que biogenéticamente se originan por la vía del ácido sikímico.
2. El rizoma de *Centella asiática* contiene asiaticósido, una saponina triterpénica pentacíclica.
3. El salicósido se extrae de las hojas de *Salix alba*.
4. La d-tubocurarina actúa como antagonista de acetilcolina sobre receptores muscarínicos en placa motora.

112. ¿Cuál de las siguientes es una característica de la farmacocinética no lineal?:

1. Los parámetros farmacocinéticos no se mantienen constantes e independientes de la dosis administrada y del tiempo.
2. Los parámetros farmacocinéticos se mantienen constantes e independientes de la dosis administrada y del tiempo.
3. Se cumple el principio de superposición de las curvas de niveles plasmáticos – tiempo a distintas dosis.
4. Todos los procesos que experimenta el fármaco en el organismo se ajustan a cinéticas de primer orden.

113. Acaba de prepararse en la farmacia del hospital una suspensión de un fármaco que presenta hidrólisis en medio ácido. ¿Cuál de las siguientes formas de administración presentará una mayor biodisponibilidad?:

1. Por una sonda nasoyeyunal.
2. Por la vía oral fisiológica.
3. Por una gastrostomía endoscópica percutánea (PEG).
4. Por una sonda nasogástrica.

114. En el análisis farmacocinético modelo-dependiente de curvas de niveles plasmáticos – tiempo tras administración extravasal, el cálculo del período de latencia se realiza a partir de:

1. La fase lineal terminal de la representación semilogarítmica de niveles plasmáticos – tiempo.
2. La fase inicial de la curva de niveles plasmáticos – tiempo.
3. La pendiente de la fase lineal terminal de la curva de niveles plasmáticos – tiempo.
4. El tiempo al que se produce la intersección de las rectas semilogarítmicas extrapoladas con el eje de ordenadas correspondiente a las fases de absorción y de eliminación.

115. ¿A qué tipo de proceso cinético se ajustan habitualmente la filtración glomerular y la reabsorción tubular pasiva?:

1. Ambas a procesos cinéticos de primer orden.
2. Ambas a procesos cinéticos de orden cero.
3. La filtración glomerular a cinética de primer orden y la reabsorción tubular pasiva a cinética de orden cero.
4. La filtración glomerular a cinética de orden cero y la reabsorción tubular pasiva a cinética de primer orden.

116. ¿Para cuál de los siguientes fármacos no tendría interés clínico realizar una prueba farmacogenética que midiera la actividad de alguna enzima responsable de su metabolismo?:

1. Etanercept.
2. Aripiprazol.
3. Tacrolimus.
4. 5-Fluorouracilo.

117. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA respecto a la dosis de choque de un medicamento administrado por vía intravenosa?:

1. La dosis de choque necesaria para alcanzar la concentración plasmática objetivo está determinada por el volumen de distribución.
2. Cuando el intervalo de administración es igual a la semivida del fármaco, una dosis de choque de dos veces la dosis de mantenimiento lograría alcanzar el estado de equilibrio.
3. La dosis de choque es independiente de la concentración plasmática objetivo, al depender solamente de su eliminación.
4. Es una estrategia de dosificación establecida para muchos fármacos con semivida de eliminación elevada.

118. En administración extravasal, el fenómeno denominado de flip-flop ocurre cuando:

1. El proceso de absorción es más rápido que el de eliminación.
2. El proceso de eliminación es más rápido que el de absorción.
3. El proceso de absorción se produce a la misma velocidad que el de eliminación.
4. El proceso de liberación del fármaco de la forma de dosificación limita su absorción.

119. ¿Cuál de los siguientes enunciados en relación a la actividad de la glicoproteína P y el proceso de absorción es correcto?:

1. La amiodarona actúa a nivel de la glicoproteína P intestinal, dificultando la absorción de fármacos que son sustrato de esta.
2. Se considera un transporte pasivo, ya que su actividad es ATP-independiente.
3. En el ser humano se encuentra fundamentalmente a nivel del tracto gastrointestinal, aunque también está presente en otros lugares, como la barrera hematotesticular. Sin embargo, la barrera hematoencefálica carece de ella.
4. El dabigatrán es un ejemplo de fármaco que requiere una reducción de dosis cuando se administra con inhibidores de glicoproteína P.

120. Respecto a la farmacocinética de la digoxina, podemos afirmar que:

1. La biodisponibilidad de los comprimidos es próxima al 100%.
2. Algunos fármacos como la quinidina y el verapamilo disminuyen las concentraciones séricas de digoxina por aumento de la eliminación renal.
3. Presenta un volumen de distribución de aproximadamente 0,1 L/Kg por su elevada unión a proteínas plasmáticas.
4. La principal vía de eliminación de la digoxina es a través de procesos de filtración glomerular del riñón.

121. ¿En cuál de las siguientes vías de administración de fármacos el tipo de estrato que regula la absorción se considera subcelular?:

1. Parenteral extravascular.
2. Oral.
3. Transpulmonar.
4. Percutánea.

122. Acude a urgencias un paciente con COVID-19, al que le prescriben nilmatrevir/ritonavir. El paciente toma además ibrutinib de forma crónica para tratar su leucemia linfocítica crónica, un fármaco metabolizado a nivel hepático. ¿Qué podríamos esperar en este paciente con respecto a su tratamiento?:

1. La fuerte inducción de los citocromos producida por ritonavir podría causar una disminución de los niveles plasmáticos de ibrutinib, reduciendo su eficacia.
2. A pesar de que la eliminación de ibrutinib es principalmente hepática, el bloqueo de los transportadores activos renales causado por ritonavir podría provocar cambios en los niveles plasmáticos de ibrutinib, aumentándolos.
3. El ritonavir es un inhibidor importante del citocromo 3A, incrementando por tanto los niveles de ibrutinib, y con ello posiblemente su toxicidad.
4. Al ser un tratamiento de 5 días, se puede considerar que el uso de fármacos inhibidores o inductores del metabolismo durante periodos de tiempo tan cortos no van a modificar los niveles plasmáticos de otros fármacos.

123. ¿En cuál de los siguientes casos esperamos encontrar una cantidad de cobre elevada en la orina?:

1. Paciente con enfermedad de Menkes.
2. Paciente con una patología que curse con un déficit en la síntesis de ceruloplasmina.
3. Paciente que ingiere grandes cantidades de zinc de forma crónica.
4. Paciente con mutaciones en el transportador codificado por el gen ATP7A.

124. En cuanto a la estructura helicoidal de la conformación A y B del ADN bicatenario, ¿qué afirmación es cierta?:

1. Ambas conformaciones presentan una hélice con vuelta a la izquierda (ADN-levógiro).
2. Ambas conformaciones presentan una hélice con vuelta a la derecha (ADN-dextrógiro).
3. La conformación A presenta una hélice con vuelta a la derecha (ADN-dextrógiro) y la conformación B presenta una hélice con vuelta a la izquierda (ADN-levógiro).
4. La conformación A presenta una hélice con vuelta a la izquierda (ADN-levógiro) y la conformación B presenta una hélice con vuelta a la derecha (ADN-dextrógiro).

125. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca del ciclo del ácido cítrico, también conocido como ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, es correcta?:

1. Es un ciclo reversible, que puede funcionar en ambas direcciones.
2. El calcio (Ca^{2+}) es un potente inhibidor del ciclo, actuando sobre la isocitrato deshidrogenasa y la α -cetoglutarato deshidrogenasa.
3. La succinil-CoA sintetasa, anclada en la membrana mitocondrial interna, forma parte del complejo II de la cadena de transporte electrónico.
4. El ciclo cataliza la oxidación de acetil-CoA a CO_2 , generando $\text{NADH}+\text{H}^+$, FADH_2 y GTP, aunque la enzima fumarasa no participa en la producción de ninguna de estas moléculas mencionadas.

126. La proteína quinasa dependiente de AMP o AMP quinasa, es uno de los principales reguladores de la homeostasis metabólica. En su forma activa, esta enzima produce:

1. La inhibición de la glucólisis y de la glucogenólisis muscular.
2. La inhibición hepática de la lipogénesis y de la colesterogénesis.
3. La activación de la síntesis de ácidos grasos en adipocitos.
4. La activación de la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa (PEPCK) y la consiguiente estimulación de la gluconeogénesis hepática.

127. ¿Dónde tienen lugar de forma casi exclusiva las reacciones del ciclo de la urea?:

1. En el músculo esquelético.
2. En el hígado.
3. En el riñón.
4. En la mucosa intestinal.

128. Los métodos homogéneos directos para la cuantificación del colesterol-HDL permiten determinar el colesterol-no-HDL. ¿Qué lipoproteínas engloba esta fracción lipoproteica?:

1. LDL.
2. IDL y LDL.
3. VLDL y lipoproteínas remanentes.
4. Quilomicrones, VLDL, IDL y LDL.


129. Un paciente fue sometido a una pancreatoduodenectomía (resección completa del duodeno, de la vesícula biliar y de la cabeza del páncreas) hace 6 meses. Ha recibido múltiples ciclos de antibióticos de amplio espectro por haber sido colonizado por una bacteria multi-resistente durante el ingreso, y actualmente presenta hematuria. ¿Qué afirmación sería más probable?:

1. Debido a una resección de este tipo y el uso prolongado de antibióticos, la hematuria podría ser secundaria a una deficiencia de naftoquinonas.
2. Debido a la resección parcial del páncreas y total de la vesícula biliar, la hematuria podría ser secundaria a una trombopenia por deficiencia de tocoferol.
3. Debido a la resección duodenal, la hematuria podría ser secundaria a un déficit de absorción de vitamina B12.
4. Debido a la resección duodenal, la hematuria podría ser una de las hemorragias típicas de la púrpura Schoenlein-Henoch, causada por déficit de vitaminas liposolubles.

130. ¿Qué papel desempeña la apoproteína E en la eliminación de remanentes de quilomicrones y de lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) de la circulación sanguínea?:

1. Favorece la transferencia de material lipídico de ambas lipoproteínas a las HDL.
2. Es reconocida por los receptores celulares hepáticos que pertenecen a la familia de receptores de lipoproteínas de baja densidad.
3. Actúa como cofactor activador de la lipoproteína lipasa sérica.
4. Estabiliza la estructura de las lipoproteínas y desaparece de ellas por la cesión de ácidos grasos a las células periféricas.

131. La imagen adjunta muestra un proteinograma de un individuo sano y de un paciente en estudio. ¿Qué alteración es la más probable para este caso?



1. Hipoalbuminemia.
2. Inflamación crónica.
3. Inmunodeficiencia.
4. Paraproteinemia o gammapatía monoclonal.

132. ¿En cuál de las siguientes acciones esperarías que un mayor porcentaje de la producción de ATP procediera del sistema oxidativo?:

1. Esprintar durante un partido de tenis (10 segundos, uso mayoritario de musculatura de miembros inferiores).
2. Realizar una tanda de 30 flexiones (60 segundos, uso mayoritario de musculatura de pecho y miembros superiores).
3. Jugar una partida de ajedrez contra Hans Niemann (30 minutos, sin uso mayoritario de ninguna musculatura).
4. Competir en una prueba de natación de 100 m mariposa (70 segundos, uso de miembros superiores, inferiores y pecho).

133. Un recién nacido de 72 horas de vida debuta con un cuadro de hiperamonemia, sospechándose un error congénito del metabolismo. Análiticamente destaca la ausencia de acidosis, así como unos niveles de citrulina en plasma bajos, y un nivel elevado de ácido orótico en orina. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable?:

1. Déficit de carbamil-P-sintetasa 1.
2. Enfermedad del jarabe de arce.
3. Déficit de ornitín transcarbamilasa.
4. Déficit de piruvato deshidrogenasa.

134. Señale qué respuesta es INCORRECTA en relación a los heteropolisacáridos:

1. El ácido hialurónico es el glicosaminoglicano que más comúnmente se encuentra formando la parte glucídica de los proteoglicanos.
2. Los proteoglicanos son heterósidos que presentan un porcentaje mayor de glúcidos que las glucoproteínas.
3. El fondaparinux es un fármaco anticoagulante que presenta una secuencia heteropolisacáridica semejante a la heparina, a la que se ha añadido un grupo metoxilo.
4. Los glicosaminoglicanos están formados por unidades monosacáridicas distintas, una de las cuales es siempre N-acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina.

135. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un sistema de reparación del ADN?:

1. Reparación por escisión de bases.
2. Reparación por supresión de nucleótidos.
3. Reparación de emparejamientos de la hebra simple.
4. Reparación de pares erróneos.

136. ¿Cuál es la explicación más probable para los resultados del siguiente urianálisis?

Nitrito (2+), Esterasa Leucocitaria (3+), Cetonas (Negativo), Glucosa (trazas):

1. Contaminación de la muestra por mala manipulación.
2. Infección del tracto urinario.
3. Anorexia o ayuno muy prolongado.
4. Incapacidad glomerular para la conservación de macromoléculas.

137. Indique cuál de estas etapas del ciclo de Krebs está sometida a regulación alostérica:

1. Isocitrato - α -cetoglutarato.
2. Citrato - isocitrato.
3. Succinil-CoA - succinato.
4. Fumarato - malato.

138. Respecto al aminoácido cisteína, señale el enunciado correcto:

1. Es uno de los aminoácidos esenciales en el adulto.
2. Tiene capacidad de absorber luz ultravioleta a 280 nm.
3. Forma parte del tetrapéptido glutatión, que protege de la oxidación a través de la enzima glutatión peroxidasa.
4. Se clasifica generalmente como polar a pesar de tener un índice hidropático positivo.

139. ¿Con respecto al metabolismo hepático del alcohol (etanol), qué afirmación es correcta?:

1. Se inicia con una descarboxilación oxidativa catalizada por la enzima alcohol descarboxilasa.
2. Genera un exceso de acetil-CoA que se puede utilizar para la síntesis de ácidos grasos.
3. Provoca un aumento del pH sanguíneo debido a la acción final de la enzima acetaldehído deshidrogenasa.
4. Para ser metabolizado, se consume NADH y se genera en consecuencia NAD^+ .

140. MB es un paciente de 73 años ingresado tras una cirugía de colon por su proceso oncológico de base. El cirujano le prescribe una nutrición parenteral estandarizada, ya que el paciente padece de íleo paralítico tras la operación y lleva varios días de ayuno. Al día siguiente, en la analítica presenta hipofosfatemia, hipomagnesemia e hipopotasemia, así como déficit de vitamina B1. ¿Cuál es el escenario más probable que explica esta situación?:

1. Las nutriciones parenterales comerciales carecen de electrolitos, por lo que deberían haberse añadido en el Servicio de Farmacia.
2. Debido al proceso de base, el paciente se encontraba desnutrido y parece presentar un síndrome de realimentación tras el inicio de la nutrición.
3. La nutrición parenteral ha interactuado con la medicación que toma el paciente provocando una desregulación electrolítica.
4. Esta es una situación habitual en pacientes de edad avanzada, que responden mal a tratamientos con nutrición parenteral.

141. En relación a las endonucleasas de restricción, ¿qué afirmación es INCORRECTA?:

1. Reconocen secuencias palindrómicas; GATC sería un ejemplo de estas.
2. Cortan la molécula de ADN en un sitio preciso.
3. No se pueden emplear en procesos de clonación debido a su termolabilidad, quedando restringidas a procesos de modificación génica más sencillos.
4. Pueden originar extremos tanto romos como cohesivos, dependiendo de la enzima.

142. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una mutación puntual en la secuencia de ADN?:

1. Sustitución.
2. Delección.
3. Inserción.
4. Traslocación.

143. ¿Cuál de las siguientes funciones NO la realiza un derivado del isopreno?:

1. Regular el metabolismo del calcio.
2. Provocar la respuesta inflamatoria y fiebre.
3. Estimular la proliferación de la mucosa endometrial del útero.
4. Incrementar la reabsorción de sodio y secreción de potasio.

144. En un paciente con un diagnóstico de ictericia a causa de una anemia hemolítica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?:

1. Presentará una hiperbilirrubinemia a expensas de un aumento de la bilirrubina indirecta.
2. Es esperable que se produzca un incremento de bilirrubina en la orina.
3. Se producirá un descenso de la haptoglobina, y un aumento de la lactato deshidrogenasa.
4. Suelen presentar un índice de producción de reticulocitos mayor o igual a 2,5 veces el valor normal.

145. ML es una mujer de 86 años que consulta por mal estado general. Como antecedentes personales destacan diabetes y enfermedad por reflujo gastroesofágico en tratamiento con omeprazol desde hace 10 días. Se encuentra afebril, y una tira de orina revela hematuria y leucocituria, con nitritos negativos. Analíticamente destaca un filtrado glomerular de 40 mL/min (CKD-EPI) y unas proteínas en orina de 24 horas ligeramente elevadas. En una analítica de hace 30 días el filtrado glomerular era normal (100 mL/min). ¿Cuál de los siguientes diagnósticos sería el más probable?:

1. Nefritis intersticial aguda.
2. Nefropatía diabética.
3. Síndrome nefrótico.
4. Infección del tracto urinario.

146. Cuando un aparato de análisis de muestras de sangre nos da el valor de índice sérico, este hace referencia a:

1. Un índice que mide el grado de anemia del paciente de forma precisa.
2. Un indicador de la calidad de la muestra, que nos informa de la validez de los resultados que podamos obtener.
3. Una medida de la celularidad del suero, que informa tanto de los hematíes presentes como de los leucocitos.
4. Un índice cuantitativo que calcula la cantidad de proteínas séricas presentes, si bien no hace distinciones entre proteínas α -1 y α -2.

147. En relación con los ARNm policistrónicos, ¿qué afirmación es cierta?

1. A pesar de ser muy largos, codifican una sola proteína.
2. Se sintetizan en el interior del núcleo celular para luego salir de este y traducirse en el citoplasma.
3. Una de sus características particulares es que son los únicos ARNm donde encontramos codones formados por 4 bases, en lugar de 3.
4. Los podemos encontrar en procariotas y virus, pero no en eucariotas.

148. En una muestra de un paciente, nos encontramos con LDH y K^+ elevados, y la haptoglobina disminuida. ¿Cuál de las siguientes patologías es más probable?:

1. Déficit de piruvato quinasa.
2. Síndrome de Lesch-Nyhan.
3. Síndrome de Hurler.
4. Hiperpotasemia franca con anemia por insuficiencia renal crónica.

149. AR es una paciente que ingresa para tratarse de un linfoma, y tiene un diagnóstico de déficit grave de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa. Al revisar su prescripción, usted se encuentra con que uno de los fármacos que recibe presenta especial riesgo de desencadenar una crisis de anemia hemolítica. ¿Cuál es ese fármaco?

1. Meropenem.
2. Tramadol.
3. Rasburicasa.
4. Bisoprolol.

150. Tras iniciar tratamiento quimioterápico en un paciente hematológico con alta carga de enfermedad, ¿cuál de las siguientes alteraciones hidroelectrolíticas sería más probable encontrar?:

1. Hiperfosfatemia.
2. Hipernatremia.
3. Hipercalcemia.
4. Hipomagnesemia.

151. La técnica más adecuada para el análisis multi-elemental es:

1. Espectrometría de emisión atómica con arco y chispa.
2. Espectrometría de emisión atómica en plasma.
3. Espectrometría de absorción atómica en llama.
4. Espectrometría de absorción atómica con horno.

152. La primera ley de la termodinámica indica que:

1. Si un cuerpo A se encuentra en equilibrio térmico con un cuerpo B y éste a su vez está en equilibrio térmico con un cuerpo C, A y C se encuentran en equilibrio térmico.
2. No es posible alcanzar el cero absoluto en un número finito de etapas.
3. Un sistema termodinámico puede intercambiar energía con su entorno en forma de trabajo y de calor, y variar de esa forma su energía interna. La relación entre estas tres magnitudes viene dada por el principio de conservación de la energía.
4. Es imposible que un sistema realice un proceso cíclico cuyos únicos efectos sean el flujo de calor hacia el sistema desde una fuente de calor y la realización, por parte del sistema, de una cantidad de trabajo equivalente.

153. El inyector de “bucle” o de válvula de 6 vías es una parte crucial del cromatógrafo de líquidos porque, desde un punto de vista cuantitativo, mejora la:

1. Selectividad de la separación.
2. Sensibilidad de la separación.
3. Resolución de la separación.
4. Reproducibilidad de la separación.

154. Las transiciones electrónicas con absortividades molares más pequeñas que producen una banda de absorción en la región del espectro visible son:

1. Orbital π - orbital π antienlazante ($\pi - \pi^*$).
2. Campo-ligando.
3. Orbital no enlazante - orbital π antienlazante ($n - \pi^*$).
4. Orbital no enlazante - orbital σ antienlazante ($n - \sigma^*$).

155. La absorbancia total de una disolución a una longitud de onda dada, es:

1. Independiente del disolvente utilizado.
2. Independiente del pH de la disolución.
3. Igual a la suma de las absorbancias de los componentes individuales en la disolución.
4. Igual a la absorbancia del componente más absorbente.

156. En una reacción de orden 0 (siendo k la constante de velocidad):

1. La velocidad de la reacción es dependiente de la concentración.
2. La representación de la concentración frente al tiempo da una línea recta cuya pendiente es $-1/k$.
3. El tiempo de semivida es proporcional a la concentración e inversamente proporcional a k.
4. La unidad de la constante k es (t^{-1}).

157. ¿Con cuál de las siguientes volumetrías relacionaría la valoración por desplazamiento?:
1. Ácido-base.
 2. Formación de complejos.
 3. Oxido-reducción.
 4. Precipitación.
158. En la validación de un método analítico, el límite de cuantificación del método se calcula a través de la señal x_{LC} , obtenida sumando la señal del blanco X_B , y la desviación estándar correspondiente a señales repetidas del blanco empleado σ_B mediante la fórmula: $x_{LC} = X_B + n\sigma_B$. ¿Cuál debe ser el valor de n ?:
1. 1.
 2. 2.
 3. 5.
 4. 10.
159. ¿Cuál de los siguientes sistemas de ionización utilizados en espectrometría de masas utiliza iones gaseosos reactivos para lograr la obtención de iones?:
1. Ionización química.
 2. Ionización por impacto de electrones.
 3. Ionización por bombardeo de átomos rápidos.
 4. Ionización/desorción asistida por una matriz.
160. En la determinación cuantitativa de especies atómicas mediante espectrometría de emisión en plasma ICP, las muestras se introducen en la antorcha de plasma:
1. Como nebulizado o aerosol, tangencialmente y a través del cilindro exterior arrastradas por el flujo del aire.
 2. Como nebulizado o aerosol, por el cilindro de cuarzo concéntrico central arrastradas por el flujo del aire.
 3. Como nebulizado o aerosol, tangencialmente y a través del cilindro exterior arrastradas por el flujo del argón.
 4. Como nebulizado o aerosol, por el cilindro de cuarzo concéntrico central arrastradas por el flujo del argón.
161. La fluorescencia es un proceso en el que tiene lugar:
1. Una transición radiante en la que se emite un fotón sin cambio de multiplicidad.
 2. Una transición radiante en la que se emite un fotón con cambio de multiplicidad.
 3. Una transición no radiante en la que se emite un fotón sin cambio de multiplicidad.
 4. Una transición no radiante en la que se emite un fotón sin cambio de multiplicidad.
162. De los siguientes ácidos, ¿cuál es el más apropiado para preparar una disolución tampón de pH=5?:
1. Ácido fosfórico, ($pK_{a1} = 2,14$; $pK_{a2} = 7,19$; $pK_{a3} = 12,34$).
 2. Ácido carbónico, ($pK_{a1} = 6,35$; $pK_{a2} = 10,32$).
 3. Ácido acético, ($pK_a = 4,75$).
 4. Ácido hipocloroso, ($pK_a = 7,52$).
163. En espectrofotometría de absorción atómica, un aumento de la temperatura en el atomizador produce:
1. Un aumento de la sensibilidad porque aumenta la eficacia de la atomización.
 2. Una disminución de interferencias porque aumenta el ensanchamiento de las líneas atómicas por efecto Doppler.
 3. Un aumento de la sensibilidad porque disminuye la eficacia de la atomización.
 4. Un aumento de interferencias porque disminuye el ensanchamiento de las líneas atómicas por efecto Doppler.
164. ¿En qué proceso se basa la técnica analítica de nefelometría?:
1. En la absorción de radiación.
 2. En la emisión de radiación.
 3. En la dispersión de radiación.
 4. En la refracción de radiación.
165. La membrana de un electrodo selectivo a iones fluoruro constituida prácticamente en su totalidad por LaF_3 es una membrana:
1. De vidrio.
 2. Sólida cristalina.
 3. Líquida con un ionóforo.
 4. Líquida con un intercambiador iónico.
166. En un espectro de absorción infrarrojo, el número de onda de un grupo funcional diatómico:
1. Aumenta al disminuir la constante de fuerza del enlace.
 2. Aumenta al aumentar la masa reducida.
 3. Aumenta al aumentar la constante de fuerza del enlace.
 4. Es independiente de la masa reducida.
167. La distancia cuadrática promedio que recorre una molécula en un líquido:
1. Es proporcional a la viscosidad del líquido.
 2. Tiene una relación inversamente proporcional al radio hidrodinámico de la molécula.
 3. Muestra una relación inversamente proporcional con la temperatura absoluta.
 4. Es dependiente del gradiente de concentración.

- 168. En una valoración yodimétrica empleando triyoduro como reactivo valorante, la estandarización previa de este reactivo se realiza con:**
1. Permanganato potásico.
 2. Dicromato potásico.
 3. Tiosulfato de sodio anhidro.
 4. Dióxido de cloro.
- 169. Al aumentar la fuerza iónica de una disolución donde se encuentran iones Ca^{2+} y Ag^+ , la variación del coeficiente de actividad de un ion con respecto al valor de 1 (comportamiento ideal) será:**
1. Mayor para el catión Ca^{2+} que para el catión Ag^+ .
 2. Menor para el catión Ca^{2+} que para el catión Ag^+ .
 3. Igual para ambos cationes.
 4. Al ser ionizaciones naturales, ninguno de los dos mostrará variación respecto al comportamiento ideal.
- 170. ¿Cuál es el mecanismo de toxicidad de la saxitoxina, sintetizada por algunos dinoflagelados?:**
1. Inhibición de la acetilcolinesterasa.
 2. Bloqueo de los canales de sodio dependientes de voltaje.
 3. Activación del receptor de glutamato.
 4. Antagonista de los receptores de glicina.
- 171. ¿Cuál de las siguientes enfermedades NO ocurre como consecuencia de la exposición crónica a asbestos?:**
1. Mesotelioma pleural.
 2. Fibrosis.
 3. Cáncer de pulmón.
 4. Enfisema.
- 172. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?:**
1. El flumazenilo está indicado para el diagnóstico diferencial del coma inducido por benzodiazepinas.
 2. La sobredosis de benzodiazepinas en presencia de alcohol puede causar una depresión respiratoria potencialmente mortal.
 3. El flumazenilo es un antagonista no competitivo del receptor benzodiazepínico.
 4. El flumazenilo se utiliza para revertir el efecto sedante de las benzodiazepinas usadas en intervenciones quirúrgicas menores.
- 173. ¿Cuáles de los siguientes tratamientos serían recomendables en el caso de una intoxicación con pesticidas organofosforados?:**
1. Neostigmina y piridoxina.
 2. Diazepam y acetilcolina.
 3. Atropina y pralidoxima.
 4. Clorpromazina y sales de calcio.
- 174. ¿Qué tratamiento se utiliza para revertir el efecto de agentes metahemoglobinizantes?:**
1. Azul de metileno.
 2. Hidroxibalaminas.
 3. Deferoxamina.
 4. Tiamina.
- 175. La síntesis de Strecker de α -aminoácidos (tratamiento con NH_3 y HCN seguido de hidrólisis) parte de:**
1. Ácidos α -bromocarboxílicos.
 2. Acilaminomalonatos de dietilo.
 3. Alfa-cetoácidos.
 4. Aldehídos.
- 176. En relación con la tautomería, indique cuál de las afirmaciones siguientes es correcta:**
1. Los tautómeros de las cetonas son formas resonantes.
 2. Los tautómeros de las cetonas presentan similar estabilidad.
 3. La tautomería de las cetonas puede ser catalizada por ácidos y bases.
 4. La reactividad de los tautómeros de una cetona es similar.
- 177. ¿Cuál de los compuestos siguientes podría dar una reacción de sustitución nucleofílica aromática al ser tratado con NaOH acuoso?:**
1. 2,4,6-Trinitroclorobenceno.
 2. 2,4,6-Trimetilbromobenceno.
 3. 3,5-Dimetoxifluorobenceno.
 4. 3-Amino-5-nitroclorobenceno.
- 178. ¿Cuál de los siguientes compuestos presenta mayor acidez?:**
1. Acetaldehído.
 2. Metanol.
 3. 2,4-Pentanodiona.
 4. Acetato de etilo.
- 179. El O_2 y O_3 son ejemplos de:**
1. Isótopos.
 2. Alótopos.
 3. Isómeros.
 4. Confórmeros.

180. Dadas las siguientes especies:

a) CO_3^{2-} b) SO_2 c) CCl_4 d) CO

Señale cuales presentan hibridación sp^2 en el átomo central:

1. a y b.
2. b y d.
3. b y c.
4. a.

181. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referentes a la molécula de trifluoruro de boro es correcta?:

1. La molécula es polar.
2. La geometría molecular es piramidal trigonal.
3. Todos los enlaces de esta molécula son polares.
4. El BF_3 es una base de Lewis.

182. Dadas las especies: H , He^+ y Li^{2+} , la energía necesaria para arrancar un electrón de cada una de ellas:

1. Sería la misma ya que son isoelectrónicos.
2. Sería mayor en el Li^{2+} .
3. Sería mayor en el H .
4. Sería mayor en el He^+ .

183. Una odds:

1. Es el cociente entre la probabilidad de ocurrencia de un suceso y la probabilidad de no ocurrencia de dicho suceso.
2. Expresa la frecuencia relativa de un suceso en tantos por uno.
3. Es una tasa que incluye el factor tiempo.
4. Es la probabilidad de que ocurra un suceso.

184. ¿En cuál de los siguientes casos se comete un error de tipo I en una prueba de hipótesis?:

1. Cuando se acepta la hipótesis nula siendo verdadera la hipótesis nula.
2. Cuando se acepta la hipótesis nula siendo verdadera la hipótesis alternativa.
3. Cuando se rechaza la hipótesis nula siendo verdadera la hipótesis nula.
4. Cuando se rechaza la hipótesis nula siendo verdadera la hipótesis alternativa.

185. Un gráfico de violín:

1. Es una figura musical relativa al instrumento homónimo.
2. Es una distribución armonizada de dos variables cualitativas con similar dispersión.
3. Es una distribución armonizada de dos variables cuantitativas con similar dispersión.
4. Es una combinación de un diagrama de cajas y la gráfica de densidad de probabilidad de una variable determinada.

186. En una regresión logística simple:

1. La variable dependiente es siempre binaria.
2. La variable dependiente es siempre cuantitativa.
3. La variable independiente es siempre binaria.
4. La variable independiente es siempre cuantitativa.

187. Si una prueba diagnóstica tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 95%:

1. Su valor predictivo positivo es del 0%.
2. Su valor predictivo positivo es del 100%.
3. Su valor predictivo negativo es del 0%.
4. Su valor predictivo negativo es del 100%.

188. La prueba U de Mann-Whitney se usa para comparar:

1. Dos muestras independientes que cumplen criterios de normalidad.
2. Dos muestras independientes que no cumplen criterios de normalidad.
3. Dos muestras apareadas que cumplen criterios de normalidad.
4. Dos muestras apareadas que no cumplen criterios de normalidad.

189. En ensayos clínicos con menores ¿a partir de qué edad, además del consentimiento de los padres o representantes legales, debe prestar consentimiento el sujeto?:

1. 12 años.
2. 14 años.
3. 16 años.
4. 18 años.

190. ¿Cuál de los siguientes errores de medicación se considera reacción adversa a medicamentos y se debe notificar al Sistema Español de Farmacovigilancia?:

1. Cualquier fallo terapéutico por omisión del tratamiento.
2. Cualquier error de administración de un medicamento por un profesional sanitario.
3. Cualquier error de administración de un medicamento por el propio paciente.
4. Cualquier error que ocasiona daño al paciente.

191. ¿Cuál de las siguientes definiciones de estudio observacional con medicamentos es correcta?:

1. Investigación en la que la decisión de prescribir los medicamentos en investigación se toma junto con la de incluir al sujeto en el estudio clínico.
2. Investigación que implique la recogida de datos individuales relativos a la salud de personas con el fin de obtener información sobre los patrones de utilización de los medicamentos en la población.
3. Investigación en la que se aplican procedimientos de diagnóstico o seguimiento a los sujetos de ensayo que van más allá de la práctica clínica habitual.
4. Investigación destinada a descubrir o comprobar los efectos clínicos, farmacológicos o demás efectos farmacodinámicos de uno o más medicamentos.

192. ¿Qué situación no está recogida en el Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, que regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales?:

1. El acceso a medicamentos de uso compasivo.
2. El acceso a medicamentos en fase de investigación clínica en el contexto de un ensayo clínico.
3. El acceso a medicamentos no autorizados en España siempre que estén legalmente comercializados en otros Estados.
4. El acceso a medicamentos autorizados cuando se utilicen en condiciones distintas a las autorizadas, que en todo caso tendrá carácter excepcional.

193. Ningún medicamento puede comercializarse en España sin la autorización previa de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Si el solicitante, que no dispone de autorización de comercialización comunitaria, presenta su solicitud de autorización de forma simultánea en varios países de la Unión Europea, nos referimos a un procedimiento de autorización:

1. Descentralizado.
2. Reconocimiento mutuo.
3. Centralizado.
4. Multinacional.

194. Si desarrollamos un animal *knock-out* para el componente C4 del sistema del Complemento, ¿cuál de los siguientes procesos no podrá efectuarse?:

1. Formación de anafilotoxinas.
2. Formación del complejo de ataque a membrana (MAC).
3. Formación de la C3 convertasa de la vía de las lectinas.
4. Formación de la C3 convertasa de la vía alternativa.

195. ¿Cuál de las siguientes moléculas participa en la señalización y activación de los linfocitos T, constituyendo la segunda señal de activación?:

1. CD3.
2. CD4 y CD8.
3. CD5.
4. CD28.

196. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre las inmunodeficiencias (IDs) es INCORRECTA:

1. Las IDs que afectan a los mecanismos de fagocitosis van asociadas de forma frecuente a infecciones por bacterias extracelulares.
2. Las IDs de proteínas del sistema del complemento provocan una mayor incidencia de infecciones víricas.
3. La severidad de las IDs causadas por linfocitos B depende del isotipo de Ig afectado.
4. Las IDs primarias son congénitas y las secundarias son inducidas por agentes externos.

197. La activación de las células B para producir anticuerpos de alta afinidad requiere la unión del antígeno por el receptor de célula B (BCR):

1. Como contacto directo con una célula T cooperadora CD8+ activada en el timo.
2. Como contacto directo con una célula T cooperadora CD4+ activada en el timo.
3. Como contacto directo con una célula T cooperadora CD4+ activada en el ganglio linfático.
4. Como contacto directo con una célula T cooperadora CD8+ activada en el ganglio linfático.

198. Ingres en la UCI un paciente hematológico con fiebre, hipotensión y distrés respiratorio, requiriendo del uso de noradrenalina y de ventilación mecánica para mantener las constantes en rango. Ocurre después de la administración de un nuevo anticuerpo monoclonal biespecífico. ¿Qué síndrome es más probable en este paciente?:

1. Síndrome serotoninérgico.
2. Síndrome de liberación de citocinas.
3. Síndrome neuroléptico maligno.
4. Síndrome de tipo DRESS (reacción de sensibilidad a medicamentos con eosinofilia y síntomas sistémicos).

- 199. La reacción en el centro germinal es una parte importante del desarrollo dependiente de antígeno de los linfocitos B. ¿Mediante cuáles de los mecanismos siguientes se produce?:**
1. La expansión clonal, la proliferación, el cambio de clase de inmunoglobulina y la exclusión alélica.
 2. La hipermutación somática, la edición del TCR, el cambio de isotipo y la diferenciación.
 3. La expansión clonal, el cambio de isotipo, la hipermutación somática y la diferenciación.
 4. La hipermutación somática, el reordenamiento del segmento variable del BCR y la activación de los linfocitos B.
- 200. Indique la respuesta correcta sobre el uso de anticuerpos unidos a fármacos en inmunoterapia antitumoral:**
1. Supone una ventaja, ya que los anticuerpos son proteínas muy resistentes al pH del estómago y previenen la desnaturalización del fármaco.
 2. Supone una ventaja, ya que usa la especificidad de los anticuerpos para que la acción del fármaco se ejerza sobre las células a las que se une el anticuerpo.
 3. A pesar de presentar bastantes beneficios, presentan una desventaja, ya que los anticuerpos presentan reactividad cruzada asociada y se pueden unir tanto al tejido canceroso como al tejido sano.
 4. Supone una ventaja, ya que la generación y purificación de los anticuerpos es muy sencilla y por tanto el coste del tratamiento es bajo.
- 201. ¿Cuál de las siguientes modificaciones en la estructura de las tetraciclinas aumenta su estabilidad sin pérdida de actividad biológica?:**
1. Sustitución del grupo amida en posición 2 por un nitrilo.
 2. Eliminación del grupo hidroxilo en la posición 6.
 3. Introducción de grupos alquilo voluminosos en el nitrógeno amídico.
 4. Eliminación de un agrupamiento β -hidroxicarbonilo.
- 202. ¿Cuál de los siguientes microorganismos se transmite por mordedura de rata?:**
1. *Streptobacillus moniliformis*.
 2. *Bartonella bacilliformis*.
 3. *Rickettsia typhi*.
 4. *Coxiella burnetii*.
- 203. En una unidad de urgencias pediátricas se emplea de rutina como solución de mantenimiento un suero glucosalino 1/3 (contiene glucosa al 3,3% y NaCl 0,3%; o lo que es lo mismo, glucosa 183 mmol/L y NaCl 51 mmol/L). ¿Cuál es la afirmación correcta con respecto a este suero?:**
1. Es hiposmótico con respecto al plasma humano.
 2. Es hiperosmótico con respecto al plasma humano.
 3. Es hipertónico con respecto al plasma humano.
 4. Es isosmótico con respecto al plasma humano.
- 204. ¿Cuál de los siguientes antiviricos está indicado solo en profilaxis de la reactivación del citomegalovirus (CMV) y no en el tratamiento de la enfermedad causada por este virus en pacientes receptores de un trasplante?:**
1. Foscarnet.
 2. Letermovir.
 3. Cidofovir.
 4. Valganciclovir.
- 205. Señale la opción correcta en relación a los fosfoglicéridos:**
1. El factor activador de plaquetas pertenece a esta clase.
 2. Son lípidos insaponificables si tienen carga neta neutra, y saponificables si negativa.
 3. El fosfatidilinositol, que se encuentra libre en el citoplasma celular, es un importante precursor de segundos mensajeros intracelulares.
 4. La cardiolipina es el principal componente de la membrana plasmática del músculo cardíaco estriado.
- 206. ¿Cuál de los siguientes antibióticos es inactivado por el surfactante pulmonar?:**
1. Ceftriaxona.
 2. Levofloxacino.
 3. Linezolid.
 4. Daptomicina.
- 207. ¿Cuál de los siguientes emparejamientos entre fármaco antidiabético y efecto adverso es INCORRECTO?:**
1. Insulina - hipoglucemia.
 2. Sulfonilureas - pérdida de peso.
 3. Biguanidas - náuseas y diarrea.
 4. Glitazonas - retención de fluidos y edemas.

208. Los llamados inhibidores mixtos son un tipo de inhibidores enzimáticos. Con respecto a estos:

1. Se denominan así en referencia a que pueden unirse al mismo sitio que el sustrato o a otro diferente.
2. Afectan a la K_m aparente, pero no a la velocidad máxima (V_{max}).
3. En la práctica, sólo se observan en enzimas con un único sustrato.
4. Pueden provocar un aumento o disminución de la K_m aparente según sea la forma del enzima a la que más fuertemente se une el inhibidor.

209. El índice de masa corporal:

1. Es una proporción.
2. Es una odds.
3. Es una tasa.
4. Es una razón.

210. En un método analítico, la concordancia entre el valor medido y el valor real se relaciona con la siguiente propiedad analítica:

1. La selectividad.
2. La precisión.
3. La exactitud.
4. La sensibilidad.

