




**Università degli Studi di Milano**  
**CORSO DI LAUREA IN SCIENZE NATURALI**  
Corso di Biologia generale e ambientale con elementi di istologia

# **COMPONENTI CHIMICI DI CELLULE E TESSUTI**

## **Citologia e Istologia – Capitolo 1**



Anno accademico  
2022-2023


# Livelli di studio della Biologia

Lo studio della vita si estende dalla **scala microscopica** (molecole e cellule che compongono gli organismi) alla **scala macroscopica** (intero pianeta vivente).

È possibile dividere questo enorme intervallo di scala in diversi livelli di organizzazione biologica, all'interno di una gerarchia.


La biologia è lo studio della vita a tutti i livelli di organizzazione, dalle molecole alla biosfera.

Ogni livello dell'organizzazione della vita presenta specifiche **proprietà emergenti**, cioè caratteristiche che non sono presenti ai livelli inferiori.



# COMPONENTI CHIMICI DELLE CELLULE

**La tavola periodica raggruppa gli elementi secondo le loro proprietà fisiche e chimiche.**

[illegible]

# COMPONENTI CHIMICI DELLE CELLULE

<div>1</div> <div>H</div> <div>1</div> <div>numero atomico</div> <div>massa atomica</div>																	He	
Li	Be																	Ne
11 Na 23	12 Mg 24																	Ar
19 K 39	20 Ca 40	Sc	Ti	23 V 51	24 Cr 52	25 Mn 55	26 Fe 56	27 Co 59	28 Ni 59	29 Cu 64	30 Zn 65	Ga	Ge	As	34 Se 79	Br	Kr	
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	42 Mo 96	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	53 I 127	Xe	
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn	
Fr	Ra	Ac	Rf	Ha														

 **Essenziali abbondanti**

### ■ Essenziali minori




**Oligoelementi**

- La materia è costituita da elementi. Un **ELEMENTO** è una sostanza che non può essere suddivisa in sostanze più semplici per mezzo di reazioni chimiche ordinarie.
- Dei 92 elementi naturali, 25 sono essenziali per la vita, di cui **C, O, H e N** costituiscono ~ il **96% del peso** di un organismo, mentre **Ca, P, K, S, Na, Cl e Mg** ~ il **4%**.
- **Elementi traccia** o **oligoelementi**: elementi necessari a un organismo in quantità estremamente basse (<0,01%).

# ATOMI

## RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DEGLI ATOMI



Gli **elettroni** sono carichi negativamente e sono presenti nello stesso numero dei protoni. Essi ruotano attorno al nucleo rimanendo confinati all'interno di livelli energetici definiti **orbitali**


L'atomo si definisce in base al numero di massa e al numero atomico: il **numero di massa** è la somma del numero di neutroni e protoni presenti nel nucleo; il **numero atomico** è il numero di protoni, che, in condizioni di stabilità, corrisponde al numero di elettroni.

**Isotopi** di uno stesso elemento hanno lo stesso numero di protoni ed elettroni, mentre varia il numero di neutroni.

**Più atomi legati tra loro formano le MOLECOLE**

# ELEMENTI E ISOTOPI

- Tutti gli atomi di un elemento contengono lo stesso numero di protoni, tuttavia gli elementi presenti in natura sono costituiti da una miscela di atomi che hanno un numero diverso di neutroni e perciò una massa differente → **ISOTOPI**
- Isotopi di uno stesso elemento hanno lo **stesso numero di protoni ed elettroni**, ma **diverso numero di neutroni**.
- Tutti gli isotopi di un elemento hanno le **stesse caratteristiche chimiche**.
- Alcuni isotopi, chiamati **ISOTOPI RADIOATTIVI**, sono instabili e tendono a decadere spontaneamente emettendo particelle ed energia = **decadimento radioattivo**
- Se cambia il numero di protoni, l'atomo si trasforma in un elemento diverso.







# ELEMENTI E ISOTOPI

- Il **PESO ATOMICO** o **MASSA ATOMICA** di un elemento è la **media pesata** dei numeri di massa di tutti gli isotopi in natura.

P.es., peso atomico del C = 12.011; peso atomico dell'H = 1.0079.

- L'energia liberata dal decadimento radioattivo può interagire con la materia circostante → **UTILIZZO DEI RADIOISOTOPI**:

- **traccianti per seguire gli atomi attraverso il metabolismo**; i radioisotopi possono essere incorporati nelle molecole e agire come “etichette” che permettono ai ricercatori e ai medici di seguire il destino di tali molecole e qualsiasi cambiamento esse subiscano all'interno dell'organismo
- **datazione radiometrica**, per datare l'età dei fossili e delle rocce: ogni isotopo radioattivo “genitore” decade in un isotopo “figlio” a una velocità costante, espressa dal tempo necessario perché il 50% di un radioisotopo decada (cioè, si trasformi in un elemento diverso), definito **emivita**.

P.es.,  $^{15}\text{O} = 2 \text{ min}$ ;  $^{13}\text{N} = 10 \text{ min}$ ;  $^{132}\text{I} = 2.4 \text{ ore}$ ;  $^{14}\text{C} = 5730 \text{ anni}$ ;  
 $^{235}\text{U} = 704 \text{ milioni di anni}$ ;  $^{238}\text{U} = 4.5 \text{ miliardi di anni}$ .




# ELEMENTI E ISOTOPI

In medicina i radioisotopi sono utilizzati sia per la diagnosi sia per la terapia.

**Es. Attività metabolica del cervello:**


**glucosio** marcato con un isotopo radioattivo permette di individuare differenze nell'attività cerebrale di una persona sana e di una che abusa di metamfetamina; più una regione del cervello è attiva, più zucchero essa ingloba.



Le radiazioni associate al decadimento radioattivo creano rischi per la vita, dato che possono danneggiare molecole e strutture cellulari. La gravità di questi danni per l'organismo dipende dal tipo e dalla quantità di radiazione assorbita.

# RAPPRESENTAZIONI SCHEMATICHE

- Quando il guscio di valenza **non è completo**, l'atomo tende a cedere, acquisire o condividere  $e^-$  per completare il guscio esterno.
- I gusci di valenza di tutti gli isotopi di uno stesso elemento sono uguali: è per questo che essi hanno proprietà chimiche uguali e possono sostituirsi tra loro nelle reazioni chimiche.




**NUMERO ATOMICO = numero di protoni nel nucleo**  
**NUMERO DI MASSA  $\approx$  PESO ATOMICO**


# ELETTRONI E LEGAMI CHIMICI

Il comportamento chimico di un atomo dipende principalmente dal n° di e<sup>-</sup> presenti nel suo livello più esterno o **guscio di valenza**

**Gli atomi reattivi raggiungono la stabilità condividendo e<sup>-</sup> con altri atomi oppure cedendo o acquistando uno o più e<sup>-</sup>.**



# ELEMENTI E ATOMI



La combinazione, in un rapporto fisso, di due o più elementi diversi porta alla formazione di un **COMPOSTO**, che ha caratteristiche diverse da quelle degli elementi che lo costituiscono.


Ad es., il sale da cucina è il cloruro di sodio (NaCl), un prodotto commestibile, in cui il sodio metallico si combina nel rapporto di 1:1 con il cloro, un gas velenoso.

# COMPONENTI CHIMICI DI CELLULE E TESSUTI

## DAGLI ATOMI ALLE MOLECOLE – LEGAMI CHIMICI

I **legami chimici** sono le interazioni tra atomi che portano alla formazione di molecole.


**ATOMI**



**MOLECOLE**



**Virus**



**Batteri**



**Cellule eucariote**



**LEGAMI FORTI**

**LEGAMI DEBOLI**

**LEGAME COVALENTE**


**LEGAME IONICO**

**LEGAME METALLICO**

**FORZE DI VAN DER WAALS**

**LEGAME IDROGENO**

**INTERAZIONI IDROFOBE**




**molecole  
biologiche**






# LEGAME COVALENTE & LEGAME IONICO



**LEGAME COVALENTE**

**= LEGAME FORTE**




**LEGAME IONICO**

**= LEGAME DEBOLE**



# LEGAME COVALENTE & LEGAME IONICO

## LEGAME COVALENTE PURO O NON POLARE O APOLARE



**NON polare**


Elettroni messi in comune

**cloro Cl-Cl o  $\text{Cl}_2$**

**CONDIVISIONE  
DI ELETTRONI**

**Elettroni messi in  
condivisione a  
distanza identica  
tra i due atomi**

## LEGAME IONICO (DEBOLE)




**TRASFERIMENTO  
DI ELETTRONI**

**cloruro di  
sodio NaCl**

# ATOMI


## RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DEGLI ATOMI



11

**Sodium**

Na



Atomic mass: 22.989


Electron configuration: 2, 8, 1

**ATOMO DI SODIO**

17

**Chlorine**

Cl




Atomic mass: 35.45

Electron configuration: 2, 8, 7


**ATOMO DI CLORO**

**Più atomi legati tra loro formano le MOLECOLE**


# LEGAME IONICO



(A)



**Cristalli di NaCl  
osservati al microscopio**



(C)


1 mm

**Gli IONI sono  
particelle  
elettricamente  
cariche che si  
formano quando  
gli atomi  
acquistano o  
perdono  
uno o più  $e^-$ .**

**Quando un atomo interagisce con un altro atomo molto più elettronegativo,  
può avvenire un trasferimento completo di uno o più elettroni.**

# LEGAMI COVALENTI POLARI E APOLARI


- Gli atomi di elementi diversi differiscono per la loro affinità per gli elettroni.  
**ELETTRONEGATIVITÀ:** attrazione esercitata da un atomo sugli  $e^-$  di un legame
- **LEGAME COVALENTE APOLARE:** legame covalente tra due atomi dello stesso elemento o di elettronegatività simile, in cui gli  $e^-$  sono condivisi in maniera equivalente. Es.  $H_2$ ,  $O_2$ ,  $N_2$ ,  $CH_4$ .





# LEGAMI COVALENTI

## LEGAME COVALENTE POLARE (O ETEROPOLARE)




### LEGAME COVALENTE POLARE:

legame covalente tra due atomi con diversa elettronegatività, in cui gli  $e^-$  **NON** sono condivisi in maniera equivalente perché sono attratti maggiormente dall'atomo più elettronegativo. Tale legame ha due estremità (o poli) diverse, una con parziale carica positiva, l'altra con parziale carica negativa. Es.  $H_2O$

# LEGAMI COVALENTI

## LEGAME COVALENTE POLARE & NON POLARE


Elettroni messi  
in comune a  
distanza identica  
tra i due atomi



**STATO GASSOSO**

## LEGAME COVALENTE NON POLARE

Elettroni messi  
in comune a  
distanza diversa  
tra i due atomi



**STATO LIQUIDO**

## LEGAME COVALENTE POLARE




# LEGAMI COVALENTI

## LEGAMI COVALENTI SEMPLICI, DOPPI & TRIPLI


Un legame covalente può essere:

- **SEMPLICE** (o **singolo**) = condivisione di una singola coppia elettronica
- **DOPPIO** = condivisione di due coppie elettroniche
- **TRIPLIO** = condivisione di tre coppie elettroniche; quest'ultimo è raro (es., nell'azoto gassoso,  $N_2$ )

### LEGAME CARBONIO-CARBONIO SINGOLO



### LEGAME CARBONIO-CARBONIO DOPPIO




# COMPONENTI CHIMICI DI CELLULE E TESSUTI

## DAGLI ATOMI ALLE MOLECOLE – LEGAMI CHIMICI

I **legami chimici** sono le interazioni tra atomi che portano alla formazione di molecole.


**ATOMI**



**MOLECOLE**



**Virus**



**Batteri**



**Cellule eucariote**



**LEGAMI FORTI**

**LEGAMI DEBOLI**

**LEGAME COVALENTE**


**LEGAME IONICO**

**LEGAME METALLICO**

**FORZE DI VAN DER WAALS**

**LEGAME IDROGENO**

**INTERAZIONI IDROFOBE**



**molecole  
biologiche**


# LEGAMI DEBOLI

## FORZE DI VAN DER WAALS

Le **forze di van der Waals** possono essere attrattive o repulsive e si manifestano tra atomi di una stessa molecola o di molecole diverse, quando si trovano molto vicini tra loro, senza che vi sia la formazione di un legame chimico.

Derivano dall'interazione elettrostatica tra le nubi elettroniche e i nuclei degli atomi coinvolti, che è modificata dalla presenza degli atomi delle molecole vicine, dall'ambiente circostante o dalle fluttuazioni elettroniche. Abbiamo tre tipi di interazione:

- dipolo-dipolo (Interazione di Keesom)
- dipolo-dipolo indotto (Forza di Debye)
- dipolo istantaneo-dipolo indotto (Forza di London)



**Pur essendo piuttosto deboli (100-1000 volte meno di un legame ionico o covalente), le forze di van der Waals sono essenziali in molti processi biologici, come il ripiegamento delle catene amminoacidiche delle proteine.**

# LEGAMI DEBOLI

## INTERAZIONI IDROFOBE

Le **interazioni idrofobe** sono interazioni che contribuiscono a diminuire i contatti con l'acqua delle **molecole non polari (o idrofobe)**.

Esse si originano perché le molecole d'acqua tendono a formare interazioni più forti tra loro piuttosto che con molecole non polari.

Di conseguenza, le regioni non polari delle macromolecole biologiche tendono a sfuggire all'ambiente acquoso, nascondendosi all'interno delle macromolecole stesse.

L'interazione idrofoba non è quindi un vero e proprio legame.




**Pur essendo deboli, le interazioni idrofobe sono fondamentali in molti processi biologici, come il ripiegamento delle proteine, la formazione delle membrane cellulari e l'inserzione in membrana delle proteine.**



# LEGAMI DEBOLI

## INTERAZIONI IDROFOBE



**Molecole non polari (o idrofobe)**

Le **interazioni idrofobe** sono interazioni che contribuiscono a diminuire i contatti con l'acqua delle **molecole non polari (o idrofobe)**.


Le **interazioni idrofobe** si originano perché le molecole di H<sub>2</sub>O tendono a formare interazioni più forti tra loro piuttosto che con molecole non polari. Di conseguenza, le regioni non polari delle macromolecole biologiche tendono a sfuggire all'ambiente acquoso, «nascondendosi» all'interno delle macromolecole stesse. L'interazione idrofoba non è quindi un vero e proprio legame.

**Pur essendo deboli, le interazioni idrofobe sono fondamentali in molti processi biologici, come il ripiegamento delle proteine, la formazione delle membrane cellulari e l'inserzione in membrana delle proteine.**

# LEGAMI DEBOLI

## LEGAME A IDROGENO


Il legame a idrogeno si forma quando un atomo di H è vicino a un atomo che attrae elettroni, es: OSSIGENO o AZOTO.




► Il legame a idrogeno (debole) ha una forza pari a 1/20 rispetto a quella di un legame covalente.

## ESEMPI DI MOLECOLE BIOLOGICHE

Gli **AMMINOACIDI** nelle proteine sono uniti (anche) da legami a idrogeno.



Le **BASI AZOTATE** negli acidi nucleici (DNA e negli RNA) sono legate da legami a idrogeno. Nell'esempio Guanina e Citosina.






# ACQUA

## L'ACQUA COME SOLVENTE - MOLECOLE IDROFILE & IDROFOBE

Grazie alla sua polarità, l'acqua è un solvente per le sostanze polari o idrofile




Il comportamento di solvente dell'acqua è determinato dalla **polarità** della sua molecola: quando un **composto ionico o polare** è disciolto in acqua, è circondato dalle molecole di acqua, che si inseriscono tra uno ione e l'altro o tra una molecola e l'altra di soluto, orientandosi così da presentare agli ioni del soluto la porzione che reca la carica opposta.

**Le sostanze ioniche o polari sono solubili in acqua, mentre non sono solubili in acqua le sostanze non polari.**

# ACQUA


## L'ACQUA COME SOLVENTE - MOLECOLE IDROFILE & IDROFOBE

### COMPOSTI IONICI (idrofili)



I COMPOSTI IONICI (es: NaCl) si dissolvono perché le molecole d'acqua sono attratte dallo ione positivo e dallo ione negativo, sono quindi definiti IDROFILI.

### MOLECOLE NON POLARI (idrofobe)



### MOLECOLE POLARI (idrofile)




Le MOLECOLE POLARI (es: urea) si dissolvono perché le molecole d'acqua formano con loro i legami a idrogeno, sono perciò IDROFILE.

Le MOLECOLE NON POLARI non si dissolvono perché non formano interazioni con le molecole d'acqua, sono perciò IDROFOBE e non solubili in acqua.


# LE FORME DELL'ACQUA

ghiaccio




Nel ghiaccio, le molecole di acqua sono mantenute in posizioni fisse da legami a idrogeno.

H<sub>2</sub>O liquida




I legami a idrogeno si formano e si rompono continuamente allo spostarsi delle molecole di acqua.

vapore



Nel suo stato gassoso l'acqua non forma legami a idrogeno.




**Il ghiaccio è meno denso (~10%) dell'H<sub>2</sub>O liquida, ecco perché il ghiaccio galleggia e l'H<sub>2</sub>O si espande quando congela. La densità dell'H<sub>2</sub>O è massima a 4°C.**

**Nel ghiaccio ogni molecola è legata a 4 molecole vicine da legami a idrogeno stabili, formando un cristallo tridimensionale. Tuttavia, le molecole di H<sub>2</sub>O non sono così strettamente impacchettate come lo sono nell'H<sub>2</sub>O liquida e nel cristallo sono presenti ampi spazi. A parità di volume il ghiaccio possiede un numero di molecole inferiore rispetto all'acqua liquida.**

# PROPRIETÀ DELL'ACQUA e LEGAMI A IDROGENO

- **Coesione:** capacità delle molecole di acqua di opporsi alla separazione le une dalle altre quando sono sottoposte a tensione.
- **Elevata tensione superficiale**
- **Elevato punto di ebollizione**
- **Elevato calore specifico:** quantità di calore che 1 g di una sostanza deve assorbire o perdere affinché la sua temperatura aumenti o diminuisca di 1°C. L'elevato calore specifico conferisce all'acqua la sua capacità di stabilizzare la temperatura → l'acqua è un buon isolante.
- **Elevato calore di evaporazione:** quantità di energia che 1 g di un liquido deve assorbire per convertirsi allo stato di vapore.




**Tensione superficiale.**






# PROPRIETÀ DELL'ACQUA e LEGAMI A IDROGENO

(a) L'acqua a temperatura ambiente è un liquido.





(b) L'acqua è una molecola polare.


Si formano legami a idrogeno tra atomi parzialmente carichi con polarità opposta.



CH<sub>4</sub> e CO<sub>2</sub> non posseggono atomi parzialmente carichi, e pertanto non formano legami a idrogeno.



(c) L'acqua in fase liquida è molto più densa che nella sua fase solida (ghiaccio).



Quando l'acqua in fase liquida è raffreddata a sufficienza per formare un solido (ghiaccio), questo è meno denso, quindi galleggia sull'acqua liquida.

Se il CH<sub>4</sub> e la CO<sub>2</sub> liquidi fossero raffreddati a sufficienza per formare solidi, si depositerebbero sul fondo della fase liquida.


# PROPRIETÀ DELL'ACQUA e LEGAMI A IDROGENO

(d) L'acqua ha un elevato calore specifico ed è un buon isolante.




Ci vuole più energia termica per alzare la temperatura dell'acqua rispetto a quella che è necessaria per aumentare la temperatura del  $CH_4$  o della  $CO_2$ .

(e) L'acqua ha un elevato calore di evaporazione.





# ACQUA E pH




- In soluzione, l' $\text{H}_2\text{O}$  pura ha una leggera ma costante tendenza a ionizzarsi.
- In ogni momento si trova dissociata una molecola su ~500 milioni. La reazione è reversibile e all'equilibrio.
- La concentrazione dei due ioni  $\text{H}_3\text{O}^+$  ( $\text{H}^+$ ) e  $\text{OH}^-$  in  $\text{H}_2\text{O}$  pura, a  $25^\circ\text{C}$ , è  $10^{-7}$  M. Questa soluzione è detta **NEUTRA**.

# ACIDI, BASI e pH

## SOLUZIONI ACIDE, NEUTRE e BASICHE

Una sostanza che in soluzione acquosa libera ioni idrogeno ( $H^+$ ) si definisce **ACIDO**  
una sostanza che in soluzione acquosa libera ioni idrossido ( $OH^-$ ) si definisce **BASE**.



L'acqua distillata (priva di sali disciolti) si dissocia secondo la reazione:



Questa reazione di dissociazione è molto lenta e la quantità di molecole dissociate è molto piccola. Nell'acqua pura a  $25^\circ C$ , la concentrazione degli ioni idronio e ossidrile è:

$$[H_3O^+] = [OH^-] = 1 \times 10^{-7} \text{ mol/l (M)}$$

Poiché l'aggiunta di un acido o di una base nell'acqua alza o abbassa la concentrazione degli ioni  $H_3O^+$ , si prende come misura dell'acidità o della basicità di una soluzione il valore della concentrazione di tali ioni:

- **soluzione acida** quando  $[H_3O^+] > 10^{-7} \text{ M}$
- **soluzione neutra** quando  $[H_3O^+] = 10^{-7} \text{ M}$
- **soluzione basica (o alcalina)** quando  $[H_3O^+] < 10^{-7} \text{ M}$ .

**Per indicare l'acidità o l'alcalinità di una soluzione si utilizza il pH.**


# ACIDI, BASI e pH

## SOLUZIONI ACIDE, NEUTRE & BASICHE

Per indicare l'acidità o l'alcalinità di una soluzione si utilizza il **pH**, il logaritmo decimale inverso della concentrazione degli ioni  $H^+$


$$pH = -\log_{10} [H^+]$$

Il pH di una soluzione si può misurare utilizzando uno strumento chiamato pH-metro, che ha una scala graduata in valori di pH



# ACIDI, BASI e pH

## pH DEL SANGUE E DEI FLUIDI BIOLOGICI



sangue	pH 7.35 - 7.45
lacrime	pH 7.4 circa
saliva	pH 6.35 - 6.85
succhi gastrici	pH 0.9
urina	pH 4.4 - 8.0
latte	pH 6.6 - 6.9

► I pH dei fluidi biologici devono restare COSTANTI in determinati intervalli di valori per non andare incontro a pericolose patologie.

Il pH del sangue deve essere il più possibile costante, altrimenti si possono manifestare:

- coma acidotico (pH < 7.0) → esito fatale
- tetania alcalotica (pH > 7.8) → iperattività nervosa, convulsioni.


Le attività vitali sono compatibili solo con minime variazioni del pH dei liquidi biologici intra-ed extracellulari. Questi sono dotati di sistemi di regolazione del pH, i **SISTEMI TAMPONE**, che attenuano le variazioni di pH dovute ad alterazioni metaboliche o respiratorie o al contatto diretto con acidi e basi.

**Le cellule sono immerse in una soluzione acquosa a pH controllato e costante (soluzione tampone)**

# I TAMPONI MINIMIZZANO I CAMBIAMENTI DI pH

**TAMPONE:** sostanza, o insieme di sostanze, che minimizza le variazioni di  $[H^+]$  e  $[OH^-]$  in soluzione: si oppone alle variazioni di pH dovute all'aggiunta di un acido o una base, assorbendo o rilasciando  $H^+$ . Un sistema tampone è costituito da un acido o una base debole.

➡ *Tutti gli organismi contengono molti **tamponi naturali** che minimizzano i cambiamenti di pH.*





# ACIDI, BASI e pH

## SISTEMI TAMPONE:

Le soluzioni tampone contengono miscele di soluti che impediscono variazioni di pH in seguito all'aggiunta di moderate quantità di acidi e di basi forti.

Esse contengono, in concentrazioni circa uguali, un **ACIDO DEBOLE** e la sua base coniugata oppure una **BASE DEBOLE** e il suo acido coniugato.

Consideriamo una soluzione costituita da **acido acetico** e **acetato di sodio**.

L'acetato di sodio è completamente dissociato in acqua :



L'acido acetico, che è un acido debole, si dissocia secondo il seguente equilibrio:



Gli ioni  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  provenienti dalla dissociazione dell'acetato di sodio spostano l'equilibrio di dissociazione dell'acido acetico a sinistra.


Aggiungiamo piccole quantità di un acido forte (ioni  $\text{H}^+$ ) e dovrebbe abbassare il pH della soluzione. Tuttavia, gli ioni  $\text{H}^+$  vengono "catturati" dallo ione  $\text{CH}_3\text{COO}^-$ , formando altro acido acetico non dissociato:



**Il pH NON si abbassa**

Aggiungiamo piccole quantità di una base forte (NaOH) che si dissocia completamente:  $\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$

Gli ioni  $\text{OH}^-$  che così si liberano dovrebbero alzare il pH della soluzione, ma vengono "catturati" dalle molecole di  $\text{CH}_3\text{COOH}$  presenti, formando acqua secondo la reazione:




**Il pH NON si alza**

Anche in questo caso il pH rimane pressoché invariato, perché la quantità di  $\text{H}^+$  varia pochissimo, dato che gli ioni ossidrile liberati dalla base forte sono neutralizzati.



ione bicarbonato / acido carbonico


Proteine



idrogeno fosfato/diidrogenofosfato

# ACQUA

## COMPOSIZIONE CHIMICA DELLE CELLULE



# MOLECOLE ORGANICHE DELLE CELLULE

## QUATTRO CLASSI PRINCIPALI

Componenti base semplici  
delle cellule (MONOMERI)

ACIDI GRASSI

MONOSACCARIDI

AMMINOACIDI

NUCLEOTIDI

Componenti base complessi  
delle cellule (POLIMERI)

LIPIDI/GRASSI


POLISACCARIDI

PROTEINE

ACIDI NUCLEICI



**CONDENSAZIONE**



**IDROLISI**