$C_L \longrightarrow C_L \cdot \pi^t = \pi^{tt} C$

$C_L \cdot \mathrm{diag}(\pi^t / \pi^L) = C_U$

$C_L \cdot \mathrm{diag}(\pi^{tr}) = T_L$

~~$T_L \cdot \mathrm{diag}($~~

$\mathrm{diag}(\pi^{tr}) \; C \; \mathrm{diag}(\pi^{tr})$

$T_L \qquad T_U$

$\left\| \hat{C}^{(L)} - \hat{C}^{(U)} \right\|_2 \longrightarrow$ sample error.

$C = C^1$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \leftarrow \begin{pmatrix} \alpha & \alpha & \alpha \\ \alpha & \alpha & \alpha \\ \alpha & \alpha & \alpha \end{pmatrix} + \beta I$

$\begin{pmatrix} 0'34 & 0'33 \\ 0'33 & 0'34 \\ 0'33 & 0'32 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 0'98 & & \\ & 0'98 & \\ & & 0'97 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 0'7 & & \\ & 0'7 & \\ & & 0'6 \end{pmatrix}$



$C(\pi + \nu) = C\pi$

$C' \quad C$

$d^T(\pi + \nu) \neq d^T \pi$



$\pi + \nu$


π_1

$\begin{pmatrix} 0'98 & & \\ & 0'9 & \\ & & 0'7 \end{pmatrix}$

π_2

$\begin{pmatrix} 0'9 & & \\ & 0'9 & \\ & & 0'8 \end{pmatrix}$

$d^T \nu \neq 0$



- Trade-off Tr / Val
- Sampling - size
- Metodi (Bay-KDE, Bay-SQS)
- Transductive?
- Analisi errori.
- Measures. (F1)
- Prior Informative.

