

7. Which of the following are correct calculations for difference quotient of:

$$c(t) = 8t^2 + 2t + 6$$

$$c(t) = 8t^2 + 2t + 6$$

$$c(t+h) = 8(h+t)^2 + 2(h+t) + 6$$

$$= 8h^2 + 16ht + 2h + 8t^2 + 2t + 6$$

$$\frac{c(t+h) - c(t)}{h} = \frac{(8h^2 + 16ht + 2h + 8t^2 + 2t + 6) - (8t^2 + 2t + 6)}{h}$$

$$= \frac{8h^2 + 16ht + 2h}{h}$$

$$= \frac{h(8h + 16t + 2)}{h}$$

$$= 8h + 16t + 2$$

$$c(t) = 8t^2 + 2t + 6$$

$$c(t+h) = 8(h+t)^2 + 2(h+t) + 6$$

$$= 8h^2 + 16ht + 18h + 8t^2 + 18t + 16$$

$$\frac{c(t+h) - c(t)}{h} = \frac{(8h^2 + 16ht + 18h + 8t^2 + 18t + 16) - (8t^2 + 2t + 6)}{h}$$

$$= \frac{8h^2 + 16ht + 2h}{h}$$

$$= \frac{h(8h + 16t + 2)}{h}$$

$$= 8h + 16t + 2$$

$$c(t) = 8t^2 + 2t + 6$$

$$c(t+h) = 8(h+t)^2 + 2(h+t) + 6$$

$$= 8h^2 + 16ht + 2h + 8t^2 + 2t + 6$$

$$\frac{c(t+h) - c(t)}{h} = \frac{(8h^2 + 16ht + 2h + 8t^2 + 2t + 6) - (8t^2 + 2t + 6)}{h}$$

$$= \frac{8h^2 + 16ht + 2h}{h}$$

$$= \frac{h(8h + 16t + 2)}{h}$$

$$= 8h + 16t + 2$$

$$c(t) = 8t^2 + 2t + 6$$

$$c(t+h) = 8(h+t)^2 + 2(h+t) + 6$$

$$= 8h^2 + 16ht - 14h + 8t^2 - 14t + 12$$

$$\frac{c(t+h) - c(t)}{h} = \frac{(8h^2 + 16ht + 34h + 8t^2 + 34t + 42) - (8t^2 + 2t + 6)}{h}$$

$$= \frac{8h^2 + 16ht + 2h}{h}$$

$$= \frac{h(8h + 16(t+1) + 2)}{h}$$

$$= 8h + 16t + 2$$

Solution