

π 的计算

李青林,5110309074

郑辉煌,5110209289

1 实验任务1

从单位圆正方形开始，成倍增加边数，求 π 的近似值

设边数为 $4 \cdot 2^n$ 时，边长为 a_n

易得

$$a_{n+1} = \sqrt{\left(\frac{a_n}{2}\right)^2 + \left(1 - \sqrt{1 - \left(\frac{a_n}{2}\right)^2}\right)^2} = \sqrt{2 - \sqrt{4 - a_n^2}}$$

$4 \cdot 2^n$ 边型面积为

$$S_{n+1} = 4 \cdot 2^n \cdot \frac{1}{4} \cdot a_n = 2^n a_n \approx \pi$$

初始条件为 $a_0 = \sqrt{2}$

MATLAB代码:

```
function task1(n)
    a = zeros(1,100);
    a(1) = sqrt(2);
    for i = 2:n
        a(i) = sqrt(2-sqrt(4-a(i-1)^2));
    end
    pi = 2^n * a(n);
    vpa(pi,20)
end
```

n 取不同值时, π 的值

n	π
10	3.1415914215046352176
14	3.1415926548075892022
20	3.1415965537048196858

可以看出, 使用该方法得到的结果精度比较低, 并且由于计算过程中的误差积累, 反而导致迭代次数增加, 误差反而增加的事情发生

2 实验任务2

2.1

用反正切函数的幂级数展开式结合有关公式求 π , 若要精确到50位数字, 试比较简单公式和Machin公式所用的项数.

$$\arctan x = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$$

简单公式

$$\frac{\pi}{4} = \arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3}$$

展开, 变形得

$$\pi = 4 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{2n-1} \left(\frac{1}{2^{2n-1}} + \frac{1}{3^{2n-1}} \right)$$

MATLAB代码:

```
function task2_1(n)
    ret = 0; k = 1;
    for i=1:n
        ret = ret + k / (2 * i - 1) * ( 1 / 2^(2 * i - 1) ...
            + 1 / 3^(2 * i - 1));
        k = k * -1;
    end
    vpa(ret*4,50)
end
```

n	π
19	3.1415926535899427740616829396458342671394348144531
20	3.1415926535897932384626433832795028841971693993751

Machin公式

$$\frac{\pi}{4} = 4\arctan\frac{1}{5} - \arctan\frac{1}{239}$$

展开,变形得

$$\pi = 4 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{2n-1} \left(\frac{4}{5^{2n-1}} - \frac{1}{239^{2n-1}} \right)$$

MATLAB代码:

```
function task2_2(n)
    ret = 0; k = 1;
    for i=1:n
        ret = ret + k / (2 * i - 1) * ( 4 / 5^(2 * i - 1) ...
            - 1 / 239^(2 * i - 1));
        k = k * -1;
    end
    vpa(ret*4,50)
end
```

n	π
8	3.1415926535886029569155653007328510284423828125000
9	3.1415926535897932384626433832795028841971693993751

可以看出,要精确到50位,简单公式需要20项,而Marchin公式只需要9项,因此Marchin公式更精确

2.2

验证公式

$$\frac{\pi}{4} = \arctan\frac{1}{2} + \arctan\frac{1}{5} + \arctan\frac{1}{8}$$

试试用此公式右端作幂级数展开完成任务2.1所需的项数

$$\begin{aligned}
& \tan\left(\arctan\frac{1}{2} + \arctan\frac{1}{5} + \arctan\frac{1}{8}\right) \\
&= \frac{\frac{1}{2} + \tan\left(\arctan\frac{1}{5} + \arctan\frac{1}{8}\right)}{1 - \frac{1}{2} \cdot \tan\left(\arctan\frac{1}{5} + \arctan\frac{1}{8}\right)} \\
&= \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}} \\
&= 1 = \tan\frac{\pi}{4}
\end{aligned}$$

∴公式成立

对公式展开，变形得

$$\pi = 4 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{2n-1} \left(\frac{1}{2^{2n-1}} + \frac{1}{5^{2n-1}} + \frac{1}{8^{2n-1}} \right)$$

MATLAB代码:

```

function task2_3(n)
    ret = 0; k = 1;
    for i=1:n
        ret = ret + k / (2 * i - 1) * ( 1 / 2^(2 * i - 1) ...
        + 1 / 5^(2 * i - 1) + 1 / 8^(2 * i - 1));
        k = k * -1;
    end
    vpa(ret*4,50)
end

```

n	π
19	3.1415926535899427740616829396458342671394348144531
20	3.1415926535897932384626433832795028841971693993751

要精确到50位，该公式需要20项，和简单公式相同。原因是

$$\arctan\frac{1}{5} + \arctan\frac{1}{8} = \arctan\frac{1}{3}$$

3 实验任务3

用数值积分计算 π ,分别用梯形法和Simpson法精确到10位数字,用Simpson法精确到15位数字.

$$4 \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \pi$$

梯形公式MATLAB代码:

```
function task3_1(n)
    x=0:1/n:1;
    y=1./(1+x.^2);
    s=2*sum(y)-1-0.5;
    2*s/n
end
```

$n = 100000$, 结果为3.141592653589588

即要精确到10位, 需要划分100000个区间

Simpson公式MATLAB代码:

```
function task3_2(n)
    x = 0:1/n:1; m = length(x); s = 0;
    for i = 1:m-1
        s = s + (x(i+1)-x(i)) / 6 * (1 / (1 + x(i)^2) ...
            + 4 / (1 + (x(i) + x(i+1))^2 / 4) + ...
            1 / (1 + x(i+1)^2));
    end
    vpa(s*4,15)
end
```

$n = 18$, 结果为3.14159265357156

$n = 50$, 结果为3.14159265358979

即Simpson公式只需要划分18个区间即可精确到10位,划分50个区间可以精确到15位

因此Simpson公式比梯形公式更精确。

4 实验任务4

4.1

用Monte Carlo法计算 π ,除了加大随机数,在随机数一定时可重复算若干次后求平均值,看能否求得5位精确数字?

Monte Carlo方法:

MATLAB代码(每次撒 k 个点, 运行 n 次求平均):

```
function task4_1(k, n) %rand k points, n test average
    sum = 0; a = zeros(n);
    for i = 1:n
        a(i) = monteCalPi( k );
        sum = sum + a(i);
    end
    vpa(sum / n, 10)
end
function y = monteCalPi( k )
    m = 0;
    for n = 1:k
        if rand(1)^2 + rand(1)^2 <= 1
            m = m + 1;
        end;
    end
    y = 4 * m / k;
end
```

取 $k = 10000, n = 10000$ 时,算出 $\pi = 3.14157176$

模拟Buffon实验:

模拟方法: 将针看作长为 l 的线段, 随机确定中点到平行线的距离 x 和针与平行线的夹角 α ,再判断相交

MATLAB代码(平行线间距 d , 针长 $l(l \leq d)$, m 次投针):

```

function task4_2( l, d, m )
    n = 0;
    for k = 1:m
        x = unifrnd(0, d/2);
        alpha = unifrnd(0, pi);
        if x < 0.5 * l * sin(alpha)
            n = n+1;
        end
    end
    y = 2 * l / d * m / n;
    vpa(y, 10)
end

```

取 $l = 10, d = 20, m = 10000$, 得 $\pi = 3.143665514$

实验证明, 随机算法通常难以保证精度, 并且计算结果的误差时大时小

5 实验任务5

利用积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2}, \quad n \text{ 为奇数}$$

推导公式

$$\frac{\pi}{2} = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdots \frac{2n}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n+1}$$

用此公式计算的近似值, 效果如何?

证明:

$$\because x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \text{ 时, } 0 < \sin x < 1$$

$$\therefore \forall n \in \mathbf{N}^*, \sin^{2n+1} x < \sin^{2n} x < \sin^{2n-1} x$$

$$\therefore \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n-1} x dx$$

由分部积分, 得

$$\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} < \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2} < \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!}$$

变形, 得

$$\left(\frac{2n}{2n+1}\right) \frac{\pi}{2} < \frac{((2n)!!)^2}{(2n+1)((2n-1)!!)^2} < \frac{\pi}{2}$$

由夹逼定理

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{2 \cdot 4 \cdots (2n)}{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)} \right) = \frac{\pi}{2}$$

整理之, 得

$$\frac{\pi}{2} = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdots \frac{2n}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n+1}$$

MATLAB代码:

```
function task5(n)
    prod = 1;
    for i=1:n
        prod = prod * ( 4 * i^2 ) / ( 4 * i^2 - 1 );
    end
    vpa(2 * prod,20)
end
```

当 $n = 1000000$ 时, $\pi = 3.141591868192467718$, 精确到小数点后5位
可知该方法精度较低

6 实验任务6

e 是一个重要的超越数

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$$

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{e^\theta}{(n+1)!}$$

还有

$$e = \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{k}{n^2} \right)^n$$

试用上述公式或其他方法近似计算 e

使用公式 $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$

MATLAB代码:

```
function task6_1( n )  
    e = (1 + 1/n) ^ n;  
    vpa(e, 50)  
end
```

取 $n = 10000$ 时, 得 $e = 2.718145927$, 精确到小数点后3位.

使用公式 $e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{e^\theta}{(n+1)!}$

MATLAB代码:

```
function task6_2( n )  
    e = sym(1);  
    temp = 1;  
    for i = 1:n  
        temp = temp * i;  
        e = e + sym(1 / temp);  
    end  
    vpa(e, 10)  
end
```

取 $n = 10$, 得 $e = 2.718281801$, 可以精确到小数点后7位
对比可知, 级数法精度更高.

7 总结

本文通过多种方法求 π , 每种方法精确性各有不同
对于利用级数或连乘的方法中, Machin公式精度最高
对于使用数值积分的方法, Simpson公式精度最高
对于使用随机算法的方法, 精度都比较低, 且误差难以控制
本文还对 e 进行求值, 得知级数法精度最高

8 分工

李青林: 负责实验1,2,3,5和报告编写
郑辉煌: 负责实验4,5,6