

## ZGODA PACJENTA NA ZABIEG PO UZYSKANIU INFORMACJI

(wejdzie w skład dokumentacji)

<i>Imię, nazwisko pacjenta:</i>		<i>Data urodzenia:</i>
<i>Lekarz odpowiedzialny za pouczenie pacjenta:</i>		
<i>Miejsce pracy/ oddział:</i>		

<b><i>Pouczenie pacjenta dotyczące zabiegu:</i></b>	<b>Kaniulacja systemu żył centralnych</b>
<i>Cel przeprowadzenia zabiegu (indykacja):</i>	Kaniulacja systemu żył centralnych oznacza zapewnienie dostępu do obiegu krwi, jednak w celu zaaplikowania infuzji i leków, wraz z roztworami hiperosmolarnymi, których nie można podać do żylnego systemu peryferyjnego, jednak w celu obserwacji centralnego ciśnienia w żyłach, które nas informuje o stanie hydratacji (nawodnienia) organizmu.
<i>Przebieg zabiegu:</i>	Po dezynfekcji miejsca wkłucia aplikuje się podskórnie środek znieczulający z miejscowym (lokalnym) uczynkiem. Następnie igłę wprowadza się do v. jugularis (szyjne naczynie krwionośne) lub do v. subclavia (naczynie krwionośne pod obojczykiem), lub do v. femoralis (naczynie krwionośne na udzie). Z pomocą igły zostanie wprowadzony do żyły przewód, a poprzez przewód plastikowy wężyk (kaniula), i z kolei cienka plastikowa rureczka. Kaniula zostanie przyszyta do skóry, by nie doszło do jej przesunięcia.
<i>Ewentualne komplikacje (ograniczenia):</i>	<p><b>Możliwe komplikacje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Odma opłucnej: wessanie powietrza do jamy klatki piersiowej z następstwem ucisku płuca i pogorszeniem oddychania. Komplikację rozwiązuje się wprowadzeniem drenu do klatki piersiowej i aktywnym wyssaniem powietrza z jamy klatki piersiowej.</li> <li>▪ Krwiak (hematom) w okolicy miejsca wkłucia, usunięcie rozwiązuje się zastosowaniem lodowania i maści, które pomagają przy wchłonięciu krwiaka.</li> <li>▪ Nakłucie tętnicy, która znajduje się bezpośrednio przy żyły, co przejawia się wielkim krwiakiem podskórnym i możliwym krwiakiem opłucnej ( luźna krew w jamie klatki piersiowej). Komplikację tego typu rozwiązuje się zastosowaniem drenażu wprowadzonego do klatki piersiowej i odsysaniem ciekłej treści.</li> <li>▪ Po wprowadzeniu kaniuli do systemu żył centralnych wykonuje się rentgen płuc dla kontroli wprowadzenia kateteru a równocześnie wykluczenia komplikacji (odma płuc). Wprowadzenie kaniuli do systemu żył centralnych nie wymaga żadnych zarządzeń reżymowych, wystarczy przebywanie w łóżku w czasie aplikacji infuzji.</li> </ul>

**KANIULACJA SYSTEMU ŻYL CENTRALNYCH**

<i>Zgoda pacjenta z wykonaniem zabiegu medycznego:</i>	<p>Ja, pacjent (pełnomocnik ustawowy) oświadczam, że zostałem(am) jasną, dla mnie zrozumiałą formą poinformowany(a) o przebiegu leczenia. Oświadczam, że wszystkie informacje są dla mnie jasne i zrozumiałe, jestem zaznajomiony(a) z przebiegiem i komplikacjami związanymi z zabiegiem. Umożliwiono mi też kłaść pytania i prowadzić dyskusję z lekarzem na temat tej problematyki.</p> <p><b>Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kaniulacji systemu żył centralnych.</b></p>
<i>Data:</i>	
<i>Podpis pacjenta (pełnomocnika ustawowego):</i>	
<i>Podpis lekarza:</i>	