

## INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S VÝKONEM

(stává se součástí dokumentace)

Jméno, příjmení pacienta:		Datum narození:
Lékař zodpovědný za poučení pacienta:		
Pracoviště /oddělení:		

<b>Poučení pacienta o výkonu:</b>	<b>Totální endoprotéza metatarso-phalangeálního kloubu palce (MTP kloub)</b>
Účel provedení výkonu /indikace/:	Účelem tohoto zdravotního výkonu je implantovat do MTP kloubu všechny komponenty endoprotézy tak, abychom dosáhli příznivé pooperační funkce tohoto kloubu .
Provedení výkonu:	<p>V epidurální či jiné anestezii se provede řez nad MTP kloubem a bude přes podkoží kloubní pouzdro proniknuto k MTP kloubu. Pak se odstraní část kloubní plochy z prvního metatarsu a část kloubní plochy z prvního článku palce, podle daných parametrů a zavede se do dutiny obou kostí v podstatě náhražka hlavičky (krátký dřík) do metatarsu a jamky (podobný implantát do prvního článku palce). Mezi tyto komponenty se vsune polyetylenová vložka a celý systém se vybalancuje tak, aby hybnost v MTP kloubu byla volná. Může se použít i kostní štěp z kostní banky, který slouží ke krytí defektů v kostní tkáni a dále jako biologický materiál k lepšímu hojení.</p> <p>Operace bude dále pokračovat rekonstrukcí kloubního pouzdra, dále se zavede redonův drén k odsávání krvavé tekutiny, která se může tvořit po operačním výkonu. Operace bude ukončena zašitím jednotlivých vrstev operační rány a přiložením sterilního krytí. Operovaná končetina může být bezprostředně po operaci uložena na braunově dlaze.</p>
Možné komplikace /omezení/:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Porucha hojení rány;</li> <li>▪ Pooperační infekce rány;</li> <li>▪ Pooperační infekce kloubu;</li> <li>▪ Hluboká žilní tromboza a plicní embolie;</li> <li>▪ Poranění nervových struktur;</li> <li>▪ Hojení rány nadměrnou jizvou (keloid);</li> <li>▪ Pooperační hematom a otok.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti bude záviset na typu výkonu a na eventuálním výskytu pooperačních komplikací;</li> <li>▪ Možná fixace operované končetiny po dobu třech týdnů po operaci sádrovou dlahou nebo v ortéze;</li> <li>▪ Během hospitalizace zahájení rehabilitace pod vedením fyzioterapeuta;</li> <li>▪ Odstranění stehů z rány 12-14. den;</li> <li>▪ Do vytažení stehů relativní šetření operované nohy, pak postupně větší zátěž a pokračování v rehabilitaci po vedením fyzioterapeuta. Celkové léčení 8-12 týdnů.</li> </ul>

<i>Vyslovení souhlasu pacienta s provedením zdravotního výkonu:</i>	<p>Já pacient (zákonný zástupce) prohlašuji, že jsem byl(a) jasnou a mně srozumitelnou formou informován(a) o léčebném postupu. Prohlašuji, že jsem všem informacím jasně porozuměl(a), jsem obeznámen(a) s postupem i komplikacemi výkonu. Rovněž mi bylo umožněno klást otázky a diskutovat s lékařem o této problematice.</p> <p><b>S provedením totální endoprotézy metatarso-phalangeálního kloubu souhlasím.</b></p> <p>Současně prohlašuji, že v případě výskytu neočekávaných komplikací, vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně mého života nebo zdraví souhlasím s tím, aby byly provedeny další potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně mého života nebo zdraví.</p>
<i>Datum:</i>	
<i>Podpis pacienta /zákonného zástupce/:</i>	
<i>Podpis lékaře:</i>	

Souhlasím, aby během poskytování zdravotní péče byli přítomni i zdravotničtí pracovníci, kteří nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněni a taktéž odborní pracovníci výrobců a distributorů prostředků zdravotnické techniky.

.....  
podpis pacienta