

POUČENÍ PRO RODIČE DÍTĚTE PODSTUPUJÍCÍHO VYŠETŘENÍ V CELKOVÉM ZNECITLIVĚNÍ

(stává se součástí dokumentace)

<i>Jméno, příjmení dítěte::</i>		<i>Datum narození:</i>
<i>Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte:</i>		
<i>Pracoviště /oddělení:</i>	Anesteziologická ambulance KHN a.s.	

	<p style="text-align: center;">Vážení rodiče,</p> <p>ošetřující lékař doporučil vyšetření Vašeho dítěte pomocí magnetické rezonance (dále MR) nebo počítačové (computerové) tomografie (dále CT). CT i MR jsou vyšetření nebolestivá, některými dětmi však špatně tolerovaná. Především nutnost pobytu v omezeném prostoru, požadavek ležet v průběhu vyšetření bez hnutí, nepřítomnost další osoby, jakož i průvodní hluk, mohou být pro některé děti nepřekonatelnou překážkou, pokud by byli vyšetřeni při plném vědomí. V těchto případech podstupují děti vyšetření CT nebo MR v celkovém znecitlivění - celkové anestézii, sedaci či analgosedaci, které zajišťuje odborný lékař - anesteziolog.</p> <p>Je naším zájmem, aby plánované vyšetření Vašeho dítěte v celkovém znecitlivění proběhlo bez jakýchkoliv rušivých příhod, proto Vás žádáme, abyste si pozorně přečetli níže uvedené pokyny a řídili se jimi. V případě výskytu jakýchkoliv nejasností, týkajících se nutné přípravy Vašeho dítěte před celkovým znecitlivěním, kontaktujte, prosím, anesteziologickou ambulanci Karvinské hornické nemocnice a.s., telefon <u>596 380 606</u>.</p> <p>Přečtěte si také, prosím, tiskopis „Informovaný souhlas s celkovým znecitlivěním k provedení vyšetření magnetickou rezonancí nebo počítačovým tomografem u dítěte“. Vámi – zákonnými zástupci dítěte - podepsaný tiskopis bude vyžadován společně s předoperačním pediatrickým vyšetřením před podáním celkového znecitlivění.</p>
<i>Pokyny pro rodiče – nutné úkony před podáním celkového znecitlivění dítěti</i>	<p>Před podáním celkového znecitlivění je nutno, aby bylo Vaše dítě prohlédnuto pediatrem, který jej sleduje. Písemné zhodnocení zdravotního stavu Vašeho dítěte, které Vám pediatr vystaví, a které nesmí být starší než 1 týden, bude vyžadováno anesteziologem před podáním celkového znecitlivění.</p> <p>Odborný lékař, který vyšetření pomocí CT nebo MR doporučil, zajistí nutnou přípravu Vašeho dítěte před vyšetřením a odborný dohled po nezbytně nutnou dobu po vyšetření. Z tohoto důvodu je nutno počítat s krátkou hospitalizací na dětském oddělení.</p> <p>V den vyšetření CT nebo MR v celkovém znecitlivění musí být dítě lačné –</p>

POUČENÍ PRO RODIČE DÍTĚTE PODSTUPUJÍCÍHO VYŠETŘENÍ V CELKOVÉM ZNECITLIVĚNÍ

	<p><u>poslední lehké jídlo</u> smí jíst nejpozději o půlnoci před vyšetřením. Po půlnoci se může napít vody či čaje (i oslazených), a to naposledy ve 4:00 hod. ráno. <u>Nesmí pít zejména mléko, kakao, „bublínkové“, vody, kolu a jiné limonády, džusy, kávu s mlékem.</u></p> <p>V případě, že Vaše dítě užívá pravidelně nějaké léky (včetně inzulínu), postupujte dle doporučení příslušného odborného lékaře nebo pediatra.</p>
Informace o rizicích celkové anestézie:	<p>Moderní celková anestetika – léky, které jsou užívány k navození celkového znecitlivění – jsou v dnešní době již velmi bezpečná, s minimem nežádoucích účinků. Žádný lékařský zákrok – tedy ani podání celkového znecitlivění k plánovanému vyšetření - není ovšem zcela bez rizik. V dalším textu jsou vyjmenovány nejčastěji se vyskytující možné komplikace. Naprostá většina z nich – označujeme je jako „běžné“ – neznamenají pro Vaše dítě ohrožení jeho zdraví, ale je žádoucí, abyste byli o nich informováni. Některé komplikace, byť se vyskytují zcela výjimečně, mohou znamenat možné ohrožení zdraví nebo života Vašeho dítěte. Tyto komplikace si mohou z důvodů nutnosti sledování Vašeho dítěte odborným personálem vyžádat jeho delší pobyt na nemocničním lůžku. Toto riziko je ovšem u zdravých dětí při dodržení všech pokynů velice malé. Pokud Vaše dítě prodělalo vážnější onemocnění, nebo je dlouhodobě léčeno či sledováno pro nějakou chorobu, upozorněte na tuto skutečnost lékaře, který vyšetření Vašeho dítěte MR nebo CT doporučil, jakož i anesteziologa, který bude celkové znecitlivění Vašemu dítěti podávat.</p>
Možné komplikace běžné:	<p>Ospalost, malátnost, zhoršení koordinace pohybů (může přetrvávat až <u>24 hodin</u> po podání celkového znecitlivění) – po tuto dobu je <u>nutný nepřetržitý dohled dospělou osobou</u>, neboť je zvýšené riziko úrazů.</p> <p>V některých případech je zapotřebí zavést do průdušnice rourku k zajištění průchodnosti dýchacích cest. Tato je před probuzením odstraněna, ale po dobu několika dnů může přetrvávat pocit škrábání či mírná bolestivost v krku – tyto pocity postupně odezní.</p> <p>Mírná bolestivost a „modřina“ v místě, kde byla zavedena žilní kanyla (plastová „jehla“, která umožňuje nepřetržitý přístup do žilního řečiště a slouží k podávání preparátů navozujících celkové znecitlivění a nezbytných léků) – většinou na horní končetině – možné je chlazení místa vpichu studenými obklady, většinou však problémy během několika dní vymizí samovolně.</p>
Možné komplikace vzácnější:	<p>Nevolnost, pobolívání hlavy, psychická rozlada.</p> <p>V případě nutnosti zavedení rourky do průdušnice může, zejména u kývajících se zubů, dojít k jejich dalšímu uvolnění.</p>
Možné komplikace vzácné, ale závažné:	<p>Chrapot, pískavé až ztížené dýchání – mohou být příznaky otoku či zánětu v dýchacích cestách. Tato komplikace je důvodem k prodlouženému pobytu Vašeho dítěte v nemocnici. Pokud je dítě již doma, je důvodem k <u>okamžité lékařské kontrole – kontaktujte Rychlou lékařskou pomoc (155).</u></p> <p>Ostatní komplikace, včetně vážných, jsou velice vzácné.</p>

POUČENÍ PRO RODIČE DÍTĚTE PODSTUPUJÍCÍHO VYŠETŘENÍ V CELKOVÉM ZNECITLIVĚNÍ

	<p>Před začátkem vyšetření budete mít možnost hovořit s lékařem, který celkové znecitlivění Vašemu dítěti bude podávat. Tento Vás podrobně seznámí s vybraným způsobem celkového znecitlivění. Zároveň Vás bude informovat o případných možných komplikacích a zodpoví Vám na všechny Vaše případné dotazy.</p>
<i>V období po vyšetření:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zajistěte si předem dopravu domů - dospělá osoba, doprovázející dítě, by neměla zároveň řídit motorové vozidlo; ▪ Zajistěte si telefonické spojení z domova a možnost dopravy do nemocnice; ▪ Po návratu z nemocnice by dítě mělo zůstat doma, odpočívat, vyhýbat se činnostem, které vyžadují zvýšenou pozornost (jízda na kole, průlezký), jíst jen malé porce lehkých jídel; ▪ Pokračujte v podávání všech léků, které Vaše dítě dlouhodobě užívá; ▪ Po dobu 24 hodin od podání celkového znecitlivění by Vaše dítě nemělo nejezdit bez doprovodu dospělou osobou prostředky hromadné dopravy.
<i>Důležité upozornění:</i>	<p>Jakákoliv změna zdravotního stavu Vašeho dítěte, ke které dojde <u>v období 3 týdnů</u> před plánovaným termínem vyšetření, může být důvodem k tomu, že celkové znecitlivění nebude možno podat. Jedná se především o zvýšené teploty neznámého původu, zhoršení dlouhodobě léčených chorob (astmatický záchvat, zvýraznění léčené alergie, atd.). <u>Zcela nepřipustné pro podání celkového znecitlivění je přítomnost infekce horních cest dýchacích (rýma, chřipka, angína, atd.).</u> Při jakýchkoliv pochybnostech ohledně zdravotního stavu Vašeho dítěte kontaktujte lékaře, který vyšetření CT nebo MR doporučil, pediatra, event. anesteziologickou ambulanci Karvinské hornické nemocnice a.s. (<u>596 380 606</u> - v pracovních dnech od 10:00 do 14:00 hod.).</p>
<i>Prohlášení zákonného zástupce dítěte:</i>	<p>Stvrzuji svým podpisem, že jsem porozuměl(a) výše uvedeným pokynům a budu se jimi v období před i po vyšetření v celkovém znecitlivění řídit.</p> <p><i>(Dokument má tři strany, existují dvě identické kopie, jedna se stává součástí klientovy dokumentace, druhá zůstává ve vlastnictví zákonného zástupce dítěte.)</i></p>
<i>Datum:</i>	
<i>Podpis zákonného zástupce dítěte:</i>	