

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S VÝKONEM

(stává se součástí dokumentace)

Jméno, příjmení pacienta:		Datum narození:
Lékař zodpovědný za poučení pacienta:		
Pracoviště /oddělení:		

Poučení pacienta o výkonu:	Operace laterální (zevní) epikondylitidy (tenisový loket) Operace mediální (vnitřní) epikondylitidy (golfový loket)
Účel provedení výkonu /indikace /:	Účelem tohoto zdravotního výkonu je uvolnění, odstranění či posunutí bolestivého a zánětem drážděného úponu svalů na zevní nebo vnitřní straně loketního kloubu.
Provedení výkonu:	Ve svodné (pouze operovaná končetina) nebo celkové anestézii bude proveden podélný řez 6–8 cm dlouhý nad zevním (laterální epikondylitida) nebo vnitřním (mediální epikondylitida) kostním výběžkem pažní kosti v oblasti loketního kloubu. Dále bude následovat protěti podkoží až k postiženému úponu předloketních svalů. Samotný výkon potom bude obnášet odstranění postiženého úponu s částí kostního výběžku, přesunutí úponu směrem na předloktí a jeho fixace stehy. Takto bude odstraněn zdroj obtíží a dráždění na zevní nebo vnitřní části loketního kloubu. Výkon bude ukončen sešitím všech nutných vrstev operační rány stehy a dle nutnosti nasazením sádrové fixace (sádrová dlaha).
Možné komplikace /omezení/:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Poškození drobných nervů v oblasti operačního přístupu s následnými poruchami citlivosti v operované oblasti; ▪ U operace mediální (vnitřní) epikondylitidy poškození ulnárního (loketního nervu) v jeho průběhu žlábkem na vnitřní straně loketního kloubu s možnou nutností operace daného nervu (vzácně); ▪ Poškození cév v oblasti operačního přístupu s následnou nutností stavění krvácení, tvorbou pooperačního podkožního hematomu a zvýšeným otokem operované oblasti; ▪ Porucha hojení rány; ▪ Pooperační infekce rány; ▪ Pooperační dlouhodobá bolestivost a zvýšená citlivost jizvy; ▪ Dlouhodobé oslabení svalové síly operovaných svalů. <p>Po provedení uvedeného zdravotního výkonu doporučena:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sádrová fixace lokte po dobu 2–4 týdnů od operace; ▪ Následně ambulantní rehabilitace; ▪ Možnost plné zátěže za 8–10 týdnů od operace.

Informovaný souhlas pacienta s výkonem

– OPERACE LATERÁLNÍ (ZEVNÍ) EPIKONDYLITIDY (TENISOVÝ LOKET)

– OPERACE MEDIÁLNÍ (VNITŘNÍ) EPIKONDYLITIDY (GOLFOVÝ LOKET)

strana 2

<i>Vyslovení souhlasu pacienta s provedením zdravotního výkonu:</i>	<p>Já pacient (zákonný zástupce) prohlašuji, že jsem byl(a) jasnou a mně srozumitelnou formou informován(a) o léčebném postupu. Prohlašuji, že jsem všem informacím jasně porozuměl(a), jsem obeznámen(a) s postupem i komplikacemi výkonu. Rovněž mi bylo umožněno klást otázky a diskutovat s lékařem o této problematice.</p> <p>S provedením operace laterální (zevní) epikondylitidy (tenisový loket) - - operace mediální (vnitřní) epikondylitidy (golfový loket) souhlasím.</p> <p>Současně prohlašuji, že v případě výskytu neočekávaných komplikací, vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně mého života nebo zdraví souhlasím s tím, aby byly provedeny další potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně mého života nebo zdraví.</p>
<i>Datum:</i>	
<i>Podpis pacienta /zákonného zástupce/:</i>	
<i>Podpis lékaře:</i>	

Souhlasím, aby během poskytování zdravotní péče byli přítomni i zdravotničtí pracovníci, kteří nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněni a taktéž odborní pracovníci výrobců a distributorů prostředků zdravotnické techniky.

.....
podpis pacienta