



## INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S VÝKONEM

(stává se součástí dokumentace)

Jméno, příjmení pacienta:		Datum narození:
Lékař zodpovědný za poučení pacienta:		
Pracoviště /oddělení:		

<b>Poučení pacienta o výkonu:</b>	<b>Kaudální tlaková blokáda</b>
Účel provedení výkonu /indikace/:	Jedná se o určitý druh opichu, při kterém je do dolní části kanálu páteřního vpravena směs látek, které by měly zmírnit bolesti, a to na delší dobu – až několik týdnů. Výkon se nejčastěji provádí u pacientů s déletrvajícím bolestí pramenící z útlaku nervových struktur vyhlázkou ploténkou (hernií) nebo u pacientů po operacích v dolní části páteře, u kterých bolesti trvají i po operaci. Tento opich může být proveden téměř u všech, výjimku tvoří pacienti, kteří jsou léčeni léky proti krevní srážlivosti („ředění krve“) a pacienti s alergií na určité látky.
Provedení výkonu:	<p>Samotný výkon se provádí následovně: vleže na břiše s vypodloženou pánevní oblastí si lékař nahmatá místo vpichu – jedná se o drobný kanál v dolní části křížové kosti, mezi ní a kostrčí - „mezi půlkama“ (<b>obr. 1</b>).</p>  <p>Obr. 1: křížkem je znázorněno místo vpichu</p> <p>Provede se pečlivá desinfekce okolí a poté <b>místní umrtvení</b> vpichem znecitlivující látky (anestetika) pod kůži. Až začne látka působit, provede lékař vpich další, tentokrát byste jej už neměl(a) cítit. Tímto vpichem delší tenkou jehlou lékař nalezne zmíněný otvor a jím pronikne až dovnitř tzv. <b>sakrálního kanálu</b> (poměrně objemná dutina uvnitř kosti křížové, která souvisí s kanálem páteřním, kde se nacházejí nervové struktury, které chceme znecitlivit (<b>obr. 2</b>). Do zmíněného prostoru pak bude vpravena účinná látka – toto budete pociťovat jako tlak v křížové oblasti. Aplikaci látky a vytažením jehly je celý výkon ukončen.</p>

<i>Provedení výkonu /pokračování/:</i>	 <p>Obr. 2: zavedení jehličky do sakrálního kanálu (vysvětlení výše)</p>
<i>Možné komplikace /omezení/:</i>	<p>Jakýchkoli lékařský zákrok skýtá určité možnosti komplikací. V případě kaudálních blokád jsou nicméně <b>velmi vzácné</b>. Hrozí zavlečení infekce, přechodné zvýraznění bolesti v dolní části zad, bolesti v místě vpichu.</p> <p>Po opichu doporučujeme ještě asi půlhodinu setrvat na lůžku v poloze vleže. Efekt této injekce nebude okamžitý – nástup účinku bude <b>několikahodinový až několikadenní</b>.</p>

<i>Vyslovení souhlasu pacienta s provedením zdravotního výkonu:</i>	<p>Já pacient (zákonný zástupce) prohlašuji, že jsem byl(a) jasnou a mně srozumitelnou formou informován(a) o léčebném postupu. Prohlašuji, že jsem všem informacím jasně porozuměl(a), jsem obeznámen(a) s postupem i komplikacemi výkonu. Rovněž mi bylo umožněno klást otázky a diskutovat s lékařem o této problematice.</p> <p><b>S provedením kaudální tlakové blokády souhlasím.</b></p>
<i>Datum:</i>	
<i>Podpis pacienta /zákonného zástupce/:</i>	
<i>Podpis lékaře:</i>	