

ІНФОРМОВАНА ЗГОДА ПАЦІЄНТА НА ПРОЦЕДУРУ

(стає складовою частиною документації)

Ім'я, прізвище пацієнта:		Дата народження:
Лікар, що відповідає за інформування пацієнта:		
Кабінет/відділення:		

Інформація для пацієнта щодо процедури:	Канюляція центральної венозної системи
Мета проведення процедури /показання/:	Канюляція центральної венозної системи означає забезпечення доступу до кровотоку – з одного боку, для внутрішньовенного введення розчинів і лікарських засобів, зокрема гіперосмолярних розчинів, які не можна вводити в периферичну венозну систему, з іншого боку, для контролю центрального венозного тиску, який інформує нас про стан гідратації (забезпечення водою) організму.
Проведення процедури:	Після дезінфекції місця ін'єкції в підшкірну клітковину вводять анестетик місцевої (локальної) дії. Потім канюляційну голку вводять у v. jugularis (судина на шиї) або у v. subclavia (судина під ключицею), або у v. femoralis (судина на стегні). Через голку до вени вводять провідник, по провіднику – пластикову трубку (канюлю), а далі – тонку пластикову трубку. Цю канюлю пришивають до шкіри, щоб не сталося її зміщення.
Можливі ускладнення /обмеження/:	<p><u>Можливі ускладнення:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Пневмоторакс: потрапляння повітря у плевральну порожнину з подальшим стисканням легені та порушенням дихання. Ускладнення лікується введенням дренажу в плевральну порожнину та активним відсмоктуванням з неї повітря; Гематома (крововилив) у місці ін'єкції, яку лікують за допомогою прикладання холоду та мазей, що сприяють розсмоктуванню гематоми; Прокол артерії, розташованої безпосередньо біля вени, що проявляється великою гематомою у підшкірній клітковині та можливим гемотораксом (вільна кров у в плевральній порожнині). Ускладнення у вигляді гемотораксу усувається шляхом введення дренажу до плевральної порожнини та відсмоктування з неї рідкого вмісту; Після введення канюлі до центральної венозної системи проводять рентгенографію легенів для перевірки введення катетера, а також для виключення ускладнення (пневмотораксу). Введення канюлі до центральної венозної системи не потребує жодних режимних заходів, лише перебування в ліжку під час інфузії.

- КАНЮЛЯЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВЕНОЗНОЇ СИСТЕМИ

<i>Згода пацієнта на проведення медичної процедури:</i>	<p>Я, пацієнт (законний представник), заявляю, що був (-ла) в чіткій і зрозумілій для мене формі поінформований (-а) про медичну процедуру. Заявляю, що я добре зрозумів (-ла) всю інформацію, ознайомлений (-а) з процедурою та ускладненнями процедури. Мені також була надана можливість поставити запитання та обговорити з лікарем цю проблематику.</p> <p>Даю згоду на канюляцію центральної венозної системи.</p>
<i>Дата:</i>	
<i>Підпис пацієнта /законного представника/:</i>	
<i>Підпис лікаря:</i>	