

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S VÝKONEM

(stává se součástí dokumentace)		
Jméno, příjmení	Datum narození:	
pacienta:		
Lékař zodpovědný		
za poučení pacienta:		
Pracoviště /oddělení:		

Poučení pacienta o výkonu:	Dočasná kardiostimulace
Účel provedení výkonu /indikace/:	Trpíte závažnou poruchou vedení vzruchu v srdečních dutinách, která je nasledována většinou poklesem krevního tlaku a s tím souvisejícím sníženým prokrvením životně důležitých orgánů. Tento stav vyžaduje zavedení dočasné stimulační elektrody do pravé komory srdeční. Vnitřní konec elektrody je zaklíněn v hrotu pravé komory, vnější konec je napojen na kardiostimulátor, který vytváří elektrické impulsy pro vaše srdce. Kardiostimulátor zůstává mimo tělo pacienta, po nezbytně nutnou dobu nahrazuje funkci centra automatického vytváření elektrické aktivity ve vašem srdci. Po odeznění poruchy vedení vzruchu se kardiostimulační elektroda odstraní. Přetrvává-li porucha delší dobu, je nezbytné zavést trvalý kardiostimulátor.
Provedení výkonu:	V místním znecitlivění se provede širší jehlou vpich do podklíčkové nebo jugulární žíly, přes kterou se zavede tenký drátek (zavaděč). Po zavaděči se nasune do žíly tenké pouzdro, přes které se zasune vlastní kardiostimulační elektroda. Tento výkon se provádí na JIP.
Možné komplikace /omezení/:	 Alergie na podané anestetikum či desinfekční prostředek, která se projevuje od drobných kožních reakcí se svěděním a vyrážkou až po šokový stav; Krvácení z místa vpichu do podkoží (hematom) nebo dutiny hrudní s následným utlačením plíce, poranění dutiny hrudní nebo samotné plíce s následným únikem vzduchu do hrudní dutiny a kolapsem plíce (pneumothorax); Možnou komplikací je vzduchová embolie (ucpání plícní cévy bublinou vzduchu) nebo poranění nervové pleteně v oblasti ramene; Závažné poruchy srdečního rytmu, nejčastěji při dotyku elektrody se srdeční svalovinou; Infekční komplikace - jednak kožní v místě vpichu, jednak celkové zanesením infekce do těla prostřednictvím infikovaného katetru (katetrová sepse s teplotou, zimnicí, třesavkou); Protržení srdečního svalu elektrodou a její vycestování do osrdečníku.
Léčba komplikací:	 Léčba alergické reakce je prostřednictvím léků; Zástava krvácení se děje kompresí místa vpichu; Zakrvácení do dutiny hrudní nebo pneumothorax se odstraňuje zavedením drénu do dutiny hrudní a odsátím obsahu dutiny hrudní (krev, vzduch), který způsobuje útlak plíce; Infekční komplikace se léčí antibiotiky.

Revize: duben 2020

Vyslovení souhlasu pacienta s provedením zdravotního výkonu:	Já pacient (zákonný zástupce) prohlašuji, že jsem byl(a) jasnou a mně srozumitelnou formou informován(a) o léčebném postupu. Prohlašuji, že jsem všem informacím jasně porozuměl(a), jsem obeznámen(a) s postupem i komplikacemi výkonu. Rovněž mi bylo umožněno klást otázky a diskutovat s lékařem o této problematice. S provedením dočasné kardiostimulace souhlasím. Současně prohlašuji, že v případě výskytu neočekávaných komplikací, vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně mého života nebo zdraví souhlasím s tím, aby byly provedeny další potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně mého života nebo zdraví.
Datum:	
Podpis pacienta /zákonného zástupce/:	
Podpis lékaře:	

Revize: duben 2020