

### 1.3 Zvýšení bezpečí u rizikových léků

<b>Zpracoval:</b>	<b>Schválil:</b>	<b>Platnost standardu od:</b>
<b>Bc. Taťána Bělicová</b>	<b>Rada kvality</b>	<b>1. 1. 2018</b>

<b>Identifikace výtisku:</b>	Výtisk jediný – originál (výtisk z elektronické podoby má pouze informativní charakter)		
<b>Poslední revize:</b> č. 1      12/2019	<b>Důvod revize:</b> úprava textu a přílohy standardu – seznam léků, jejichž názvy a balení vypadají nebo znějí podobně, byl vytipován pro injekční formu léků	<b>Přezkoumal:</b> Bc. Taťána Bělicová	<b>Účinnost:</b> <b>20. 2. 2020</b>
<b>Poslední revize:</b> č. 2      2/2022	<b>Důvod revize:</b> periodická – beze změny	<b>Přezkoumal:</b> Bc. Taťána Bělicová	-
<b>Poslední revize:</b>	<b>Důvod revize:</b>		
<b>Poslední revize:</b>	<b>Důvod revize:</b>		
<b>Poslední revize:</b>	<b>Důvod revize:</b>		
<b>Poslední revize:</b>	<b>Důvod revize:</b>		
<b>Poslední revize:</b>	<b>Důvod revize:</b>		
<b>Poslední revize:</b>	<b>Důvod revize:</b>		
<b>Poslední revize:</b>	<b>Důvod revize:</b>		
<b>Poslední revize:</b>	<b>Důvod revize:</b>		

### Účel a naplnění standardu

Vysoce rizikové léky jsou léčiva s vysokým rizikem poškození pacienta při nesprávném podání. Léčivé přípravky jsou vždy uchovávány v originálních obalech v uzamčených příručních lékárnách.

KHN a.s. považuje za rizikové léky:

- inzulíny,
- neředěné hepariny,
- koncentrované infuzní a injekční roztoky KCL 7,45 % a vyšší,
- NaHCO<sub>3</sub>,
- 10% NaCl,
- 40% glukóza.

Pokud je na některém oddělení mezi rizikové léky zařazen i jiný lék, musí být uveden v seznamu.

**Tyto rizikové léky jsou vždy skladovány odděleně od ostatních léčiv.**

Prostor, kde jsou rizikové léky skladovány, je viditelně označen nápisem „ Rizikové léky“ a zároveň je uveden seznam rizikových léků, které se na oddělení vyskytují.

Na odděleních, kde není nutností rizikové léky mít k dispozici, se tyto léky neskladují.

Za riziková jsou rovněž považována vytipovaná léčiva v injekční formě, která mají podobný název či podobné balení a případná záměna by pro pacienta představovala poškození zdraví či smrt. Z preventivních důvodů poškození zdraví pacienta je vypracován seznam těchto rizikových léčiv používaných v KHN (viz příloha standardu). Tyto léky jsou před distribucí na oddělení označeny zaměstnanci lékárny oranžovým čtverečkem. Aktualizace přílohy je prováděna 1x za kvartál a provádí ji zaměstnanec lékárny ve spolupráci se staničními sestrami.

**Při aplikaci těchto léků musí sestra věnovat zvýšenou pozornost při kontrole názvu léků a síly. Tyto léky musí být vždy uloženy v originální krabičce tak, aby vždy bylo viditelné označení oranžovým čtverečkem.**

Postup při objednávání a podávání léků je popsán v akreditačním standardu – 7. Skladování, předepisování a podávání léčiv.

Úklid a dezinfekce prostor pro skladování rizikových léků je shodný s úklidem lékárny, dle harmonogramu oddělení.