

1. Základní neodkladná resuscitace zahrnuje:	Celkem %	Celkem
A - Pouze přivolání resuscitačního týmu	0,9%	3
B - Oživovací pokusy s pomůckami	3,7%	12
C - Oživovací pokusy bez pomůcek vyjma AED (automatický externí defibrilátor)	95,4%	311
2. V jakém pořadí vyšetříme postiženého v případě kolapsu	Celkem %	Celkem
A - dýchání, vědomí, oběh	0,6%	2
B - vědomí, dýchání, oběh	96,6%	315
C - vědomí, oběh, dýchání	2,8%	9
3. Pacient leží na zemi, nereaguje na oslovení ani na bolestivý podnět, zprůchodníme dýchací cesty a ... (jednu s možností) sledujeme, jestli pacient dýchá:	Celkem %	Celkem
A - minimálně 10s	97,5%	318
B - méně než 3s	2,5%	8
C - minimálně 40s	0,0%	0
4. Zástavu oběhu diagnostikujeme:	Celkem %	Celkem
A - na základě nehmatného pulsu na a.radialis	13,2%	43
B - na základě natočené křivky EKG	0,3%	1
C - na základě bezvědomí a zástavy dechu	86,5%	282
5. Postižený náhle zkolaboval, leží, nereaguje na oslovení, lapavě dýchá /gaspings/. Je potřeba přivolat resuscitační tým a ihned:	Celkem %	Celkem
A - zahájit umělé dýchání	1,2%	4
B - otočit postiženého do zotavovací (stabilizované) polohy, protože hrozí riziko aspirace	3,4%	11
C - záklon hlavy, vytažení jazyka, ucpání nosních křídel	95,4%	311
6. Klapky pro přivolání nemocničních resuscitačních týmů jsou:	Celkem %	Celkem
A - 401 MO-JIP, 400 CNP-JIP	0,0%	0
B - 400 MO-JIP, 411 CNP-JIP	7,4%	24
C - 411 MO-JIP, 400 CNP-JIP	92,6%	302

7. Ke zprůchodnění dýchacích cest provedeme:	Celkem %	Celkem
A - předklon hlavy, pootevření úst	0,0%	0
B - záklon hlavy, pootevření úst	90,8%	296
C - záklon hlavy, vytažení jazyka, ucpání nosních křídel	9,2%	30
8. Základní neodkladnou resuscitaci v terénu do příjezdu RLP u DOSPĚLÝCH zahajujeme:	Celkem %	Celkem
A - uvolněním dýchacích cest, 2 umělými vdechy a nepřímou srdeční masáží	2,1%	7
B - uvolněním dýchacích cest, přímou srdeční masáží	1,5%	5
C - uvolněním dýchacích cest, nepřímou srdeční masáží a 2 umělými vdechy – v případě, že jsou k dispozici pomůcky k tomu určené	96,3%	314
9. Při základní neodkladné resuscitaci DOSPĚLÝCH bez pomůcek činí poměr kompresí hrudníku a umělých vdechů:	Celkem %	Celkem
A - 15:2	0,0%	0
B - 30:2	100,0%	326
C - 2:30	0,0%	0
10. Nepřímá srdeční masáž se provádí u dospělé osoby:	Celkem %	Celkem
A - na levé straně hrudníku	0,0%	0
B - v horní třetině hrudní kosti	0,9%	3
C - ve střední části hrudníku	99,1%	323
11. V případě maligní arytmie (porucha rytmu, která může vést k zástavě oběhu) může sestra provést defibrilační výboj bez indikace lékaře:	Celkem %	Celkem
A - po kontrole pulzace na velkých tepnách	1,2%	4
B - po předchozí kontrole srdečního rytmu a následném vytištění záznamu EKG křivky nebo při použití AED (automatický externí defibrilátor)	98,8%	322
C - na pokyn druhé sestry	0,0%	0
12. Frekvence stlačování hrudníku u nepřímé srdeční masáže je:	Celkem %	Celkem
A - 80 / min	0,0%	0
B - 100-120 / min	99,7%	325
C - 90 / min	0,3%	1

13. Hloubka stlačení hrudníku při nepřímé srdeční masáži je:	Celkem %	Celkem
A - 2-3 cm	0,0%	0
B - 5-6 cm	99,4%	324
C - 7-8 cm	0,6%	2
14. Mezi jasné známky smrti patří:	Celkem %	Celkem
A - Přítomnost hmyzu na těle postiženého	0,3%	1
B - Posmrtná ztuhlost, posmrtné skvrny, zranění neslučitelná se životem (dekapitace)	99,7%	325
C - Hnilobné změny na bérce, exoftalmus	0,0%	0